四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第一三三冊目次

太平惠民和劑局方十卷 （宋）陳師文等撰 指南總論三卷 （宋）許洪撰

增廣和劑局方圖經本草藥性總論一卷 元至元二十六年高氏日新堂刻本 〇〇一

世醫得效方二十卷 （元）危亦林撰 元至正五年陳志刻本（卷十九至二十配鈔本） 一五八

太平惠民和劑局方十卷

（宋）陳師文等撰

指南總論三卷

（宋）許洪撰

增廣和劑局方圖經本草藥性總論一卷

元至元二十六年高氏日新堂刻本

太平惠民和劑局方十卷、指南總論三卷、兩淮鹽政採進本

舊本題宋庫部郎中提轄措置藥局陳師文等奉敕編。案王應麟玉海云、大觀中、陳師文等校正和劑局方五卷、二百九十七道、二十一門。晁公武讀書志云、大觀中、詔通醫刊正藥局方書、閱歲書成、校正七百八字、增損七十餘方。又讀書後志曰、太醫局方十卷、元豐中、詔天下高手醫各以得效祕方進、下太醫局驗試、依方製藥鬻之、仍摹本傳於世。是大觀之本實因神宗時舊本重修、故公武有校正增損之語也。然此本止十四門、而方乃七百八十八。考玉海又載紹興十八年閏八月二十三日改熟藥所爲太平惠民局。二十一年十二月十七日以監本藥方頒諸路。此本以太平惠民爲名、是紹興所頒之監本、非大觀之舊矣。其中又有寶慶淳祐續添諸方、更在紹興之後。兼附用藥總論、指南三卷、皆從圖經本草鈔撮增入、亦不知何時所加。陳振孫書錄解題稱、和劑局方其後時有增補、殆指此類歟。戴良九靈山房集有丹溪翁朱震亨傳曰、時方盛行陳師文裴宗元所定大觀二百九十七方、翁窮晝夜是習、既而悟曰、操古方以治今病、其勢不能以盡合。苟將起度量、立規矩、稱權衡、必也素難諸經乎。又稱震亨得羅知悌之學以歸、諸醫泥陳裴之學者、聞其言、大驚而笑且排。及治許謙末疾良驗、笑且排者始皆心服。是此書盛行於宋元之間。至震亨局方發揮出、而醫學始一變也。又岳珂桯史曰、和劑局方乃當時精集諸家名方、凡幾經名醫之手、至提領以從官內臣參校、可謂精矣。然其間差訛者亦自不少。且以牛黃清心丸一方言之、凡用藥二十九味、寒熱訛雜、殊不可曉。嘗見一名醫云、此方祇前八味至蒲黃而止。自乾山藥以下凡二十一味、乃補虛門中山芋丸。當時不知緣何誤寫在此方之後、因循不曾改正。余因其說而考之、信然。如此之類、必多有之云云。是併不能無所舛誤矣。然歷代相傳專門禁方、多在是焉。在用者詳審而已。必因噎而廢食、則又一偏之見矣。

進表

昔神農嘗百草之味以救萬民之疾周官
設疾醫之政以掌萬民之病著在簡編為
萬世法我
宋勃興神聖相授咸以至仁厚德涵養生
類且謂札瘥薦臻四時代有救恤之術莫
先方書故自開寶以來屢敕近臣讎校本
草厥後纂次神醫普救刊行太平聖惠重
定鍼艾俞穴校正千金外臺又作慶曆善
救簡要濟衆等方以惠天下或範金揭石
或鏤板聯編是雖神農之用心成周之致
治無以過也天錫神考睿聖承統其好生
之德不特見於方論而已又設太醫局熟
藥所於京師其恤民瘼可謂勤矣
主上天縱深仁孝述前列爰自崇寧增置
柒局揭以和劑惠民之名俾夫修製給賣
各有攸司又設收買藥材所以革偽濫之
弊比 詔會府咸置藥局所以推廣祖考
之德澤可謂曲盡然自創局以來所有之
方或取於鬻藥之家或得於陳獻之士未

經參訂不無舛訛雖嘗鏤板頒行未免傳
疑承誤故有藥味脫漏銖兩過差製作多
不依經祖龔間有偽妄至於貼榜謬戾尤
多殆不可以一二舉也頃因條具上達
朝廷繼而被命遴選通醫俾之刊正於是
請書監之秘文採名賢之別錄公私衆本
搜獵靡遺事關所從無不研核或端本以
正末或泝流以尋源訂其訛謬折其淆亂
遺佚者補之重複者削之未閱歲而書成
繕寫甫畢謹獻于
朝將見合和者得十全之效飲餌者無纖
芥之疑須此成書惠及區宇遂使熙豐惠
民之美意崇觀述事之洪規本末巨細無
不畢陳納斯民於壽康召和氣於穹壤億
萬斯年傳之無極豈不韙歟

將仕郎措置藥局檢閱方書陳承
奉議郎守太醫令兼措置藥局檢閱方書裴宗元
朝奉郎守尚書庫部郎中提轄措置藥局陳師文謹上

○卷第一 諸風 附脚氣 ○卷第二 傷寒 附中暑
○卷第三 諸氣 附脾胃 積聚 ○卷第四 痰飲 附咳嗽
○卷第五 諸虛 附骨熱 痼冷 附消渴
○卷第六 積熱 瀉痢 附秘澁
○卷第七 眼目 咽喉口齒
○卷第八 雜病 瘡腫傷折
○卷第九 婦人 附産圖 ○卷第十 小兒 附諸湯 諸香
凡柒伯捌拾捌方
圖經本草 新增 用藥總論指南 三卷

太平惠民和劑局方總目

○卷之一

治諸風 附脚氣

至寶丹 靈寶丹 潤體圓
烏犀圓 牛黃清心圓 摩挲圓
透冰丹 龍腦天麻煎 牛黃小烏犀圓
婁金圓 龍虎丹 麝香天麻圓
龍腦芎犀圓 銀液丹 和太師牛黃圓
碧霞丹 雄朱圓 八風丹
牛黃生犀圓 辰砂天麻圓 青州白圓子
辰砂圓 牛黃金虎丹 防風圓
川芎圓 薄荷煎圓 天南星圓
犀角圓 皁角圓 小續命湯
防風湯 排風湯 大通聖白花蛇散、
消風散 羌活散 八風散、
清神散 虎骨散 骨碎補圓、
紹興續添方 烏荊圓 加減三五七散、
太陽丹 方見傷寒類 如聖餅子 方見一切氣類 沒藥降聖丹 方見傷折類
傷折類 乳香沒藥圓 白龍圓
七聖散、 活血應痛圓 四生散、
通關散 四斤圓 鐵彈圓
寶慶新增方 大聖一粒金丹 乳香應痛圓
省風湯 追風散 乳香圓
黑神圓 拒風丹 急風散、
淳祐新添方 三生飲 大醒風湯
五痺湯、 壽星圓 左經圓
吳直閣增諸家名方 活絡丹、 七生圓

川芎茶調散（見傷寒類）　乳香趁痛散　黑龍圓
驚氣圓、　乳香宣經圓、　換腿圓、

續添諸局經驗祕方
大聖保命丹　四生圓
輕脚圓　大防風湯、　經進地仙丹、
伏虎丹、　烏藥順氣散、　祕方換腿圓、
左經圓　木瓜圓　追風應痛圓、
磁石圓　胡麻散、　黑神圓
追風散　苦參圓

卷之二

治傷寒　附　中暑

人參敗毒散　小柴胡湯　林檎散
柴胡石膏散　麻黃湯　小青龍湯
聖散子　五積散　升麻葛根湯
葛根解肌湯　金沸草散　大柴胡湯
术附湯　防己黃芪湯　薑附湯
竹葉石膏湯　五苓散　四逆湯
大順散　白虎湯　香薷圓
香薷散　黃連香薷散　枇杷葉散

紹興續添方
僧伽應夢人參散
香蘇散　加減三五七散（方見諸風）
大己寒圓　太陽丹　和解散
正氣散　十華散　對散
桂苓圓　消暑圓

寶慶新增方
辰砂五苓散　柴胡升麻湯
縮脾飲　解暑三白散　保真湯
人參順氣散　消風百解散

淳祐新添方
人參養胃湯　參蘇飲　神术散

吳直閣增諸家名方
對金飲子　劫勞散
人參輕骨散　葱白散　桂枝湯
黃龍圓　不換金正氣散　川芎茶調散
滲濕湯　冰黃散

續添諸局經驗祕方
神仙百解散　八解散　白术散
人參順氣散　藿香正氣散　三物湯
來蘇散　香薷湯　十神湯
水浸丹　荊芥散　六和湯

卷之三

治一切氣　附　脾胃　積聚

蘇合香圓　安息香圓　丁沉圓
大沉香圓　理中圓　和胃圓
紫蘇子圓、　養脾圓　五膈圓
嘉禾散、　理中湯　調中沉香湯
勻氣散　烏沉湯　五膈寬中散
膈氣散　建中散　平胃散
三和散　七氣湯　益智散
藿香半夏散　草豆蔻散　積氣圓
丁香圓　小丁香圓　三稜煎圓
青木香圓　消食圓　小獨聖圓
溫白圓　九痛圓　生氣湯

紹興續添方
如聖餅子　四柱散
俞山人降氣湯　神保圓、　撞氣阿魏圓
沉香降氣湯　小烏沉湯　丁沉煎圓
感應圓　小理中圓　大七香圓

小七香圓　連翹圓　酒癥圓、
分氣紫蘇飲子　四倍散　木香餅子
草菓飲、　溫中良薑圓　煨薑圓
參苓白朮散　紅圓子
寶慶新增方　蘇子降氣湯　安中散
分心氣飲　奪命抽刀散　金露圓
秘傳降氣湯、　木香分氣圓　鐵刷湯
燒脾散　新法半夏湯　白朮六一湯
鹽煎散　神仙沉麝圓　治中湯
淳祐新添方
枳實理中圓　進食散　白沉香散
吳直閣增諸家名方
丁香煮散　雞舌香散　二薑圓
薑合圓　順氣木香散　和氣散
快氣湯　蓬煎圓　守中金圓
集香圓　異香散　肉豆蔻圓
三稜散　如神圓　丁香脾積圓
續添諸局經驗秘方
分心氣飲　木香分氣圓　化氣湯
降氣湯　千金大養脾圓　蟠葱散
五皮散　四君子湯　鹽煎散
參苓壯脾圓　人參丁香散　人參煮散
棗肉平胃散　盧氏感應圓　木香流氣飲、
五香散　人參木香散　十八味丁沉透膈湯
麝香蘇合香圓　廾四味流氣飲　木香檳榔圓、

○卷之四

治痰飲 附 欬嗽

倍朮圓　消飲圓　化痰玉壺圓
辰砂化痰圓　金珠化痰圓　玉液圓
玉芝圓　桔梗湯　胡椒理中圓
備急五嗽圓　大阿膠圓、　百部圓
款冬花散　鍾乳補肺湯、　華蓋散、
丁香半夏圓　藿香散
紹興續添方　二陳湯　溫肺湯
寶慶新增方　麻黃散　人參養肺圓
人參訶子圓　溫中化痰圓
淳祐新添方　新法半夏湯　丁香五套圓、
縮砂圓　滌白圓　破飲圓
吳直閣增諸家名方　溫中化痰圓　養中湯
人參款花膏　橘皮半夏湯
續添諸局經驗秘方
人參潤肺圓　定喘瑞應丹　人參清肺湯
新法半夏湯　人參定喘湯　細辛五味子湯
茯苓半夏湯　人參藿香湯、　半夏圓
杏參散　杏子湯　四七湯

○卷之五

治諸虛 附 骨蒸

膃肭臍圓　兎絲子圓　金釵石斛圓
何首烏圓　石南圓、　八味圓
黃耆圓　茴香圓　五補圓
無比山藥圓、　大山芋圓　定志圓
黃耆建中湯　人參黃耆散　成煉鍾乳粉
玉霜圓　預知子圓
紹興續添方

安腎圓　麝香鹿茸圓　妙香散
寶慶新增方　養氣丹　朴附圓
川練散　雙和湯　平補鎮心丹
十四味建中湯　思仙續斷圓、黃耆六一湯
木瓜圓　茱萸內消圓、青娥圓、
淳祐新添方　接氣丹　寧志膏、
三仙丹　樂令建中湯　金鈴子圓
吳直閣增諸家名方　張走馬玉霜圓　降心丹
黃耆鱉甲散　四神丹　十全大補湯
秦艽鱉甲散、沉香鱉甲散　小兎絲子圓
續添諸局經驗秘方　沉香鹿茸圓　椒附圓
平補鎮心丹　青娥圓　威喜圓
遠志圓　小安腎圓　三建丹
伏火二氣丹　靈砂　上丹
鹿茸四斤圓　玄兎丹　龍齒鎮心丹
羊肉圓　茯苓大補圓　十四友圓
鍾乳白澤圓　三建湯　十全飲

治痼冷 附消渴

二氣丹　崔氏烏頭圓　曹公卓鍾乳圓
金液丹　橘皮煎圓　附子理中圓
北亭圓
紹興續添方　沉香蓽澄茄散
寶慶新增方　清心蓮子飲　獨活寄生湯
淳祐新添方　人參養榮湯　鹿茸大補湯
養胃散　參香散
吳直閣增諸家名方　霹靂丹　來復丹
養正丹　黑錫丹　玉華白丹

續添諸局經驗秘方
金鎖正元丹　秘傳玉鎖丹　巴戟圓
十補圓　正元散　茯兎圓

○卷之六

治積熱

紫雪　紅雪通中散　涼膈散
洗心散　八正散　龍腦飲子
妙香圓　龍腦雞蘇圓、牛黃涼膈圓
抱龍圓　甘露圓
紹興續添方
甘露飲、桂苓圓（方見傷寒類）　消暑圓（方見傷寒類）
寶慶新增方　五淋散、消毒麻仁圓、
淳祐新添方　導赤散
吳直閣增諸家名方　三黃圓　消毒犀角飲
續添諸局經驗秘方　碧雪　勝冰丹、
導赤圓　五淋散　麥門冬散
真珠散　靈液丹

治瀉痢 附秘澀

鍾乳建脾圓　朝真丹、駐車圓、
訶梨勒圓　大溫脾圓　黃連阿膠圓
神效胡粉圓、桃花圓　靈砂丹
不二圓　訶梨勒散　木香散
神功圓　麻仁圓、脾約麻仁圓
七聖圓　七宣圓、七棗湯
胃風湯　半硫圓　赤石脂散
紹興續添方　純陽真人養臟湯

感應圓 大巳寒圓
諸家經驗方 御米湯 地榆散
金粟湯 育腸圓 腸風黑散
斗門散 水煮木香圓
大斷下圓 狗頭骨圓
淳祐新添方
吳直閣增諸家名方
水煮木香圓 大香連圓 戊己圓
聖散子 豆附圓 溫中圓
肉豆蔻散 神應黑玉丹 罌粟湯
固腸散 麴朮圓 縷金丹
[illegible]圓 遇仙立效散 三神圓
續添諸家經驗秘方 地榆散 秘傳斗門散
丁香豆蔻散 萬金飲 如神止瀉圓
神效參香散 黃耆湯

○卷之七

治眼目

錦鳩圓 駐景圓 蜜蒙花散
羚羊角散 秦皮散 鎮肝圓
菊睛圓
紹興續添方 菩薩散 撥雲散
資生新增方 草龍膽散 蟬花散
淳祐新添方 春雪膏
吳直閣增諸家名方 流氣飲 洗肝散
菊花散 明睛散
續添諸家經驗秘方 蟬花無比散 明睛地黃圓
洗眼紫金膏 草龍膽散 湯泡散
還睛圓 曾青散 秘傳羊肝圓

治咽喉口齒

龍石散 如聖湯 鵬砂圓
[illegible]散 玉屑無憂散
資生新增方 如聖勝金鋌
淳祐新添方 鵬砂散
吳直閣增諸家名方 赴筵散 吹喉散
續添諸家經驗秘方
如聖勝金鋌 五香散 如神散
玉池散 荊芥湯 細辛散

○卷之八

治雜病

耆婆萬病圓 神應圓 集效圓

乳香圓 解毒雄黃圓 剋效餅子
烏梅圓 神助散 立效散
必勝散 釣腸圓 石韋散
牡蠣散 法製熟艾
紹興續添方 對金飲子方見傷寒門 清心蓮子飲見積熱門
常山飲 犀角圓 勝金圓
寶慶新增方 腸風黑散 神應黑玉丹方見瀉痢門
淳祐新添方 備急圓 青解毒圓
吳直閣增諸家名方 奪命丹
寸金圓 茱萸內消圓 麝香大戟圓
續添諸家經驗秘方 葫蘆巴圓
三白散

治瘡腫傷折

雲母膏　小犀角圓　何首烏散
樺皮散　大拯活血丹　玉龍膏
花蘂石散
紹興續添方　化毒排膿內補十宣散　沒藥降聖丹
寶慶新增方　千金漏蘆湯　滑肌散　神效托裏散、
紅玉散　萬金膏
淳祐新添方　接骨散　急風散
吳直閣增諸家名方　油調立效散　導滯散　如聖散
檳榔散　拔毒散　琥珀膏
丹參膏　神效當歸膏、膩粉膏、
烏蛇膏　槐白皮膏　神仙太一膏、
續添諸局經驗秘方　補損當歸散　復元通氣散
排膿托裏散　升麻和氣飲　五香連翹湯

卷之九

治婦人諸疾 附產圖

熟乾地黃圓　澤蘭圓　鍾乳澤蘭圓
人參荊芥散　牡丹煎圓　椒紅圓
熟乾地黃散　安息活血丹　吳茱萸湯
伏龍肝散、溫經湯　禹餘糧圓
逍遙散、白薇圓　小白薇圓
紫石英圓　四物湯　陽起石圓、
白朮散、膠艾湯、保生圓
榆白皮散　當歸圓　當歸建中湯
大通真圓　半夏茯苓湯　茯苓圓
催生丹　芎藭、抵聖散

治小兒諸疾

返魂丹　定命丹　八珍丹
太一銀朱丹　軟金丹　鵲頂丹
至聖丹、定吐救生丹　五福化毒丹、
靈砂歸命丹　大天南星圓　五疳保童圓
熊膽圓　虎睛圓　天麻防風圓
化蟲圓　進食圓　金箔鎮心圓、
比金圓　香連圓　紫霜圓
開胃圓　沒食子圓　水銀扁圓子
牛黃膏　金箔辰砂膏　潤肺散、
惺惺散　人參羌活散　辰砂金箔散
消毒散、人參散　生犀散、
清涼飲子　天竺飲子　朱砂圓
蘆薈圓　和中散　人參半夏圓
辰砂半夏圓、丁香散　六神丹
太一丹　大驚圓
紹興續添方　蟬蝎丹　史君子圓
加減四君子湯　消毒犀角飲 方見傷寒類
寶慶新增方　肥兒圓　至聖保命丹
挨積圓　急風丹
淳祐新添方　助胃膏　觀音散
小抱龍圓　釣藤膏、
吳直閣增諸家名方　高良薑散　人參圓
蚵蚾圓　白豆蔻散　當歸圓
溫脾散　柴胡散　鷄根散
厚朴散
人參散　豆蔻香連圓　木香白朮散

當歸散　牛膝湯　四順理中圓
漏蘆散　大聖散
紹興續添方　黑神散　油煎散
寶慶新增方　滋血湯　烏金散
暖宮圓　琥珀澤蘭煎　安胎飲
淳祐新添方
神仙聚寶丹　詵詵圓　人參鱉甲圓
吳直閣增諸家名方　濟危上丹　琥珀黑龍丹
魏夫人濟陰丹　琥珀黑散　滑胎枳殼散
戊香散　竹茹湯
續添諸局經驗秘方
琥珀圓　皺血圓　內灸散
烏雞煎圓　白堊丹　暖宮圓
滋血湯　安胎飲　益陰丹

妙應丹　人參養血圓　牡丹散
紅花當歸散　烏金散　艾附圓
當歸芍藥散　調經散　調中湯
旋覆湯　黑龍丹　人參當歸散
當歸養血圓　四神散　當歸黃耆湯
神授散　小地黃圓　交感地黃煎圓
加減吳茱萸湯　熟乾地黃湯　阿膠枳殼圓
失笑散　增損四物湯　成煉鍾乳散
猪蹄湯　**產圖**　入月安產圖
體玄子借地法　禁草法　禁水法
產前將護法　產後將護法　推行年法
產母宜向方　產母忌向方　藏胎衣方
逐日日遊神　胎神遊方　催生符

龍骨圓　烏梅散　白及散
附子散　赤石脂散　蘗惡散
半夏散　朱礬散　紫蘇子散
犀角人參散　蒲黃散　錢氏白朮散
續添諸局經驗秘方　全蝎觀音散　鎮心至寶丹
小黃連阿膠圓　蛇頭圓　五疳消食圓
麥煎散　辰砂茯神膏　神仙消疳圓
小駐車圓　銀白散　蝦蟆圓
磨積圓　龍膽圓

諸湯

豆蔻湯　木香湯　桂花湯
破氣湯　玉真湯　薄荷湯
紫蘇湯　棗湯　二宜湯
厚朴湯　五味湯　仙朮湯
杏霜湯　生薑湯　益智湯
茴香湯
淳祐新添方　茴香湯　檀香湯
縮砂湯　胡椒湯
吳直閣增諸家名方　擣脾湯　小理中湯
白梅湯　三倍湯
續添諸局經驗秘方　鐵刷湯　快湯

諸香

芬積香　衙香　降真香
清遠香

太平惠民和劑局方目錄
建安丙午年高氏日新堂刊行

太平惠民和劑局方卷一

[illegible]

治諸風 附 脚氣

至寶丹 療卒中急風不語，中惡氣絕，中諸物毒暗風，中熱疫毒，陰陽二毒，山嵐瘴氣毒，蠱毒，水毒，產後血暈，口鼻出血，惡血攻心，煩躁氣喘，吐逆，難產悶亂，死胎不下。已上諸疾，並用童子小便壹合，生薑自然汁叁伍滴，入於小便內溫過，化下叁圓至伍圓，神效。又療心肺積熱，伏熱嘔吐，邪氣攻心，大腸風秘，神魂恍惚，頭目昏眩，眠睡不安，脣口乾燥，傷寒狂語，並皆療之。

生烏犀屑 研 朱砂 研飛 雄黃 研飛 生玳瑁屑 研 琥珀 研，各壹兩 麝香 研 龍腦 研，各壹分 金箔 半入藥，半為衣 銀箔 研，伍拾片 牛黃 研，半兩 安息香 壹兩半，為末，以無灰酒攪澄飛過，濾去沙土，約得淨數壹兩，慢火熬成膏

右將生犀、玳瑁為細末，入餘藥研勻，將安息香膏重湯煮凝成後，入諸藥中和搜成劑，盛不津器中，並旋圓如梧桐子大。用人參湯化下叁圓至伍圓。又療小兒諸癇，急驚心熱，卒中客忤，不得眠睡，煩躁，風涎搐搦。每貳歲兒服貳圓，人參湯化下。

靈寶丹 有三名，一名歸命丹，[illegible] 治中風，手足不仁，言語謇澀，或痛連骨髓，或痺襲皮膚，瘙痒如蟲行，頑痺如鐵石，或多痰，好睡，或健忘多嗔，血脉不行，肉色乾瘦，或久在牀枕，起便須人，語澀面浮，惟覺不健，或偏廢疾，古今暴而終，並皆治之。

硫黃 [illegible] 自然銅 打碎細研如粉，壹兩 雄黃 打研如粉 [illegible] 光明砂 打研如粉，壹兩半

已上肆味，用壹有蓋甆瓶子，先以金箔叁片鋪於瓶子底上，便入硫黃，又以金箔兩片蓋之，次入雄黃，又金箔兩片蓋之，次入朱砂，又金箔兩片蓋之，次入自然銅，又金箔叁片蓋之，以瓶子蓋合，却不用固濟，於灰池內坐瓶子令穩，以火養叁日叁夜，第壹日用熟炭火半斤，圍瓶子叁寸；第貳日用熟火拾兩，去瓶子貳寸半；第叁日用火壹斤，去瓶子貳寸，以火盡為度。候冷取藥出瓶子，以紙叁重裹藥，於淨濕土中培至來旦，取出更研令細。

磁石 [illegible] 紫石英 研如粉
陽起石 研如粉 長理石 研如粉

已上肆味，各叁分，用壹有蓋甆瓶子，先入磁石，次入陽起石，次入長理石，次入紫石英。其所入金箔一依前法重重入之，以蓋子合其口，不固濟，用火養叁日叁夜，第壹日用熟炭火壹斤，去瓶子叁寸；第貳日用火半秤，去瓶子貳寸半；第叁日用火半秤，去瓶子貳寸；壹日至夜任火自消，候冷取出，藥用紙裹入濕土中培至來旦，取出更研令極細。

虎脛骨 酒塗炙令黃 腽肭臍 酒刷微炙
龍齒 龍腦 麝香 牛黃

已上陸味，各壹兩，搗羅為末，更細研如粉。

鍾乳 [illegible]
天麻 去苗 遠志 去心 仙靈脾 巴戟
烏蛇 酒浸，去皮骨炙 苦參 各壹兩壹分

已上柒味，搗為麄散，以前鍾乳水壹斛，煎至柒升，用生絹濾去滓澄清。

肉桂 去麄皮 鹿茸 去毛，酥炙微黃 木香 肉豆蔻 各壹兩半
延胡索 胡桐律 各叁分

已上陸味，搗羅為末，以前鍾乳汁柒升，煎至肆升，以生絹濾去滓澄清。

半夏 湯洗柒遍，去滑 當歸 去苗 [illegible]

已上貳味搗羅為末以前鍾乳汁肆升煎至叁升以
生絹濾去滓澄清
生地黃汁 童子小便 無灰酒各壹升 皂莢仁打碎如粉
右件地黃汁等合前藥汁都以陸升內銀鍋中於靜室內以
文武慢火養至壹升下金石藥末在內以柳木篦攪勿令住
手看稀稠得所去火然後入牛黃等陸物攪令極勻即下皂
莢仁末及磨了犀角水以綿濾過入在藥內然後鉢內以乳
鎚令力士研叁伍阡下研訖分為叁分內壹分入芒硝壹兩
更研勻餘貳分臘圓如菉豆大。凡治風病及撲傷肢節不問輕
重年月淺深先以茶清調下紅雪通中散壹貳錢訪覘當須
臾以熱茶投令宣瀉壹兩行便依法煎生薑黑豆湯下叁粒
當以他人熱手更摩所患處須臾熱徹當覺內內有物如火
至病所壹貳百日及壹年內風疾下牀不得若拾服後便可
行步如患至重者每利壹度後隔日服伍粒又住叁伍日即
更利不過叁拾粒平復如故若打撲損多年每遇天陰疼痛
動不得者可伍柒服如患風疾及撲傷肢節拾年伍歲運動
不能者但依法服之拾粒便効重者不過叁拾粒有人患卒
中惡暴亡者但心頭未冷取藥伍粒以醋調摩臍中壹阡餘
遍當從臍四面漸暖待眼開後以熱醋研下拾圓入口即活
如有中一切風牙關緊急及卒暴亡者以熱醋研叁兩圓
灌在口中下得咽喉即活如要常服空心溫酒下貳圓服拾
粒消壽限之內永無風疾此藥神驗功非人智能測

防風圓治諸風手足不隨神志恍惚語言蹇澀口眼喎斜
肢節痠疼骨節煩疼頭旋眩運恍惚不寧健忘怔忪痰涎壅滯
及皮膚頑厚麻痺不仁

防風去蘆叉 白龍腦別研 乳香別研 羚羊角末別研
附子炮去皮臍 白殭蠶微炒 檳榔 肉豆蔻仁
沉香 茯神去木 丁香 蔓荊子去白皮
牛黃別研 蘇合香油 麻黃去根節 生犀角末別研
雄黃研飛 麝香別研 木香 辰砂研飛
茯苓去皮 白附子炮 羌活去蘆 蜈蚣微炒
人參去蘆 肉桂去麤皮 芎藭各壹兩 真珠末別研如粉各叁分
獨活去蘆 乾蝎微炒 半夏
川烏頭炮去皮臍 白花蛇
天麻 琥珀別研 膩粉研 白豆蔻仁各半兩
金箔為衣

右為細末入研藥令勻煉蜜搜和圓如雞頭大每服壹圓細
嚼溫酒下荊芥茶下亦得加至貳圓如破傷中風脊強手搐
口噤發痫即以熱豆淋酒化破叁圓斡口開灌下少時再服
汗出乃愈若小兒驚風諸癇每服半圓薄荷湯化下不拘時

牛黃圓治丈夫婦人卒中諸風牙關緊急膈上多痰或語言
蹇澀口眼喎斜用薄荷汁與酒各少許化叁圓服之良久再
服立有大効又治癱緩偏風搐搦手足瘛瘲心神不安遍身
頑麻腸風痔瘻腎臟風毒上攻下疰婦人血風頭旋吐逆皮
膚腫癢遍身疼痛

白朮 白芷 乾薑炮
枳殼去瓤麩炒 天竺黃細研 虎骨 厚朴去麤皮
何首烏 敗龜 桑螵蛸微炒
縮砂仁 蔓荊子去白皮 丁香 蠶蛾微炒
萆薢微炙 細辛去苗 藁本去土 槐膠
阿膠杵碎炒 陳皮去白微炒 天南星
羌活去蘆 麝香別研 天麻 半夏
茯苓去皮 獨活去蘆 人參去蘆 羚羊角鎊
藿香葉去土 檳榔 川烏
肉桂去麤皮 沉香 麻黃 白殭蠶
白附子 乾蝎 沒藥 白花蛇

烏蛇 木香 石斛
水銀 蟬殼（去土微炒） 川芎 肉豆蔻
硫黃 附子（炮去皮臍）
龍腦 朱砂（研飛） 雄黃（研飛） 牛黃
狐肝
膩粉 當歸 烏犀 烏雞
右伍拾捌味並須如法修事，搗研令細，用白蜜合和入臼杵，為丸，丸如梧子大，常服壹圓，不計時，薄荷湯或茶嚼下

牛黃清心圓 治諸風緩縱不隨，語言蹇澁，心忪健忘，恍惚去來，頭目眩冒，背中煩熱，痰涎壅塞，精神昏憒；又治心氣不足，神志不定，驚恐怕怖，悲憂慘戚，虛煩少睡，喜怒無時，或發狂顛，神情昏亂

白芍藥 麥門冬（去心） 黃芩 當歸
防風 白朮 柴胡 桔梗
芎藭 白茯苓（去皮） 杏仁
神麯 蒲黃 人參 羚羊角末
麝香 龍腦 肉桂（去麤皮） 大豆黃卷（碎炒）
阿膠 白蘞 乾薑（炮）
牛黃 犀角末 雄黃 乾山藥
甘草 金箔 大棗
右除棗、杏仁、金箔、二角末及牛黃、麝香、雄黃、龍腦肆味外，為細末，入餘藥和勻，用煉蜜與棗膏為圓，每兩作壹拾圓，用金箔為衣，每服壹圓，溫水化下，食後服之。小兒驚癇，即酌度多少，以竹葉湯溫溫化下

[illegible]圓 治中風癱緩，半身不遂，口眼喎斜，言語蹇澁，精神昏塞，步履艱難，或肌肉偏枯，手足顫曳，或筋脈拘攣，不得屈伸，及氣運并諸風，身體疼痛

黑參 地榆 天台烏藥 川烏（炮去皮臍）
木香 丁香 蓽澄茄
雄黃（研飛） 烏犀 龍腦 辰砂
自然銅 麝香（各四兩） 天麻 真珠末
右壹拾[illegible]味為末，研勻，煉蜜和圓，如櫻實大，每服壹圓，溫酒化下，不拘時候，服訖避風，衣被蓋覆令汗出，患重者服壹月全安，輕者半月差，初患伍餘服可安

[illegible] 治一切風毒上攻，頭面腫痒，痰涎壅塞，心胸不利，口舌乾澁，風毒下疰，腰腳沉重，腫痛生瘡，大便多秘，小便赤澁，及治中風癱緩，一切風疾

川大黃 山梔子（去皮） 益智子（去皮） 威靈仙（去蘆頭）
蔓荊子 白茯苓（去皮）
白芷 香墨 麝香 茯神（去木）
川烏 天麻 仙靈脾
右細末，研藥勻，煉蜜搜和，如麥飰相似，以真酥塗杵臼搗杵，如乾旋入蜜，令得所和搜成劑，每服旋圓如梧子大，用薄荷自然汁同溫酒化下兩圓，如卒中風涎潮昏塞，煎皂莢白礬湯放溫化肆圓，嚾之，癱緩風每日服三伍圓，漸覺有効，常服壹圓，疎痰利膈，用溫酒下，食後服。小兒驚風入腹，[illegible]薄荷汁化下半圓，立効。治瘰癧，用葱湯下壹圓，忌動風毒物

[illegible]天麻[illegible] 治一切風及癱緩風，半身不隨，口眼喎斜，語澁癡，精神昏憒，或筋脈拘攣，遍身麻痺，百節疼痛，手足顫掉，及腎臟風毒上攻，頭面虛腫，耳鳴重聽，鼻塞口乾，痰涎不利，下疰腰腿，腳膝緩弱，腫痛生瘡；又治婦人血風攻疰，身體疼痛，面浮肌瘦，口苦舌乾，頭旋目眩，昏困多睡，或皮膚瘙痒，癮疹生瘡，暗風夾腦風，偏正頭疼，並皆治之

甜瓜子 浮萍草 川烏（炮去皮臍） 地榆
黑參 天麻
已上陸味為細末，用雪水、白沙蜜各壹拾伍斤零[illegible]

兩同化開用絹袋子濾過銀石器内慢火熬成膏再

生龍腦八兩研　麝香四兩研

右爲細末除龍麝外用天麻烏頭膏和攪令勻放冷入龍麝再攪令勻入臼内搗千百杵搜丸如彈子大每服一丸皂莢子大與薄荷同嚼茶酒任下不計時候治癱緩風併服見効如破傷風用豆淋酒下數發汗用服葱熱酒併服無服常服亦得

天麻丸 治諸風筋脉拘急手足麻痺語言蹇澀口面喎斜心忪恍惚痰涎壅滯頭目昏眩肢節煩疼及中風癱緩暗風癇病邪風上攻面腫耳鳴下痓腰脚沉重疼痛婦人血風頭旋吐逆皮膚腫痒遍身疼痛

天麻去苗秤八兩　川烏炮去皮臍　地榆洗焙　玄參各焙四兩

已上肆味爲細末以水少許化蠶同於石鍋内慢火熬攪成稠膏放令次入後藥

浮萍草淨洗焙　龍腦　薄荷葉去土　甜瓜子各四兩　生犀

朱砂研飛各五兩　龍腦研　牛黄研　麝香各一兩研

右爲細末與前膏子拌攪和圓如雞頭大每服一圓細嚼荆芥茶下温酒亦得不計時候

[illegible]圓 治諸風神志不定恍惚去來舌強語澀心怔煩悶口眼喎僻手足嚲曳及風虛眩冒頭目昏痛或旋運僵仆涎潮搐搦卒中急風不省人事小兒驚風諸癇並皆治之

甘菊揀八兩　黄芩去黑心四兩　藁本　白殭蠶去絲嘴炒

甘草炙　羌活去苗　麻黄去根節　茯苓去皮

芎藭　犀角各一兩鎊　白芷　南星

細辛去苗洗焙　人參去蘆　防風去蘆　川芎各

龍腦研　牛黄研　麝香研　白附子炮各兩

天竺黄　白花蛇酒浸去皮骨炙　天麻去苗各二兩

生地黄汁五升入蜜　金箔

右爲細末以地黄汁膏子搜和每兩作伍拾圓以金箔爲衣

每服壹圓細嚼温酒下若中風涎潮不語昏塞甚者加至叁圓用薄荷自然汁同温酒共半盞化藥灌之常服壹圓濃煎人參湯嚼下薄荷湯亦得小兒每服皂莢子大薄荷湯化下

龍虎丹 治丈夫婦人新得久患癱緩風半身不遂手脚筋衰及風邪疰遍身瘡疥頭風多饒白屑頭面上生瘡刺風狀如針刺癇風急倒作聲項頭風不認痛痒癧風頸生斑駁暗風頭旋眼黑痰風面生赤點肝風鼻悶眼瞤偏風口眼喎斜節風肢節斷續胖風心多驚邪酒風行步不前肺風鼻塞項疼膽風令人不睡氣風肉如蟲行腎風耳内蟬鳴陰間濕痒

黑牽牛炒　蔓荊子去白皮　天麻去苗　牛膝去苗酒浸焙

硫黄細研　天竺黄細研　細辛去苗　半夏湯洗七次生薑汁製

附子炮去皮臍　何首烏去黑皮　羌活去苗　獨活去苗

柴胡去苗　川芎　桔梗各貳兩　寒水石火煅

茴香炒去土　甘松洗去土　肉桂去粗皮　五靈脂生

白芷生　菊花去土　川烏炮去皮臍　白殭蠶去絲嘴炒

縮砂仁　牙硝研　木香生　水銀

雄黄研飛　麝香研各乙兩　地龍去土炒　白乾薑炮

朱砂研飛　白蒺藜炒　防風去苗各三兩　烏蛇酒浸去皮骨炙

龍腦研

右爲細末煉蜜爲劑每服壹圓如彈頭大用薄荷酒嚼下日進三服重即兩服産後驚風亂道見物朱砂酒磨下産後身多虛腫血風頻增昏沉身如針刺髮隨梳落面黄心邪當歸酒嚼下日進兩服若治傷寒炒葱豉酒嚼下一二服蓋覆出汗立愈小兒驚風薄荷酒化下少許大人急風口噤失音薄荷酒化灌之常服茶酒任下不拘時候服

[illegible]天麻圓 治風痺手足不隨或少力顫掉血脉凝滯肌肉頑痺遍身疼痛轉側不利筋脉拘攣不得屈伸

[illegible]　麻黄去根節　防風

天麻 去蘆 各乙兩 沒藥 別研 朱砂 研飛 安息香 酒研 乳香 研 麝香 各壹兩 血竭 細研 阿膠 各兩半

右件藥除研藥外將破出藥同研停勻煉蜜與安息香同熬過後成劑入臼搗杵熟丸如彈子大每服壹丸以溫酒或荊芥湯化下空心服療癱瘓汗為效如不欲化服即丸如梧桐子大每服五十丸依前湯使下

龍腦芎犀丸 消風化痰除心肺邪熱去頭面諸風治偏正頭痛心忪煩躁面熱目瞤咽嗌腫痛痰熱欬嗽咽膈不利

石膏 細研 川芎 各四兩 生龍腦 別研 生犀屑 各壹兩

山梔子 去皮 乙兩 朱砂 研飛 四兩 內乙兩為衣 人參 去蘆

茯苓 去皮 細辛 去苗 甘草 炙 各貳兩 阿膠 碎炒 乙兩半

麥門冬 三兩 去心

右除別研後入外並搗羅為細末次入研藥蜜為丸每服壹丸至貳丸細嚼茶酒任下食後服

辰砂天南星丸 治諸風痰涎蘊結心膈痞悶頭痛目運面熱心忪痰唾稠黏精神不爽及風癇潮搐涎潮昏塞並宜服之

黑鉛 壹兩 與水銀結沙子 水銀 朱砂 半兩 研飛 天南星 三分 炮為末

鐵粉

膩粉 壹兩

右同研勻以麵糊為丸如梧桐子大每服貳丸用薄荷蜜湯下生薑湯亦得微利為度食後服如治風癇不計時候服

牛黃金虎丸 治卒暴中風眩運倒仆精神昏塞不省人事牙關緊急目睛直視胸膈喉中痰涎壅塞及諸癇潮發手足瘈瘲口眼相引項背強直並皆治之

石鷰 蛇黃 磁石 火燒醋淬九遍細研

雄黃 研飛 辰砂 研飛 石綠 研飛 牛黃

粉霜 研 輕粉 細研 麝香 細研 銀箔 研

金箔 為衣

右件都研勻細用糯米粥和丸如雞頭大每服壹丸煎薄荷酒磨下大人可服半丸小兒拾歲已下分為四服窒四歲已下分為伍服未滿一歲可分為七服如牙關緊急以物斡開灌之

碧霞丹 治卒中急風眩運僵仆痰涎壅塞心神迷悶牙關緊急目睛上視及五種癇病涎潮搐搦

石綠 研九度飛 拾兩 附子尖 烏頭尖 蠍梢 各柒拾箇

右件為末入石綠令勻麵糊為丸如雞頭大每服急用薄荷汁半盞化下壹丸更入酒半合溫暖服之須臾吐出痰涎然後隨證治之如牙關緊急斡開灌之立驗

保命丹 治中風涎潮咽膈作聲目眩不開口眼喎斜手足不遂應是一切風疾並宜服之

雄黃 研 朱砂 研 龍腦 研 麝香 研 各壹錢

白殭蠶 去絲嘴 生 白附子 生 天南星 炮 生 烏蛇 去皮骨 半兩

右除研外餘皆為末煉蜜為丸如梧桐子大如中風涎潮牙關不開先用大蒜壹瓣搗爛塗在兩牙關外腮上次用豆淋酒化壹丸揩牙齗上即開續用薄荷酒化下壹兩丸如丈夫風氣婦人血風牙關緊急者只用豆淋酒化藥揩牙齗上即開如頭風目眩暗風眼黑欲倒者急嚼壹兩丸用薄荷酒下

八風丹 治諸風及痰熱上攻頭痛面赤目眩旋運鼻塞咽乾頸項不利痰唾稠濁神情如醉百節疼痛耳嘯蟬鳴面上游風口眼蠕動

滑石 細研 天麻 酒浸 各乙兩 龍腦 研 麝香 各研壹分

白殭蠶 微炒 白附子 炮 各半兩 半夏 白礬製 貳兩 凝水石 火燒通赤細研水飛 半斤

右件藥搗羅為細末入研者藥同研令勻煉蜜和丸如櫻桃大每服壹丸細嚼溫荊芥湯下茶酒亦得食後服

牛黃生犀圓 治風盛痰壅頭痛目眩咽膈煩悶神思恍惚心

齒赤口乾多渴睡卧不安小便赤澀大便多秘
黃丹(研) 雄黃(研飛) 膩粉(研) 羚羊角(屑 各壹兩)
鉛 水銀(與鉛同結砂子) 朱砂(研飛) 龍齒(各壹兩)
天麻(去苗) 牙硝(研) 半夏(白礬製 各一兩)
生犀(鎊) 龍腦(研 各一) 牛黃(研 各錢半)
右為末煉蜜為圓每兩作貳拾圓每服壹圓溫薄荷湯化下中風涎潮牙關緊急昏迷不省用膩粉壹錢與壹圓生薑自然汁七點薄荷水同化下得吐或利逐出痰涎即愈小兒風熱痰壅睡卧不安上竄斷齒每服半圓如急驚風涎潮搐搦眼目戴上牙關緊急用膩粉半錢生薑自然汁叁五點薄荷水同化下壹圓更看歲數大小加減

辰砂天麻圓 治諸風痰盛頭痛目眩旋運欲倒嘔噦惡心恍惚健忘神思昏憒肢體疼倦頸項拘急頭面腫痒手足麻痺常服除風化痰清神思利頭目
川芎 麝香(研) 白芷 辰砂(研飛)
白附子(炮) 天麻(去苗) 天南星
右末煉蜜圓如梧桐子大每服貳拾圓溫荊芥湯下不拘時

青州白圓子 治男子婦人半身不遂手足頑麻口眼喎斜痰涎壅塞及一切風他藥所不能療者小兒驚風大人頭風洗頭風婦人血風並宜服之
半夏 川烏頭(去皮臍生用)
南星(三兩) 白附子(二兩生)
右搗羅為細末以生絹袋盛用井花水擺未出者更以手揉令出如有滓更研再入絹袋擺盡為度放磁盆中日中曬夜露至曉棄水別用井花水攪又曬至來日早再換新水攪如此春伍日夏三日秋七日冬十日去水曬乾候如玉片碎研以糯米粉煎粥清為圓如菉豆大初服五圓加至拾五圓生薑湯下不拘時候如癱緩風以溫酒下貳拾圓日三服至三日後當有汗便能舒展經三五日可欠足瘥常服拾圓已來不無風痰膈壅之患小兒驚風薄荷湯下壹圓

辰砂圓 治諸風痰盛頭痛惡心精神昏憒口吻心忪嘔吐痰涎胸膈煩悶
鵬砂(研) 牛黃(各壹錢) 白附子(炮) 白殭蠶
天南星 辰砂(半兩) 半夏
右為細末同研令勻水煮麵糊為圓如梧桐子大每服貳拾圓用生薑荊芥湯下不拘時候

牛黃金虎丹 治急中風身背強直口禁失音筋脈拘急鼻乾面黑遍身壯熱汗出如油目瞪唇青心神迷悶形體如醉痰涎壅塞胸膈喉中如拽鋸聲
天雄 白礬(枯過) 天竺黃(研)
天南星 膩粉
牛黃 生龍腦 金箔 雄黃
右為末煉蜜搜和每壹兩半作拾圓以金箔為衣每服壹圓以新汲水化灌之扶坐使藥行化良久續以薄荷自然汁更研化壹圓灌之立愈肥盛體虛多涎有風之人宜常以此藥隨身備急忽覺眼前暗黑心膈悶亂有涎欲倒化藥不及急嚼壹圓新汲水下小兒急驚風壹歲兒服綠豆大壹圓薄荷自然汁化灌之更量歲數臨時加減有孕婦人不得服

防風圓 治一切風及痰熱上攻頭痛惡心項背拘急目眩旋運心怔煩悶手足無力骨節疼痺言語蹇澁口眼瞤動神思恍惚痰涎壅滯昏憒健忘虛煩少睡
防風(洗) 川芎 天麻 甘草(炙 各貳兩)
朱砂(研 半兩)
右為末煉蜜為圓每兩作拾圓以朱砂為衣每服壹圓荊芥湯化服茶酒嚼下亦得不拘時候

川芎圓 治消風壅化痰涎利咽膈清頭目治頭痛旋運心忪煩

□□頸項緊急肩背拘倦肢體煩疼皮膚瘙癢腦昏目疼鼻塞聲重
面上遊風狀如蟲行

川芎　龍腦薄荷 焙乾 各柒拾伍兩　細辛 洗 伍兩
防風 去苗 貳拾伍兩　桔梗 壹佰兩　甘草 爁 參拾伍兩

右為細末煉蜜搜和每壹兩半分作伍拾圓每服壹圓細嚼
臘茶清下食後臨卧

【薄荷煎圓】消風熱化痰涎利咽膈清頭目治遍身麻痺百節
酸疼頭昏目眩鼻塞腦痛語聲重項背拘急皮膚瘙癢或
生瘡疹及治肺熱喉腥脾熱口甜膽熱口苦又治鼻衄唾血
大小便出血及脘看傷風并沐浴後並可服之

龍腦薄荷 取葉壹拾斤　防風 去苗　川芎 各叁拾兩
縮砂仁 伍兩　桔梗 伍拾兩　甘草 炙 肆拾兩

右為末煉蜜為圓每兩作叁拾圓每服壹圓細嚼茶酒任下

【天南星圓】治風化痰清神爽氣利胸膈消酒毒止嘔逆惡心
中酒嘔吐

天南星 [illegible]
丁香　麝香 研 各壹兩　龍腦 研 壹兩半　辰砂 研 [illegible]

右為細末入研藥勻煉蜜并酒便和為圓每兩作伍拾圓以
朱砂末為衣每服壹圓燭嚼濃煎生薑湯下不計時候酒後
含化除煩渴止嘔逆

【犀角圓】除三焦邪熱疎一切風氣治風盛痰實頭目昏重肢
節拘急痰涎壅滯腸胃燥澀大小便難

黃連 去鬚　犀角 鎊 各拾兩　人參 去蘆 貳拾兩　大黃 捌拾兩
黑牽牛 壹佰貳拾兩炒搗取粉陸拾兩

右與牽牛粉合和為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服拾伍
圓至貳拾圓臨卧溫水下更量虛實加減

【皂角圓】治風氣攻注頭面腫痒遍身拘急痰涎壅滯胸膈煩
悶頭痛目眩鼻塞口乾皮膚瘙痒腰腳重痛大便風秘小便
赤澀及咳嗽喘滿痰唾稠濁語澀涎多手足麻痺暗風癇病
偏正頭疼夾腦風婦人血風攻注遍身疼痛心怔煩躁瘾疹
瘙痒並宜服之

皂角 [illegible]　乾薄荷葉
槐角 各伍兩　青橘皮 去穰　知母　貝母 去心
半夏 [illegible]　威靈仙 洗　白礬 枯過　甘菊 去枝 各壹兩
牽牛子 [illegible]

右為末以皂角膏搜和為圓如梧桐子大每服貳拾圓食後
生薑湯下痰實咳嗽用蛤粉薤汁下手足麻痺用生薑薄荷
湯下語澀涎盛用荊芥湯下偏正頭疼夾腦風用薄荷湯下

【小續命湯】治卒暴中風不省人事漸覺半身不隨口眼喎斜
手足戰掉語言蹇澀肢體麻痺神昏氣亂頭目眩重痰涎并
多筋脈拘攣不能屈伸骨節煩疼不得轉側及治諸風服之
皆驗若治腳氣緩弱久服得差又痛風人每遇天色陰晦節
候變更宜預服之以防瘖瘂

防己　肉桂 去麤皮　黃芩　杏仁 去皮尖炒黃
芍藥 白者　甘草 爁　芎藭　麻黃 去根節
人參 去蘆 各壹兩　防風 去蘆 壹兩半　附子 炮去皮臍 半兩

右除附子杏仁外搗為麤末後入二味令勻每服叁錢水一
盞半生薑伍片煎取一盞去滓稍熱服食前加棗一枚尤好

【排風湯】治風虛發熱項背拘急肢節不隨恍惚狂言來去無
時不自覺悟亦治腳氣緩弱甚效此藥溫和不虛人

秦艽 去苗土　獨活 去蘆　麻黃 去節　半夏 [illegible]
防風 去蘆 各貳兩　升麻　防己　白朮
石膏 煅　芍藥 白　黃芩　甘草
當歸 去蘆　遠志 去心　人參 [illegible]

右麄末入半夏片令勻每服肆錢水貳中盞生薑柒片煎至壹盞去滓取清汁陸分入麝香末少許食後臨卧帶熱服

排風湯 治男子婦人風虛冷濕邪氣入臟狂言妄語精神錯亂肝風發則面青心悶吐逆嘔沫脇滿頭眩重耳不聞人聲偏枯筋急曲拳而卧心風發則面赤翕然而熱悲傷瞋怒目張呼喚脾風發則面黃身體不仁不能行步飲食失味夢寐倒錯與亡人相隨肺風發則面白欬逆唾膿血上氣奄然而極腎風發則面黑手足不隨腰痛難以俛仰痺冷骨疼若有此候令人心驚志意不定恍惚多忘服此湯安心定志聰耳明目通臟腑諸風疾

白鮮皮 當歸去蘆酒浸一宿 肉桂去粗皮 芍藥白者

杏仁去皮尖麩炒 甘草炒 防風去蘆 芎藭

白朮各貳兩 獨活去蘆 麻黃去根節 茯苓去皮各叁兩白者

右為麄末每服叁錢水壹盞半入生薑肆片同煎至捌分去滓溫服不計時候

[illegible] 大治諸風無問新久手足軃曳腰脚緩弱行步不正精神昏冒口面喎邪語言蹇澀痰涎壅盛或筋脉攣急肌肉頑痺皮膚瘙痒骨節煩疼或痛無常處遊走不定及風氣上攻面浮耳鳴頭痛目眩下疰腰脚腰疼腿重腫痒生瘡並宜服之

海桐皮去粗皮 杜仲剉炒 天麻去苗 乾蝎炒

郁李仁 赤箭 當歸去蘆酒浸 厚朴去粗皮薑汁製

蔓荊子去白皮 木香 防風去苗 藁本去土

白附子炮 肉桂去粗皮 羌活去蘆頭 萆薢酒浸

虎骨酥炙 白芷 山藥 白花蛇酒浸去皮骨

菊花去枝梗 牛膝去苗 甘草炙 威靈仙去土

右等分為末每服壹錢至貳錢溫酒調下荊芥湯亦得空心服之常服祛逐風氣流行榮衛久病風人亦宜常服輕可中風不過貳拾服平復如故

消風散 治諸風上攻頭目昏痛項背拘急肢體煩疼肌肉蠕動目眩旋運耳嘯蟬鳴眼澀好睡鼻塞多嚏皮膚頑麻瘙痒瘾疹又治婦人血風頭皮腫痒肩背骨痛旋運欲倒痰逆惡心

荊芥穗 甘草炒 芎藭 羌活

白殭蠶炒 防風去蘆 茯苓去皮用白者 蟬殼去土微炒

藿香葉去梗 人參去蘆各二兩 厚朴去粗皮薑汁製炒 陳皮去白洗焙各半兩

右為細末每服貳錢茶清調下如久病偏風每日三服便覺輕減如脫著沐浴暴感風寒頭痛聲重寒熱倦疼用荊芥茶清調下溫酒調下亦得可併服之小兒虛風目澀昏困及急慢驚風用乳香荊芥湯調下半錢並不計時候

[illegible] 治風氣不調頭目昏眩痰涎壅滯遍身拘急及風邪寒壅頭痛項強鼻塞聲重肢節煩疼天陰風雨預覺不安

前胡去蘆 羌活去蘆 麻黃去根節 白茯苓去皮

川芎 黃芩 甘草爁 蔓荊子去白皮

枳殼去瓤麩炒 細辛去苗 石膏另研 菊花去梗

防風各乙兩

右為末入石膏研勻每服貳錢水壹大盞入生薑三四片薄荷三兩葉同煎至柒分稍熱服不拘時候

八風散 治風氣上攻頭目昏眩肢體拘急煩疼或皮膚風瘡痒痛及治寒壅不調鼻塞聲重

藿香去土半斤 白芷 前胡去蘆各乙斤 黃耆去蘆

甘草爁 人參去蘆各貳斤 羌活去蘆 防風去蘆各三斤

右為細末每服貳錢水壹中盞入薄荷少許同煎至七分去滓食後溫服臘茶清調亦得小兒虛風乳香臘茶清調下半錢更量兒大小加減服

川芎丸 消風壅化痰涎治頭昏目眩心忪面熱腦痛耳鳴鼻塞聲重口眼瞤動精神昏憒肢體疼倦頸項緊急心膈煩悶咽嗌不利

檀香半兩 人參去蘆 羌活去蘆 防風去蘆各[illegible]

薄荷去土 荊芥穗 甘草炙各[illegible]

石膏研[illegible] 細辛去苗[illegible]

右為末每服貳錢沸湯點服或入茶末點服亦得食後服

[illegible]散 治風毒邪氣乘虛攻注皮膚骨髓之間與血氣相搏往來交擊痛無常處遊走不定晝靜夜甚少得眠睡筋脈拘急不能屈伸一名乳香趁痛散 [illegible]

蒼耳子微炒 骨碎補 自然銅醋淬研 騏驎竭細研

白附子炮 赤芍藥各三兩 當歸 肉桂去粗皮

白芷 沒藥 防風去苗 牛膝去苗酒浸

五加皮 天麻去蘆 檳榔 羌活各[illegible]兩

虎脛骨酥炙 敗龜酥炙各[illegible]

右件搗羅為末入研藥勻每服壹錢溫酒調下不拘時候

[illegible]圓 治肝腎風虛上攻下疰筋脈拘攣骨節疼痛頭面浮腫手臂少力腰背強痛腳膝緩弱屈伸不利行履艱難並宜服

荊芥穗 白附子炮 牛膝酒浸焙乾 肉蓯蓉酒浸切作片焙乾

骨碎補去毛炒 威靈仙去苗 縮砂仁各[illegible] 地龍去土炒

沒藥各[illegible] 自然銅[illegible] 草烏頭[illegible] 半夏[illegible]

右同為細末酒煮麵糊圓如梧桐子大每服伍圓至柒圓溫酒下婦人醋湯或當歸酒下妊娠不宜服之不計時候

[illegible]圓 治諸風緩縱手足不隨口眼喎斜言語謇澀眉目瞤動頭昏腦悶筋脈拘攣不得屈伸遍身麻痺百節疼痛皮膚瘙癢抓成瘡瘍又治婦人血風渾身痛癢頭疼眼暈又腸風臟毒下血不止服之尤效久服令人顏色和悅力強輕健鬚髮不白

川烏炮去皮臍壹兩 荊芥穗貳兩

右為細末醋麵糊圓如梧桐子大每服貳拾粒酒或熟水下有疾食空時日三四服無疾早晨一服

[illegible]

[illegible]丹 治八風五痺癱瘓[illegible]口眼喎斜目角牽引項背拘強牙關緊急心中憒悶神色如醉遍身發熱骨節煩疼肌肉麻木腰膝不仁皮膚瞤動或如蟲行又治陽虛頭痛風寒入腦目旋運轉有似舟船之上耳內蟬鳴或如風雨之聲應風寒濕痺腳氣緩弱等疾並能治之 [illegible]

山茱萸 乾薑炮 茯苓去皮各三斤 附子炮去皮臍三斤五兩

細辛八兩 防風四斤

右為細末每服貳錢溫酒調下食前

[illegible]丹 治男子婦人一切風氣通經絡活血脈治筋骨疼痛手足麻痺半身不隨頭風頭旋偏正頭風小中急風手足疼痛牙關緊急四肢軟弱腳藏風毒上攻頭面下疰腰腳生瘡遍體疼痛並宜服之

撫芎八兩 躑躅花炒 木鱉仁 白膠香

藿香 白殭蠶 五靈脂 白芷

當歸 地龍 何首烏

威靈仙 草烏頭

右為末醋糊圓如梧桐子大每服伍圓不可多服食後用薄荷茶吞下溫酒亦得有孕婦人不可服

[illegible]圓 治男子婦人一切風遍身瘡癬手足頑麻偏正頭疼鼻塞腦悶大解傷寒治頭風

藁本去土 細辛 白芷 川芎 甘草

右為細末各等分用藥四兩入石膏末一斤係煆了者水搜為圓每兩入粒薄荷茶嚼下每服一粒食後服風蚛牙一粒分作三服乾揩後用荊芥湯漱之更用藥末嚼下

[illegible]圓 治風濕流注經絡間肢節緩縱不隨或腳膝疼痛不能步履

續斷　獨活　防風　杜仲
萆薢　牛膝（酒浸焙）　甘草

右件各修事淨焙乾半兩為細末每服貳錢溫酒調下

活血應痛圓 治風濕客於腎經血脈凝滯腰腿重疼不能轉側皮膚不仁遍身麻木上攻頭面虛腫耳內常鳴下注腳膝重痛少力行履艱難亦治項背拘攣不得舒暢常服活血脈壯筋骨使氣脈宣流

狗脊（去毛）四斤　蒼朮（米泔浸一宿去皮）六斤　香附子（去毛炒）七斤半
陳皮（洗去白）五斤半　没藥（別研）一十一兩　威靈仙（洗）二斤　草烏頭（炮）一斤半

右為細末用酒煮麵糊為圓如梧桐子大每服十五粒至二十粒溫酒或熟水任下不拘時候久服忌桃李雀鴿諸血物

四生圓 治男子婦人肝腎風毒上攻眼赤痒痛不時羞明多淚下注腳膝生瘡及遍身風癬服藥不驗居常多覺兩耳中痒正宜服此無不取效

黃耆　川羌活　蒺藜（炒）　白附子（生）各等分

右為細末每服貳錢薄荷酒調下如腎藏風下疰生瘡以腰子批開以藥末二錢合定裹煨香熟空心細嚼以鹽酒送下

[illegible] 治中風傷寒發熱惡風頭痛目眩鼻塞聲重背拘急身體酸疼肌肉瞤動牙關緊急及新頭風攻疰眼暗並宜服之

撫芎二兩　川芎（去蘆）　川烏（炮）貳兩　龍腦薄荷（去土）
白芷　甘草各貳兩　細辛半兩

右為細末每服壹大錢蔥白茶清調下薄荷湯亦得不拘時

四斤圓 治腎經不足下攻腰腳腿膝腫痒不能屈伸腳弱少力不能踏地腳心隱痛行步喘乏筋脈拘攣腰膝不利應風寒濕痺腳氣緩弱並宜服之

宣州木瓜（去瓤）　牛膝（去蘆剉）　天麻（去蘆剉）　蓯蓉（洗淨切）各焙乾秤一斤

已上肆味如前修事了用無灰酒伍升浸春秋各伍日夏三日冬十日足取出焙乾再入

附子（炮去皮臍）　虎骨（塗酥炙）各貳兩

右同為細末用浸前藥酒打麵糊為圓如梧桐子大每服三五十圓空心煎木瓜酒下或鹽湯吞下亦得日常服補虛除濕大壯筋骨

[illegible]圓 治卒暴中風神志昏憒牙關緊急目睛直視手足瘛瘲口面喎斜涎潮語澀筋攣骨痛癱瘓偏枯或麻木不仁或瘙痒無常應是風疾及打撲傷損肢節疼痛皆治之通經絡活血脈

乳香（別研）　没藥（別研）各乙兩　川烏頭（炮去皮尖臍）貳兩末
麝香（別研）乙錢　五靈脂（用酒研淘去沙石曬乾）四兩為末

右先將乳香没藥於陰涼處細研次入麝香次入藥末再研滴水和圓如彈子大每服一圓薄荷酒磨化下食後臨卧服

大聖一粒金丹 治男子婦人急患中風左癱右瘓手足亸曳口眼喎斜涎潮語澀遍身疼痛偏正頭風及一切風疾悉皆療之

大黑附子（炮去皮尖）　大川烏頭（炮去皮尖）
新羅白附子（炮）各二兩　白蒺藜（炒去尖）　白殭蠶（洗去絲嘴炒）各乙兩
五靈脂（研）　没藥（別研）　白礬（枯別研）　麝香（淨肉研）
細香墨（燒醋淬）　朱砂（研）各半兩　金箔（為衣）

右前六味同為細末後四味研停合和用井花水一盞研墨盡為度將墨汁搜和杵臼內搗伍伯下圓如彈子大金箔為衣窨乾每服一粒食後臨卧生薑自然汁磨化入熱酒服再以熱酒隨意多少飲之就無風處卧衣被蓋覆汗出即差病少者每粒分二服忌發風物孕婦不可服

[illegible] 治一切風氣左癱右瘓口眼喎斜半身不遂語言謇澀精神恍惚痰涎壅塞筋脈拘攣或遍身頑痺走疰瘙痒痛腳膝緩弱行步艱難又治打撲傷損瘀血不散痛不可忍或行路勞傷腳膝浮腫疼痛或腎臟風虛上攻面腫耳鳴下疰腳膝沉重及治偏正頭疼攻疰眼目並皆療之

龍骨（[illegible]）　蜈蚣（[illegible]）

赤小豆生用 虎骨酥炙去脂 白殭蠶炒去絲嘴 草烏頭炮去皮尖

白膠香研 天麻去蘆 川牛膝酒浸 川當歸去蘆

全蠍去毒 乳香研 木鱉仁去殼別研

右為細末用醋糊圓如梧桐子大每服伍圓至柒圓冷酒茶

下或冷茶清下亦得不計時候忌諸熱物每服後久此藥化

臨睡服尤妙忌濕麵炙煿鮓醬熱毒動風等物

【省風湯】治卒急中風口噤全不能言口眼喎斜筋脉攣急抽

掣疼痛風盛痰實旋暈僵仆頭目眩重胸膈煩滿左癱右瘓

手足麻痺骨節煩疼步履艱辛恍惚不定神志昏憒一切

風證可預服之

防風去蘆 南星生用各肆兩 半夏白好者水浸洗生用

黃芩去腐 甘草生用各貳兩

右㕮咀每服四大錢用水弍大盞生薑拾片煎至壹中盞去

滓溫服不拘時候

【消風散】治年深日近偏正頭疼又治肝臟久虛血氣衰弱風

毒之氣上攻頭痛頭眩目暈心忪煩熱百節酸疼腦昏目痛

鼻塞聲重項背拘急皮膚瘙痒面上遊風狀若蟲行又一切

頭風兼治婦人血風攻注頭目昏痛並皆治之常服清頭目

利咽膈消風壅化痰涎 又方見後

川烏炮去皮 防風去蘆 川芎洗 白殭蠶去絲嘴炒

荊芥去梗 石膏煅 甘草炙各壹兩 白附子炮

羌活去蘆 全蠍去毒 白芷 天南星炮

天麻去蘆 地龍去土 乳香研 草烏炮去皮尖

沒藥別研 雄黃各壹分

右為細末每服半錢入好茶少許同調食後及臨睡服

【乳香圓】治一切風疾左癱右瘓口眼喎斜半身不遂語言蹇

澀精神恍惚痰涎壅塞手足嚲曳筋脉拘攣或遍身頑痺走

注疼痛腳膝緩弱行步艱辛又治打撲傷損瘀血不散痛不

南星生壹兩 木香壹分 川烏生去皮 附子生去皮臍

右㕮咀每服半兩水弍大盞薑拾伍片煎至捌分去滓溫服

不拘時候

【大醒風湯】治中風痰厥涎潮昏運手足搐搦半身不隨及歷

節痛風筋脉攣急並皆治之

南星生捌兩 防風生肆兩 獨活生 附子生去皮臍

全蠍微炒 甘草生各貳兩

右㕮咀每服肆錢重水貳大盞生薑貳拾片煎至捌分去滓

溫服不拘時候日進貳服

【五痺湯】治風寒濕邪客留肌體手足緩弱麻痺不仁或氣血

失順痺滯不仁並皆治之

片子薑黃洗去灰土 羌活 白朮

防己各壹兩 甘草微炙半兩

右㕮咀每服肆錢重水壹盞半生薑拾片煎至捌分去滓病

在上食後服病在下食前服

【□風圓】治心臟因驚搐神不守舍風涎潮作手足抽掣事多健

忘舉止失常神情昏塞並宜服之

天南星[illegible] 朱砂貳兩別研 琥珀壹兩別研

右研停生薑汁煮麪糊圓如梧桐子大每服叁拾圓加至伍

拾圓煎石菖蒲人參湯送下食後臨臥服

【□經圓】治筋骨諸疾手足不隨不能行步運動但不曾針灸

傷筋脉者服伍圓必效此藥尤能通行榮衛導經絡專治心

腎肝叁經服後小便少淋澀乃其驗也 又方見後

木鱉子去殼別研 白膠香研 五靈脂 草烏頭生去皮臍各叁兩半

當歸壹兩去土 斑猫壹伯箇去頭足翅少醋炙

右件肆味為末與前貳味和停用黑豆去皮生杵粉壹斤醋

煮為糊和藥圓如雞頭大每服壹圓溫酒磨下

活血應痛丸 治丈夫元臟氣虛婦人脾血久冷諸般風邪濕毒之氣留滯經絡流注腳手筋脈攣拳或發赤腫行步艱辛腰腿沉重腳心吊痛及上衝腹脇膨脹胸膈痞悶不思飲食衝心悶亂及一切痛風走注渾身疼痛

川烏(炮去皮臍) 草烏(炮去皮臍) 地龍(去土) 天南星(炮各陸兩)

乳香(研) 沒藥(各貳兩貳錢研)

右為細末入研藥和勻酒麪糊為圓如梧桐子大每服貳拾圓空心日午冷酒送下荊芥茶下亦得

七生圓 治丈夫婦人三十六種風五般腰疼打撲傷損入骨疼痛骨髓拘急手足頑麻走疰不定筋脈攣縮久患風疾皆療之

地龍(去土) 五靈脂(去石) 松脂(去木) 荊芥(去梗)

川烏(炮去皮尖) 天南星(炮各壹兩) 草烏(炮去皮尖貳兩)

右為細末醋煑麪糊為圓如梧桐子大每服伍圓至柒圓茶酒任下孕婦不可服

[illegible] 方見傷寒門

乳香趁痛散 方見[illegible]

川芎[illegible]圓 治一切中風頭疼

白芷(生) 藁本(各貳兩) 軟石膏(細研) 川烏(去皮尖炮)

南星(各洗半斤) 麻黃(去根節) 薄荷(各半斤) 京墨([illegible])

右為細末煉蜜杵圓如彈子大每服壹圓薄荷茶嚼下

[illegible]圓 治[illegible]心氣心受風邪發作牙關緊急涎潮昏塞醒則精神若癡大宜服之

紫蘇子(壹兩) 橘紅 南木香 附子(生去皮臍)

麻黃(去根節) 花蛇(酒浸炙去皮骨) 白殭蠶(微炒) 南星(洗[illegible])

天麻(去苗各半兩) 朱砂(壹分[illegible]) 乾蠍(壹分去毒[illegible])

右為末入研腦麝少許同研極停煉蜜杵圓如龍眼大每服壹粒用金銀薄荷湯化下溫酒亦得[illegible]

[illegible]

舒筋圓 治腎臟虛為風濕寒暑進襲四氣相搏半身不遂手足頑麻骨節煩疼足脛浮腫或發熱漸成腳氣肝腎不足四肢攣急遍身攻注或閃肭打撲內傷筋骨男子疝氣婦人經脈不調常服活血止痛補虛壯筋骨

川楝子(剉炒) 牽牛子(炒) 烏藥(去木) 茴香(淘去沙土炒)

橘皮(去白) 萆薢(微炙) 防風(各壹兩) 乳香(研)

草烏([illegible]) 五靈脂([illegible]) (各半兩)

威靈仙(去蘆洗二兩)

右為細末酒糊為圓如梧桐子大每服伍拾圓鹽湯鹽酒任下婦人醋湯下

[illegible]圓 治足三陰經虛為風寒暑濕進襲挾痰流注攻腎脇有積下注腳膝疼痛漸成腳氣腫滿行步艱辛足心如火上氣喘急食不思食

薏苡仁(炒) 石南葉 石斛(去根) 萆薢(微炙)

川牛膝(去苗酒浸) 天南星(炮) 羌活(去蘆) 防風(去蘆叉)

黃耆(去蘆蜜炙) 當歸(酒浸) 天麻(去苗) 續斷(各壹兩半)

檳榔(二兩半) 木瓜(四兩)

右為末酒煑麪糊圓如梧桐子大每伍拾圓溫酒鹽湯任服

大聖[illegible] 治丈夫女人一切風疾氣血俱虛陰陽偏發卒暴中風僵仆昏塞涎潮搐搦腳手顫掉不省人事舌強失音手足嚲曳口眼喎斜或癱瘓偏枯半身不遂語言謇澀舉止錯亂四肢麻木又治癲癇倒卧目瞑不開涎盛作聲或角弓反張目睛直視口禁悶絕牙關緊急又治風搏於陽經目眩頭痛耳作蟬聲皮膚瞤搐頻欠好睡項強拘急不能回顧及腎臟風虛腳膝疼痛步履艱辛偏風流注一身臂伸不得無問久新並皆治之

方與前大聖一粒金丹同

右為細末拌勻用[illegible]汁和藥每壹兩分作陸圓窨乾用

金牧分炙等服一圓用生薑半兩和皮擦取自然汁烊藥開於薑汁內化盡爲度用無灰酒半盞暖熱同浸化温服量病人酒性多少更吃温酒一二升投之以助藥力次用衣被蓋覆便卧汗出爲度覺輕若每服半圓不拘時如有風疾常服尤佳補五臟固真元通流關節袪逐風邪壯筋骨活血駐顏

四生圓 專治左癱右瘓口眼喎斜中風涎急半身不遂不能舉者悉皆療之

五靈脂去石　骨碎補　川烏頭去皮　當歸各等分

右爲細末用無灰酒打麪糊爲圓如梧桐子大每服七圓漸加至拾圓至拾伍圓温酒下服此藥莫服[illegible]恐藥無効

左經圓 治左癱右瘓脚弱不能行履

木鼈子去殼研　白膠香研　五靈脂各二兩　草烏去皮尖四兩

赤小豆一兩爲末打糊

右末赤小豆糊爲圓如梧子大每服一圓旋加至拾圓温酒或木瓜湯下病在上食後臨卧服病在下空心服忌熱物少時

大防風湯 袪風順氣活血脉壯筋骨除寒濕逐冷氣又治患痢後脚痛瘓弱不能行履名曰痢風或兩膝腫大痛髀脛枯腊但存皮骨拘攣踡卧不能屈伸名曰鶴膝風服之氣血流暢肌肉漸生自然行履如故

川芎一兩半　附子一兩半炮去皮臍　熟乾地黄洗　白朮

防風去蘆　當歸去蘆酒浸炒　白芍藥　黄芪

杜仲去粗皮炒令絲斷　羌活去蘆　人參去蘆

甘草炙各二兩　牛膝去蘆酒浸切焙各一兩

右爲麁末每服伍錢水壹盞半入生薑柒片大棗壹枚同煎捌分去滓温服空心食前

[illegible] 治男子五勞七傷榮衛俱虛精神耗減行步艱辛飲食無味眼昏耳焦面色黧黑皮膚枯燥女人血海虛冷月經不調臟寒少子下部[illegible]又治[illegible]傷風傷寒諸風諸證並皆療之

人參　黄芪蜜炙各一兩　附子炮　川椒去目炒出汗

蓯蓉酒浸焙各四兩　川烏炮　茯苓白　甘草各一兩

白朮各一兩　菟絲子酒浸　覆盆子　天南星湯洗生薑炒

防風去蘆　白附子　何首烏　牛膝去蘆酒浸二兩

狗脊去毛　赤小豆　骨碎補去毛　烏藥

羌活　萆薢各二兩　木鼈子去殼　地龍去土各三兩

右爲細末煮酒麪糊爲圓如梧桐子大每服三十圓加至四十圓空心温酒吞下[illegible]

伏[illegible] 專治左癱右瘓[illegible]方

生乾地黄　蔓荊子去白　白殭蠶炒去絲各一分　五靈脂去石半兩

躑躅花炒　天南星　白膠香　草烏頭各一兩

右爲細末酒煮半夏末爲糊圓如龍眼大每一圓分作四服酒吞下日進二服[illegible]

烏藥順氣散 治男子婦人一切風氣攻注四肢骨節疼痛遍身頑麻頭目旋暈及療癱瘓語言謇澁筋脉拘攣又治脚氣步履艱難脚膝軟弱婦人血風老人冷氣上攻胸臆兩脇刺痛心腹膨脹吐瀉腸鳴

麻黄去根節　陳皮去白　烏藥去木各二兩　白殭蠶去絲嘴炒

川芎　枳殼去穰麩炒　甘草炒　白芷

桔梗各一兩　乾薑炮半兩

右爲細末每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎至七分温服如四時傷寒憎寒壯熱頭痛肢體倦怠加葱白三寸同煎

併服出汗見效如閃挫身體疼痛温酒調服遍身瘙痒抓之成瘡用薄荷三葉煎服孕婦不可服常服疎風順氣

[illegible]圓 治腎經虛弱下注腰膝或當風取凉冷氣所乘沉重少力移步艱緩筋脉拘攣不能屈伸腳心隱痛有妨履地大治乾濕腳氣赤腫痛楚發作無時呻吟難忍氣滿喘促舉動艱難面色黧黑傳送秘澀並皆療之

薏苡仁　石南葉　天南星炮　川牛膝酒浸焙
肉桂去麄皮　當歸去蘆　天麻去苗　附子炮去皮臍
羌活　防風去叉　石斛去根　萆薢微炙
黃芪蜜炙　續斷各一兩　蒼朮米泔浸一兩半　檳榔半兩
乾木瓜四兩

右為細末麪糊為圓如梧桐子大每服三十圓至五十圓空心温酒或木瓜湯吞下日進二三服常服舒筋輕足永無腳氣之患（昔人有此疾服之一月腳力頓覺有健壯之功）

左經圓 治左癱右瘓手足顫掉言語謇澀渾身疼痛筋脉拘攣不得屈伸項背强直下注腳膝行履艱難骨節煩痛不能轉側跌撲閃肭外傷內損並皆治之常服通經絡活血脉疎風順氣壯骨輕身

生黑豆一斤以斑猫二十一个去頭足同煮候豆脹為度去斑猫不用取豆焙乾
川烏炮去皮臍二兩　乳香研一兩　沒藥一兩半　草烏炮四兩

右為末醋糊為圓如梧桐子大每服三十圓温酒下不拘時

木瓜圓 治腎經虛弱下攻腰膝沉重少力腿腳腫痒注破生瘡腳心隱痛筋脉拘攣或腰膝緩弱步履艱難舉動喘促面色黧黑大小便秘澀飲食減少無問久新並宜服之

熟乾地黃洗焙　陳皮去白　烏藥各四兩　黑牽牛三兩炒
石南藤　杏仁去皮尖　當歸　肉蓯蓉酒浸焙
乾木瓜　續斷　牛膝酒浸各二兩　赤芍藥一兩

右為細末酒糊為圓如梧桐子大每服三五十圓空心木瓜湯下温酒亦可

[illegible]圓 治一切風疾生癱右瘓半身不遂口眼喎斜牙關緊急語言蹇澁筋脉攣急骨節痛上攻下疰遊走不定腰腿沉重耳鳴重聽腳膝緩弱不得屈伸步履艱難遍身麻痺皮膚頑厚又婦人血風攻疰身體疼痛面浮肌瘦口苦舌乾頭旋目眩昏困多睡或皮膚瘙痒癮疹生瘡暗風夾腦偏正頭疼並治之

威靈仙　狗脊去毛各四兩　何首烏
乳香研一兩　五靈脂酒浸淘去沙石　川烏各一兩炮去皮臍

右為末酒糊為丸每服十五圓加至二十圓麝香温酒吞下只温酒亦得食前空服常服輕身體壯筋骨通經活絡除濕去風孕婦不可服

磁石圓 治腎藏風毒上攻頭面浮腫耳鳴眼暗頭皮腫痒太陽穴痛鼻塞腦悶牙齒動搖項背拘急渾身瘙痒癮疹生瘡百節疼痛皮膚頑痺下疰腳膝筋脉拘攣不能屈伸腳下隱痛步履艱難並宜服之常服能補益去風明目活血駐顏

磁石火煅醋淬不知數一十兩　木二十四兩去蘆頭　牛膝六兩酒浸焙　黃蜀葵八兩炒
川芎　肉桂去麄皮　赤芍藥　黑牽牛各四兩炒
草烏十四兩炮去皮臍

右為細末酒糊為丸每服三十圓服葱茶酒吞下煨葱茶下亦得偏正頭疼生葱茶下婦人血風渾身疼痛頭目眩暈面浮肺重荊芥湯下日進三服大有神效

胡麻散 治脾肺風毒攻衝遍身皮膚瘙痒或生瘡疥或生癮疹用手搔時浸淫成瘡久而不瘥愈而復作面上遊風或如蟲行紫癜白癜頑麻等風或腎藏風攻注腳膝生瘡並宜服之

胡麻十二兩　荊芥　苦參各八兩　何首烏十兩洗焙
甘草炙　威靈仙各六兩

右為細末每服二錢薄荷茶點食後服或酒調蜜湯點亦得服此藥後頻頻洗浴貴得汗出而立効

〔□□圓〕治一切風疾及癱瘓風手足顫掉渾身麻痺肩背拘急骨節疼痛攣痹婦人血風頭旋眼暈精神困倦

牡丹皮　白芍藥　川芎　麻黃去根節各四兩

赤芍藥　甘草各十兩　荊芥　草烏炮六兩

烏豆八兩　何首烏十二兩米泔浸切焙

右為細末水糊為圓如雞頭大每服一丸細嚼茶酒任下不計時候婦人血風流注用當歸酒下小兒驚風煎金銀湯化傷風咳嗽消白麻黃下頭痛荊芥茶下

追風散 治證與前追風散同

白殭蠶去絲嘴炒　全蝎微炒　甘草炙　荊芥各二兩

川烏炮去皮臍　防風去蘆叉　石膏各研四兩　川芎三兩

麝香三兩研

右為細末每服半錢好茶調下食後臨卧服常服清頭目利咽膈消風壅化痰涎

苦參圓 治心肺積熱腎臟風毒攻於皮膚時生疥癩瘙痒難忍時出黃水及大風手足爛壞眉毛脫落一切風疾並皆治之

苦參三十二兩　荊芥去梗十六兩

右為細末水糊為丸如梧桐子大每服三十丸好茶吞下或荊芥湯下食後服

大平惠民和劑局方卷之一

太平惠民和劑局方卷二

治傷寒 附中暑

人參敗毒散 治傷寒時氣頭痛項強壯熱惡寒身體煩疼及寒壅咳嗽鼻塞聲重風痰頭痛嘔噦寒熱並皆治之

柴胡去苗　甘草爁　桔梗　人參去蘆

芎藭　茯苓去皮　枳殼去瓤麩炒　前胡去苗洗

羌活去苗　獨活去苗

右拾味各壹拾兩為麤末每服貳錢水壹盞入生薑薄荷各少許同煎柒分去滓不拘時候寒多則熱服熱多則溫服

小柴胡湯 治傷寒溫熱病身熱惡風頸項強急胸脅滿痛嘔噦煩渴寒熱往來身面皆黃小便不利大便秘硬或過經未解或潮熱不除及瘥後勞復發熱疼痛婦人傷風頭痛煩熱經血適斷寒熱如瘧發作有時及產後傷風頭痛煩熱並宜服之

半夏湯洗七次焙乾半　柴胡去蘆半斤

人參　甘草炙　黃芩各參兩

右為麤末每服叁大錢水壹盞半生薑伍片棗壹箇擘破同煎至柒分去滓稍熱服不拘時小兒分作貳服量大小加減

〔□□散〕治傷寒及時行疫癘頭痛項強壯熱惡寒腰背四肢拘急煩疼面赤咽乾喘逆煩渴

麻黃去節　肉桂去麤皮　蒼朮去皮　川大黃

乾葛　石膏　山梔子去皮各壹兩半

木通　瞿麥　甘草炙　前胡

川芎各壹兩[illegible]　川烏頭炮去皮臍半兩

右為麤末每服貳錢水壹盞入林檎拾數片新者亦得煎至柒分去滓稍熱服不計時相次再服衣被蓋覆汗出為度

柴胡石膏散 治時行溫疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞咽乾心胸

滿寒熱往來痰實欬嗽涕唾稠粘

赤芍藥 柴胡去苗 前胡去苗 石膏煅

乾葛各伍拾兩 升麻貳拾伍兩 黃芩 桑白皮各參拾柒兩半

荊芥穗去土參拾柒兩半

右為麄末每服貳錢水壹盞入生薑參片豉拾餘粒同煎柒分去滓稍熱服小兒分作參服更量大小加減不計時候

麻黃湯 治傷寒頭痛發熱惡風骨節疼痛喘滿無汗

麻黃去節參兩 甘草炙壹兩 肉桂去粗皮貳兩 杏仁柒拾枚去皮尖炒別研膏

右為麄末入杏仁膏令勻每服參錢水壹盞半煎至捌分去滓溫服以汗出為度若病自汗者不可服不計時候

小青龍湯 治傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱欬嗽微喘又治溢飲身體疼重及欬逆倚息不得臥或因形寒飲冷內傷肺經欬嗽喘急嘔吐涎沫並宜服之

乾薑炮 細辛去葉 麻黃去節根 肉桂去粗皮

芍藥 甘草炒各參兩 五味子貳兩 半夏湯洗柒次切片貳兩半

右將柒味為麄末入半夏令勻每服參錢水壹盞半煎至柒分去滓溫服食後

聖散子 治傷寒時行疫癘風溫濕溫一切不問陰陽兩感表裏未辨或外熱內寒或內熱外寒頭項腰脊拘急疼痛發熱惡寒肢節疼重嘔逆喘欬鼻塞聲重及食飲生冷傷在胃脘胸膈滿悶腹脇脹痛心下結痞手足逆冷腸鳴泄瀉水穀不消時自汗出小便不利並宜服之

厚朴去粗皮薑汁炙 白朮 防風去蘆頭 吳茱萸湯洗柒次

澤瀉 附子炮裂去皮臍 藁本去土 高良薑

猪苓去皮 藿香去枝土 蒼朮 麻黃去根節

細辛去苗 芍藥 獨活去蘆 半夏湯洗柒次薑汁製

茯苓去皮 柴胡去蘆 枳殼去瓤麩炒各半兩

甘草炙壹兩 草豆蔻仁拾個去皮 石菖蒲各半兩

右為麄散每服肆錢水壹盞半煎取壹盞去滓熱服不計時候取遍身微汗即愈時氣不和空腹飲之以辟邪疫

五積散 調中順氣除風冷化痰飲治脾胃宿冷腹脇脹痛胸膈停痰嘔逆惡心或外感風寒內傷生冷心腹痞悶頭目昏痛肩背拘急肢體怠惰寒熱往來飲食不進及婦人血氣不調心腹撮痛經候不調或閉不通並宜服之

白芷 川芎 甘草炙 茯苓去皮

當歸去蘆 肉桂去粗皮 芍藥 半夏湯洗柒次各參兩

陳皮去白 枳殼去瓤炒 麻黃去根節各陸兩 蒼朮米泔浸去皮貳拾肆兩

乾薑爁肆兩 桔梗去蘆頭拾貳兩 厚朴去粗皮肆兩

右除肉桂枳殼貳味別為麄末外壹拾參味同為麄末慢火炒令色轉攤冷次入桂枳殼末令勻每服參錢水壹盞半入生薑參片煎至壹中盞去滓稍熱服如冷氣奔衝心脇臍腹脹滿刺痛反胃嘔吐泄利清穀及痃癖癥瘕膀胱小腸氣痛即入煨生薑參片鹽少許同煎如傷寒時疫頭痛體疼惡風發熱項背強痛入葱白參寸豉柒粒同煎若但覺惡寒或身不甚熱肢體拘急或手足厥冷即入炒茱萸柒粒鹽少許同煎如寒熱不調欬嗽喘滿入棗煎服婦人難產入醋壹合同煎服之並不拘時候

升麻葛根湯 治大人小兒時氣溫疫頭痛發熱肢體煩疼及瘡疹已發及未發疑貳之間並宜服之

升麻 白芍藥 甘草炙各拾兩 葛根拾伍兩

右為麄末每服參錢用水壹盞半煎取壹中盞去滓稍熱服不計時候日貳參服以病氣去身清涼為度小兒量力服之

葛根解肌湯 治傷寒溫病時行寒疫頭痛項強發熱惡寒肢體拘急骨節煩疼腰脊強痛胸膈煩悶

葛根肆兩 麻黃去節參兩 肉桂去粗皮壹兩

甘草炙 黃芩 芍藥各貳兩

右為麤末每服叁錢水壹盞半入棗壹枚劈破煎至捌分去
滓稍熱服不拘時候取汗出為度

金沸草散 治風化痰除頭目昏痛頸項強急往來寒熱肢體煩
疼胷膈滿悶痰涎不利欬嗽喘滿涕唾稠粘及治時行寒疫壯
熱惡風

旋覆花去梗　麻黃去節　前胡去蘆各叁兩　荊芥穗肆兩
甘草炒　半夏湯洗七次薑汁浸　赤芍藥各壹兩

右為麤末每服叁錢水壹盞半入生薑叁片棗一箇同煎至
捌分去滓溫服不計時候有寒邪則汗出如風盛則解利

大柴胡湯 治傷寒拾餘日邪氣結在裏寒熱往來大便秘澀腹滿
脹痛譫語心中痞鞕飲食不下或不大便伍陸日繞臍刺
痛時發煩躁及汗後如瘧日晚發熱兼臟腑實脈有力者可服

枳實去穰麸炒半兩　柴胡去蘆半斤　大黃二兩　半夏湯洗七次切貳兩半
赤芍藥　黃芩各叁兩

右伍味為麤末入半夏拌勻每服叁大錢以水壹盞半入生
薑伍片棗壹枚煎至壹中盞濾去滓溫服食後臨卧此藥治
傷寒內熱裏實若身體疼痛是表證未解不可服之

术附湯 治風濕相搏身體疼煩不能轉側不嘔不渴大便堅硬
小便自利及風虛頭目眩重甚者不知食味此藥暖肌補中助
陽氣止自汗

甘草貳兩炒　白术四兩　附子炮去皮臍薄切片壹兩半

右搗白术甘草為麤末入附子令勻每服叁錢水壹盞半入
生薑伍片棗壹箇擘破同煎至壹盞去滓溫服食前

防己黃芪湯 治風濕相搏客在皮膚一身盡重四肢少力關節
煩疼時自汗出洒淅惡風不欲去衣及治風水客搏腰脚浮腫
上輕下重不能屈伸

防己肆兩　黃芪伍兩　甘草炙貳兩　白术叁兩

右為麤末每服叁錢水壹盞半入生薑叁片棗壹箇同煎至
壹盞去滓稍熱服不計時候服訖蓋覆溫用令微汗差

乾薑附子湯 治傷寒已經轉下又曾發汗內外俱虛邪氣未解表證
不見身無大熱晝日煩躁不得眠睡夜即安靜不嘔不渴脈
沉微者宜服之又治暴中風冷久積痰水心腹冷痛霍亂轉筋
一切虛寒並皆治之

乾薑壹兩　附子生去皮臍細切壹枚

右合勻每服叁錢水壹盞半煎至壹盞去滓溫服食前

竹葉石膏湯 治傷寒時氣表裏俱虛遍身發熱心胷煩悶或得
汗已解內無津液虛羸少氣胷中煩滿氣逆欲吐及諸虛煩熱
並宜服之諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不疼痛頭亦不
痛脈不緊數即不可汗下宜服此藥

人參去蘆貳兩　甘草炙貳兩　石膏壹斤　半夏湯洗七次貳兩半
麥門冬去心伍兩半

右為麤末入半夏令勻每服叁錢水兩盞入青竹葉生薑各
伍陸片煎至壹盞半濾去滓入粳米百餘粒再煎米熟去米
溫服不計時候

五苓散 治傷寒溫熱病表裏未解頭痛發熱口燥咽乾煩渴飲
水或水入即吐或小便不利及汗出表解煩渴不止者宜服之
又治霍亂吐利躁渴引飲

澤瀉貳拾伍兩　白术　猪苓去皮　赤茯苓去皮各拾伍兩
肉桂去粗皮拾兩

右為細末每服貳錢熱湯調下不計時候服訖多飲熱湯有
汗出即愈又治瘀熱在裏身發黃疸濃煎茵蔯蒿湯調下食
前服之疸病發渴及中暑引飲亦可用水調服之小兒加白
术末少許服之如發虛熱加綿黃蓍人參末少許服之

四逆湯 治傷寒自利不渴嘔噦不止或吐利俱發小便或澀或
利或汗出過多脈微欲絕腹痛脹滿手足逆冷及一切虛寒厥
冷並宜服之凡病傷寒有此證候皆由陽氣虛裏有寒雖更覺

頭痛壯熱發熱惡寒四肢拘急表證未罷者不可攻表先宜服
此藥助陽救裏

甘草炙貳兩　乾薑壹兩半　附子半兩炮去皮臍細切

右以甘草乾薑爲麁末入附子令勻每服叁錢水壹盞半煎
至壹中盞去滓溫服不計時候常服消暑氣分水穀

大順散 治冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分清濁相干
陰陽氣逆霍亂嘔吐臟腑不調

甘草剉寸長叁拾斤　乾薑　杏仁去皮尖炒　肉桂去粗皮各肆斤

右先將甘草用白砂炒及八分黃熟次入乾薑同炒令薑裂
次入杏仁又同炒候杏仁不作聲爲度用篩隔淨後入桂壹
處搗羅爲散每服貳錢水壹中盞煎至柒分去滓溫服如煩
躁井花水調下不計時候以沸湯點服亦得

白虎湯 治傷寒大汗出後表證已解心胸大煩渴欲飲水及吐
或下後七八日邪毒不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上
乾燥而煩欲飲水數升者宜服之又治夏月中暑毒汗出惡寒
身熱而渴

知母肆兩　甘草炙貳兩　石膏搗碎壹斤半

右爲細末每服叁錢水壹盞半入粳米叁拾餘粒煎至壹盞
濾去滓溫服小兒量力少與之或加人參少許同煎亦得食
後服此藥立夏後立秋前可服春時及立秋後并亡血虛家
並不可服

香薷圓 治大人小兒傷暑伏熱躁渴瞀悶頭目昏眩胸膈煩滿
嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食或發霍亂吐利轉筋
並宜服之

香薷去土　紫蘇莖葉　乾木瓜各壹兩　丁香
茯神去木　檀香剉　藿香葉　甘草炙各伍錢

右爲細末煉蜜和圓每兩作叁拾圓每服壹圓至貳圓細嚼
溫湯下或新汲水化下亦得小兒服半圓不計時候

香薷散 治臟腑冷熱不調飲食不節或食腥鱠生冷過度或起
居不節或露臥濕地或當風取涼而風冷之氣歸於三焦傳於
脾胃脾胃得冷不能消化水穀致令真邪相干腸胃虛弱因飲
食變亂於腸胃之間便致吐利心腹疼痛霍亂氣逆有心痛而
先吐者有腹痛而先利者有吐利俱發者有發熱頭痛體疼而
復吐利虛煩者或但吐利心腹刺痛者或轉筋拘急疼痛或但
嘔而無物出或四肢逆冷而脈欲絕或煩悶昏塞而欲死者此
藥悉能主之

白扁豆微炒　厚朴去粗皮薑汁炙熟各半斤　香薷去土壹斤

右麁末每服叁錢水壹盞入酒壹分煎柒分去滓水中沉冷連
喫兩服立有神效隨病不拘時候 **一方** 不用白扁豆加黃
連肆兩剉碎以生薑汁同研勻炒令黃色名曰**黃連香薷散**

枇杷葉散 治冒暑伏熱引飲過多脾胃傷冷飲食不化胸膈痞
悶嘔噦惡心頭目昏眩口乾煩渴肢體困倦全不思食或陰陽
不和致成霍亂吐利轉筋煩躁引飲

枇杷葉去毛炙　陳皮湯浸去白焙　丁香各半兩　厚朴去皮塗薑汁炙肆兩
白茅根　麥門冬去心　乾木瓜　甘草炙各壹兩
香薷叁分

右件藥搗羅爲末每服貳錢水壹盞入生薑叁片煎至柒分
去滓溫服溫水調下亦得如煩躁用新汲水調下不計時候
小兒三歲已下可服半錢更量大小加減

[illegible]人參散 治傷寒體熱頭痛及風壅痰嗽咯血等疾

甘草炙六兩　人參　桔梗微炒　青皮去瓤
白芷　乾葛　白朮各叁兩　乾薑炮伍兩半

右爲細末每服貳錢水壹盞入生薑叁片棗貳箇煎柒分通口
進如傷寒入豆豉同煎熱進大有神效不計時候 一方無白朮

香蘇散 治四時瘟疫傷寒

香附子炒香去毛　紫蘇葉各肆兩　甘草炙壹兩　陳皮貳兩不去白

右為麄末，每服叁錢，水壹盞，煎柒分，去滓熱服，不拘時候，日叁服。若作細末，只服弍錢，入鹽點服。常有白髮老人，皆賴此方，凡有大疫疾，即以藥給與其人。家家如此，人人服之，其疫即退。

大已寒圓 治諸方見寒疾類，治久寒積冷，臟腑虛弱，心腹疞痛，脇肋脹滿，泄瀉腸鳴，自利自汗，米穀不化，陽氣暴衰，陰氣獨勝，手足厥冷，傷寒陰盛，神昏脈短，四肢怠惰，並宜服之

蓽撥　肉桂各四斤　乾薑炮　高良薑各六斤

右為細末，水煮麪糊為圓，如梧桐子大，每服弍拾粒，米飲湯下，食前服之

太陽丹 治頭疼，傷寒風氣，偏正夾腦，一切頭疼，每服壹粒，清荷茶嚼下。風壅痰盛，咽膈不利，亦宜服之

腦子　川芎　甘草　白芷各壹斤　石膏　大川烏炮去皮臍

右為細末，蜜同麪糊為圓，每兩作壹拾捌粒，朱砂為衣

和解散 治男子婦人四時傷寒頭痛，憎寒壯熱，煩躁自汗，欬嗽吐痢

厚朴去皮薑汁炙　陳皮各四兩　藁本　桔梗　甘草各半斤　蒼朮去皮壹斤

右同為麄末，每服叁錢，水壹盞半，入生薑叁片，棗貳枚，煎至柒分，不計時候熱服

正氣散 治傷寒陰證，憎寒惡風，正氣逐冷，胸膈噎塞，脇肋膨脹，心下堅痞，吐痢嘔逆，酸水欬逆，怠惰，不思飲食

甘草炒　陳皮　藿香　白朮各壹兩　厚朴　半夏

右為細末，每服貳錢，生薑叁片，棗壹枚，水壹盞，煎至柒分，食前稍熱服。又治久患瘧疾，膈氣心痛，日進叁服。常服順氣寬中，辟除瘟疫

十補圓 治丈夫五勞七傷，渾身疼痛，四肢拘急，腰脚無力，脚氣流注，腿痛，行步不得，及虛勞等患，並皆治之。氣虛不思飲食，霍亂吐瀉，四肢冷麻

五加皮　陳皮　乾薑炮　甘草炙　桔梗　羌活　黃芪　肉桂去粗皮　蒼朮　附子炮　大川烏

右為細末，每服貳錢，水壹盞，薑貳片，棗壹枚，煎至柒分，不拘時候熱服。空心酒調服亦得

如聖圓 治男子婦人五勞七傷，感冷冒寒，氣弱虛羸，少力，常服壯筋骨，快體輕健，進食

天仙藤　青蒿子　桑白皮炒　香附子炒　荊芥穗　前胡　柴胡　桔梗　麻黃去根節　蒼朮炒　乾葛　陳皮各拾斤　茴香炒　秦艽　川芎　白芍藥　藁本　黃芪　半夏　羌活各貳斤半　甘草炒　肉桂去粗皮　白芷　厚朴去粗皮薑汁炙

右貳拾肆味為麄末，每服叁大錢，水壹盞半，入生薑鳥梅棗子，煎至柒分，去滓溫服，併兩滓作服

桂苓圓 大解暑毒

肉桂去粗皮不見火　茯苓去皮各等分

右為細末，煉蜜為圓，每兩作捌圓，每服壹圓，用新汲水或熱水嚼下，化下亦得

消暑圓 治傷暑發熱頭疼

半夏醋煮伍斤　甘草生　茯苓去皮各半斤

右細末，生薑汁作薄糊為圓，如梧子大，每服伍拾粒，水下。易簡方云：此藥合時須用好醋煮，半夏薑汁作糊，無見生水，臻志修合，用之神效。中暑為患，藥下即甦。傷暑發熱頭疼，用之尤驗。夏月常服，止渴利便，雖多飲水，亦不為害。應是暑藥

皆不及此若嬈飲佐節並用姜湯嚥下入夏之後不可闕此

辰砂五苓散治傷寒表裏未解頭痛發熱心胸鬱悶唇口乾焦神思昏沉狂言譫語如見神鬼及治瘴瘧煩悶未省者

辰砂研　白朮去芦　木猪苓去黑皮　澤瀉洗各　赤茯苓去皮各拾貳兩　肉桂去粗皮八兩

右為細末每服貳錢沸湯點服不拘時如中暑發渴小便赤澁用新汲水調下小兒五心煩熱焦躁多哭咬牙上攛欲為驚狀每服半錢溫熟水調下

柴胡升麻湯治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞咽乾心胸煩滿寒熱往來痰盛咳嗽涕唾稠粘

柴胡去芦　前胡去芦　乾葛　石膏煅　赤芍藥各拾兩　升麻伍兩　荊芥去梗柒兩半　黃芩去粗皮　桑白皮各陸兩半

右㕮咀每服叁大錢水壹盞半生姜叁片豉拾餘粒同煎壹盞去滓稍熱服不拘時小兒更量大小加減

縮脾飲解伏熱除煩渴消暑毒止吐利霍亂之後服熱藥太多致煩躁者並宜服之

縮砂仁　烏梅肉淨　草菓煨去皮　甘草炙各肆兩　乾葛剉　白扁豆去皮炒各貳兩

右㕮咀每服肆錢水壹大椀煎捌分去滓以水沉冷服以解煩或欲熱欲溫並任意服代熟水飲之極妙

三白散治冒暑伏熱引飲過多陽氣逆霍亂嘔吐小便不利臟腑不調惡心頭暈並皆治之

澤瀉　白朮　白茯苓各等分

右㕮咀每服壹貼水壹盞生姜伍片燈心拾莖煎捌分去滓服不拘時每貼重半兩

神朮散治四時傷寒不問陰陽二證纔覺疾作急服此藥立效

藁本去芦　川芎各貳兩　甘草炒各兩　蒼朮米泔浸去粗皮切炒

右㕮咀為粗末每服叁錢水壹盞半生姜叁片同煎柒分去滓熱服不拘時神效不可具述

人參順氣散治丈夫婦人風虛氣弱榮衛不和肢節疼痛身體沉重頭目旋暈背拘急手足冷麻半身不遂口眼喎斜痰涎不利言語蹇澀或脾胃不和心腹刺痛脇肋脹滿倦怠少力霍亂轉筋吐瀉不止胎前產後並宜服之

乾薑　人參各乙兩　川芎　甘草炙　苦梗去芦　厚朴去粗皮薑汁製　白朮　陳皮洗去白　白芷　麻黃去節各四兩　乾葛去粗皮叁兩半

右為細末每服貳錢水壹盞薑叁片棗壹枚薄荷伍柒葉同煎捌分不拘時如傷風感冷頭疼腰重咳嗽鼻塞加葱白煎

和解散治四時傷寒頭疼項強壯熱惡寒身體煩疼四肢倦怠行步喘乏及寒壅咳嗽鼻塞聲重涕唾稠粘潮熱煩悶並宜服之

荊芥　白芷　陳皮去白　蒼朮　麻黃去節各肆兩　甘草炙貳兩

右細末每服式大錢水壹大盞薑叁片烏梅壹箇同煎柒分不拘時溫服或茶酒調下欲發散風邪入連鬚葱白叁寸同煎

人參養胃湯治外感風寒內傷生冷增寒壯熱頭目昏疼肢體拘急不問風寒二證及內外之殊均可治療先用厚被蓋睡連進此藥數服以薄粥湯之類佐之令四肢微汗濈濈然俟汗乾則徐徐去被謹避外風自然解散若元自有汗亦須溫潤以和解之或有餘熱則以參蘇飲款款調之或尚頭疼則以濃煎生葱白湯下理解于三證既除則不以服藥但節其飲食適其寒溫自然平治大抵感冒古人不敢輕發汗者止由麻黃能開腠理用或不能得其宜則導泄真氣因而致虛變生他證此藥乃平和之劑止能溫中解表而已不致妄擾也兼能辟山嵐瘴氣四時瘟疫常服尤佳

半夏（湯洗）　厚朴（去粗皮薑汁製）　蒼朮（米泔浸）各乙兩　藿香葉（去土）　草果（去皮）　茯苓　白茯苓（去黑皮）　人參各半兩
甘草（炙）弍分半　橘紅　半兩弍分半

右爲㕮咀每服肆錢水壹盞半薑柒片烏梅壹箇煎至柒分去滓熱服之兼治飲食傷脾發爲痎瘧或脾胃中脘虛寒嘔逆惡心皆可化之或發寒瘧寒疫及惡寒者並加附子

（參蘇飲） 治感冒發熱頭疼或因痰飲凝節兼以爲熱並宜服之若因感冒發熱亦如服養胃湯法以被蓋卧連進數服微汗即愈面有餘熱更宜徐徐服之自然平治因痰飲發熱但連日頻進此藥以熱退爲期不可預止雖有前胡乾葛但能解肌耳既有枳殼橘紅輩自能寬中快膈不致傷脾兼大治中脘痞滿嘔逆惡心開胃進食無以踰此毋以性凉爲疑一切發熱皆能取效不必拘其所因也小兒室女亦宜服之

木香半兩　紫蘇葉　乾葛（洗）　半夏（湯洗七次薑汁製炒）
前胡（去苗）　人參　茯苓（去皮）各叁分　枳殼（去穰麩炒）
桔梗（去蘆）　甘草（炙）　陳皮（去白）各半兩

右㕮咀每服肆錢水壹盞半薑柒片棗壹箇煎陸分去滓微熱服不拘時候（易簡方）不用木香只拾味

（神朮散） 治四時瘟疫頭痛項強發熱憎寒身體疼痛及傷風鼻塞聲重咳嗽頭昏並皆治之

蒼朮（米泔浸）伍兩　藁本（去土）　香白芷
細辛（去葉土）　羌活（去蘆）　川芎　甘草（炙）各乙兩

右爲細末每服叁錢水壹盞生薑叁片葱白叁寸煎柒分温服不拘時如覺傷風鼻塞只用葱茶調下

（對金飲子） 治諸疾無不愈者常服固元陽益氣健脾進食和胃祛痰自然榮衛調暢寒暑不侵此藥療四時傷寒極有功效

厚朴（去皮薑汁炙）　蒼朮（米泔浸）乙觔　甘草（炙）各叁兩　陳皮（去白炒令黃）半斤

右爲麤末每服叁錢水壹盞薑叁片棗貳枚煎至柒分去滓食前服食瘧疫時氣貳壹傷寒頭痛壯熱加連鬚葱白伍枚豉叁拾粒同煎服數劑汗出得安如未得汗以稀粥投之厚蓋衣服取汗立愈五勞七傷腳手心熱煩燥不安肢節酸疼加柴胡去蘆頭同煎痰嗽發瘧加薑製半夏煎本臟氣痛加茴香煎水氣腫滿加桑白皮煎婦人赤白帶下加黃耆煎酒傷加丁香食傷加高良薑四時泄瀉加肉豆蔻風疾加荊芥穗腿膝冷疼加牛膝渾身拘急及虛壅加地骨皮腿痒加兎絲子白痢加吳茱萸赤痢加黃連頭風加藁本轉筋霍亂加楠木皮已上功伊止加壹銖此藥不問老少胎前產後五勞七傷六極八邪耳鳴眼昏夢泄盜汗四肢沈重腿膝酸疼婦人宮壯久冷月水不調若能每日空心壹服即出顏容豐肥解調三焦壯筋骨祛冷氣快心胸神效莫述

（[illegible]散） 治五勞七傷四時傷寒山嵐瘴瘧時行疫癘心神煩躁口苦舌乾增寒壯熱頭疼鼻塞腰腳酸疼背脊強急渾身疼痛

地骨皮（去骨）　前胡（去蘆）　荊芥　各壹兩　香附子（炒去毛）
蒼朮（泔浸去皮）　甘草　麻黃（去根節）　白芷　各肆分半
川芎（弍兩弍）　桔梗　當歸　肉桂（去粗皮）乙兩
石膏九分　陳皮　天仙藤弍分

右爲細末每服貳錢水壹盞烏梅半箇入鹽同煎服如要出汗加葱白薑錢煎連進叁服常服温鹽酒調熱鹽湯點亦得

（人參[illegible]散） 解利四時傷寒頭痛壯熱項背拘急骨節煩疼憎寒惡風肢體困倦大便不調小便赤澀嘔噦煩渴或傷風感寒頭痛涕唾鼻塞聲重咳嗽痰涎及山嵐瘴氣時行疫癘潮熱往來及壯熱勞七傷中脘氣滯心腹疼悶停痰嘔噦冷氣奔衝攻疰刺痛又治婦人血氣撮痛經候不調並宜服之

貝母（去心）　白茯苓（去皮）　半夏（湯洗）乙兩　枳殼（去穰麩炒）弍兩半
蒼朮（米泔浸）乙觔　人參　白朮（炒）　白芷（不見火）

陳皮去白　秦艽　赤芍藥各[illegible]兩　川芎
當歸去芦焙　肉桂去粗皮　乾薑炮各[illegible]兩　柴胡去芦
麻黄去根節各[illegible]兩　桔梗去芦　甘草各[illegible]四兩　厚朴[illegible]
右件為細末每服叁錢水壹盞生薑叁片同煎至柒分通口稍熱服身體倦怠加烏梅壹箇咳嗽加棗貳枚同煎不拘時

[illegible]解四時傷寒頭痛壯熱項背拘急骨節煩疼憎寒惡風肢體倦大便不調小便赤澁嘔逆煩渴不思飲食又傷風感寒頭痛体熱鼻塞聲重咳嗽痰涎山嵐瘴氣時行疫癘並皆治之
川芎　蒼术米泔浸　白术各[illegible]兩　甘草炙
石膏煅　乾葛各[illegible]兩　麻黄去根節
右件為細末每服貳錢水壹盞生薑叁片葱白貳寸煎至柒分熱服不拘時候如要出汗併煎叁服被蓋汗出為度

[桂枝湯]治太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔
桂枝去皮　芍藥各[illegible]兩　甘草[illegible]兩
右為麁末每服貳錢以水壹盞入生薑叁片棗叁枚擘破同煎取柒分去滓溫服不計時候惟春初可行自春末及夏至已前可加黄芩半兩夏至後加知母半兩石膏貳兩或升麻半兩若病人素虛寒者不用加減無汗休服

[illegible]治丈夫婦人伏暑發熱作渴嘔吐惡心年深暑毒不瘥者
黄連[illegible]兩　好酒伍升
右黄連以酒煮乾為度研為細末用麵水煮糊搜和為圓如梧桐子大每服叁拾圓熟水吞下又療傷酒過多臟毒下血大便泄瀉用溫米飲吞下食前進壹日兩服

[illegible]治四時傷寒瘟疫時氣頭疼壯熱腰背拘急五勞七傷山嵐瘴氣寒熱往來五膈氣咳嗽痰涎行步喘乏或霍亂吐瀉臟腑虛寒下痢赤白並宜服之
厚朴去粗皮姜汁製　藿香去枝土　甘草炙　半夏[illegible]

蒼术[illegible]　陳皮去白
右等分為剉散每服叁錢水壹盞半生薑叁片棗子貳枚煎至捌分去滓食前稍熱服忌生冷時臟毒物若四方人不伏水土宜服之常服能辟嵐氣調和脾胃美飲食

[川芎茶調散]治丈夫婦人諸風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻塞聲重傷風壯熱肢體煩疼肌肉蠕動膈熱痰盛婦人血風攻注太陽穴疼但是感風氣悉皆治之
薄荷[illegible]　川芎　荊芥去梗　香附子炒八兩
防風去芦　白芷　羌活　甘草[illegible]
右件為細末每服貳錢食後茶清調下常服清頭目

[illegible]治寒濕所傷身重腰冷如坐水中小便或澁或出大便溏泄皆因坐卧濕處或因雨露所襲或因汗出衣衾冷濕久久得之腰下重疼兩脚疼痛腿膝或腫或不腫小便利反不渴悉能主之
蒼术　白术　甘草[illegible]
乾薑[illegible]　橘紅　丁香各[illegible]分　茯苓去皮
右㕮咀每服肆錢水壹盞半棗壹枚薑叁片煎柒分食前溫服

[illegible]治冒暑伏熱頭目昏暈嘔吐泄瀉口乾煩渴背寒面垢
赤茯苓去皮　甘草[illegible]　寒食麪[illegible]　生薑[illegible]
右為細末每服貳錢新汲水或冷熱水調下不拘時候

[illegible]治傷寒瘟疫身疼痛百節拘急頭目昏痛肢節勞倦壯熱增寒神志不爽感冒瘟疫瘴氣常服辟瘟疫治勞倦
山茵陳[illegible]　柴胡去苗　前胡[illegible]　人參
羌活　獨活　甘草　蒼术米泔浸[illegible]
乾葛　白芍藥　升麻　防風去苗
藁本去芦　藿香去梗　白术　半夏[illegible]
(江南)已後不加減　(江西)已後每料加

柴胡去蘆 赤茯苓 當歸各等分

[illegible]已後減柴胡壹分不用當歸赤茯苓只加

乾薑炮 肉桂去粗皮各等分 麻黃去節

[illegible]已後並無加減 一方無當歸有茯苓去皮

右為細末每服叁錢水壹盞半薑叁片棗貳枚同煎至壹盞熱服不計時候併進貳服如要表散加葱白叁寸豉叁拾粒同煎服以衣被蓋覆汗出而愈

[illegible] 治四時傷寒頭疼壯熱感風多汗及療勞傷過度骨節酸疼飲食無味四肢疼倦行步喘乏面色痿黃怠惰少力咳嗽寒熱羸弱自汗胸膈不快嘔逆惡心

人參 茯苓 甘草炙 陳皮去白

白朮 藿香去土各壹兩 厚朴去皮薑汁炙

半夏壹兩湯洗柒次

右為細末每服貳錢水壹盞生薑叁片棗子壹枚葱白叁寸同煎至柒分溫服不拘時候

[illegible] 治傷寒氣脈不和汗後壯熱鼻塞頭悶涕唾稠粘痰欬壅滯或冒涉風濕增寒發熱骨節疼痛或中暑嘔吐眩暈及大病後將理失宜食復勞復病證如初又治五勞七傷氣虛頭眩精神恍惚睡臥不寧肢體倦怠潮熱盜汗脾胃虛損面色痿黃飲食不美口吐酸水臟腑滑泄腹內虛鳴反胃吐逆心腹絞痛久瘧久痢及膈氣咽塞上氣喘促坐臥不安或飲食所傷胸膈痞悶腹脅膨脹婦人胎前產後血氣不和霍亂吐瀉氣厥不省人事常服辟四時不正之氣及山嵐瘴疫神效不可具述

山藥 桔梗 茯苓去皮 甘草

白芷 陳皮去白 青皮去白 香附子炒各叁兩

白朮 兩 乾薑炮 兩

右為末每服貳錢水壹盞生薑叁片棗壹枚木瓜乾壹片紫蘇葉煎柒分食前服若吐瀉入白梅煎喘入桑白皮杏仁煎傷寒再發入薄荷腸風入木通叁寸痢者入少許中暑嘔逆入香薷產前產後血氣不和入荊芥煎霍亂入藿香煎氣厥入鹽湯調下

人參順氣散 治證服法並與前人參順氣散同

人參 桔梗 甘草炙 乾葛

白朮 白芷各乙兩 麻黃去根節乙兩半 乾姜半兩

藿香正氣散 治傷寒頭疼憎寒壯熱上喘咳嗽五勞七傷八般風痰五般膈氣心腹冷痛反胃嘔惡氣瀉霍亂臟腑虛鳴山嵐瘴瘧遍身虛腫婦人產前產後血氣刺痛小兒疳傷並宜治之

大腹皮 白芷 紫蘇 茯苓去皮各乙兩

半夏麴 白朮 陳皮去白 厚朴去麤皮薑汁炙

苦梗各貳兩 藿香去土三兩 甘草炙貳兩半

右為細末每服貳錢水一盞薑三片棗一枚同煎至七分熱服如欲出汗衣被蓋再煎服

三拗湯 治感冒風邪鼻塞聲重語音不出或傷風傷冷頭痛目眩四肢拘倦咳嗽多痰胸滿氣短

甘草不炙 麻黃不去根節 杏仁不去皮尖

右等分㕮咀為麤散每服伍錢水壹盞半薑伍片同煎至壹盞去滓通口服以衣被蓋覆睡取微汗為度

[illegible] 解利四時溫疫傷寒身體壯熱頭痛憎寒項強拘急渾身疼痛煩渴悶亂大小便澀嗜臥少力全不思飲食及治氣疾五勞七傷山嵐瘴瘧寒熱往來等疾並皆治之

柴胡去蘆 甘草炙 乾薑炮各壹兩 肉桂去粗皮不見火

桔梗 防風 荊芥穗 五加皮各乙兩

芎藭半兩 麻黃去根節 陳皮乙兩 黃芪乙分

右為細末每服貳分水一盞生姜三片同煎至捌分熱服不拘時候常服和順三焦辟瘴氣進飲食

[illegible] 治中和氣調榮衛治飲食不節飢飽失時或冷物過多

或硬物壅駐，或食畢便睡，或驚憂恚怒，或勞役動氣，便欲飲食，致令脾胃不和，三脘痞滯，內感風冷，外受寒邪，憎寒壯熱，遍身疼痛，胸膈滿悶，霍亂嘔吐，脾疼翻胃，中酒不醒，四時傷寒頭痛，並進叁服，得汗即差。常服益脾溫胃，散宿痰停飲，能進食，辟風寒暑濕霧露之氣。

白扁豆炒　茯神　厚朴去麁皮，剉，薑汁炒，各乙兩

香薷貳兩　甘草炙，半兩

右為細末，每服貳錢，沸湯點服，入鹽點亦得，不拘時。

十神湯 治時令不正，瘟疫妄行，人多疾病。此藥不問陰陽兩感，或風寒濕痺，皆可服之。

川芎　甘草炙　麻黃去根節　升麻各四兩

乾葛十四兩　赤芍藥　白芷　陳皮去白

紫蘇去麁梗　香附子杵去毛，各四兩

右為細末，每服叁大錢，水壹盞半，生薑伍片，煎至柒分，去滓熱服，不以時候。如發熱頭痛，加連鬚葱白叁莖；如中滿氣實，加枳殼數片同煎服。雖產婦、嬰兒、老人皆可服餌。如傷寒不分表裏證，以此導引經絡，不致變動，其功效非淺。

水浸丹 治伏暑傷冷，冷熱不調，霍亂吐利，口乾煩渴，並宜服之。

巴豆大者廿五枚，去皮心膜，研，取出油盡如粉　黃丹炒，研，羅過，取乙兩乙分

右同研勻，用黃蠟鎔作汁，別為丸如梧桐子大。每服伍圓，以水浸少頃，別以新汲水吞下，不拘時候。

[illegible]散 治傷寒頭疼，鼻塞流涕，聲重咽乾，胸膈滿悶，頭目昏痛如破。

天南星[illegible]　草烏頭去皮臍，剉　荊芥穗[illegible]

石膏乙兩，研

右為細末，每服貳錢，入陳茶末壹分，生薑自然汁半呷，薄荷三葉，水貳盞，同煎八分，通口服。

六和湯 治心脾不調，氣不升降，霍亂轉筋，嘔吐泄瀉，寒熱交作，痰喘咳嗽，胸膈痞滿，頭目昏痛，肢體浮腫，嗜臥倦怠，小便赤澀，并傷寒陰陽不分，冒暑伏熱煩悶，或成痢疾，中酒煩渴畏食，婦人胎前產後，並宜服之。

縮砂仁　半夏湯洗七次　杏仁去皮尖　人參　甘草炙，各壹兩　赤茯苓去皮　藿香葉拂去塵　白扁豆薑汁略炒　木瓜各二兩　香薷　厚朴薑汁製，各四兩

右剉，每服肆錢，水壹盞半，生薑叁片，棗子壹枚，煎至捌分，去滓，不拘時候服。

太平惠民和劑局方卷之二

太平惠民和劑局方卷三

治一切氣 附積聚 脾胃

蘇合香圓 療傳尸骨蒸殗殜肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴瘧赤白暴利瘀血月閉痃癖丁腫驚癇鬼忤中人小兒吐乳大人狐狸等病（麝香蘇合圓方見後）

白朮　青木香　烏犀屑　香附子（炒去毛）
朱砂（研水飛）　訶梨勒（煨取皮）　白檀香　安息香（別為末用無灰酒一升熬膏）
沉香　麝香（研）　丁香　蓽撥（各貳兩）
龍腦（研）　蘇合香油（入安息香膏內各壹兩）　薰陸香（別研壹兩）

右為細末入研藥勻用安息香膏幷煉白蜜和劑每服旋圓如梧桐子大早朝取井華水溫冷任意化服肆圓老人小兒可服壹圓溫酒化服亦得並空心服之用蠟紙裹壹圓如彈子大緋絹袋盛當心帶之一切邪神不敢近

安息香圓 治一切冷氣心腹疼痛胸膈噎塞脅肋膨脹心下堅痞腹中虛鳴噦逆惡心噫氣吞酸胃中冷逆嘔吐不止宿飲不消胃脘刺痛時吐清水不思飲食並皆治之

肉桂（去粗皮貳兩半）　訶子（炮取皮貳兩）　阿魏（細研白麵少許溲和作餅子炙令香熟壹分）
茯苓（白者）　當歸（去蘆洗切焙）　乾薑（炮去皮）　肉豆蔻（去殼）
川芎　丁香皮　縮砂仁　五味子（微炒）
巴戟（去心麩炒）　益智（子去皮）　白豆蔻（去皮各壹兩半）
硇砂（研半兩湯化去石入蜜中）　檳榔（煨）　蓽澄茄
芍藥　莪茂　三稜（炮）　安息香（酒半盞化去砂入蜜）
香附（去毛）　茴香（微炒各半兩）　胡椒　高良薑
木香　沉香　乳香（別研）　丁香（各壹兩）

右件藥除安息香硇砂外並壹處杵羅為細末用蜜叁拾兩入安息香硇砂於銀器中煉熟剩一件藥杵壹貳仟下圓如雞頭肉大每服壹圓細嚼溫酒下沸湯或生薑湯下亦得食前服

丁沉圓 治一切冷氣攻心腹脅肋脹滿刺痛胸膈噎塞痰逆惡心噫氣吞酸不思飲食胃中冷逆嘔吐不止及翻胃膈氣宿食留飲心痛霍亂婦人血氣心腹痛並皆治之

甘草（炙）　青皮（去白炒壹兩）　丁香　白豆蔻仁
沉香　木香　檳榔　肉豆蔻（各伍兩）
白朮（剉微炒肆拾兩）　人參（去蘆）　茯苓（去皮）　訶梨勒（煨去核拾兩）
肉桂（去粗皮）　乾薑（炮各貳兩半）　麝香（別研乙兩）

右為細末入麝香令勻煉蜜和丸如酸棗大每服壹圓細嚼炒生薑鹽湯下溫酒亦得空心食前服

大沉香圓 治一切冷氣攻心腹刺痛胸膈噎塞嘔吐痰水噫氣吞酸口苦舌澀不思飲食及膀胱腎間冷氣攻衝腰背拘急臍腹絞痛手足逆冷小便滑數又治卒暴心痛霍亂吐利疝瘕氣痛婦人血氣刺痛並宜服之

天台烏藥　白芷　甘松（洗淨）　甘草（爁）
薑黃（去皮）　檀香　乾薑（炮）　肉桂（去粗皮各貳斤半）
白豆蔻（去殼）　沉香（各貳拾兩）　香附子（去毛炒伍斤）

右為末煉蜜搜和每壹兩作貳拾丸每服壹圓嚼破炒生薑鹽湯下元氣發動炒茴香熱酒下空心食前服

理中圓 理中焦不和脾胃宿冷心下虛痞腹中疼痛胸脅逆滿噎塞不通嘔吐冷痰飲食不下噫醋吞酸口苦失味怠墮嗜臥全不思食又治傷寒時氣裏寒外熱霍亂吐利心腹絞痛手足不和身熱不渴及腸鳴自利米穀不化

白朮　乾薑（炮）　人參　甘草（爁各貳拾兩）

右為末煉蜜為丸每壹兩作壹拾圓每服壹圓食前沸湯化下嚼服亦得或圓如梧桐子大服並得大病新差多唾不止及新產內虛皆可服之常服溫脾暖胃消痰逐飲順三焦進飲食辟風寒濕冷邪氣

[illegible]圓 治脾胃不和中脘氣痞心腹脹悶不思飲食嘔吐痰逆噫氣吞酸面色萎黃肌肉消瘦腹脅刺痛便利不調少力嗜臥體重節痛及治虛勞脾胃虛弱飲食不化心腹痞滿並宜服之此藥老幼氣弱此可常服能溫和脾胃調進飲食

厚朴 去粗皮剉以生薑汁炒 半夏 湯洗 壹兩半

鱉甲 醋炙去裙 [illegible] 壹兩

神麴 碎炒 麥蘗 微炒 白朮 炒 肉桂 去粗皮

枳殼 麩炒 三稜 煨 青皮 去白炒 人參 各壹兩

陳皮 去白 訶子 煨去核 檳榔 當歸 各壹兩半

芍藥 甘草 炒 乾薑 炮 赤茯苓 去皮 各[illegible]分

右為細末煉蜜圓如小豆大每服貳拾圓加至叁拾圓微嚼破溫水下不計時候

紫蘇子圓 治一切氣逆胸膈噎悶心腹刺痛脅肋脹滿飲食不消嘔逆欲吐及治肺胃傷冷咳嗽痰涎或上氣奔急不得安臥

紫蘇子 淘淨炒 陳皮 去白 各貳兩 肉桂 去粗皮 人參 去蘆

高良薑 [illegible]

右件味為細末煉蜜和圓如彈子大每服壹圓細嚼溫酒下米飲亦得不計時候或作小圓服之亦得若食瓜膾生冷覺有所傷噎氣生熟欲成霍亂者含化壹圓細細嚥汁服盡應時立愈常服此藥永不患霍亂甚妙

[illegible]圓 治脾胃虛冷心腹絞痛胸膈滿悶脅肋虛脹嘔逆惡心噫氣吞酸泄瀉腸鳴米穀不化肢體倦怠不思飲食

大麥蘗 炒 白茯苓 去皮 人參 去蘆 乾薑 炮

縮砂 去皮 白朮 [illegible] 甘草 [illegible]

右為末煉蜜和圓每兩作拾圓每 以壹圓細嚼生薑湯送下食前服此藥養胃進食

五膈圓 治因愁憂思慮飲食不節動氣傷神致使陰陽不和臟腑生病結於胸膈遂成憂膈氣膈食膈飲膈勞膈之病若食生冷即發心胸痞滿氣不得通疼痛如刺及引背膂食即不下心下堅痛痛即欲吐得吐即已甚者手足逆冷上氣咳逆喘息短氣

蜀椒 去目并閉口者微炒去汗 細辛 去苗土 肉桂 去粗皮

遠志 去心 麥門冬 去心 甘草 炙 各伍兩 乾薑 炮

人參 去蘆 附子 炮去皮臍 各肆兩半

右為細末煉蜜和圓如彈子大每服壹圓含化嚥之胸膈噎中當熱藥力稍盡更服壹圓日叁服夜貳服服藥柒日即愈或圓如梧桐子大溫酒服之亦得食後服

嘉禾散 亦名穀神散 治中滿下虛五噎五膈脾胃不和胸膈痞悶脅肋脹滿心腹刺痛不思飲食或多痰逆口苦吞酸胸滿短氣肢體怠惰面色萎黃如中焦虛痞不任攻擊臟氣虛寒不受峻補或因病氣衰食不復常稟受怯弱不能多食尤宜服之常服育神養氣和補脾胃進美飲食

枇杷葉 去毛 [illegible] 薏苡仁 微炒 白茯苓 去皮

人參 去蘆 縮砂 去皮 各壹兩 大腹子 微炒 隨風子 [illegible]

杜仲 去皮用薑汁[illegible]炙 石斛 細剉酒炒 藿香葉

木香 沉香 丁香 陳皮 去白 各[illegible]分

穀蘗 微炒 檳榔 炒 五味子 微炒 白豆蔻 微炒去皮

青皮 去白 桑白皮 炒 白朮 [illegible] 神麴 微炒

半夏 [illegible] 甘草 炙 壹兩半

右搗羅為末每服貳錢水壹盞入生薑貳片肥棗叁枚同煎至柒分溫服不計時候及療四時傷寒能調治陰陽使無變動剋日得安如療五噎入乾柿壹枚同煎拾服見效如療膈氣吐逆羸困入薤白叁寸棗伍枚同煎婦人亦可服

[illegible]湯 治脾胃不和中寒上衝胸脅逆滿心腹疞痛痰逆惡心或時嘔吐心下虛痞膈塞不通飲食減少短氣羸困溫中逐

水止汗去濕又脾胃冷濕泄瀉注下水穀不分腹中雷鳴傷寒時氣裏寒外熱霍亂吐利手足厥冷胸痺心痛逆氣結氣並皆治之

人參　甘草炒　白朮　乾薑炮各叁兩

右麤末每服叁錢以水壹盞半煎中盞去滓稍熱服空心食前

調中沉香湯 調中順氣除邪養正治心腹暴痛胸膈痞滿短氣煩悶痰逆惡心食飲少味肢體多倦常服飲食增進腑臟和平肌膚光悅顏色光潤

麝香半錢研　沉香貳兩　生龍腦壹錢研　甘草壹錢炒

木香　白豆蔻仁各壹兩

右爲細末入研藥勻每服半錢用沸湯點服或入生薑壹片鹽少許亦得酒食後服之大妙

勻氣散 治氣滯不勻胸膈虛痞宿冷不消心腹刺痛除脹滿噎塞止嘔吐惡心常服調順脾胃進美飲食

丁香　檀香　木香　白豆蔻仁各貳兩

藿香葉　甘草炒各捌兩　縮砂仁肆兩

右爲末每服壹錢入鹽末壹字用沸湯點服不計時候

烏沉湯 和一切氣除一切冷調中補五藏益精壯陽道暖腰膝去邪氣治吐瀉轉筋癥癖疼痛風水毒腫冷風麻痺又主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行瘴疫膀胱腎間冷氣攻衝背膂俛仰不利及婦人血氣攻擊心腹撮痛並宜服之

天台烏藥壹佰兩　沉香伍拾兩　人參叁兩　甘草爁肆兩半

右爲末每服半錢入生薑叁片鹽少許沸湯點服空心食前

五膈寬中散 治因憂恚寒熱動氣傷神致陰陽不和腑藏生病結於胸膈之間遂成五膈之病一曰憂膈胸中氣結津液不通飲食不下羸瘦短氣二曰恚膈心下實滿噫輒酢心飲食不消大小便不利三曰氣膈胸脇逆滿咽塞不通噫聞食臭四曰寒膈心腹脹滿咳嗽氣逆腹上苦冷雷鳴繞臍痛不能食肥五曰熱膈五心中熱口中爛生瘡四肢煩重脣口乾燥身體或熱腰背疼痛胸痺引背不能多食及一切氣疾並皆治之

白豆蔻去皮貳兩　甘草炙伍兩　木香叁兩　厚朴去皮生薑汁炙熟壹斤

縮砂仁　丁香　青皮去白　陳皮去白各肆兩

香附子炒去毛拾陸兩

右爲細末每服貳錢入生薑貳片鹽少許沸湯點服不計時候

[illegible]氣散 治五種膈氣三焦痞塞胸膈滿悶背膂引疼心腹膨脹脇肋刺痛食飲不下噎塞不通嘔吐痰逆口苦吞酸羸瘦少力短氣煩悶常服順氣寬中消痃癖積聚散驚憂恚氣

肉豆蔻仁　木香　乾薑炮　厚朴去粗皮生薑汁炙

青皮去白　甘草爁各伍兩　三稜炮　益智仁

莪朮炮　肉桂去粗皮　陳皮去白　檳榔

枳殼去穰麩炒各拾兩

右爲細末每服貳錢水壹盞入生薑貳片棗半箇同煎柒分和滓熱服如不及煎入鹽少許沸湯點服亦得不拘時候

寬中湯 治脾胃不和中脘氣滯宿寒留飲停積不消心腹刺痛脇肋膨脹嘔吐痰逆噫氣吞酸腸鳴泄利水穀不化肢體倦怠不思飲食

青州棗　厚朴去粗皮各壹斤剉　乾薑炮　半夏湯洗去滑

甘草各伍兩　陳皮去白

已上陸味用水叁斗煮令水盡焙乾

草豆蔻去皮　人參　藿香　訶子煨取皮

白茯苓去皮各壹兩　白朮壹兩

右麤末每服貳錢水壹盞生薑叁片煎至柒分去滓溫服食前

[illegible]散 治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺痛口苦無味胸滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面色萎黃肌體瘦弱怠惰嗜臥

[illegible]實痛多自利或發霍亂及一切五噎八痞膈氣反胃並宜服

蒼朮（貳斤，去皮米泔浸一宿） 厚朴（壹斤，去皮，薑汁製炒香）

陳皮（去白，各壹斤貳兩） 甘草（炒，拾兩）

右為細末，每服貳錢，以水壹盞，入生薑貳片，乾棗兩枚，同煎至柒分，去滓，帶熱服，空心食前。入鹽壹捻，沸湯點服亦得。常服調氣暖胃，化宿食，消痰飲，辟風寒冷濕四時非節之氣。

三和散 治五藏不調，三焦不和，心腹痞悶，脇肋膜脹，風氣壅滯，肢節煩痠，頭面虛浮，手足微腫，腸胃燥澀，大便秘難，雖年高氣弱並可服之。又治背痛脇痛，有妨飲食，及脚氣上攻，胸腹滿悶，大便不通

羌活（去蘆） 紫蘇（去梗，各[illegible]） 沉香 宣州木瓜（薄切，焙乾）

大腹皮（炙焦黃，各壹兩） 芎藭（[illegible]參兩） 甘草（炒）

陳皮（去白） 木香 檳榔（[illegible]） 白朮（各參分）

右為麤末，每服貳大錢，水壹盞，煎至陸分，去滓，溫服，不計時

七氣湯 治虛冷上氣及寒氣、熱氣、怒氣、恚氣、喜氣、憂氣、愁氣，內結積聚，堅牢如杯，心腹絞痛，不能飲食，時發時止，發即欲死，此藥主之

人參 甘草（炙） 肉桂（去麤皮，各壹兩） 半夏（湯洗七次，切，焙，伍兩）

右為麤末，入半夏令勻，每服參錢，水壹大盞，入生薑參片，煎柒分，去滓，稍熱服，食前

[illegible] 治傷寒陰盛，心腹痞滿，嘔吐泄利，手足厥冷，及一切冷氣衝心，脇肋腹脹滿絞痛

川烏（炮，去皮尖，肆兩） 益智（去皮，貳兩） 乾薑（炮，壹兩） 青皮（去白，參兩）

右件為散，每服參錢，水貳盞，入鹽壹捻，生薑伍片，棗貳箇，擘破，同煎至捌分，去滓，溫服，食前

藿香半夏散 治胃虛中寒，停痰留飲，噦逆嘔吐，胸滿噎痞，短氣倦怠，不入飲食

丁香皮（半兩） 藿香葉（壹兩） 半夏（貳兩，湯洗七次，[illegible]） 黃[illegible]

右為散，每服貳錢，水壹盞，生薑七片，煎柒分，去滓，溫服，食前

[illegible]散 治脾胃不調，胸膈滿悶，飲食不化，嘔逆惡心，或霍亂嘔吐，心腹刺痛，腸鳴泄利，水穀不分

草豆蔻（去皮，[illegible]） 生薑（[illegible]） 甘草（[illegible]）

右件拌勻，入於銀器內，用水過藥三指許，以慢火熬令水盡，焙令乾，搗為細末，每服壹錢，用沸湯點服，不計時候。夏月煎作熟水，常服調中，止逆除冷氣，消飲食

[illegible]圓 治[illegible]藏腑不和，藏腑虛弱，寒冷之氣留滯於內，使氣積不散，胸膈支滿，食即氣噎，心腹膨脹，氣刺氣急，宿食不化，心腹引痛，噫氣吞酸，停飲浸漬，惡心嘔逆，癥瘕疼痛，臟腑不調，飲食不進，往來寒熱，漸覺羸瘦，以致着床，面黃肌瘦，精神困頓

巴豆（去皮心膜，[illegible]） 桃仁（去皮尖，麩炒，別研）

附子（炮，去皮臍，半兩） 米醋（[illegible]） 大黃（[illegible]）

乾漆（炒，煙盡） 木香 鱉甲（醋炙黃，半兩） 三稜（[illegible]）

肉桂（去麤皮） 硇砂（[illegible]，研） 朱砂（研，飛） 麝香（[illegible]，別研）

右為細末，入研藥勻，以醋煮麵糊圓如梧桐子大，每服貳圓，炒生薑湯溫下，或木香湯亦得，食後臨臥服，更看虛實加減服之。忌生硬冷物

丁香圓 治積滯不消，心腹堅脹，痰逆嘔噦，噫醋吞酸，脇肋刺痛，胸膈痞悶，或反胃惡心，食飲不下，氣上衝胸，痞噎不通，及癥酒癖，血瘕氣塊，時發刺痛，全不思食，並治之。常服消飲食，行滯氣

豬牙皂角（[illegible]） 好墨（[illegible]） 肉桂（去麤皮）

乾薑（炮） 丁香 木香（[illegible]） 乾漆（[illegible]）

黑牽牛（[illegible]） 川大黃（[illegible]） 蓬莪茂（炮） 京三稜（炮）

硇砂（別研） 附子（炮，去皮臍） 青皮（去白，[illegible]兩）

巴豆霜（[illegible]）

右以大黃、硇砂、巴豆霜和劑，圓如菉豆大，每服壹兩圓，茶酒任下。如要取化癥瘕癖塊，用生薑湯下柒圓，並食後臨臥服之

丁香圓 治積滯生冷，留飲宿食，止痰逆惡心，霍亂嘔吐，治心腹脹悶，脇肋刺痛，胷膈痞滿，噎塞不通，常服順脾胃，進飲食。

丁香（去一兩） 木香（各一兩半）
五靈脂（拾兩） 巴豆（去皮出油，拾兩）
肉豆蔻（去殼，拾箇）

右為細末，入巴豆令勻，麪糊和令得所，圓如黍米大，每服伍圓至柒圓，溫生薑湯下，橘皮湯亦得，食後服。如霍亂吐逆，煎桃葉湯放冷下。小兒吐逆不定，叁歲兒服叁圓，伍歲已下服肆圓，用生薑桃葉湯下。

三稜煎圓 順氣寬中，消積滯，化痰飲，治中脘氣痞，心腹堅脹，脇下緊硬，胷中痞塞，喘滿短氣，噫氣不通，嘔吐痰逆，飲食不下，大便不調，或泄或秘。

杏仁（湯浸去皮尖，麩炒黃色） 硇砂（飛研） 神麴（碎炒）
麥蘖（炒，各壹兩） 青皮（去白） 乾漆（炒） 蘿蔔子（微炒，各貳兩）
三稜（生，細剉，搗羅為末，以酒熬成膏）

右件為末，以三稜膏勻攪和圓，如梧桐子大，每服拾伍圓至貳拾圓，溫米飲下，食後服。

青木香圓 寬中利膈，行滯氣，消飲食，治胷膈噎塞，腹脇脹痛，心下堅痞，腸中水聲，嘔噦痰逆，不思飲食。

補骨脂（炒香） 蓽澄茄 檳榔（酸粟米飯裹，濕紙包，火中煨令紙焦，去飯，各肆拾兩）
黑牽牛（貳佰肆拾兩，炒香，別搗末，壹佰貳拾兩） 木香（貳拾兩）

右為細末，入牽牛末令勻，漸入清水和令得所，圓如菉豆大，每服貳拾圓，茶湯熟水任下，食後服，每酒食後可服伍圓或柒圓。小兒壹歲服壹圓，懷姙婦人不得服之。

消食圓 治脾胃俱虛，不能消化水穀，胷膈痞悶，腹脇時脹，連年累月，食減嗜卧，口苦無味，虛羸少氣；又治胷中有寒，飲食不下，反胃翻心，霍亂嘔吐，及病後新虛，不勝穀氣，或因病氣衰，食不復常，並宜服之。

烏梅（去核，焙乾） 乾薑（炮，各肆兩） 小麥蘖（炒黃，叁兩） 神麴（搗末，炒，陸兩貳錢）

右件為末，煉蜜和搜為圓，如梧桐子大，每服拾伍圓，加至貳拾圓，米飲下，日貳服，不計時候。

小[illegible]圓 治脾胃不和，飲食多傷，心腹刺痛，噫氣惡心，嘔痞吞酸，乾噦食臭，腹脇脹悶，不思飲食。

巴豆（去皮心，研出油，取霜） 肉桂（去麤皮） 硇砂（研飛，壹兩）
半夏（湯洗） 丁皮 烏梅（去核） 乾薑（炮）
當歸（去蘆） 三稜（煨）

右為細末，入巴豆硇砂勻，水煑麪糊為圓，如麻子大，每服叁圓至伍圓，用溫水下，食後服。常服化滯氣，利胷膈，止逆消食。

紫菀圓 治心腹積聚，久癥癖塊，大如杯椀，黃疸宿食，朝起嘔吐，支滿上氣，時時腹脹，心下堅結，上來搶心，傍攻兩脇，十種水病，八種痞塞，翻胃吐逆，飲食噎塞，五種淋疾，九種心痛，積年食不消化，或瘧疾連年不差，及療一切諸風，身體頑痺，不知痛痒，或半身不遂，或眉髮墮落，及療七十二種風，叁拾陸種遁尸疰忤，及癲癇，或婦人諸疾，斷緒不生，帶下淋瀝，五邪失心，愁憂思慮，意思不樂，飲食無味，月水不調，及腹中一切諸疾，有似懷孕，連年累月，羸瘦困弊，或歌或哭，如鬼所使，但服此藥，無不除愈。

川烏（炮去皮臍，壹兩半） 柴胡（去蘆） 桔梗 吳茱萸（湯洗七次，焙乾，炒）
菖蒲 紫菀（去苗葉及土） 黃連（去鬚） 乾薑（炮）
肉桂（去麤皮） 茯苓（去皮） 蜀椒（去目及閉口，炒出汗）
人參 厚朴（去麤皮，薑汁製炒） 皂莢（去皮子，炙） 巴豆（去皮心膜，出油，炒，研，各半兩）

右為細末，入巴豆勻，煉蜜為圓，如梧桐子大，每服叁圓，生薑湯下，食後或臨卧服，漸加至伍柒圓。

九痛圓 治九種心痛：一蟲心痛，二疰心痛，三風心痛，四悸心痛，五食心痛，六飲心痛，七冷心痛，八熱心痛，九去來心痛。又治連年積冷，流注心胷痛，并療冷衝上氣，落馬墮車，瘀血等疾。

狼毒（炙香，壹兩） 附子（炮去皮臍，叁兩） 吳茱萸（湯洗七次，焙乾，炒，壹兩）
人參 乾薑（炮） 巴豆（去皮心膜，炒乾，取霜）

右陸味爲細末煉蜜和圓如梧桐子大每服空腹温酒下壹圓卒中惡心腹脹痛口不能言者服貳圓立瘥

【生氣湯】治男子婦人一切冷氣攻心胸脇脹滿刺痛噫醋吞酸痰逆嘔吐胸膈痞悶飲食不美又治五膈五噎一切氣疾常服除邪冷生胃氣

鹽炒貳兩半　丁皮壹兩　胡椒壹分　丁香

檀香各壹兩半　乾薑炮　甘草炙壹兩

右柒味同搗用慢火爐令香熱乘熱入磁器內密蓋覆候冷碾羅作細散每服半錢至壹錢用沸湯點服不計時候

【[illegible]子】治男子婦人氣厥上盛下虛痰飲風寒伏留陽經偏正頭疼痛連腦巔吐逆惡心目暈耳聾常服清頭目消風化痰暖胃

防風　天麻　半夏生薑汁半兩　天南星洗

乾薑　川烏頭炮去皮臍　川芎　甘草炙貳兩

右爲細末湯浸蒸餅和圓如雞頭大捻作餅子曬乾每服伍餅同荊芥參伍穗細嚼茶酒任下熱水亦得不拘時候

【四[illegible]圓】治丈夫元藏氣虛真陽耗敗兩耳常鳴臍腹冷痛頭旋目暈四肢怠倦小便滑數泄瀉不止凡藏氣虛弱者悉宜服之

木香　茯苓　人參　附子炮去皮臍各壹兩

右爲細末每服貳錢水壹大盞生薑叁片棗子壹箇鹽少許煎柒分空心食前服

【[illegible]】治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛喘滿咽乾不利煩渴引飲頭目昏眩腰腳無力四肢倦怠咳嗽兼治風濕腳氣

前胡　五加皮　厚朴　黃耆

當歸　紫蘇子　甘草炙　肉桂不見火

陳皮去白　半夏麴　乾薑炮　人參

附子炮去皮臍　羌活　桔梗各半兩

右捨伍味同作麁末每服叁錢水壹盞半入紫蘇叁葉生薑叁片棗壹枚煎至柒分去滓食後服

【[illegible]圓】治心腹痛撮痛常燈心湯下腹痛撮痛煨薑煎湯下血痛炒薑醋湯下脇氣[illegible]白礬蛤粉各三分黃丹[illegible]分同研爲散煎桑根白皮糯米飲調下叁錢氣小喘止用桑白皮糯米飲下腎氣脇下痛炒茴香酒下大便不通蜜湯調檳榔末壹錢下氣噎木香湯下宿食不消茶酒漿飲任下諸氣惟膀胱氣脇下痛最難治獨此藥能去之有人病項筋痛諸醫皆以爲風治之數月不差乃流入背膂久之又注右脇攣痛甚苦乃合服之投而愈後當再發又一投瘥

木香　胡椒各壹分　乾蝎全者　巴豆去心皮別研

右爲細末入巴豆霜令勻湯釋蒸餅圓如麻子大朱砂爲衣每服叁粒湯使如前

【[illegible]圓】治男子五種積氣及九般心痛痃癖氣塊冷氣攻刺及脾胃停寒胸膈脹悶腹脹腸鳴嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人血氣血刺等疾

茴香炒　青皮去白　甘草炒　蓬莪朮炮

川芎　陳皮去白各壹兩　白芷半兩　丁香皮

縮砂仁　肉桂去皮各半兩　生薑[illegible]

胡椒　阿魏[illegible]

右搗爲末用阿魏糊和圓如雞頭大每藥圓壹斤用朱砂爲衣丈夫氣痛炒薑鹽湯下壹粒至貳粒婦人血氣醋湯下常服壹粒細嚼茶酒任下

【[illegible]香[illegible]圓】治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞心腹脹滿喘促短氣乾噦煩滿咳嗽痰涎口中無味嗜臥減食又治胃中留飲[illegible]酸脇下支結常覺痞悶及中寒咳逆脾濕洞泄兩脇虛鳴臍下撮痛皆能治之又治腳氣上衝心腹堅

[illegible]滿咳逆[illegible]者尤宜服之常服開胃消痰[illegible]進飲食

香附（炒去毛）[illegible] 沉香（半兩） 縮砂仁（四兩） 甘草（炙，各二十兩）

右為細末每服一錢入鹽少許沸湯點服凌晨霧露空心服食之去邪惡氣使無瘴疫

小烏沉湯 調中快氣治心腹刺痛

烏藥（去心，十兩） 甘草（炒，一兩） 香附子（沙盆內斷去皮毛焙乾，二十兩）

右為細末每服一錢入鹽少許或不著鹽沸湯點服不拘時

丁沉煎圓 辟霧露寒邪散膈脘凝滯調順三焦和養榮衛治心胸痞悶噫醋吞酸嘔逆痰水津液不收兩脇刺痛腹中堅滿口苦無味不思飲食

丁香（十二兩） 沉香（二兩） 木香（一錢半） 丁皮（一兩）

白豆蔻仁（九兩半）

右為細末別用甘草熬膏子為圓每壹兩分作貳百五十圓

每服一粒含化空心食

感應圓 治虛中積冷氣弱有傷停積胃脘不能傳化或因氣傷冷因饑飽食醉酒過多心下堅滿兩脇脹痛心腹大疼霍亂吐瀉大便頻併後重遲澀久痢赤白膿血相雜米穀不消愈而復發又治中酒嘔吐痰逆惡心喜睡頭旋胸膈痞悶四肢倦怠不欲飲食又治妊娠傷冷新產有傷若久有積寒吃熱藥不效者又治久病形羸積年累月漸致虛弱面黃肌瘦飲食或進或退大便或秘或泄不拘久新積冷並悉治之大病不過三服便見痊愈此藥溫無毒並不燥熱不損胃氣亦不吐瀉止是磨化積聚消逐溫冷痰飲食所傷快三焦滯氣旋圓如菉豆大每服三五粒量虛實加減溫水吞下不拘時候常服進飲食消酒毒令人不中酒又治小兒脾胃虛弱累有傷滯[illegible]每服伍粒至米大乾薑湯下不拘時候前項疾證連日用熱藥又取轉並不成效者

百草霜[illegible] 杏仁[illegible]

南木香（去蘆，二兩半） 丁香（一兩半） 川乾薑（炮，一兩）

肉豆蔻（去皮用，二十箇） 巴豆（七十箇，去皮心膜，研出油如粉）

右除巴豆粉百草霜杏仁三味外餘四味搗為細末與前三味同拌研令細用好蠟匱和先將蠟六兩溶化作汁以重綿濾去滓以好酒一升於銀石器內煮蠟熔數沸傾出候酒冷其蠟自浮取蠟秤用凡春夏修合用清油一兩於銚內熬令末散香熟次下煎黃蠟四兩同化作汁就鍋內乘熱拌和前項藥末秋冬修合用清油一兩半同煎煮熟作汁和匱藥末成劑分作小鋌子以油單紙裹旋圓服此高殿前家方也

小理中圓 治三脘氣弱中焦積寒脾虛不磨飲食遲化吃物頻傷[illegible]胸膈[illegible]脇肋刺痛嘔吐[illegible]腹脹腸鳴心腹疼痛噎塞[illegible]胃吐食飲食減少

紅豆[illegible] 木香[illegible] 縮砂仁[illegible] 草豆蔻（煨）

青皮（去白） 乾薑（炮）[illegible] 京三稜[illegible]

肉桂[illegible] 良薑[illegible] 牽牛[illegible]

右為末水煮麵糊圓如梧子大每三十圓[illegible]不拘時此藥元利性不[illegible]

大沉香圓 治男子婦人脾元氣冷胃氣虛乏不思飲食心腹[illegible]冷氣[illegible]中酒吐酒冷痰翻胃霍亂吐瀉[illegible]並宜治之

香附子（炒，去毛，百九十二兩） 麥蘗（炒，一百兩） 丁香皮（一百二十兩）

縮砂仁 薑黃[illegible]三十二兩 烏藥（各六十四兩）

肉桂（去粗皮） 甘草[illegible] 陳皮（去白，五十兩）

右為末煉蜜為圓如彈子大每服一粒鹽酒鹽湯嚼下婦人脾血氣如經月水不調並用炒薑酒嚼下醋湯亦得大有神效忌生冷肥膩等物

[illegible]溫中快膈化積和氣治中酒吐酒嘔逆噁心[illegible]飲食不下冷氣[illegible]遠年[illegible]

及黃赤白痢疾、脾毒泄瀉、婦人脾血氣、小兒疳氣,並宜服之。

甘松(炒)八十兩　益智仁(去皮)二十兩　香附子(炒去毛)　丁香皮

甘草(炒)各一百二十兩　蓬莪术(煨)　縮砂仁各二十兩

右為末,水浸蒸餅為圓,如菉豆大,每服貳拾圓,溫酒、鹽湯、熟水任下。或氣脹滿,炒薑鹽湯下;或酒食過度,頭疼惡心,胸膈滿悶,先嚼貳拾圓,後吞貳拾圓,生薑紫蘇湯下。此藥性溫平,不動臟腑。

[illegible]圓 治男子婦人脾胃不和,氣滯積聚,心腹脹滿,乾嘔醋心,飲食不下,胸膈噎塞,脇肋疼痛,酒積面黃,四肢虛腫,行步不能,但是脾胃諸疾,並宜服之。

神麴(炒)　陳皮(去白)　青皮(去白)　蓬莪术(煨)

肉桂(去粗皮不見火)　好墨(燒)　檳榔(各二十兩)　牽牛子

三稜(炮)　肉豆蔻(五兩)

右為末,麪糊為圓,如梧桐子大,每服叁拾圓,生薑湯下。久患赤白痢及大腸風秘,脾毒瀉血,黃連煎湯下;婦人諸疾,艾醋湯下。不拘時,孕婦莫服。

[illegible]圓 治飲酒過度,頭旋惡心,嘔吐不止,及酒積停於胃間,遇飲即吐,久而成癖。

雄黃　半夏　巴豆(去皮出油)　蝎梢各[illegible]

右先將同研細,入白麪秤重伍兩半,滴水和如菉豆大,候稍乾,入麩內炒香,將一粒放水中,如浮起,漉出於水上,即去麩不用。每服貳粒,溫酒下,食後[illegible],每服壹粒,茶酒任下。

[illegible]散 治男子婦人脾胃不和,胸膈噎塞,腹脇疼痛,氣促喘急,心下脹悶,飲食不思,嘔逆不止。

五味子　白皮　陳皮(去白)　桔梗(炒)

草果仁　大腹皮　甘草(炙)　茯苓

右件味㕮咀,為粗末,秤貳拾斤,淨入揀嫩枝葉乾紫蘇拾伍斤,拌勻,同壹處,每服肆錢,水壹大盞,生薑叁片,入鹽少許,同煎至柒分,去滓,空心食前常服,和胃進食。

[illegible]圓 治大人小兒脾氣不順,補虛進食。

白茯苓(去皮)　人參(去蘆)　訶子(煨去核)　白朮(炒)

右為末,每壹大錢,水壹盞,生薑壹片,棗壹箇,煎柒分,空心溫服。

[illegible]圓 治脾經虛冷,胃脘寒痰,留飲膈噎,停痰口淡舌澀,心腹撮痛,嘔逆宿水,脇下疼悶,喘滿氣急,倦怠少力,全不思食,常服寬中,利胸膈,散滯氣,消停寒,美飲食。

縮砂仁二兩　檀香(不見火)　甘松(洗)五兩　丁香

蓬莪术(醋煮)　木香二兩半

右為細末,別用甘草熬膏為圓,每兩作貳伯伍拾圓,捏作餅子,每服叁伍餅子,細嚼,生薑湯下,溫酒亦得,不拘時候。

[illegible]散 治脾寒瘧疾

紫蘇葉　草果仁　川芎　白芷

高良薑(炒)　青橘皮(去白)　甘草(炒)

右等分,為末,每服貳大錢,水壹盞,煎至柒分,去滓,熱服。貳滓併煎,當發日連進三服,無不效驗。

[illegible]圓 溫脾胃,順三焦,治寒痰聚結,氣壅不通,食即輒吐,咽膈噎悶,兩脇刺痛,嘔吐噦逆,噫醋惡心,中滿短氣,噎塞閑食,臭及痰留飲,腸鳴濕泄,冷瀉注下不止。常服建脾胃,美飲食,辟寒邪,養正氣。

高良薑拾斤　乾薑(炮)　白术各二斤　肉桂(去粗皮)

甘草(炙)乙斤

右為細末,煉蜜為圓,每壹兩作壹拾貳圓,每服壹圓,細嚼,生薑橘皮湯,米飲亦得,空心食前。

[illegible]圓 治本臟虛,飲食不化,或成痰癖,或發心痛,冷積水脹,結聚疼痛,一切冷氣等疾。

附子　硇砂　木香　生薑

右用大附子伍拾箇,各重半兩者,去皮臍,以尖刀子剜去心

子約容碗砂半錢安之却以附子末和麵作餅子裹附子用
文武火煨令黃用木香如附子之半同為細末以水為圓如
雞頭大每服以生薑汁煨作兩片以藥在內濕紙裹令服候
煨熟白湯嚼下空心服

參苓白朮散 治脾胃虛弱飲食不進多困少力中滿痞噎心
忪氣喘嘔吐泄瀉及傷寒咳噫此藥中和不熱久服養氣育
神醒脾悅色順正辟邪

蓮子肉去皮 薏苡仁 縮砂仁 桔梗炒令深黃色
白扁豆薑汁浸去皮微炒 白茯苓 人參去蘆
甘草炒 白朮 山藥各貳斤

右為細末每服貳錢棗湯調下小兒量歲數加減服

紅丸子 治丈夫脾積氣滯胸膈滿悶面黃腹脹四肢無力酒
積不食乾嘔不止背胛連心胸及兩乳痛婦人脾血積氣諸
般血氣及小兒食積骨瘦面黃肚脹氣急不嗜飲食漸
成脾勞不拘老少並宜服之

荊三稜浸軟切片 蓬莪朮 青橘皮 陳皮去白各伍斤
乾薑炮 胡椒各叁斤

右為細末用醋麪糊為圓如梧桐子大礬紅為衣每服叁拾
粒食後薑湯下小兒臨時加減與服

蘇子降氣湯 治男女虛陽上攻氣不升降上盛下虛膈壅痰多
咽喉不利咳嗽虛煩引飲頭目昏眩腰疼腳弱肢體倦怠腹肚
㽲刺冷熱氣瀉大便風秘澀滯不通肢體浮腫有妨飲食

紫蘇子 半夏湯洗七次 川當歸去蘆 甘草炙貳兩
前胡去蘆 厚朴去粗皮薑汁拌炒 肉桂去粗皮

右為細末每服貳大錢水壹盞半入生薑貳片棗子壹箇紫蘇
伍葉同煎至捌分去滓熱服不拘時候常服清神順氣和五
臟行滯氣進飲食去濕氣

[illegible] 治遠年日近腳氣衝心胸口吐酸水寒邪之氣留滯於
內停積不消胸膈脹滿攻刺腹脇惡心嘔逆面黃肌瘦四肢
倦怠又治婦人血氣刺痛小腹連腰攻疰重痛並能治之

玄胡索去皮 良薑炒 乾薑炮 茴香炒
肉桂各伍兩 牡蠣燒 甘草炙各拾兩

右為細末每服貳錢熱酒調下婦人淡醋湯調服如不飲酒
者用鹽湯點下並不拘時

分心氣飲 治男子婦人一切氣不和多因憂愁思慮怒氣傷神
或臨食有所憂或事不隨意使鬱抑之氣留滯不散停於胸膈之
間不能流暢致心胸痞悶脇肋虛脹噎塞不通噫氣吞酸嘔噦
惡心頭目昏眩四肢倦怠面色萎黃口苦舌乾飲食減少日漸
羸瘦或大腸虛秘或因病之後胸膈虛痞不思飲食並皆治之

木香不見火 桑白皮炒 丁香皮 大腹子
桔梗去蘆炒 麥門冬去心 草果仁 大腹皮炙
厚朴去粗皮薑汁炙 白朮 人參 香附子炒去毛
紫蘇去梗 陳皮去白 藿香 甘草炙

右㕮咀每服貳錢水壹盞入生薑叁片棗子壹箇擘破去核
及燈心拾莖煎至柒分去滓溫服不拘時候 又方見後

[illegible] 治男子婦人脾胃積冷中焦不和心下虛痞腹
中疼痛胸脇逆滿噎塞不通嘔吐冷痰飲食不下噫氣吞酸
口苦無味不思飲食婦人久患血氣刺痛不可忍者

乾薑 良薑
糯米 石菖蒲

右與淨為細末每服貳錢用鹽少許沸湯點不拘時常服醒
脾胃進飲食化痰大解酒毒空心食前服或溫酒調尤佳

[illegible] 治腹內積聚癥塊久患大如盃
及黃瘦宿水朝暮咳嗽積年冷氣時復腹下盤痛絞結衝心
及兩脇徹背連心痛氣不息氣逆脇下狀如蟲咬不可忍又
治十種水氣反胃吐食嘔逆飲食多噎五般痔瘻

風有飲𠂢行手足煩熱夜卧不安狂語無度又治小兒驚搐婦人五邪夢與鬼交沉重不思飲食昏如醉不曉人事欲死懼多或歌或哭不定月脈不調心中如狂身體羸瘦莫辨其狀但服此藥萬無失一是藥且按更不細述

生乾地黄 貝母去心 紫菀 柴胡去芦
乾薑炮 桂心 人參 防風去芦
枳殼 蜀椒 桔梗 吳茱萸
甘草炙 芎藭 菖蒲 白茯苓
厚朴 鼈甲 甘松 草烏頭
黄連 巴豆

右為細末以麪糊圓如梧桐子大每服伍圓小兒兩圓心中痰患生薑湯下心痛酸石榴皮湯下口瘡蜜湯下頭痛石膏湯下……惡茶下一切脾氣橘皮湯下水瀉氣瀉煎陳皮飲下赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢甘草乾薑湯下小腸氣……草湯下婦人血氣當歸酒下如不飲酒當歸煎湯下亦得……嵐氣小腸氣及下生附子湯下常服及應急諸般疾患只米飲茶酒熟水任下傷冷痰癖酒食所傷酒疸黄疸結氣痃癖並用鹽湯鹽酒下

……治男子婦人上熱下虛之疾凡飲食過度致傷脾胃酒色無節耗損腎元水土交攻陰陽關隔遂使氣不升降上熱則頭目昏眩痰實嘔逆胸膈不快咽喉乾燥飲食無味下弱則腰脚無力大便秘澀裏寒腹痛腸腹冷痛治以涼則脾氣怯弱腸鳴下利治以溫則上焦熱口舌生瘡及脚氣上攻與久痢不差宜先服此藥以所主療治之無不效者

桑白皮 草果仁 青皮 五加皮
半夏麯 桔梗 訶子 甘草炙
枳殼 陳皮 柴胡 地骨皮各壹兩

右為麤散和勻每服……生薑……水壹盞同煎至柒分食後通口服常服調順脾胃消痰利三焦開胃化痰和五臟口燥加半夏……心肺虛加人參茯苓……上膈熱加……下部大段虛加少許炮附子如使附子多加生薑婦人血虛加當歸煎

……治一切氣逆心腹刺痛腹脇虛脹飲食不消乾嘔

木香 甘松 甘草
香附子 蓬莪朮

右為細末水糊為圓每服……橘皮湯下不計時心胃虛弱人最宜服常服寬中順氣進食

……治男子……積心氣痛婦人血氣刺痛及治中酒惡心一切腑臟冷氣……腹風下白痢……泄瀉

良薑 茴香 甘草 蒼朮

右為細末每服貳錢薑叁片鹽少許水壹盞煎至柒分溫服或熱酒調下亦得如脾寒用酒壹盞煎臨發時連進叁服兼治四方之人不伏水土小兒臟寒泄瀉並用薑叁片棗壹枚煎服……伏熱……生薑冷水調下若行路早起棗壹枚去核包……同生薑叁片嚼下能辟四時非節疫癘……嵐瘴

……治脾胃虛弱久寒積冷心氣脾痛冷痰翻胃臍腹刺痛嘔吐惡心不思飲食及療婦人血氣攻刺腹脇撮痛服之立效

赤芍藥 乾薑 良薑 甘草

右為末每服貳大錢白湯點下不拘時候

……治脾胃不和中脘氣滯宿食留飲停積不消心腹刺痛脇肋膨脹嘔吐痰水噫氣吞酸中酒吐酒噦逆惡心頭痛煩渴倦怠嗜卧不思飲食

陳皮去白 神麯 草果 半夏麯
乾薑炮 丁皮 木香 白茯苓
甘草

右為細末每服壹錢鹽湯點服不拘時候常服溫平攻疾開胃安脾消酒進食

白朮六一湯 治脾胃不和心腹痞悶脇肋䐜脹口苦無味嘔噦惡心不思飲食面色痿黃腸虛自利肌體瘦弱膈氣翻胃

白朮去芦陸兩　甘草炙壹兩

右為細末每服貳錢水壹盞煎至捌分空心食前服或沸湯點服亦得常服育神溫胃逐濕消痰不以四時並宜服之

[illegible]湯 治男子婦人一切冷氣攻衝胸脇及前後心連背疼痛轉項拘急或脾胃虛冷不思飲食時發嘔吐霍亂轉筋臍腹冷疼泄瀉不止及膀胱成陣刺痛小腸氣吊內外腎疼又治婦人血氣刺痛血積血瘕繞臍撮痛並皆治之　又方見后

草果仁去皮煨　縮砂去殼　檳榔煨剉　厚朴去粗皮

肉豆蔻煨　羌活去芦　蒼朮米泔浸　陳皮去白

蓽澄茄　枳殼去瓤麩炒　良薑油炒　茯苓去皮

大麥芽炒　茴香炒　川芎洗剉　甘草炙各六兩

右件碾為細末每服貳錢水壹盞半入鹽壹字同煎至捌分空心食前服之

神仙沉麝圓 治一切氣痛不可忍者

沒藥研　血竭研　沉香剉　麝香研

辰砂各壹兩　木香半兩　甘草貳兩

右為末熬甘草膏搜和每服壹圓用薑鹽湯嚼下血氣醋湯下松滋令萬君椒寶此藥婦人產後血痛氣痛不可忍者只壹圓立愈萬君神秘之每有人病止指與半圓往往亦瘥神效不可盡述

治中湯 治脾胃不和飲食減少短氣虛羸而復嘔逆霍亂吐瀉胸痺心痛逆氣短氣中滿虛痞膈塞不通或大病瘥後胸中有寒時加咳唾並宜服之

人參　甘草炒　乾薑炮

白朮炒　青皮炒　陳皮各壹兩去白

右為麄末每服叁錢水壹盞半煎至壹中盞去滓稍熱服空心食前或霍亂後氣虛未禁熱藥者尤宜服之

枳實理中圓 理中焦除痞滿逐痰飲止腹痛大治傷寒結胸欲絕心膈高起實滿作痛手不得近

枳實麩炒　白朮　人參去芦

甘草炙　白茯苓去皮　乾薑炮各貳兩

右搗羅為細末煉蜜為圓如雞子黃大每服壹圓熱湯化下連進二三服胸中豁然不拘時候

[illegible] 治脾胃虛冷不思飲食及久病人脾虛全不食者只壹貳服頓然思食

青橘皮去瓤　陳橘皮去白　高良薑　肉桂去粗皮

甘草各壹兩　草果肉　川烏頭炮去皮　訶子煨去核

右為細末每服貳錢水壹大盞生薑伍片煎至柒分食前服

白沉香散 治一切冷氣攻衝心腹脇肋脹滿刺痛噫醋吞酸嘔逆惡心胸膈噎塞飲食減少常服消痰氣和脾胃

川白薑炒　半夏麴　白茯苓　附子炮去皮

訶子肉　乾山藥　沉香　白朮煨

木香　人參去芦　丁香各半兩　甘草炒

右為細末每服貳大錢水壹盞生薑叁片棗叁枚木瓜壹片煎柒分食前服

[illegible] 治脾臟伏冷胃脘受寒胸膈痞悶心腹刺痛痰逆惡心寒嗽中滿臟腑虛滑飲食減少翻胃吐逆四肢逆冷但是沉寒痼冷無問久新功效不可具述

丁香不見火　紅豆去皮　青皮去白　甘草炙

川烏炮去皮　陳皮去白　乾薑炮　良薑炮去芦各肆兩

益智去皮　胡椒各貳兩

右件剉為麄散每服貳錢水壹盞生薑叁片鹽壹捻煎至柒分

分作二服空心食前稍熱服滓再煎無病退即止極妙

撞氣丸治男子女人陰陽不和臟腑虛弱中脘氣滯宿寒留飲停積不消胸膈脹滿心脾引痛攻刺腹脇有妨飲食又治中酒吐酒停飲浸漬嘔逆惡心噫氣吞酸並皆治之

香附子炒去毛　赤芍藥　天台烏去木

良薑去蘆用油炒　肉桂去粗皮各乙兩　甘草炙半兩

右為細末每服貳錢入鹽少許用沸湯點服不拘時候

[illegible]養脾溫胃去冷消痰大治心腹疼痛胸下氣進美飲食療一切冷物所傷並皆治之

乾薑炮　良薑去蘆頭

右件等分為細末麵糊為圓如梧桐子大每服拾伍圓至貳拾圓食後橘皮湯下　妊娠婦人不宜服

蓬莪朮圓治男子婦人氣血虛弱久積陰冷留滯不化結聚成形心腹脹刺痛成陣上連胸脇或脾胃久虛內傷冷物泄瀉注下腹痛腸鳴或久痢純白時下青黑腸滑不禁又治胃脘停痰嘔吐吞酸痞塞不通可思飲食身體沉重面色痿黃或久患心脾痛服之永除根本

丁香不見火　木香不見火　人參各乙兩　白朮炒

青皮去白　陳皮去白各乙兩　附子炮去皮臍　厚朴去粗皮薑汁炙

肉豆蔻去殼各乙兩　乾薑炮半兩

右件為細末入硇砂糊薑汁麵打糊為圓每壹兩作貳拾圓每服壹圓用老薑壹塊如拇指頭大切開作合子安藥於內用濕紙裹慢火煨熟取出去紙和薑細嚼白湯送下孕婦不得服小兒壹粒分肆服老人小兒內有傷積服之無不神驗此藥不損臟腑

順氣木香散治氣不升降嘔逆惡心胸膈痞悶脇肋脹滿及酒食所傷噫氣吞酸心脾刺痛大便不調面黃肌瘦可思飲食並療婦人血氣刺痛及一切冷氣並皆治之

丁皮不見火　縮砂仁　良薑去蘆　肉桂去粗皮

乾薑炮　甘草爁　陳皮去白　厚朴去粗皮薑汁炙

蒼朮米泔浸　桔梗去蘆　茴香炒各叁兩

右為細末每服貳錢水壹盞薑叁片棗貳枚煎至捌分稍熱服不拘時或入鹽少許沸湯點服常服寬中順氣和胃進食

[illegible]治脾胃不和中脘氣滯宿寒留飲停積不消心腹脹滿嘔吐酸水脾疼泄瀉臟腑不調飲食減少應男子女人一切氣疾並宜服之

香附子炒去毛　陳皮去白　肉桂去粗皮　良薑去蘆

青皮去白　甘草爁　茴香炒　蒼朮米泔浸各壹兩

桔梗去蘆

右件搗為細末每服貳錢入鹽少許沸湯點服或鹽酒調下不拘時候常服溫脾胃進飲食

快氣湯治一切氣疾心腹脹滿胸膈噎塞噫氣吞酸胃中痰逆嘔吐及宿酒不解可思飲食

縮砂仁捌兩　香附子炒去毛叁拾貳兩　甘草爁肆兩

右為細末每服壹錢用鹽湯點下常服快氣美食溫養脾胃或剉為粗末入生薑同煎名小降氣湯

[illegible]治脾胃虛弱久有傷滯中脘氣痞心腹膨脹脇下堅硬胸中痞塞噫氣不通嘔吐痰水不思飲食或心腹引痛氣刺氣急及療食癥酒癖血瘕氣塊時發疼痛嘔吐酸水面黃肌瘦精神困倦四肢少力又治女人血氣不調小腹疼痛並皆治之

猪胰乙具　京三稜　蓬莪朮貳味醋煮令透切焙各四兩

已上貳味同猪胰入硇砂熬膏

川楝子去核　山藥　檳榔　枳殼去穰炒

茴香炒　附子炮去皮臍各叁兩　硇砂半兩

右件碾細末入猪胰硇砂膏同醋糊為圓如梧桐子大每服拾圓至拾伍圓生薑湯下婦人淡醋湯下不計時候

以鹽湯化服加減常服順氣寬中消積滯化痰飲

人參圓理中焦不和脾胃積冷心下虛痞腹中疼痛或飲酒過多胸脇逆滿噎塞不通咳嗽無時嘔吐冷痰飲食不下噫醋吞酸口苦失味怠惰嗜臥不思飲食又治傷寒時氣裏寒外熱霍亂吐利心腹絞痛手足不和身熱不渴腸鳴自利米穀不化

乾薑炮　甘草爁　蒼朮米泔浸　桔梗去蘆

右件各等分剉為細末煉蜜為圓如彈子大每服壹圓食前沸湯嚼下又治脾胃留濕體重節痛面色萎黃肌肉消瘦常服溫脾暖胃消痰逐飲順三焦進美飲食辟風寒濕冷

集香圓治一切氣疾胸膈痞悶脇肋脹滿心腹疼痛噫氣吞酸嘔逆噁心不思飲食或因酒過傷脾胃不和並皆治之

白豆蔻仁　縮砂仁　木香不見火　薑黃各肆兩

丁香不見火　香附子炒去毛　麝香別研

甘草

右件除研藥碾為細末入麝香拌勻用甘草膏搜和為圓如梧桐子大每服壹貳圓細嚼嚥津不拘時候常服寬中順氣消宿酒進飲食寬積滯去癥塊

三稜散治腎氣不和腹脇膨脹痞悶噎塞喘滿不快飲食難化噫氣吞酸一切氣疾腹中刺痛此藥能破癥瘕結聚大治宿冷沉積常服調五臟三焦和胃進食

京三稜炮　益智仁炒

石蓮肉乙兩　蓬莪朮炮　陳皮去白

甘草炒各陸兩　青皮去白　厚朴去皮薑汁炙各叁兩

右件為細末每服貳錢水壹盞生薑叁片棗壹箇擘破鹽少許煎至柒分通口服不計時候鹽湯點或鹽酒調皆可服

肉豆蔻圓治氣瀉痢脾胃氣虛弱飲食減少

訶梨勒皮　龍骨　木香各叁分　丁香叁分

肉豆蔻仁　縮砂仁各乙兩　赤石脂　白礬灰各半兩

右件藥搗羅為末粟米飲和搜圓如梧桐子大每服貳拾圓米飲下不計時候

三稜散治酒食所傷胸膈不快腹脇脹滿嘔吐酸水翻胃嘔逆及食積氣塊攻刺腹脇不思飲食日漸羸瘦又治年高氣弱三焦痞塞常覺妨悶並宜服之

京三稜煨切　青皮去白各貳兩

蓬莪朮煨　益智仁

白茯苓四兩　甘草炙叁兩

右為細末每服貳錢用水壹盞大棗壹枚擘破鹽少許同煎至半盞溫服不拘時候常服寬胃利膈消酒食和胃

如神圓治一切冷熱氣消癖氣和脾胃補下元

天南星炮　白芷　甘草炙

羌活　附子炮去皮臍　半夏湯洗

京三稜煨　乾薑炮

右等分為末醋煮麪糊圓如梧桐子大每服空心生薑鹽湯下貳拾圓至叁拾圓痢疾滴二宜湯下叁拾圓小兒赤痢甘草橘皮湯下叁圓至伍圓量兒大小加減與服白痢乾薑湯下

丁香脾積圓治丈夫婦人小兒諸般食傷積聚胸膈脹滿心腹膨脹噫氣吞酸宿食不化脾疼翻胃婦人血氣刺痛並宜服之

丁香　木香各半兩　皂莢叁大挺燒存性　青橘皮乙兩洗

蓬莪朮叁兩　三稜貳兩　巴豆去殼半兩　高良薑已上同用米醋煮

右入百草霜叁匙同碾為細末麪糊為圓如麻仁大每服伍圓至拾伍貳拾圓止食傷隨物下脾積氣陳橘皮湯下口吐酸水淡薑湯下嘔吐藿香甘草湯下丈夫小腸氣炒茴香酒下婦人血氣刺痛淡醋湯下嘔逆菖蒲湯下小兒疳氣史君子湯下更量虛實加減如欲宣轉可加圓數五更初冷茶清下利叁伍行後以白粥補之孕婦不得服

分心氣飲治證與前分心氣飲同

木通去節　赤芍藥　赤茯苓　肉桂去粗皮

半夏湯洗　桑白皮微炒　大腹皮　陳皮去白

青皮去白　甘草炙　羌活各乙兩　紫蘇去粗梗

右為麤末每服三錢水壹盞生薑三片棗貳箇煎至柒分去滓溫服不拘時候常服消化滯氣升降陰陽調順三焦和脾進食

【木香分氣圓】治證與前木香分氣圓同

木香　丁皮　香附子炒去毛　蓬莪朮煨

縮砂仁　甘草各四兩　藿香葉　川薑黃

檀香　甘松洗各乙兩

右拾味曬乾不見火搗羅為細末稀糊為圓如梧桐子大每服貳拾圓至叁拾圓生薑橘皮湯吞下不計時候脾胃虛弱人最宜服之常服寬中順氣進飲食

【化氣湯】治一切氣逆胸膈噎悶偏脹脇痛又治心脾疼痛嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人脾血氣

沉香　胡椒各乙兩　木香　縮砂去殼

桂心去粗皮各二兩　丁皮　乾薑炮　蓬茂煨

茴香炒　青皮去白　陳皮去白　甘草炙各四兩

右為細末每服貳錢生薑紫蘇鹽湯調下婦人淡醋湯下

【[illegible]氣湯】治中脘不快心腹脹滿陰陽壅滯氣不升降胸膈噎塞喘促短氣乾噦煩滿咳嗽痰涎口中無味嗜臥減食宿寒留飲停積不消脇下支結常覺妨悶專治脚氣上衝心腹堅滿肢體浮腫有妨飲食

紫蘇葉去粗梗　厚朴去粗皮薑汁製　肉桂去粗皮不見火　半夏湯洗七次去滑

川當歸去芦　前胡去芦洗　甘草各三兩炙　陳皮三兩半去白

右為㕮咀每服貳錢至叁錢水壹大盞生薑叁片煎至柒分去滓溫服不拘時候常服消痰飲散滯氣進飲食

【千金大養脾圓】治脾胃虛弱停寒留飲膈氣噎塞反胃吐食心胸疼痛脇肋虛脹胸脇刺痛牽引背膂食少多傷言微氣短口苦舌澀惡心嘔噦吞酸嘈雜久病泄痢腸胃虛滑或大病氣不復常飲食無味形容憔悴病後多痰並宜服之

枳殼　神麯　陳皮去白　麥糵炒

茴香　白薑炮　縮砂去皮　肉豆蔻

三稜炮　茯苓去皮　良薑　薏苡仁

益智去殼　胡椒　木香　白扁豆炒

丁香　白朮　紅豆　藿香去梗

山藥　苦梗炒　人參　甘草炙

蓬朮炮

右各等分為末煉蜜為圓如彈子大每服壹粒細嚼白湯送下溫酒亦得空心食前常服養益脾胃大進飲食

【[illegible]圓】治男子婦人脾胃虛冷攻築心腹連脇肋刺痛背膊連項拘急疼痛不思飲食時或嘔逆霍亂轉筋腹冷泄瀉膀胱氣刺小腸及外腎腫痛及治婦人血氣攻刺癥瘕塊硬帶下赤白或發寒熱胎前產後惡血不止臍腹疼痛應一切虛冷不思飲食並宜服之

延胡索三兩　蒼朮米泔浸乙宿去皮　甘草炙　茯苓白者去皮

蓬朮　二稜炮　青皮去白　丁皮

縮砂去皮　檳榔各四兩　肉桂去粗皮各六兩　乾薑炮各一兩

右搗羅為末每服貳錢水壹盞入連根葱白壹莖煎至柒分空心食前稍熱服

【五皮散】治男子婦人脾氣停滯風濕客搏脾經受濕氣不流行致頭面虛浮四肢腫滿心腹膨脹上氣促急腹脇如鼓繞臍脹悶有妨飲食上攻下疰來去不定舉動喘乏並皆治之

五加皮　地骨皮　生薑皮　大腹皮

茯苓皮各等分

右為麤末每服叁錢水壹盞半煎至捌分去滓稍熱服之不拘時候切忌生冷油膩堅硬等物

【[illegible]圓】治榮衛氣虛臟腑怯弱心腹脹滿全不思食腸鳴泄

治嘔噦吐逆大宜服之

人參去蘆　甘草炙
茯苓去皮　白术各等分

右為細末每服貳錢水壹盞煎至柒分通口服不拘時入鹽少許白湯點亦得常服溫和脾胃進益飲食辟寒邪瘴霧氣

育氣散 治證與前嘔噦散同

良薑炒　蒼术去皮各二兩　縮砂去皮　茴香炒各伍兩
肉桂去粗皮　丁皮各壹兩　橘紅拾兩　甘草炙陸兩
青皮去白陸兩　山藥半斤

右細末每服貳錢水壹盞半入鹽壹字煎至捌分空心食前

參苓壯脾圓 治脾胃虛弱胸膈痞悶脇肋脹滿心腹刺痛反胃吐食口苦吞酸胸滿短氣肢體怠惰面色萎黃及中焦痞不任攻擊藏府虛寒不受峻補或因病氣衰食不復常稟受怯弱不能飲食及久病泄痢腸胃虛滑並宜服之

人參　白术　茯苓去皮　肉桂去粗皮
縮砂去皮　乾薑炮　胡椒　麥蘗炒
神麯炒　山藥　白扁豆炒

右件等分為末煉蜜為圓如彈子大每服壹圓細嚼白湯送下溫酒亦得空心食前常服育神養氣和補脾胃進美飲食

人參丁香散 治大人小兒嘔吐不已粥飲湯藥不下凡嘔吐之病皆因三焦不調脾胃虛弱冷熱失和邪正相干清濁不分陰陽皆亂停痰留飲不能運化胸膈痞滿嘔逆惡心腹脇脹痛短氣噎悶欬嘔痰水噫醋吞酸不思飲食漸至羸瘦及療女人姙娠阻病心中煩憒頭目眩重憎聞食氣嘔吐煩悶顛倒不安四肢困弱不自勝持多卧少起又治久病羸弱脾胃虛極中滿嘔逆全不入食並宜服之

白芍藥半斤　當歸去蘆　丁香　丁皮
肉桂去粗皮　蓬术　人參各貳兩　乾薑炮
茯苓去皮　香附炒　白术　甘草炒
山藥各肆兩

右為細末每服伍錢水壹盞生薑叁片同煎至柒分空心食前溫服小兒貳歲可服半錢水伍分盞生薑壹片同煎肆分已下溫服更宜量歲數加減與之常服和脾胃進飲食

人參煮散 治脾胃不和中脘氣滯心腹脹痛不思飲食宿寒留飲停積不消或因飲冷過度內傷脾氣嘔吐痰逆寒熱往來或時汗出又治腸胃冷濕泄瀉注下水穀不分腹中雷鳴脇肋虛滿兼療傷寒陰盛四肢逆冷

人參肆兩　青皮去白各壹斤貳兩　甘草炙各兩　乾薑炮陸兩
三稜煨炮　芍藥壹斤　丁皮陸兩　茯苓去皮
蒼术各半斤去皮

右為末每服貳錢水壹盞生薑伍片棗叁箇同煎至柒分食前空心溫服

平胃散 治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺痛口苦無味胸滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面色萎黃肌體瘦弱怠惰嗜卧體重節痛常多自利或發霍亂及五噎八痞膈氣反胃並宜服之

陳橘皮去白　厚朴去粗皮薑汁製炒香　甘草剉炒
生薑　紅棗各叁斤　蒼术伍斤去粗皮米泔浸二日焙

右件剉碎拌勻以水浸過面上半寸許煮令水乾取出焙燥碾為細末每服貳錢用鹽湯點空心食前常服調氣暖胃化宿食消痰飲辟風寒冷濕四時非節之氣

[illegible]氏[illegible]圓 與和劑方大不同但用修製須知法分兩最要勻停止是燒化不可偏勝[illegible]不動臟腑其功用妙處在用蠟之多切不可減常服建脾進食永無寒熱瀉痢之疾蓋消磨積滯以漸自然無疾遇酒食醉飽尤宜多服神效不可述

[illegible]　巴豆[illegible]　丁香[illegible]
乳香[illegible]　杏仁[illegible]

右為細末每服叁錢水壹盞半煎至捌分去滓食後溫服

【[illegible]】順氣寬中治胸膈痞塞心腹刺痛脇肋脹滿飲食減少噫氣吞酸嘔逆噎悶一切氣疾並皆治之

木香不見火 青皮各叁斤不去白 薑黃

甘草剉炒[illegible] 蓬朮煨剉肆斤 鹽炒[illegible]斤 麥蘖炒去土

右為末每服壹錢沸湯點服不計時候

【十八味丁沉透膈湯】治脾胃不和中寒上氣脇肋脹滿心腹疞痛痰逆惡心或時嘔吐飲食減少十膈五噎痞塞不通噫氣吞酸口苦失味並皆主之

白朮貳兩 香附炒 人參 縮砂仁各壹兩

丁香炙 麥蘖 肉豆蔻煨 白豆蔻

木香 青皮各半兩 甘草炙壹兩半 半夏湯洗七次

藿香 厚朴薑汁炒各 神麴炒 草果各

沉香 陳皮各

右㕮咀每服肆錢水貳大盞薑叁片棗壹箇煎捌分去滓熱服

【[illegible]圓】方與前蘇合香圓方同只去腦子

【[illegible]】方與木香流氣飲方同但無石菖蒲藿香有沉香枳殼大黃[illegible]

【木香檳榔圓】疏導三焦寬利胸膈破痰逐飲快氣消食通潤大腸

郁李仁去皮 皂角去皮酥炙 半夏麴各貳兩 檳榔

枳殼麩炒 木香不見火 杏仁去皮尖麩炒 青皮去白各壹兩

右為細末別用皂角肆兩用漿水壹椀搓揉熬膏更入熟蜜少許和圓如梧桐子大每服伍拾圓食後溫生薑湯下

太平惠民和劑局方卷之三

太平惠民和劑局方卷四

治痰飲 附欬嗽

【倍朮圓】治五飲酒癖一曰留飲停水在心下二曰癖飲水癖在兩脇下三曰痰飲水在胃中四曰溢飲水溢在膈上五曰流飲水在腸間動搖有聲皆由飲酒冒寒或飲水過多所致此藥並治之

乾薑炮 肉桂去粗皮各半斤 白朮一斤

右為末煉蜜和圓如梧桐子大每服貳拾圓溫米飲下加至叁拾圓食前服日貳服

【消飲圓】治酒癖停飲痰水不消滿逆嘔吐目暗耳聾脇下急痛腹中水聲

枳實麩炒半兩 茯苓去皮 乾薑炮各三兩 白朮八兩

右同為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服伍拾圓溫米飲下不計時候

【玉壺圓】治風痰吐逆頭痛目眩胸膈煩滿飲食不下及咳嗽痰盛嘔吐涎沫

天南星生 半夏生各壹兩 天麻半兩 頭白麪叁兩

右為細末滴水為圓如梧桐子大每服叁拾圓用水壹大盞先煎令沸下藥煮伍七沸候藥浮即熟漉出放溫別用生薑湯下不計時候服

【辰砂化痰圓】治風化痰安神定志利咽膈清頭目止咳嗽除煩悶

白礬枯過別研 辰砂飛研各半兩 南星炮壹兩 半夏湯洗七次薑汁搗作麴三兩

右以白礬半夏麴天南星為末合和勻用生薑汁煮麪糊圓如梧桐子大別用朱砂末為衣每服拾圓生薑湯下食後服亦治小兒風壅痰嗽壹歲兒服壹圓搥碎用生薑薄荷湯下

【[illegible]】治痰熱安神定志除頭痛眩運心忪恍惚胸膈煩悶

治喉稠粘痰涎，喘嗽咽喉不利

皂莢仁炒　天竺黃　白礬光明者，枯，各??兩

半夏湯洗七次，用生薑汁兩浸，乾，??兩　生白龍腦細研，半兩

辰砂研，二兩　金箔為衣，拾片

右以半夏皂莢子仁為末，與諸藥同拌研勻，生薑汁煮麪糊為丸，如梧子大，每十丸至十伍丸，生薑湯下，食後臨卧服

玉液圓 治風壅，化痰涎，利咽膈，清頭目，除咳嗽，止煩熱

寒水石燒令赤，出火毒，水飛過，參拾兩　白礬枯，研　半夏湯洗七次，為末，各拾兩

右合研，以白麪糊為圓，如梧桐子大，每服十圓，溫生薑湯下，食後臨卧服，每服參拾圓亦得

玉芝圓 治風壅痰實，頭目昏眩，咳嗽煩滿，咽膈不利，嘔吐惡心，神思昏憒，心忪面熱，痰唾稠粘

人參去蘆　乾薄荷葉　白茯苓去皮　白礬枯

南星各??兩　半夏湯洗，六十兩

右為末，用生薑汁煮麪糊和圓，如梧桐子大，每服貳拾圓，生薑湯下，食後。如痰盛躁熱，薄荷湯下

桔梗湯 除痰下氣，治胸脇脹滿，寒熱嘔噦，心下堅痞，短氣煩悶，痰逆惡心，飲食不下

桔梗細剉，微炒　半夏湯洗七次，薑汁製　陳皮去瓤，各十兩　枳實麩炒赤黃，伍兩

右為麤末，每服貳錢，水壹中盞，入生薑伍片，同煎至七分，去滓溫服，不計時候

胡椒理中圓 治肺胃虛寒，氣不宣通，咳嗽喘急，逆氣虛痞，胸膈噎悶，腹脇滿痛，迫塞短氣，不能飲食，嘔吐痰水不止

款冬花去梗　胡椒　甘草炙　蓽撥

良薑　細辛去苗　陳皮去白　乾薑各四兩

白术伍兩

右為細末，煉蜜圓如梧桐子大，每服三十圓至五十圓，溫湯下，溫酒米飲亦得，不拘時候，日二服

五嗽圓 治五種咳嗽：一曰上氣嗽，二曰飲嗽，三曰燥嗽，四曰冷嗽，五曰邪嗽，皆由肺受風寒，氣不宣通所致，無問久新輕重，以至食飲不下，語聲不出，坐卧不安，晝夜不止，面目浮腫，胸脇引痛，並宜服之

肉桂去麤皮　乾薑炮　皂莢去皮子，炙黃，各等分

右為細末，煉蜜為圓，如梧桐子大，每服拾伍圓，溫酒下，米飲亦得，食後服

大阿膠圓 治肺虛客熱，咳嗽氣急，胸中煩悸，肢體倦疼，咽乾口燥，渴欲引飲，多唾涎沫，或有鮮血，肌瘦發熱，減食嗜卧，又治或因叫怒，或即房勞，肺胃致傷，吐血嘔血，並宜服之

麥門冬去心　丹參　貝母炒　防風去蘆叉

柏子仁　茯神去木　杜仲去麤皮，炒　百部根各半兩

乾山藥　阿膠炒　茯苓去皮　熟乾地黃

五味子各壹兩　人參各壹分

右為細末，煉蜜和，每兩作貳拾圓，每服壹圓，水壹中盞，煎至陸分，和滓溫服，少少頻呷，不拘時候

百部圓 治肺氣不調，咳嗽喘急，胸膈煩悶，唇乾口燥，面目浮腫，咽嗌不利，積久不差，咯唾膿血者，亦宜服之

天門冬去心，壹斤　杏仁去皮尖，炒　黃芪　百部根各壹兩

款延根　紫蘇　紫菀去苗　馬兜鈴

黑參　肉桂去麤皮

右同為細末，煉蜜和圓，如梧桐子大，每服拾伍圓，煎烏梅甘草湯溫下，食後服

款冬花散 治寒壅相交，肺氣不利，咳嗽喘滿，胸膈煩悶，痰實涎盛，喉中呀呷，鼻塞清涕，頭痛眩冒，肢體倦疼，咽嗌腫痛

款冬花去梗　知母　桑葉各拾兩　半夏湯洗七次，麩炒

甘草炙，各拾兩　麻黃去根節　阿膠炒如珠子　杏仁去皮尖，麩炒

貝母去心，麩炒，各??兩

右為麤末每服貳錢水一盞入生薑叁片同煎至柒分去滓食後溫服

鍾乳補肺湯 治肺氣不足咳嗽上氣胸滿上迫喉咽閉塞短氣喘乏連唾不已寒從背起口中如含霜雪語無音聲甚者唾血腥臭乾嘔心煩耳聞風雨聲皮毛瘁面色白

鍾乳[illegible] 桑白皮 麥門冬去心 白石英[illegible]

人參去蘆 五味子揀 款冬花去梗 肉桂去麤皮

紫菀[illegible]

右除白石英鍾乳外同為麤末與白石英等同拌令勻每服肆錢水壹盞入生薑伍片大棗壹枚擘破粳米叁拾餘粒同煎至柒分用綿濾去滓溫服食後

[illegible]散 治肺感寒邪咳嗽上氣胸背滿悶項背拘急聲重鼻塞頭目昏眩痰氣不利呀呷有聲

紫蘇子炒 赤茯苓去皮 桑白皮 陳皮去白

杏仁去皮尖炒 麻黃去根節 各壹兩 甘草炙半兩

右件味為末每服貳錢水壹盞煎至柒分去滓[illegible]服

[illegible]丸 治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐惡心吞酸噫醋心腹痞滿脇肋刺痛短氣噎悶不思飲食

肉豆蔻仁 木香 丁香 人參

陳皮去白 藿香葉 各壹分 半夏湯洗柒次生薑汁炒 [illegible]

右為細末以生薑汁煮麵糊為圓如小豆大每服貳拾圓生薑湯下不計時候

[illegible]散 溫脾胃化痰飲消宿冷止嘔吐治胸膈痞滿脇肋脹痛短氣噎悶欬嗽痰水噫醋吞酸嘔逆惡心及治山嵐瘴氣

厚朴去粗皮薑汁炙 甘草炙 半夏[illegible]

藿香葉 陳皮去白 各半兩

右為麤散每服貳錢水壹盞入生薑叁片棗壹枚同煎柒分去滓熱服不計時候日貳服

二陳湯 治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中脘不快或發為寒熱或因食生冷脾胃不和

半夏湯洗 橘紅各五兩 白茯苓三兩 甘草炙一兩半

右為㕮咀每服四錢用水一盞生薑七片烏梅一箇同煎六分去滓熱服不拘時候

溫肺湯 治肺虛久客寒飲發則喘欬不能坐臥嘔吐痰沫不思飲食

白芍藥六兩 五味子去梗炒 乾薑炮 肉桂去粗皮

半夏煮熟焙 陳皮去白 杏仁 甘草炒各三兩

細辛去蘆洗

右件剉散每服三大錢水一盞半煎至一盞去滓以絹擠汁食後服兩服滓再煎一服 一方去白芍藥細辛二味可加五味子用

[illegible]散 治丈夫婦人久近肺氣咳嗽喘急上衝坐臥不安痰涎壅盛咳唾稠粘腳手冷痺心腹疼脹兼治傷[illegible]咽膈上[illegible]

訶子皮去核 款冬花去梗 甘草[illegible] 黃[illegible]

肉桂去皮不見火 杏仁[illegible]

右為細末每服二錢水壹盞入好茶壹錢同煎八分食後夜臥通口服如半夜不能煎但以藥末入茶和勻沸湯點或乾嚥亦得忌魚酒炙煿腌肉羅蔔等物

人參[illegible]圓 治肺胃俱傷氣奔於上客熱熏肺咳嗽喘急胸中煩悸涕唾稠粘或有鮮血上氣喘急不得安臥肢體倦痛咽乾口燥飲食減少漸至瘦弱喘之[illegible]跌仆墮損或因叫怒醉飽房勞致傷肺胃吐血嘔血並皆治之

黃芪去蘆 人參各[illegible] 白茯苓去皮 桑白皮各[illegible]

杏仁去皮尖 皂角子[illegible] 半夏[illegible]

右為細末煉蜜圓如彈子大每服一圓食後細嚼用紫蘇湯送下如喘急用桑白皮湯下

人參[illegible]圓 治大人小兒一切熱嗽或傷風咳嗽冷搏於肺經聲[illegible]

治小兒痰涎不利，咳嗽喘急，晝夜不止，咯唾稠粘

縮砂仁　訶子去核　藿香去梗　龍腦薄荷葉各乙

百藥煎　葛粉各捌兩　甘草伍兩　烏梅肉炙二兩

右為末，麪糊為丸，每服一二圓，含化，嚥津，食後臨卧。

中脘圓 治停痰留飲，胸膈滿悶，頭眩目暈，好卧減食，咳嗽嘔吐，氣短惡心，或飲酒過多，或引飲無度，或過傷生冷，痰涎併多，嘔噦惡心，並宜服之　又方見後

青皮去白　良姜去蘆炒　乾姜炮　陳皮去白，各伍兩

右為細末，醋打麪糊圓如梧桐子大，每服三伍拾粒，湯飲任下，不拘時

溫中半夏湯 治脾胃虛弱，痰飲不散，嘔逆酸水，腹脅脹痞，頭旋惡心，不思飲食　又方見後

縮砂仁　神麴炒　草果二　橘紅

白豆蔻仁　丁香上兩　甘草　半夏

[illegible]

右為細末，每服壹錢，先用生姜自然汁調成膏，入炒鹽少許，沸湯點服

丁香五套圓 治胃氣虛弱，三焦痞塞，不能宣行水穀，故為痰飲結聚胸膈之間，令人頭目昏眩，胸膈脹滿，咳嗽氣急，嘔吐腹痛，伏於中脘，亦令臂疼不舉，腰腿沉重，久而不散，流入於脾，脾惡濕，得水則脹，脹則不能消化水穀，又令腹中虛滿而不食也，此藥主之

南星每兩切作十數塊，同半夏先用水浸三日，每日易水，次用白礬貳兩研碎，調入水內，再浸三日，洗淨焙乾

半夏各貳兩切破　乾薑炮　白朮　良姜

茯苓各壹兩　丁香不見火　木香　青皮　陳皮去白，各半兩

右為細末，用神麴一兩，大麥蘗貳兩，同碾取末，打糊和丸

圓如梧桐子大，每服五十圓至七十圓，溫熟水下，不拘時候。常服溫脾胃，去宿冷，消留滯，化飲食，辟霧露風冷，山嵐瘴疠不正非時之氣。但是酒癖停飲，痰水不消，累服湯藥不能作效者，服之如神

消飲圓? 溫中散滯，消飲進食，治胸膈痞悶，心腹冷疼，大能暖化生冷果食，妻月不可闕此

縮砂仁乙兩　高良姜　天南星各四兩，湯洗七次焙乾

右為細末，生姜自然汁煮麪糊為丸，如梧桐子大，每服五十圓至七十圓，生姜湯下，不拘時候

辰砂白圓? 治胸膈痰涎不利，頭目昏運，吐逆涎沫

附子生，去皮臍　生硫黃別研　天南星生用

半夏各乙兩，生用　玄精石各半兩

右為細末，入細麪三兩，令停，水和為丸，如梧桐子大，每服二十丸至三十丸，生姜湯送下，食後

破飲丸 治一切停飲不散，時嘔痰沫，頭眩欲倒，膈脘不快

旋覆花八兩　白朮乙兩　肉桂去粗皮　乾姜炮，各六兩

赤茯苓去皮　枳實麩炒

右為末，麪糊丸如梧桐子大，每服五十丸，熟水下

溫中化痰圓 治飲癖胸滿，溫中化痰，圓同

乾姜炮　半夏湯洗七次，乙兩　細辛去葉　胡椒各半兩

白朮乙兩

右為細末，生姜汁打麪糊為丸，如梧桐子大，每服三十丸至五十丸，湯飲任下，不拘時候

款冬湯 治肺胃受寒，咳嗽多痰，胸滿短氣，語聲不出，晝夜不止，飲食減少，不以遠年日近，並皆治之

半夏麴八分　甘草炙　肉桂去皮　罌粟殼去蒂蓋，蜜炙，各半兩

右為細末，每服一大錢，水一盞，生姜四片，同煎至七分，通口服，不拘時候

人參款花膏 治肺胃虛寒久嗽不已胸膈滿悶咳嗽痰涎嘔逆惡心腹脅脹滿腰背倦痛或虛勞冷嗽及遠年日近一切嗽病服諸藥不効者並皆治之

款冬花去梗 人參去蘆 五味子炒去梗 紫菀去蘆洗 桑白皮銼炒各一兩

右為細末煉蜜為丸如雞頭大每服一丸食後細嚼淡薑湯送下或每一大圓分作四小圓含化亦得

橘皮半夏湯 治肺胃虛弱好食酸冷寒痰停積嘔逆惡心涎唾稠黏或積吐粥藥不下手足逆冷目眩身重又治傷寒時氣欲吐不吐欲嘔不嘔昏憒悶亂或飲酒過多中寒停飲喉中涎聲乾噦不止

陳皮去白 半夏煮各七兩

右二件㕮咀為麄散每服三錢生薑十片水二盞煎至一中盞去滓溫服不計時候留兩服滓併作一服再煎服

人參潤肺圓 治肺氣不足咳嗽喘急痰涎不利胸膈煩悶涕唾稠黏咽乾口燥及療風壅痰實頭目昏眩精神不爽或肺胃俱虛久嗽不已漸成虛勞肢體羸瘦胸滿短氣行動喘乏飲食減少或遠年日近諸般咳嗽並皆治之

人參 款冬花去梗 細辛去葉洗 杏仁去皮尖麩炒 甘草爁各四兩 知母六兩 肉桂去麄皮 桔梗各五兩

右為細末煉蜜為圓如雞頭大每服一圓食後細嚼淡薑湯送下含化亦得

定喘餅子 治男子婦人久患咳嗽肺氣喘促倚息不得睡臥累年不瘥漸致面目虛浮

蟬蛻洗去土七箇 杏仁去皮尖炒 馬兜鈴炒各二錢 砒六分

右為細末蒸棗肉為丸如麥子大每服六七圓臨睡用蔥茶清放冷下服後忌熱物半日一本用淡砒一錢如綠豆大不損人

人參清肺湯 治肺胃虛寒咳嗽喘急胸膈噎悶腹肋脹滿迫塞短氣喜欲飲冷咽嗌隱痛及療肺痿勞嗽唾血腥臭乾嘔煩熱聲音不出肌肉消瘦倦怠減食

地骨皮 人參去蘆 阿膠麩炒 杏仁去皮尖麩炒 桑白皮去麄皮 知母 烏梅去核 甘草炙 罌粟殼去蒂蓋蜜炙

右等分㕮咀為麄散每服三錢水一盞半烏梅棗子各一枚同煎至一盞濾去滓溫溫食後臨臥服兩滓留併作一服

[illegible] 治脾胃不和中脘氣滯宿寒留飲停積不消心腹刺痛脅肋脹滿嘔吐痰水噫氣吞酸或中酒吐酒噦逆惡心頭疼煩渴倦怠嗜臥不思飲食並宜服之

陳皮去白 乾薑炮 桔梗炒 丁皮 甘草炒 半夏湯洗 [illegible] 陳皮去白 [illegible]

右為細末每服壹錢入鹽壹捻沸湯點服不拘時候常服利三焦開胃健脾消痰進飲食

人參養肺湯 治丈夫婦人遠年日近肺氣咳嗽上喘氣急喉中涎聲胸滿氣逆坐臥不安飲食不下及治肺感寒邪咳嗽聲重語音不出鼻塞頭昏並皆治之

人參切片 麻黃去節 甘草炙 阿膠炒 半夏湯洗 桑白皮 五味子 罌粟殼蜜炙

右為麄末入人參片拌勻每服三大錢水一盞半入生薑三片同煎至八分去滓食後溫服又治小兒久患肺氣喘急喉中涎聲胸膈不利嘔吐痰沫更量歲數加減服

細辛五味子湯 治肺經不足胃氣怯弱或冒風邪或停寒有飲咳嗽倚息不得安臥胸滿迫塞短氣減食乾嘔作熱咳唾結痰或吐涎沫頭目昏眩身體疼重語聲不出鼻塞清涕頭面腳膝時帶虛浮痰咳不止痛引胸脅不問新久並宜服之

北細辛去苗 半夏湯洗 甘草炙 烏梅去核各 五味子 罌粟殼去蒂蓋 桑白皮炒

右爲麁散每服叁錢水貳盞半生薑拾片煎至壹盞用紗帛濾去滓溫服留貳服滓併作壹服再煎

茯苓半夏湯 治停痰留飲胸膈滿悶咳嗽嘔吐氣短惡心以致飲食不下並宜服之

茯苓(去皮 叁兩)　半夏(湯洗七次 伍兩)

右爲麁末每服肆大錢水壹大盞生薑柒片煎至柒分去滓空心服

人參藿香散 治男子婦人脾胃氣弱嘔吐噦逆飲食不下手足逆冷涎痰稠粘又治似喘不喘欲嘔不嘔撮心憒憒煩亂不安或瘧痢諸疾水漿粥藥入口便吐服之立効久病翻胃服之百日痊安此藥溫脾胃化痰飲消宿冷止吐嘔

藿香葉(去土 肆兩)　人參(切片 肆兩)　半夏(湯洗柒次 以生薑汁製 肆兩半)

右搗爲麁末入人參令勻每服叁錢水壹盞半生薑拾片煎至壹盞去滓通口服孕婦忌

半夏圓 治肺氣不調咳嗽喘滿痰涎壅塞心下堅滿短氣煩悶及風壅痰實頭目昏眩咽膈不利嘔吐惡心神思昏憒心忪而熱涕唾稠粘並皆治之

白礬(枯過 拾伍兩)　半夏(湯洗去滑 薑汁罨壹宿 叁斤)

右搗爲細末生薑自然汁爲圓如梧桐子大每服貳拾圓加至叁拾圓食後臨卧時生薑湯下

杏參散 降痰下氣治胸脅脹滿上氣喘急倚息不得睡卧神思昏憒宜服之

桃仁(去皮尖 麩炒)　人參(去蘆)　杏仁(去皮尖 麩炒)　桑白皮(蜜炙微赤 再泔浸一宿焙)

右等分爲細末每服貳錢水壹盞半薑叁片棗壹箇煎至柒分溫服不拘時候

杏子湯 治一切咳嗽不問外感風寒內傷生冷及虛勞咯血痰飲停積悉皆治療(出易簡方)

人參(去蘆)　半夏(湯洗七次)　茯苓(去皮)　芍藥(去油)

官桂(去皮 不見火)　乾薑(炮洗)　細辛(去苗葉)　甘草(炙)　五味子(去梗) 各等分

右㕮咀每服四錢水壹盞半杏仁去皮尖剉伍枚薑伍片煎至陸分去滓食前服若感冒得之加麻黃等分如脾胃素實者用罌粟殼去筋碎剉以醋淹炒等分加之每服添烏梅壹箇煎服其効尤驗若嘔逆惡心者不可用此

一法 去杏仁人參倍加麻黃添芍藥如麻黃之數乾薑五味子各增一半名小青龍湯大治久年咳嗽痰涎壅盛夜不得睡仍專治脚氣喘急此方雖有麻黃既有官桂不致於發汗服之不妨

一方 又加麻黃甘草杏仁五味子茯苓等分搗紅棓之尤爲切當

一方 用紫蘇葉桑白皮麻黃青皮五味子杏仁甘草等分生薑柒片烏梅一箇煎服久年咳嗽氣壅喘急皆得其宜二方中有麻黃有汗人不宜服之

四七湯 治喜怒悲思憂恐驚之氣結成痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下此七氣所爲也或中脘痞滿氣不舒快或痰涎壅盛上氣喘急或因痰飲中節嘔逆惡心並宜服之

半夏(伍兩)　茯苓(四兩)　紫蘇葉(貳兩)　厚朴(叁兩)(出易簡方)

右㕮咀每服四錢水壹盞半生薑柒片棗壹箇煎至陸分去滓熱服不拘時候若因思慮過度陰陽不分清濁相干小便白濁用此藥下青州白圓子最爲切當婦人惡阻尤宜服之一名厚朴半夏湯一名大七氣湯局方有七氣湯用半夏伍兩人參官桂甘草各一兩生薑煎服大治七氣并心腹絞痛然藥味太甜恐未必能止疼順氣

一方 治七情所傷中脘不快氣不升降腹脅脹滿用香附子炒半斤橘紅六兩甘草一兩煎服尤快好事者謂其耗氣則不然蓋有是病服是藥也

太平惠民和劑局方卷之四

太平惠民和劑局方卷五

諸虛不足 (附) 骨蒸

[illegible]圓 補虛壯氣暖背扶脾壯精髓調脾胃進飲食悅顏色治五勞七傷腎氣虛備腸腹冷痛脇肋酸疼腰背拘急腳膝緩弱面色黧黑肌肉消瘦目暗耳鳴口苦舌乾腹中虛鳴脇下刺痛飲食無味心常恍惚夜多異夢晝少精神小便滑數時有餘瀝房室不舉或夢交通及一切風虛痼冷並宜服之

腽肭臍(壹對酒浸炙令熱) 硇砂(貳兩研飛) 精羊肉(...)

羊髓(各壹斤) 沉香 神麯(各壹兩)

已上陸味用無灰好酒壹㪷同於銀器內慢火熬成膏候冷入下項藥

陽起石(...) 人參(去蘆) 補骨脂(酒浸炒)

鍾乳粉 巴戟(去心) 川芎 肉豆蔻(去殼)

紫蘇子(炒) 枳殼(麩炒去瓤) 木香 蓽澄茄

葫蘆巴(炒) 天麻(去苗) 青皮(去白) 丁香

茴香(各貳兩炒) 肉桂(去粗皮) 檳榔 蒺藜子(炒)

大腹子(各壹兩半) 山藥 蓯蓉(...) 白豆蔻(去殼各壹兩)

大附子(...)

右件藥各依法修事搗羅為末入前膏內搜成劑於臼內搗千餘杵圓如梧桐子大每服貳拾圓空心溫酒下鹽湯亦得

菟絲子圓 治腎氣虛損五勞七傷少腹拘急四肢酸疼面色黧黑脣口乾燥目暗耳鳴心忪氣短夜夢驚恐精神困倦喜怒無常悲憂不樂飲食無味舉動乏力心腹脹滿腳膝痿緩小便滑數房室不舉股內濕痒水道澀痛小便出血時有遺瀝並宜服之久服填骨髓續絕傷補五藏去萬病明視聽益顏色輕身延年聰耳明目(又方用龍齒...遠志...不用石龍芮澤瀉肉蓯蓉)

菟絲子(...) 澤瀉 鹿茸(去毛酥炙) 石龍芮(去土)

肉桂(去粗皮) 附子(炮去皮) 石斛(去根) 熟乾地黃

白茯苓(去皮) 牛膝(酒浸...) 續斷 山茱萸

肉蓯蓉(酒浸...) 防風(去苗) 杜仲(去粗皮炒) 補骨脂(去毛酒炒)

蓽澄茄 沉香 巴戟(去心) 茴香(炒)

五味子 桑螵蛸(...) 芎藭 覆盆子(去枝葉萼各半兩)

右為細末以酒煮麪糊為圓如梧桐子大每服貳拾圓溫酒或鹽湯下空心服如腳膝無力木瓜湯下晚食前再服

[illegible]圓 治眞氣不足元藏虛弱頭昏面腫目暗耳鳴四肢疲倦百節酸疼腳下隱痛步履艱難肌體羸瘦面色黧黑鬢髮脫落頭皮腫痒精神昏困手足多冷心胸痞悶遶臍刺痛膝腔痠疼不能久立腰背拘急不得俛仰兩脇脹滿水穀不消腹痛氣刺發作時心懸噎塞嘔逆惡心口苦咽乾喫食無味恍惚多忘氣促喘乏夜夢驚恐心忪盜汗小便滑數或水道澀痛一切元藏虛冷之疾並能治之常服補五藏和血脈駐顏色潤髮進食肥肌大壯筋骨

川椒(去目炒出汗) 葫蘆巴(炒) 巴戟天(去心) 地龍(去土炒)

蒼朮(去皮) 烏藥(各六兩) 川烏頭(炮去皮臍) 羌活(去蘆各四兩)

茴香(炒) 赤小豆 馬藺子(醋炒) 金鈴子(麩炒)

石斛(去根各捌兩) 青鹽(貳兩)

右為細末酒煮麪糊為圓如梧桐子大每服貳拾圓溫酒下或鹽湯亦得空心食前服之

[illegible]圓 補暖水藏祛逐風冷利腰膝強筋骨黑髭鬢駐顏容

何首烏(...) 牛膝(去苗...)

右件藥以黑豆壹㪷淨淘洗曬乾用甑壹所先以豆薄鋪在甑底然後薄鋪何首烏又鋪豆又薄鋪牛膝如此重重鋪令藥豆俱盡安於釜上蒸之令豆熟為度去黑豆取藥曝乾又換豆蒸之如此叁遍去豆取藥候乾為末蒸棗肉和圓如梧

山茱萸　牛膝(去苗酒浸)　澤瀉(各乙兩)　山藥(弍兩)
五味子(陸兩)　茯苓(去皮)　杜仲(去皮炒)　兎絲子(酒浸各三兩)

右件為末煉蜜和搜為圓如梧桐子大每服弍十圓至三十圓食前溫酒下溫米飲亦得服之七日後令人身輕健四體潤澤脣口赤手足暖面有光悅消食身體安和音聲清響是其驗也十日後長肌肉此藥通中入腦鼻必酸疼勿怪

大山芋圓　治諸虛百損五勞七傷肢體沉重骨節酸疼心中煩悸脣口乾燥面體少色情思不樂欬嗽喘乏傷血動氣夜多異夢盜汗失精腰背強痛臍腹弦急嗜臥少起喜驚多忘飲食減少肌肉瘦瘁又治風虛頭目眩運心神不寧及病後氣不復常漸成勞損久服補諸不足愈風氣百疾

白朮　麥門冬(去心)　白芍藥　杏仁(去皮尖麩炒)
防風(去蘆叉)　芎藭(各乙兩半)　大豆黃卷(炒)　熟乾地黃
肉桂(去麁皮)　麴(炒)　當歸(酒浸各乙兩半)　桔梗　白茯苓(去皮)
柴胡(去苗各乙兩半)　乾薑(炮七分半)　甘草(七兩)　大棗(乙百个蒸熟去皮核)
阿膠(炒)　人參(各乙兩七錢半)　白斂(半兩)　山芋(柒兩半)

右為末煉蜜與棗肉同和圓如彈子大每服一圓溫酒或米飲化下嚼服亦得食前常服養真氣益精補髓活血駐顏

定志圓　治心氣不定五藏不足恍惚振悸憂愁悲傷差錯謬忘夢寐驚魘恐怖不寧喜怒無時朝差暮劇暮差朝劇或發狂眩並宜服之

遠志(去苗及心)　菖蒲(各貳兩)　人參　白茯苓(去皮各三兩)

右為細末煉蜜圓如梧桐子大朱砂為衣每服柒圓加至二拾圓溫米飲下食後臨臥日三服常服益心強志令人不忘

[illegible]圓　治男子女人諸虛不足小腹急痛脇肋䐜脹臍下虛滿胷中煩悸面色萎黃脣口乾燥少力身重胷滿短氣腰背強痛骨肉酸疼行動喘乏不能飲食或因勞傷過度或因病後不復並宜服之

黃芪　肉桂(去麁皮各二兩)　甘草(弍兩炙)　白芍藥(六兩)

右為麁散每服三錢水乙盞半入生薑三片大棗一枚同煎乙中盞去滓入餳少許再煎令溶稍熱服空心食前

人參黃芪散　治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱口燥咽乾頰赤心忪日晡潮熱夜有盜汗胷脇不利減食多渴欬唾稠粘時有膿血

天門冬(去心三十兩)　半夏(湯洗七次薑汁製)　知母　桑白皮(剉炒)
赤芍藥　黃芪　紫菀　甘草(炙各十五兩)
白茯苓(去皮)　柴胡(去苗)　秦艽(去土)　生乾地黃
地骨皮(揀淨)　人參　桔梗(各十兩)　鱉甲(去裙醋炙)

右為麁末每服弍大錢以水壹盞煎至柒分去滓溫服食後

鍾乳圓　治五勞七傷欬逆上氣治寒嗽通音聲明目益精安五藏通百節利九竅下乳汁益氣補虛損療腳弱疼冷下焦傷竭強陰久服延年益壽好顏色不老令人有子

鍾乳(不拘多少)

右取韶州者無問厚薄但顏色明淨光澤者即堪入鍊唯黃赤兩色不任用欲鍊亦不限多少置鍾乳於金銀器中即以大鐺中著水沉金銀器於鐺水中煮之常令如魚眼沸水減即添若薄乳三日三夜即得若麁肥厚管者即柒日柒夜候乳色變黃白即熟如疑生更煮滿十日最佳煮訖出金銀椀其鐺內煮乳黃濁水棄之勿令人服服必損人咽喉傷人肝肺令人頭痛兼復下利不止其有犯者食猪肉即愈棄此黃水訖更著清水準前更煮經半日許即出之其水色清不變即止乳無毒矣即於甆鉢中用玉槌著水研之其鉢及槌須夾白練袋籠口稍長作之使槌得轉兼通上下每日著水攪令勻調勿使著槌鉢即封繫練袋自作字記勿使人開一即免纖塵入中二即免研人竊喫研覺乾澀即是水盡即更添水常令如稀米泔狀乳細者皆浮在上麁者沉在下徧繞槌鉢四邊研之不及者即麁細

不匀為此每日須乙開或二開攪拮令匀勿使著鍵即得匀
熟免有麁細研至肆伍日狀若乳汁研揩視之狀如書中白
魚欌即成自然光白便以水洗之不隨水落者即執若得水
而落者即未成更須研之以不落為限熱灘取暴乾每服秤
半兩分為叁服用温酒調下空腹服更量病輕重增減奉可
合和用鍾乳圓散

玉霜圓 治真氣虛憊下焦傷竭臍腹弦急腰脚軟痛精神困倦面色枯槁或亡血盜汗遺瀝失精大便自利小便滑數肌肉消瘦陽事不舉久服續骨聯筋秘精堅髓延年保命却老還童安魂定魄換肌秘氣輕身壯陽益壽住世

天雄 [illegible] 磁石 [illegible]
朱砂 飛研 澤瀉 [illegible] 牛膝 [illegible] 石斛 去根各
蓯蓉 [illegible] 巴戟 [illegible] 茴香 炒 肉桂 [illegible]
家韮子 [illegible] 兎絲子 [illegible]
牡蠣 [illegible] 紫梢花 [illegible]
鹿茸 [illegible]
白龍骨 [illegible]

右件乙十六味搗羅為細末煉酒蜜各半和圓如梧桐子大每服叁拾圓空心晚食前温酒下常服補真氣壯陽道

柏子圓 治心氣不足志意不定神情恍惚語言錯妄忪悸煩鬱愁憂慘感喜怒多恐健忘少睡夜多異夢寤即驚魘或發狂眩暴不知人並宜服之

拘杞子 淨 白茯苓 去皮 黃精 蒸熟 朱砂 研水飛
預知子 去皮 石菖蒲 茯神 去木 人參
柏子仁 地骨皮 去土 遠志 去心 山藥 各等分

右件壹拾貳味搗羅為細末煉蜜圓如龍眼核大更以朱砂為衣每服壹圓細嚼人參湯下不計時候

[illegible]圓 治腎經久積陰寒膀胱虛冷下元衰憊耳重聾焦臍腿腫疼臍腹撮痛兩脇刺脹小腹堅疼下部濕癢夜夢遺精恍惚多驚皮膚乾燥面無光澤口淡無味不思飲食大便滑泄小便滑數精神不爽事多健忘常服補元陽益腎氣

肉桂 去粗皮 川烏 [illegible] 桃仁 [illegible] 白蒺藜 炒去刺
巴戟 去心 山藥 茯苓 去皮 肉蓯蓉 酒浸一宿
石斛 去根 萆薢 白朮 破故紙 各等分

右為末煉蜜為圓如梧桐子大每服叁拾圓温酒或鹽湯下空心食前小腸氣炒茴香鹽酒下

鹿茸[illegible]圓 益真氣補虛憊治下焦傷竭臍腹絞痛兩脇脹滿飲食減少肢節煩疼手足麻痺腰腿沉重行步艱難目視茫茫夜夢鬼交遺泄失精神情不樂陽事不舉小便滑數氣虛腸鳴大便自利虛煩盜汗津液內燥並宜服

鹿茸 [illegible] 熟乾地黃 [illegible]
附子 [illegible] 牛膝 [illegible]
杜仲 [illegible] 五味子 [illegible]
山藥 [illegible] 肉蓯蓉 [illegible]

右為末煉蜜為圓如梧桐子大每壹斤圓子用麝香末乙錢為衣每服貳拾粒温酒下鹽湯食前服 [illegible]

[illegible]香圓 治男子婦人心氣不足志意不定驚悸恐怖悲憂慘戚虛煩少睡喜怒不常夜多盜汗飲食無味頭目昏眩常服補益氣血安神鎮心

麝香 乙錢研 木香 [illegible] 山藥 [illegible] 茯神 去皮木
茯苓 去皮 黃芪 遠志 去心各乙兩 人參
桔梗 甘草 各半兩 辰砂 別研

右為細末每服貳錢温酒調服不拘時候

[illegible]圓 治諸虛百損脾元耗憊真陽不固三焦不和上實下虛攻頭目昏眩八風五痺或卒暴中風痰潮上膈言

語涉溢神昏氣亂狀若癡狂及奔豚腎氣上衝胸腹連兩脇膨
脹刺痛不可忍者陰陽上下氣不升降飲食不進面無精光肢
體浮腫五種水氣脚氣上衝腰背倦痛夜夢鬼交覺來盜汗胃
冷心疼小便滑數牽引小腹足膝緩弱步履艱難婦人血海久
冷赤白帶下歲久無子及陰毒傷寒面青舌卷陰縮難言四肢
厥冷不省人事者急服百粒用生薑大棗煎湯灌之即便回陽
命無不活或觸冒寒邪霍亂吐瀉手足逆冷六脉沉伏脣口青
黑腹脇攻刺及男子陽事痿怯脚膝痠疼腹臍虛鳴大便自滑
兼療膈胃煩壅痰飲虛喘百藥不愈者常服助養真氣生陽逐
陰溫平不僭消磨冷滯尅化飲食使五臟安寧六腑調暢百病
不侵出入道途宜將此藥隨行緩急服餌大有功效

禹餘粮石 火煅醋淬不計遍次以手捻得碎為度　紫石英 火煅醋淬　赤石脂 火煅醋淬壹次各半斤

代赭石 火煅醋淬不計遍次以手捻得碎為度　磁石 火煅醋淬伍拾次

已上伍石各貯之各研為細末又以水研之挹其清者
置之紙上紙用筲箕盛欲使細末在紙上而水滴在下
挹盡而止既乾各用藏瓶盛貯以鹽水紙筋和泥固濟
陰乾以好硬炭伍拾斤分為伍處每壹處用炭拾斤燒
紅作壹爐子煅此伍藥以紙灰蓋之　日後火盡灰冷
則再煅如此叁次埋地坑內兩日出火毒再研入後藥

附子 炮去皮臍　肉蓯蓉 酒浸焙　當歸 酒浸壹宿焙

茴香 炒　破故紙 酒炒　木香 不見火　肉桂 去麄皮

巴戟 鹽湯浸打去心　肉豆蔻 麵裹煨　丁香　山藥

鹿茸 酥炙　白茯苓 去皮　沉香　遠志 去心各壹兩

已上各如法修製同研為末却入

乳香 別研　五靈脂 去砂石　沒藥 去砂石各壹兩

已上叁味入眾藥同研却入

朱砂 飛過　陽起石 煅　鍾乳粉 各壹兩

已上叁味別研臨時入

右同入研過羅為細末用糯米粉煮糊為圓每兩作伍拾圓
陰乾入布袋內貯令光瑩每服伍圓至拾圓空心用溫酒吞
下或薑鹽湯或棗湯下亦可婦人用艾醋湯吞下

朴附圓 治脾元虛弱飲食遲化食必多傷腹痛腸鳴臟腑滑泄
晝夜無度胃氣虛損不美飲食嘔噦惡涎此藥性溫兼治翻胃
惡心及久患脾泄冷瀉之人最宜服此

厚朴 去粗皮薑汁製　附子 炮去皮臍各壹斤　神麴 炒兩　乾薑 炮五斤

右為細末酒煮麵糊圓如梧桐子大每服叁拾圓空心食前
米飲或鹽湯下亦得

川楝散 治膀胱小腸氣痛臍下撮痛上衝心腹面色痿黃脚下
隱痛四肢倦怠不思飲食夜多旋溺外腎瘙痒

川楝子 去皮核　破故紙 炒　茴香 炒各壹兩

葫蘆巴 炒兩　附子 炮去皮臍各壹兩半　乾薑 炮乙兩

右為細末每服貳錢空心食前熱酒調下

双和湯 治男子婦人五勞六極七傷心腎俱虛精血氣少遂成
虛勞百骸枯瘁四肢倦怠寒熱往來咳嗽咽乾行動喘乏面色
痿黃略有所觸易成他疾或傷於冷則宿食不消脾疼腹痛瀉
痢吐逆或傷於熱則頭旋眼暈痰涎氣促五心煩熱或因飢飽
動作喜怒驚恐病隨而至或虛脹而不思食或多食而不生肌
肉心煩則虛汗盜汗一切虛勞不敢服燥藥者並宜服之常服
調中養氣益血育神和胃進食補虛損

白芍藥 拾兩　當歸 洗去蘆酒浸　黃芪 蜜炙　川芎

熟地黃 洗酒蒸各肆兩　甘草 炙　肉桂 去皮不見火各叁兩貳錢

右為細末每服貳錢水壹盞半生薑叁片棗子壹枚煎至柒
分空心食前服忌生冷果子等物

平補鎮心丹 治丈夫婦人心氣不足志意不定神情恍惚夜多
異夢忪悸煩鬱及腎氣傷敗血少氣多四肢倦怠足脛酸疼睡
臥不穩夢寐遺精時有白濁漸至羸弱
又方見後

酸棗仁（去殼炒） 車前子 白茯苓（去皮）
五味子（揀） 肉桂（去粗皮） 麥門冬（去心） 茯神（去木）
天門冬（去心） 龍齒 熟地黃（洗酒蒸） 山藥
人參（去蘆） 朱砂（細研為衣） 遠志（去心） 甘草（炙）

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服叁拾圓空心飯飲下温酒亦得加至伍拾圓常服益精髓養氣血悅色駐顏

翰林劉活菴云平補鎮心丹方有二此方有五味子白茯苓車前子肉桂人參酸棗仁非惟可以治心氣不足而白濁滑渴尤為切要之藥局方無此六味有生地黃苦梗栢子仁石菖蒲當歸只宜治心氣不足腎氣傷敗血少氣多耳

十四味建中湯 治榮衛不足腑臟俱傷積勞虛損形體羸瘠短氣嗜卧寒熱頭痛咳嗽喘促吐嘔痰沫手足多冷面白脫色小腹拘急百節盡疼夜卧汗多夢寐驚悸小便滑利大便頻數失血虛極心忪面黑脾腎久虛飲食失味

當歸（去蘆酒浸） 白芍藥 白朮 甘草（炙）
人參（去蘆） 麥門冬（去心） 川芎 肉桂（去粗皮）
附子（炮去皮） 肉蓯蓉（酒浸） 半夏（湯洗） 黃芪（炙）
茯苓（去皮） 熟地黃（洗去土酒蒸）

右㕮咀為麤散每服叁錢水壹盞半生薑叁片棗子壹枚煎至壹盞去滓食前温服

〔〕治脾腎風虛毒氣流注腿膝酸疼艱於步履小便遺瀝大便後重此藥補五臟內傷調中益精凉血堅強筋骨益智輕身耐老

木瓜（去瓤） 續斷 萆薢 牛膝（酒浸）
薏苡仁 川烏（炮去皮） 防風 杜仲

右為末酒糊圓每服叁拾至伍拾圓空心食前温酒鹽湯任下

〔〕大治男子婦人諸虛不足肢體勞倦胸中煩悸時常焦渴唇口乾燥面色萎黃不能飲食或先渴而欲發瘡或病癰疽而後渴者尤宜服此常服平補血氣安和臟腑

黃芪（去蘆蜜炙） 甘草（炙）

右㕮咀每服叁錢水壹盞棗壹枚煎至柒分去滓温服不拘時

〔〕治腎經虛弱腰膝沉重腿腳腫痒注破生瘡腳心隱痛筋脈拘攣或腰膝緩弱步履艱難舉動喘促面色黧黑大小便秘澀飲食減少無問久新並宜服之

狗脊（去毛） 大艾 木瓜（去瓤）
天麻（去蘆） 當歸（酒浸） 萆薢 蓯蓉（酒浸）
牛膝

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服叁拾圓漸加至伍拾圓空心食前鹽酒吞下鹽湯亦可

〔〕治腎與膀胱經虛為邪氣所搏結成寒疝伏留不去臍腹疞刺小腸氣痛奔豚痃癖疼不可忍陰核偏大膚囊癰腫結硬牽引重大滋長或瘙痒疼痛時出黃水瘡瘍腰腿沉重足脛腫滿行步艱難服燥熱藥治療不見減瘥服之漸漸內消不動大腸亦不損經絡補虛消疝温養腎經此藥不燥熱無毒若悉心服餌其效如神

吳茱萸（湯洗炒） 陳皮（去白） 川楝（蒸去皮） 肉桂（去粗皮）
馬藺花（醋炙） 青皮（去白） 山藥 茴香（炒）
山茱萸（去核） 木香

右為細末酒糊圓如梧桐子大每服叁拾圓至伍拾圓空心温酒或鹽湯吞下

〔〕治腎氣虛弱風冷乘之或血氣相搏腰痛如折起坐艱難俛仰不利轉側不能或因勞役過度傷於腎經或處卑濕地氣傷腰或墜墮傷損或風寒客搏或氣滯不散皆令腰痛或腰間似有物重墜起坐艱辛者悉能治之

胡桃（去皮） 大蒜 破故紙 杜仲（去皮）

右為細末蒜膏為圓每服叁拾圓空心温酒下婦人淡醋湯

下常服壯筋骨活血脈烏髭鬚悅顏色

黑錫丹 治真元虛憊陰邪獨盛陽氣暴絕或大吐大瀉久痢虛脫等病餘同黑錫丹治狀此藥方佳

沉香

硫黃 〔[illegible]〕 黑錫 〔去滓秤各二兩〕 牛膝 〔酒浸〕

白朮 〔[illegible]〕 蓯蓉 〔酒浸焙〕 丁香 〔五錢〕 川練子 〔[illegible]用肉〕

木香 茴香 〔炒〕 肉豆蔻 〔麵裹煨〕 破故紙 〔炒〕

桂心 〔去粗皮〕 附子 〔炮去皮〕 胡蘆巴 〔炒〕 陽起石 〔煅各乙兩〕

右件藥并砂子四兩並擣爲細末和停用糯米粉酒煮糊爲圓如梧桐子大溫酒鹽湯空心吞下伍拾圓

寧志丸 治心氣虧虛神志不守恐怖驚惕常多恍惚易於健忘睡臥不寧夢涉危險一切心疾並皆治之

酸棗仁 〔[illegible]〕 人參 〔各三兩〕 辰砂 〔[illegible]〕 乳香 〔[illegible]〕

右件味研和停煉蜜圓如彈子大每服一粒溫酒化下棗湯亦得空心臨臥服

三仙丹 〔[illegible]〕 治腎經虛寒元氣損弱神衰力怯目暗耳聾常服補實下經溫養脾胃壯氣搜風駐顏活血增筋力烏髭鬚

川烏頭 〔[illegible]〕 茴香 〔[illegible]〕

蒼朮 〔[illegible]〕

右爲細末酒煮麪糊圓如梧桐子大每服至柒拾圓空心溫酒鹽湯任下

樂令建中湯 治血氣虛勞傷五臟六腑虛損腸鳴神倦榮衛不和退虛熱除百病

前胡 細辛 黃芪 〔蜜塗炙〕 人參

桂心 橘皮 〔去白〕 當歸 〔洗去土〕 白芍藥

茯苓 〔去皮〕 麥門冬 〔去心〕 甘草 〔炙各乙兩〕 半夏 〔湯洗七次切〕

右㕮咀每服四錢姜四片棗乙箇水乙盞煎至柒分去滓微熱服不拘時候

金鈴子圓 治腎氣發動牽引疼痛臍腹弦急攻衝不定

金鈴子 〔[illegible]〕 [illegible] 石[illegible]

破故紙 〔炒〕 茴香 〔炒〕 巴戟 〔去心各弍兩〕 木香

白茯苓 〔去皮〕 陳皮 〔去白各乙兩〕

右爲末酒煮麪糊爲圓如梧子大每伍十圓鹽湯溫酒任下

[illegible] 治男子元陽虛損五臟氣衰夜夢遺泄小便白濁臍下冷疼陽事不興久無子息漸致瘦弱變成腎勞眼昏耳鳴腰膝酸痛夜多盜汗並宜服之自能精元秘固內施不泄留濁去清精神安健如婦人宮藏冷月水不調赤白帶漏久無子息面生䵟黯髮退不生肌肉乾黃容無光澤並宜服此藥

大川烏 〔[illegible]〕 川練子 〔[illegible]〕

破故紙 〔炒〕 巴戟 〔去心[illegible]〕 茴香 〔[illegible]〕

右件碾爲細末用酒打麪糊爲圓如梧桐子大每服叁伍拾圓用酒或鹽湯下空心食前

寧心丹 心腎不足時有熱盜汗健忘遺精及服熱藥過多上盛下虛氣血不降小便赤白稠濁不清常服鎮益心神補虛養血益丹田秘精氣

熟乾地黃 〔酒洗蒸焙乾〕 天門冬 〔去心〕 麥門冬 〔去心各叁兩〕

茯苓 〔去皮〕 人參 遠志 〔[illegible]〕 茯神

山藥 〔各弍兩〕 肉桂 〔[illegible]〕 朱砂 〔[illegible]一兩〕 當歸 〔[illegible]〕

右爲末煉蜜爲圓如梧桐子大每服叁拾圓煎人參湯吞下

[illegible] 治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱口燥咽乾頰赤心忪日晚潮熱夜有盜汗胸脅不利減食多渴欬唾稠粘時有膿血

人參 肉桂 〔去粗皮〕 苦梗 〔各乙兩〕 生乾地黃 〔[illegible]〕

半夏 〔[illegible]〕 紫菀 〔去蘆〕 知母 赤芍藥

黃芪 甘草 〔[illegible]〕 桑白皮 〔[illegible]〕 天門冬 〔去心焙〕

鱉甲 〔去裙醋炙各伍兩〕 秦艽 〔去蘆〕 白茯苓 〔焙〕 地骨皮 〔去土〕

柴胡 〔各[illegible]〕

右㕮咀為麄末每服貳大錢水一盞煎至柒分去滓溫服食後

[illegible]治百病補五藏遠疫癘卻嵐瘴除尸疰蠱毒辟鬼魅邪氣大治男子婦人真元虛損精髓耗傷形羸氣乏中滿下虛致水火不交及陰陽失序精神困倦面色枯槁亡血盜汗遺瀝失精大便自利小便滑數夢寐驚恐陽事不舉腰腿沉重筋脈拘攣及治一切沉寒痼冷痃癖癥瘕臍腹絞痛久瀉久痢傷寒陰證脈候沉微身涼自汗四肢厥冷婦人百病胎藏久冷絕孕無子赤白帶下月候不調服諸藥久不差悉皆主之此丹假陰陽造化之功得天地中和之氣即與尋常一煆一煉僭燥丹藥功效不同此丹活血實髓安魂定魄悅澤顏色輕身保壽前不特藥力縱情慾久久服之可通仙道

雄黃　雌黃　硫黃　朱砂各伍兩

右件研細入磁合內將馬鞭草為末鹽泥固濟慢火四圍燒煆壹日壹夜取出再研細末以糯米粽研為糊圓如豆大每服壹粒艳早空心新汲水吞下妊婦不可服忌羊血菘菜

十全大補湯治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛夜夢遺精面色萎黃腳膝無力一切病後氣不如舊憂愁思慮傷動血氣喘欬中滿脾腎氣弱五心煩悶並皆治之此藥性溫不熱平補有效養氣育神醒脾止渴順正辟邪溫暖脾腎其效不可具述

人參　肉桂去粗皮不見火　地黃洗酒蒸焙
茯苓焙　白朮焙　川芎　甘草炙　黃芪去蘆
川當歸洗去蘆　白芍藥各等分

右壹拾味剉為麄末每服貳大錢水壹盞生薑叁片棗子貳箇同煎至柒分不拘時候溫服

[illegible]治男子婦人氣血勞傷四肢倦怠肌體瘦弱骨節煩疼頭昏頰赤肢體枯槁面色萎黃唇焦口乾五心煩熱痰涎咳嗽腰背引痛乍起乍臥夢寐不寧神情恍惚時有盜汗口苦無味不美飲食及治山嵐瘴氣寒熱往來並能治之

荊芥去梗　貝母去心　天仙藤　前胡去蘆
青皮去白　柴胡去蘆　甘草炙　陳皮去白
秦艽去蘆　鱉甲去裙醋炙各二兩　乾葛焙　白芷
肉桂去粗皮　羌活各半兩

右為細末每服貳錢水壹盞生薑叁片同煎至捌分稍熱服不拘時候酒調亦得常服養氣血調榮衛解倦怠

沉香鱉甲散治男子婦人五勞七傷氣血虛損腰背拘急手足沉重百節酸疼面色黑黃肢體倦怠行動喘乏胸膈不快咳嗽痰涎夜多異夢盜汗失精嗜臥少力肌肉瘦瘁不思飲食日漸羸弱一切勞傷諸虛百損並能治之

乾蝎壹錢半　沉香不見火　人參去蘆　木香不見火
巴戟去心　牛膝去蘆酒浸　黃芪去蘆　白茯苓焙
柴胡　荊芥去梗　半夏湯洗七次薑汁浸　川當歸去蘆
秦艽去蘆各半兩　附子炮去皮臍　肉桂去粗皮　鱉甲醋炙去裙各壹兩
羌活　熟乾地黃洗酒蒸焙各壹兩半　肉豆蔻

右為細末每服貳錢水壹盞蔥白貳寸生薑叁片棗子貳枚擘破同煎至柒分空心食前

小菟絲子圓治腎氣虛損五勞七傷少腹拘急四肢酸疼面色黧黑唇口乾燥目暗耳鳴心忪氣短夜夢驚恐精神困倦喜怒無常悲憂不樂飲食無味舉動乏力心腹脹滿腳膝痠緩小便滑數房室不舉股內濕痒水道澀痛小便出血時有遺瀝並宜服之久服填骨髓續絕傷補五臟去萬病明視聽益顏色輕身延年聰耳明目

石蓮肉貳兩　菟絲子酒浸伍兩　白茯苓焙壹兩　山藥貳兩柒錢半打糊

右為細末用山藥糊搜和為圓如梧桐子大每服伍拾圓溫酒或鹽湯下空心服如腳膝無力木瓜湯下晚食前再服

[illegible]治真氣不足下元冷憊臍腹絞痛脅肋虛脹腳膝[illegible]

虛弱腰背拘急肢体倦怠面無精光唇口乾燥目暗耳鳴心忪氣短夜多異夢晝少精神喜怒無時悲憂不樂虛煩盜汗飲食無味舉動力乏夜夢鬼交遺泄失精小便滑數時有餘瀝陰間濕痒陽事不興並宜服之

沉香乙兩　附子炮去皮臍　巴戟去心　鹿茸酥炙去毛酒炙

熟乾地黃淨洗酒浸蒸焙　兔絲子酒浸另研各伍兩

右件為細末入麝香壹錢半別研入和勻煉蜜為圓如梧桐子大每服四五拾粒好酒或鹽湯空心吞下常服養真氣益精髓明視聽悅色駐顏

椒附圓　補虛壯氣溫和五藏治下經不足內挾積冷臍腹弦急痛引腰背四肢倦怠面色黧黑唇口乾燥目暗耳鳴心忪短氣夜多異夢晝少精神時有盜汗小便滑數遺瀝白濁腳膝緩弱舉動乏力心腹脹滿不進飲食並宜服之

附子炮去皮臍　川椒去目及閉口者炒出汗　檳榔各半兩　陳皮去白

牽牛微炒　五味子　石菖蒲　乾薑炮各乙兩

右鍘味剉碎以好米醋於瓷器內用文武火煮令乾焙為細末醋煮麵糊為圓如梧桐子大每服叁十圓鹽酒或鹽湯空心食前吞下婦人血海冷當歸酒下泄瀉飯飲下冷痢薑湯下赤痢甘草湯下極緩下元治腎氣虧乏及療腰疼

[illegible]心丹　治證與前平補鎮心丹同

熟乾地黃　生乾地黃　乾山藥　天門冬

麥門冬去心　柏子仁　茯神各去木　辰砂別研為衣

苦梗去蘆各叁兩　石菖蒲　遠志去心甘草煮各貳兩

當歸去蘆各兩　龍骨乙兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服叁拾圓空心飯飲吞下溫酒亦得漸加至伍拾圓宜常服安精髓養氣血明視聽悅色駐顏

[illegible]圓　治證與前青娥圓同

[illegible]圓　治丈夫元陽虛憊精氣不固餘瀝常流小便滑數頻濁及婦人血海久冷白帶白漏白淫下部常濕小便如米泔或無子息

黃蠟乙兩　白茯苓去皮作塊用豬苓四錢半同於瓷器內煮二十餘沸出曬乾不用豬苓

右以茯苓為末熔黃蠟搜為圓如彈子大空心細嚼滿口生津徐徐嚥服以小便清為度忌米醋只吳樵醋切忌使性氣

遠志圓　治丈夫婦人心氣不足腎經虛損思慮太過精神恍惚健忘多驚睡臥不寧氣血耗敗遺瀝泄精小便白濁虛汗盜汗耳或聾耳鳴悉皆主之

遠志去心薑汁炒　牡蠣煅取粉　白茯苓去皮　人參

乾薑炮　辰砂別研各乙兩　肉蓯蓉淨洗切片焙乾各肆兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服三十粒空心食前煎燈心鹽湯下溫酒亦可此藥性溫無毒常服補益心腎聰明耳目定志安神養氣血

[illegible]圓　治腎氣虛乏下元冷憊夜多旋溺肢體倦怠漸覺羸瘦腰膝沉重嗜臥少力精神昏憒耳作蟬鳴面無顏色泄瀉腸鳴眼目昏暗牙齒蛀痛並皆治之

香附子　川烏　川練子

已上各壹斤用鹽四兩水肆升同煮候乾剉焙

熟地黃貳兩　茴香壹兩　川椒去目炒出汗

右陸味為細末酒糊為圓如梧桐子大每服貳十元至三十圓空心臨臥鹽湯鹽酒任下常服補益損下元冷憊

三[illegible]丹　壯元陽補真氣治勞傷虛損下經衰竭腎氣不固精滑遺失臟腑自利手足厥冷或脈理如絲形肉消脫或惡聞食氣聲嘶失音

陽起石酒煅　附子炮去皮　鍾乳粉各等分

右為細末和勻用糯米糊為圓如梧桐子大每服二十圓至三拾圓米飲送下食前服忌豉汁羊血

伏火二氣丹 治真元虛損，精髓耗傷，腎氣不足，面黑耳焦，下虛上盛，頭目眩暈，心腹刺痛，翻胃吐逆，霍亂盜汗，水氣喘滿，全不入食，婦人血氣久冷，崩中漏下，癥瘕塊癖。此藥奪陰陽造化之功，濟心腎交養之妙，大補諸虛。

硫黃 四兩　黑錫　水銀　丁香 不見火

乾薑 各半兩

右先鎔黑錫，後下水銀，結砂子，與硫黃一處再研成黑灰色，次入餘藥研勻，用生薑自然汁煮糊為圓如梧桐子大，每服十粒至十五粒，濃煎生薑湯下，空心食前。

[illegible]丹 性溫無毒，主五臟百病，益精養神，補氣明目，安魂魄，通血脈，止煩滿，殺邪魅，善治榮衛不交，養陰陽不升降，上盛下虛，頭旋氣促，心腹冷痛，翻胃吐逆，霍亂轉筋，臟腑滑泄，赤白下痢，久服通神，輕身不老，令人心靈。此丹按仙經服餌之法，會五行持令之妙，體性輕清，不隨煙焰飛走，男女老幼皆可服。

水銀 一斤　硫黃 四兩

右二味用新鐵銚炒成砂子，或有煙焰，即以醋酒潑，研細，入水火鼎，醋調赤石脂封口，鐵線扎縛，曬乾，鹽泥固濟，用炭二十斤煅，如鼎子裂，筆蘸赤石脂頻抹其處，火盡為度，經宿取出，研為細末，糯米糊為丸如麻子大，每服三粒，空心棗湯、米飲、井華水、人參湯任下，量病輕重增至五七粒，忌豬羊血、菉豆粉、冷滑之物。

上丹 養五臟，補不足，固真元，調二氣，和榮衛，保神守中，久服輕身耐老，健力美食明目，降心火，交腎水，益精氣，男子絕陽庶事，不與女子絕陰不能妊娠，腰膝重痛，筋骨衰敗，面色黧黑，心勞志昏，寤寐恍惚，煩憒多倦，餘瀝夢遺，膀胱邪熱，五勞七傷，肌肉羸瘁，上熱下冷，難任補藥，服之半月，陰陽自和，容色肌肉光潤，悅澤開心，意安神魄，消飲食，養胃氣。

五味子 半斤　蛇床子　百部根 酒浸一宿　菟絲子 酒浸別研

白茯苓　肉蓯蓉 酒浸　枸杞子　柏子仁 別研

杜仲 炒斷絲　防風 去叉　巴戟 去心　山藥

遠志 去心，各二兩

右為末，蜜圓如梧桐子大，食前溫酒鹽湯任下三十圓。春煎乾棗湯，夏加五味子四兩，四季月加蓯蓉陸兩，秋加枸杞子陸兩，冬加遠志陸兩。

[illegible]四斤圓 治肝腎虛熱淫於內，致筋骨痿弱，不自勝持，起居須人，足不任地，驚恐戰掉，潮熱時作，飲食無味，不生氣力，諸虛不足。

肉蓯蓉 酒浸　天麻　鹿茸 燎去毛，酥炙　菟絲子 酒浸研

熟地黃　牛膝 酒浸　杜仲 酒浸　木瓜 乾，各等分

右為末，蜜圓如梧桐子大，每服五十圓，溫酒、米湯食前下。

[illegible]丸 治三消渴，利神藥，常服禁遺精，止白濁，延年。

菟絲子 酒浸研焙為末十兩　五味子 酒浸別研為末七兩

白茯苓　乾蓮肉 各三兩

右為末，別碾乾山藥末陸兩，將所浸酒餘者添酒煮糊，搜和得所，搗數千杵，圓如梧子大，每服五十圓，米湯下，空心食前。

[illegible]丸 治心腎氣不足，驚悸健忘，夢寐不安，遺精，面少色，足脛酸疼。

龍齒 水飛　遠志 去心炒　天門冬 去心　熟地黃

山藥 各壹兩　茯神　麥門冬 去心　車前子 炒

白茯苓　桂心　地骨皮　五味子 各伍兩

右為末，蜜圓如梧桐子大，每服三十圓至五十圓，空心溫酒、米湯任下。

[illegible]圓 治真陽耗竭，下元傷憊，耳輪焦枯，面色黧黑，腰重腳弱，元氣衰微，常服固真補氣，益精駐顏。

川楝子 炒　續斷 炒去絲　茯苓　茴香 炒

補骨脂 炒　附子 炮去皮臍　葫蘆巴 微炒，各一兩

山藥炒　桃仁去皮尖炒別研　杏仁去皮尖炒別研各弍兩

右為末精羊肉肆兩酒煮爛研極細入麪煮糊圓如梧桐子大每服大棗湯溫酒空心任下叁伍拾圓

[illegible]天丸　治元臟虛憊血氣不足白濁遺泄口汗自利口苦舌乾四肢羸瘦婦人諸虛皆主之

木香炮　附子炮去皮臍　茴香炒　肉蓯蓉酒浸

川椒炒去目　巴戟去心　牛膝酒浸　白蒺藜炒去刺

桃仁去皮尖各十兩　黃芪　澤瀉　葫蘆巴

五味子各兩　檳榔　天麻　桂心

川芎　羌活各弍兩

右為細末蜜圓如梧桐子大空心酒鹽湯空腹任下叁伍拾圓

十四友圓　補心腎虛怔忪昏憒神志不寧睡臥不安故經曰臟有所傷情有所倚人不能知其病則臥不安

熟地黃　白茯苓　白茯神去木　人參

酸棗仁炒　柏子仁別研　紫石英別研　肉桂

阿膠蛤粉炒　當歸　黃芪　遠志湯浸去心酒灑蒸各乙兩

辰砂乙分別研　龍齒弍兩別研

右為末同別研藥味煉蜜為圓如梧桐子大每服叁拾圓食後棗湯下

鍾乳白澤圓　治丈夫諸虛百損五勞七傷真氣不足元臟不固神志俱耗筋力頓衰頭目眩暈耳內虛鳴心腹急痛氣逆嘔吐痰嗽喘促胸腹脹悶脾泄下痢遺精便濁厥冷自汗脈微欲絕婦人血海虛冷崩漏不止赤白帶下經候不調臍腹時痛面無顏色飲食不進但是一切虛勞之疾並宜服之

白檀香銼末　滴乳香乙兩別研　陽起石煆令通赤別研

鍾乳粉弍兩　麝香乙分別研

附子炮去皮臍各乙兩半

右和勻滴水搜成劑分作陸拾圓每服壹圓水壹盞煎化及柒分蓋空心熱服如急病不拘時久服補益精血助陽消陰

安心神定魂魄延年增壽起死回生

三建湯　治真氣不足元陽久虛寒邪攻衝肢節煩疼腰背酸痛自汗厥冷大便滑泄小便白濁及中風涎潮不省人事傷寒陰證厥逆脈微皆可服之

天雄炮去皮臍　附子炮去皮臍　大川烏炮去皮臍各等分

右為麄末每服肆錢水貳盞生薑拾伍片煎至捌分去滓溫服不拘時候

十全散　治諸虛百損榮衛不和形體羸瘦面色痿黃腳膝酸疼腰背倦痛頭眩耳重口苦舌乾骨熱內煩心忪多汗飲食進退寒熱往來喘嗽吐衄遺精失血婦人崩漏經候不調凡病後未復及憂慮傷動血氣此藥平補有效最宜服之

熟乾地黃　白茯苓　人參　桂去粗皮不見火

川當歸去蘆　白芍藥　川芎　白朮

黃芪去蘆　甘草炙各等分

右為麄末每服弍錢水壹盞生薑叁片棗子壹枚煎至柒分去滓溫服不拘時候

治痼冷　附消渴

二氣丹　助陽消陰正氣溫中治內虛裏寒冷氣攻擊心脇臍腹脹滿刺痛泄利無度嘔吐不止自汗時出小便不禁陽氣漸微手足厥冷及傷寒陰證霍亂轉筋久下冷痢少氣羸困一切虛寒痼冷並宜服之

硫黃細研　肉桂去皮為末各乙分　乾薑炮為末　朱砂研為衣各弍錢

附子乙枚大者炮去皮臍為末

右並勻研細用麪糊為圓如梧桐子大每服叁拾圓煎艾鹽湯放冷下空心食前服

[illegible]圓　治風冷邪氣入乘心絡或臟腑暴感風寒上乘於心令人卒然心痛或引背膂乍發乍止經久不差並宜服之

附子(炮去皮臍) 川烏(炮去皮臍) 赤石脂(各壹兩) 蜀椒(去目及閉口者炒出汗)
肉桂(去粗皮) 乾薑(炮各半兩)
右件搗羅細末蜜和為圓如梧桐子大每服叁圓溫酒下覺至痛處痛即止若不止加至伍陸圓以知為度若早朝服無所覺至午時再服叁圓夜又服叁圓若久心痛每旦服叁圓稍加至拾圓盡壹劑遂終身不發忌猪肉生葱

[illegible]圓 主五勞七傷肺損氣急痔丈夫衰老陽氣絕手足冷心中少氣髓虛腰疼脚痺體煩口乾不能食此藥下氣消食長肌和中安五藏除萬病
兔絲子(酒浸) 石斛(去根各乙兩) 鍾乳粉(叁兩) 吳茱萸(湯洗焙乾半兩)
右為細末煉蜜和圓梧桐子大每服柒圓空心溫酒或溫湯米飲下日再服訖行數百步飲溫酒叁合後行貳叁百步覺口胃內熱稍定即食乾飯豆醬過壹日食如常須腰將息不得隔見風穢等氣亦不可食粗臭陳惡食初服柒日內勿為陽事過柒日後任性然亦不宜傷多服過半劑覺有效即揩續服叁劑終身更無所忌

金液丹 固真氣暖丹田堅筋骨壯陽道除久寒痼冷補勞虛損治男子腰腎久冷心腹積聚脇下冷癖腹中諸蟲失精遺溺形羸力劣脚膝疼弱冷風頑痺上氣衄血咳逆寒熱霍亂轉筋虛滑下利又治痔瘻濕䘌生瘡下血不止及婦人血結寒熱陰蝕疽痔
硫黃(淨揀去砂石拾兩研細飛過用瓷盒子盛以水和赤石脂封口以鹽泥固濟曬乾地內先埋一小罐子盛水令滿安盒子在上用泥固濟了慢火養七日七夜候足加頂火一斤煆候冷取出研為細末)
右藥末壹兩用蒸餅一兩湯浸握去水脫為圓如梧桐子大每服三十圓多至百圓溫米飲下空心服之又治傷寒陰証身冷脈微手足厥逆或吐或利或自汗不止或小便不禁不拘圓數宜併服之得身熱脈出為度

[illegible]皮煎圓 治久虛積冷心腹疼痛嘔吐痰水飲食減少脇肋虛滿臍腹弦急大腸虛滑小便利數肌膚瘦悴面色萎黃肢體怠墮腰膝緩弱及治痃癖積聚上氣咳嗽久瘧久利腸風痔瘻婦人血海虛冷赤白帶下久無子息並宜服之
當歸(去蘆洗) 萆薢 厚朴(去粗皮薑汁炙) 肉蓯蓉(酒浸焙乾)
肉桂(去粗皮) 附子(炮去皮臍) 巴戟(去心) 陽起石(酒煮焙乾研)
石斛(去根) 牛膝(去蘆酒浸) 杜仲(去皮炒) 吳茱萸(水淘去浮者焙乾)
鹿茸(酥炙) 乾薑(炮) 兔絲子(酒浸)
三稜(各壹兩) 甘草(炙各壹兩) 陳橘紅(各半兩)
右為細末用酒伍勝於銀石器內將橘皮末煎熬如餳却將諸藥末入在內壹處攪和搜勻仍入臼內搗伍伯杵圓如梧桐子大每服貳拾圓空心溫酒下鹽湯亦得

附子理中圓 治脾胃冷弱心腹絞痛嘔吐泄利霍亂轉筋體冷微汗手足厥寒心下逆滿腹中雷鳴嘔噦不止飲食不進及一切沉寒痼冷並皆治之
附子(炮去皮臍) 人參(去蘆) 乾薑(炮) 甘草(炙)
白朮(各壹兩)
右為細末用煉蜜和為圓每兩作壹拾圓每服壹圓以水壹盞化破煎至柒分稍熱服之空心食前

[illegible]圓 治脾元氣弱久積陰冷心腹脇肋脹滿刺痛面色青黃肌體瘦弱怠惰嗜臥食少多傷噫氣吞酸咳逆惡心腹中虛鳴大便泄利胸膈痞塞食飲不下嘔噦霍亂體冷轉筋及五膈五噎痃癖瘕聚翻胃吐食久痛久痢並皆治之
縮砂仁 胡椒 肉桂(去粗皮) 厚朴(去粗皮薑汁炙)
附子(炮去皮臍) 川芎 當歸(去蘆洗焙) 陳皮(去白)
乾薑(炮) 甘草(炙各四兩) 青鹽(別研) 北亭(研)
白朮(別研) 五味子(乙兩半) 阿魏(醋化去砂石半兩)
右為末用銀石鍋內入好酒醋伍升白沙蜜叁拾兩先下北亭阿魏青鹽叁味并好頭麪壹升同煎稠粘便下藥末半斤

以來更煎如稀麪糊漸漸入藥末煎得所離火取出更以乾
藥末和搜成劑更擣壹千下圓如梧桐子大每服拾伍圓微
嚼破用生薑鹽湯下溫酒亦得空心食前服之忌羊血豉汁

[illegible] 治下經不足內挾積冷臍腹弦急痛引腰背面
色萎黃手足厥冷脇肋虛滿精神困倦臟腑自利小便滑數

附子炮去皮臍　沉香　蓽澄茄　葫蘆巴炒
肉桂去粗皮　茴香炒　補骨脂炒　巴戟天去心
木香　川楝子去核　川烏炮去皮臍　桃仁去皮尖麩炒

右同為細末每服貳錢水壹盞入鹽末少許煎捌分去滓
稍熱服之如膀胱小腸一切氣疾補服之有功空心食前服

清心蓮子飲 治心中蓄積時常煩躁因而思慮勞力憂愁抑鬱
是致小便白濁或有沙膜夜夢走泄遺瀝澀痛便赤如血或因
酒色過度上盛下虛心火炎上肺金受剋口舌乾燥漸成消渴
睡臥不安四肢倦怠男子五淋婦人帶下赤白及病後氣不收
斂陽浮於外五心煩熱藥性溫平不冷不熱常服清心養神秘
精補虛滋潤腸胃調順血氣

黃芩　麥門冬去心　地骨皮　車前子
甘草炙各半兩　石蓮肉去心　白茯苓　黃芪蜜炙
人參各柒錢半

右剉散每服參錢麥門冬拾粒水壹盞煎至捌分去滓水中
沉冷空心食前服發熱加柴胡薄荷煎

獨活寄生湯 治腎氣虛弱腰背疼痛此病因臥冷濕地當風所
得不時速治流入腳膝為偏枯冷痺緩弱疼重或腰痛腳重攣
痺宜急服此

獨活參兩　桑寄生古人今用川續斷即寄生亦名
當歸酒浸　白芍藥　熟地黃酒蒸　牛膝去蘆酒浸
細辛去苗　白茯苓去皮　防風去蘆　秦艽去土
人參　桂心不見火　芎藭　杜仲去粗皮炒去絲

甘草炙各貳兩

右為剉散每服肆大錢水壹盞半煎至柒分去滓空心服氣虛
下痢除地黃併治新產腹痛不得轉動及腰腳攣痛痺弱不
得屈伸此湯最能除風消血肘後有附子無寄生人
參甘草當歸近人將治歷節風并治氣流注甚有效

人參養榮湯 治積勞虛損四肢骨肉酸疼吸吸少氣行動喘啜
小腹拘急腰背強痛心虛驚悸咽乾唇燥飲食無味陰陽衰弱
悲憂慘戚多臥少起久者積年急者百日漸至瘦削五臟氣竭
難可振復又治肺與大腸俱虛咳嗽下利喘乏少氣嘔吐痰涎

白芍藥參兩　當歸　陳皮　黃芪
桂心去粗皮　人參　白朮　甘草各壹兩
熟地黃　五味子　茯苓各柒錢半　遠志半兩

右剉散每服肆錢水壹盞半生薑參片棗子貳枚煎至柒分
去滓溫服便精遺泄加龍骨壹兩咳嗽加阿膠甚妙

[illegible] 治男子婦人諸虛不足產後血氣耗傷一切虛損

鹿茸　黃芪蜜炙　當歸酒浸　白茯苓去皮
蓯蓉酒浸　杜仲　人參　芍藥
肉桂　石斛　附子炮　五味子
半夏　白朮　甘草半兩　熟乾地黃酒蒸

右㕮咀每服肆錢薑參片棗壹枚水壹盞煎柒分空心熱服

[illegible] 治腎氣虛損腰腳節骨疼痛膝脛不能屈伸久病腳膝
緩弱每服用壹字空心豆淋酒下服訖麻痺少時須臾疾消藥
氣頓愈骨中痛嚼胡桃肉酒調下甚者三五服風寒濕痺治之

全蝎　天麻三分　蒼朮　附子炮去皮臍
草烏頭各二錢

右為細末空心溫酒調下

[illegible] 治心氣不寧諸虛百損肢體沉重情思不樂夜多異夢
盜汗失精恐怖煩悸喜怒無時口乾咽燥渴欲飲水飲食減少

肌肉瘦瘁漸成勞瘵常服補精血調心氣進飲食安神守中功效不可具述

人參　山藥　黃芪蜜炙　白茯苓去皮

石蓮肉去心　白朮各一兩　烏藥　縮砂仁

橘紅　乾薑各半兩炮　丁香　南木香

檀香各一分　沉香二分　甘草二分炙

右為剉散每服四分水一大盞生薑三片棗一个煎七分去滓空心服（一法）有炮附子半兩

震靈丹紫府元君南嶽魏夫人方出道藏一名紫金丹　此丹不犯金石飛走有性之藥不僭不燥奪造化冲和之功大治男子真元衰憊五勞七傷臍腹冷疼肢體酸痛上盛下虛頭目暈眩心神恍惚血氣衰微及中風癱瘓手足不遂筋骨拘攣腰膝沉重容枯肌瘦目暗耳聾口苦舌乾飲食無味心腎不足精滑夢遺膀胱疝墜小腸淋瀝夜多盜汗久瀉久痢嘔吐不食八風五痺一切沉寒痼冷服之如神及治婦人血氣不足崩漏虛損帶下久冷胎藏無子服之無不愈者

禹餘粮火煅醋淬不計遍以手捻得碎為度　紫石英

赤石脂　丁頭代赭石如禹餘粮炮製

已上四味並作小塊入甘鍋內鹽泥固濟候乾用炭十斤煅通紅火盡為度入地坑出火毒二宿

的乳香別研　五靈脂去沙石研　沒藥去沙石研各二兩　朱砂一兩水飛過

右件前後共八味並為細末以糯米粉煮糊為圓如小雞頭大曬乾出光每一粒空心溫酒下冷水亦得常服鎮心神駐顏色溫脾腎理腰膝除尸疰蠱毒辟鬼魅邪癘久服輕身漸入仙道忌豬羊血恐減藥力婦人醋湯下孕婦不可服極有神効不可盡述

來復丹鐵甕城八角杜先生方一名正一丹　此藥配類二氣均調陰陽奪天地冲和之氣乃水火既濟之方可冷可熱可緩可急善治榮衛不交養心腎不升降上實下虛氣閉痰厥心腹冷痛臟腑虛滑不問男女老幼危急之證但有胃氣無不獲安補損扶虛救陰助陽為効殊勝

硝石一兩同硫黃並為細末入定磁內以微火慢炒用柳篦子不住手攪令陰陽氣相入不可火太過恐傷藥力再研極細名二氣末

太陰玄精石研飛

舶上硫黃用透明不夾砂石者各一兩　五靈脂須擇五臺山者用水澄去砂石日乾

青皮去白　陳皮去白各二兩

右用五靈脂二橘皮為細末次入玄精石末及前二氣末拌勻以好滴醋打糊為丸如豌豆大每服三十粒空心粥飲吞下甚者五十粒小兒三五粒新生嬰兒一粒小兒慢驚風或吐利不止變成虛風搐搦者非風也胃氣欲絕故也用五粒研碎米飲送下老人伏暑迷悶紫蘇湯下婦人產後血逆上搶悶絕并惡露不止及赤白帶下並用醋湯下常服和陰陽益精神散腰腎陰濕止腹肋冷疼立見神効應諸疾不辨陰陽證者並宜服之靈異不可具紀

黑錫丹[illegible]　却邪輔正助陽接真治元氣虛[illegible]陰邪交爭正氣乖常上盛下虛氣不升降呼吸不足頭旋氣短心神怯弱夢寐驚悸遍身盜汗腹痛腰疼或虛煩狂言口乾上喘翻胃吐食霍亂轉筋咳逆不定（一本治中風痰潮不省人事陽氣欲脫四肢厥冷如傷寒陰證自汗唇青脈沉最宜服之）及婦人產後血氣身熱月候不均帶下腹痛悉能治療常服濟心火強腎水進飲食

水銀　硫黃研細　朱砂研細　黑錫去滓秤[illegible]

右用黑盞一隻火上鎔黑錫成汁次下水銀以柳杖子攪勻次下朱砂攪令不見星子放下少時方入硫黃末急攪成汁和勻如有焰以醋洒之候冷取出研如粉極細用糯米粉煮糊為圓如菉豆大每服二十元加至三十粒鹽湯下此藥升降陰陽既濟心腎空心食前棗湯送下神効不可具述

黑錫丹（出和劑方）治脾元久冷，上實下虛，胸中痰飲，或上攻頭目徹痛，目瞪昏眩，及奔豚氣上衝，胸腹連兩脅，膨脹刺痛不可忍，氣欲絕者；及陰陽氣上下不升降，飲食不進，面黃羸瘦，肢體浮腫，五種水氣，脚氣上攻，及牙齦腫痛，滿口生瘡，齒欲落者；兼治脾寒心痛，冷汗不止，或卒暴中風，痰潮上膈，言語艱澀，神昏氣亂，喉中痰響，狀似癱瘓，曾用風藥吊吐不出者，宜用此藥百粒，煎薑棗湯灌之，壓下風涎，即時蘇省，風涎自利；或觸冒寒邪，霍亂吐瀉，手足逆冷，唇口青黑；及男子陽事痿怯，脚膝痠軟，行步乏力，臍腹虛鳴，大便久滑；及婦人血海久冷，白帶自下，歲久無子，血氣攻注頭面四肢，並宜服之。兼療膈胃煩壅，痰飲虛喘，百藥不愈者。常服克化飲食，養精神，生陽逐陰，消磨冷滯，除濕破癖，不動真氣，使五臟安寧，六腑調暢，百病不侵。

【歌曰】陰損陽衰實可傷，纖調榮衛亦難將，氣藏……者。試聽桑君為發揚。

【又】夫麥八合會功成訣。鈴子沉香壹兩餘，木附胡蘆陽起皮，桂茴肉豆等無差，梧桐酒糊猜條住，反老還童事可嘉。

沉香　附子（炮去皮臍）　胡蘆巴　陽起石（研）

肉桂（去皮）　茴香　破故紙　肉豆蔻

金鈴子（去皮核）　木香（各壹兩）　黑錫（去滓秤）　硫黃（各貳兩）

右用黑盞或新鐵銚內，如常法結黑錫硫黃砂子，地上出火毒，研令極細，餘藥並杵羅為細末，都一處和勻入研，自朝至暮，以黑光色為度，酒糊圓如梧桐子大，陰乾，入布袋內擦令光瑩。每服參肆拾粒，空心薑鹽湯或棗湯下，婦人艾醋湯下。

【□□丹】清上實下，助養根元，扶衰救元陽，益臟腑，治五勞七傷，夜多盜汗，肺萎虛損，久嗽上喘，霍亂轉筋，六脈沉伏，唇口青黑，腹脇刺痛，大腸不固，小便滑數，夢中遺泄，肌肉瘦瘁，目暗耳鳴，胃虛食減，久瘧久痢，積寒痼冷，諸藥不愈者，服之如神。

白石脂　左顧牡蠣（各半兩）

陽起石　鍾乳粉（壹兩）

右肆味各研令極細如粉，方拌和作一處，令勻研一二日，以糯米粉煮糊為圓如雞頭大，入地坑出火毒，每服壹粒，空心濃煎人參湯放冷送下，熟水亦得。常服澀溫平，不僭不燥，澤肌悅色，祛除宿患。婦人久無妊者，以當歸熟地黃浸酒下，便有符合造化之妙。或久冷崩帶，虛損臍腹撮痛，艾醋湯下。服此者以少白粥壓之，忌豬羊血、菉豆粉，恐解藥力。尤治久患腸風藏毒。

【□□元丹】治真氣不足，元臟虛弱，四肢倦怠，百節酸疼，頭昏眩痛，目暗耳鳴，面色黧黑，鬢髮脫落，頭皮腫痒，精神昏困，手足多冷，心胸痞悶，臍腹切痛，膝脛酸疼，不能久立，或腳弱隱痛，步履艱難，腰背拘急，不得俛仰，腹痛氣刺，兩脅虛脹，水穀不消，大便不調，嘔逆惡心，飲食減少，恍惚多忘，氣促喘乏，夜多異夢，心忪盜汗，小便滑數，遺瀝白濁，一切元臟虛冷之病，並能治之。

五倍子　茯苓　紫巴戟　補骨脂

肉蓯蓉　葫蘆巴　龍骨　朱砂（別研）

右為細末，入研藥令勻，酒糊為圓如梧桐子大，每服拾伍圓至貳拾圓，空心食前溫酒吞下，或鹽湯亦得。

【□□□丹】治心氣不足，思慮太過，腎經虛損，真陽不固，漩有遺瀝，小便白濁如膏，夢寐頻泄，甚則身體拘倦，骨節痠疼，飲食不進，面色黧黑，容枯肌瘦，唇口乾燥，虛煩盜汗，舉動力乏。

茯苓（貳兩）　龍骨（壹兩）　五倍子（肆兩）

右為末，水糊為圓，每服肆拾粒，空心用鹽湯吞下，日進參服。此藥性溫不熱，極有神効。

【□□圓】補腎臟，暖丹田，興陽道，減小便，填精髓，駐顏潤肌，治元氣虛憊，面目黧黑，口乾舌澀，夢想虛驚，眼中冷淚，耳作蟬鳴，腰膝沉重，百節痠疼，項筋緊急，心背腳勞倦，陰汗盜汗，四肢無力

及胎孀八子宮久冷月脉不調或多或少赤白帶下並宜服之
良薑六兩　紫金藤十六兩　巴戟拾貳兩　青鹽貳兩
肉桂去粗皮　吳茱萸各四兩
右為末酒糊為圓每服貳拾圓煖鹽酒送下鹽湯亦得日午夜卧各一服

十補圓 治真氣虛損下焦傷竭臍腹強急腰脚疼痛亡血盜汗遺泄白濁大便自利小便滑數或三消渴疾飲食倍常肌肉消瘦陽事不舉顏色枯槁久服補五藏行榮衛益精髓進飲食
附子炮去皮臍　乾薑炮　肉桂去粗皮　巴戟去心　破故紙炒
遠志去心薑汁浸炒　兔絲子酒浸別研　赤石脂煅
厚朴去粗皮薑汁炙　川椒去目及閉口者炒出汗各壹兩
右為末酒糊圓如梧桐子大每服三拾圓至伍拾圓溫酒鹽湯任下

正元散 治下元氣虛臍腹脹滿心脇刺痛泄利嘔吐自汗陽氣漸微手足厥冷及傷寒陰證霍亂轉筋久下冷利少氣羸困一切虛寒並宜服之
紅豆炒　乾薑炮　陳皮去白各壹兩　人參
白朮　甘草炙　茯苓去皮各貳兩　肉桂去粗皮
川烏炮去皮臍各半兩　附子炮去皮　山藥薑汁浸炒　川芎
烏藥去木　乾葛各乙兩　黃芪蜜炙壹兩半
右為細末每服貳錢水壹盞薑三片棗壹箇鹽少許煎柒分食前溫服常服助陽消陰正元氣溫脾胃進飲食

茯兔圓 治心氣不足思慮太過腎經虛損真陽不固溺有餘瀝小便白濁夢寐頻泄
兔絲子伍兩　白茯苓三兩　石蓮子去殼貳兩
右為細末酒煮糊為圓如梧桐子大每服三拾服空心鹽湯下常服鎮益心神補虛養血清小便

太平惠民和劑局方卷之五

太平惠民和劑局方卷六

治積熱

紫雪 療脚氣毒遍內外煩熱不解口中生瘡狂易叫走瘴疫毒癘卒死溫瘧五尸五疰心腹諸疾㽲刺切痛及解諸熱藥毒發邪熱卒黃等并解蠱毒鬼魅野道熱毒又治小兒驚癇百病
石膏　寒水石　磁石　滑石
已上肆味各叁斤搗碎水壹斛煮至肆斗去滓入下項
犀角屑　羚羊角屑　青木香搗碎　沉香搗碎各五兩
玄參洗焙搗碎　升麻各壹斤　甘草剉炒捌兩　丁香壹兩搗碎
已上捌味入前藥汁中再煮取壹斗伍升去滓入下項
朴消精者拾斤　消石四升如闕以朴消精者代之每升重柒兩柒錢半
已上貳味入前藥汁中微火上煎柳木篦攪不住手候有柒升投在木盆中半日欲凝入下項
麝香當門子壹兩貳錢半　朱砂飛研三兩
已上貳味入前藥中攪調令勻寒之貳日
右件藥成霜雪紫色每服壹錢或貳錢用冷水調下大人小兒臨時以意加減食後服

紅雪通中散 治煩熱黃疸脚氣溫瘴解酒毒消宿食開三焦利五藏爽精神除毒熱破積滯去胸膈治眼昏頭痛鼻塞口瘡重舌腸癰喉閉及傷寒狂躁胃爛發斑並宜服之
赤芍藥　人參去芦　檳榔　枳殼去瓤麸炒黃
淡竹葉　甘草生用　木香各貳兩　羚羊角屑
升麻　黃芩各三兩　梔子去皮　葛根
桑白皮　木通　大青去根　藍葉各乙兩半
川朴消拾斤　蘇枋陸兩　朱砂乙兩細研　麝香半兩細研
右藥除朱砂麝香外並細剉以水貳斗伍升煎至玖升去滓

更以綿濾過再以緩火煎令微沸然後下朴消以柳木篦攪
勿住手候凝攻下朱砂麝香等末攪令勻頓新瓷盆中經宿
即成矣細研每服壹錢至二錢新汲水調下更量老小虛實
臨時加減服凡服靈寶丹者先依上件服法調此藥服訖須
臾更以熱茶投令宣瀉壹兩行爲度後依法服靈寶丹立効

涼膈散 治大人小兒腑臟積熱煩躁多渴面熱頭昏睡焦咽燥
舌腫喉閉目赤鼻衄頷頰結硬口舌生瘡痰實不利涕唾稠粘
睡卧不寧譫語狂妄腸胃燥澀便溺秘結一切風壅並宜服之
川大黄　朴消　甘草爁各二拾兩　山梔子仁
薄荷葉去梗　黄芩各拾兩　連翹二斤半
右麁末每貳錢水壹盞入竹葉柒片蜜少許煎至柒分去滓
食後溫服小兒可服半錢更隨歲數加減服之得利下住服

洗心散 治風壅壯熱頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼熱氣上衝
口苦脣焦咽喉腫痛痰涎壅滯涕唾稠粘心神煩躁眼澀睛疼
又寒壅不調鼻塞聲重咽乾多渴五心煩熱小便赤澀大便秘
滯並宜服之
白朮壹兩半　麻黃和節　當歸去苗洗　荊芥穗
芍藥　甘草炒　大黃麪裹煨去麪切焙各陸兩
右爲細末每服貳錢水壹盞入生薑薄荷各少許同煎至柒
分溫服如小兒麩豆瘡疹欲發先狂語多渴及驚風積熱可
服壹錢並臨卧服如大人五藏壅實欲要溏轉加至肆伍錢
乘熱服之

八正散 治大人小兒心經邪熱一切蘊毒咽乾口燥大渴引飲
心忪面熱煩躁不寧目赤睛疼脣焦鼻衄口舌生瘡咽喉腫痛
又治小便赤澀或癃閉不通及熱淋血淋並宜服之
車前子　瞿麥　萹蓄亦名地萹竹　滑石
山梔子仁　甘草炙　木通　大黃麪裹煨去麪切焙各壹斤
右爲散每服貳錢水壹盞入燈心煎至柒分去滓溫服食後
臨卧小兒量力少少與之

龍腦飲子 治大人小兒蘊積邪熱咽喉腫痛赤眼口瘡心煩鼻
衄咽乾多渴睡卧不寧及除痰熱欬嗽中暑煩躁一切風壅並
宜服之
縮砂仁　栝蔞根各三兩　藿香葉二兩四錢　石膏四兩
甘草蜜炒十六兩　大梔子仁微炒拾二兩
右爲末每服壹錢至貳錢用新水入蜜調下又治傷寒餘毒
潮熱虛汗用藥貳錢水壹盞入竹葉伍片煎至柒分溫服
並食後服

妙香圓 治丈夫婦人時疾傷寒解五毒治潮熱積熱及小兒驚
癇百病等疾並皆治之
巴豆三伯一拾五粒去皮心膜炒熟研如面油　牛黃研　龍腦研
膩粉研　麝香研各三兩　辰砂飛研九兩　金箔九拾箔研
右合研勻煉黃蠟陸兩入白沙蜜叁分同煉令勻爲圓每兩
作叁拾圓如治潮熱積熱傷寒結胸發黃狂走躁熱口乾面
赤大小便不通煎大黃炙甘草湯下壹圓毒利下血煎黃連
湯調膩粉少許如中酒毒食毒茶毒氣毒風痰伏痞吐逆等
並用膩粉龍腦米飲下中毒吐血悶亂煩躁欲死者用生人
血下立愈小兒百病驚癇急慢驚風涎潮搐搦用龍腦膩粉
蜜湯下菉豆大貳圓諸積食積熱頰赤煩躁睡卧不寧驚哭
瀉利並用金銀薄荷湯下更量歲數加減如大人及婦人因
病傷寒時疾陰陽氣交結伏毒氣胃中喘躁眼赤潮發不定
再經日數七八日已下至半月日未安醫所不明證候脈息
交亂者可服壹圓或分作叁圓亦可並用龍腦膩粉米飲調
半盞已來下此壹服取轉下一切惡毒涎并藥圓瀉下如要
即收水洗淨以油單子裹埋入地中伍日取出可再與大人
小兒依法服壹圓救叁人即不堪使如要藥速行即用針刺
壹眼子於冷水浸少時服之即効更速

龍腦雞蘇圓 除煩解勞消穀下氣散胸中鬱熱主肺熱咳嗽治鼻衄吐血血崩下血血淋熱淋勞淋氣淋止消渴除驚悸涼上膈解酒毒又治胃熱口臭肺熱喉腥脾疸口甜膽疸口苦常服聰耳明目開心益智

柴胡 要真銀州者貳兩剉同木通以沸湯大半升浸一二宿絞汁後入膏　木通 貳兩剉同柴胡浸

阿膠 炒微燥　蒲黃 真者微炒　人參 各貳兩　麥門冬 湯洗去心焙乾肆兩

黃芪 去蘆壹兩　雞蘇 淨葉壹斤即龍腦薄荷也　甘草 炙壹兩半

生乾地黃末 陸兩後入膏

右除別研藥後入外並搗羅為細末將好蜜貳斤先煉壹貳沸然後下生乾地黃末不住手攪時時入絞下者木通柴胡汁慢慢熬成膏勿令焦然後將其餘藥末同和為圓如豌豆大每服貳拾圓嚼破熱水下不嚼亦得虛勞煩熱消渴驚悸煎人參湯下咳嗽唾血鼻衄吐血將麥門冬湯浸去心煎湯下並食後臨臥服之惟血崩下血諸淋疾皆空心食前服治淋用車前子湯下

牛黃涼膈圓 治風壅痰實蘊積不散頭痛面赤心煩潮躁及涎壅塞咽膈不利精神恍惚睡臥不安口乾多渴唇焦咽痛頷頰赤腫口舌生瘡

牛黃 研壹兩壹分　南星 牛膽製　甘草 爁拾兩　紫石英 研飛

麝香 研　龍腦 各研伍兩　牙硝 枯過　寒水石 粉

石膏 細研各貳拾兩

右為末煉蜜為圓每兩作叁拾圓每服壹圓溫薄荷人參湯嚼下食後服小兒常服半圓治急驚壹圓並用薄荷水化下

[illegible]圓 治風壅痰實頭目昏眩胸膈煩悶心神不寧恍惚驚悸痰涎壅塞及治中暑煩渴陽毒狂躁

雄黃 研飛　白石英 研飛　生犀角　麝香 研

朱砂 研飛各壹兩　藿香　天南星 牛膽製　牛黃 研

阿膠 炒　金箔　銀箔

右件為細末入研者藥令勻用溫湯攪和為圓如雞頭實大每服壹圓用新汲水化破入鹽少許服食後

甘露圓 治大人小兒風壅痰熱心膈煩躁夜臥不安譫語狂妄目赤鼻衄口燥咽乾中暑解熱毒

鉛白霜　龍腦 各叁分　牙硝 枯過　甘草 炙

寒水石 粉

右為細末用糯米糊圓如彈子大每服用生薑蜜水磨下半圓新汲水亦得小兒壹圓分伍服食後

甘露飲 治丈夫婦人小兒胃中客熱牙宣口氣齒齦腫爛時出膿血目瞼垂重常欲合閉或即飢煩不欲飲食及赤目腫痛不任涼藥口舌生瘡咽喉腫痛瘡疹已發未發皆可服之又療脾胃受濕瘀熱在裏或醉飽房勞濕熱相搏致生疸病身面皆黃肢體微腫胸滿氣短大便不調小便黃澀或時身熱並皆治之

枇杷葉 刷去毛　乾熟地黃 去土　天門冬 去心焙　枳殼 去瓤麩炒

山茵陳 去梗　生乾地黃　麥門冬 去心焙　石斛 去蘆

甘草 炙　黃芩

右等分為末每服貳錢水壹盞煎至柒分去滓溫服食後臨臥小兒壹服分兩服仍量歲數加減與之

[illegible]圓 治證并方見傷寒中暑類

五淋散 治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不宣出少起多臍腹急痛蓄作有時勞倦即發或尿如豆汁或如砂石或冷淋如膏或熱淋便血並皆治之

赤茯苓 陸兩　當歸 去蘆　甘草 生用各伍兩　赤芍藥 去蘆剉

山梔子仁 各貳拾兩　又方見後

右為細末每服貳錢水壹盞煎至捌分空心食前服

消毒麻仁圓 治諸般風氣上壅久積熱毒痰涎結實胸膈不利頭旋目運或因酒麪炙煿毒食所傷停留心肺浸漬腸胃蘊蓄不散久則內攝血脈消渴外則發瘡瘍赤斑遊腫

身熱悶而上壅赤口乾舌裂咽喉滿痛胸中引飲或傷寒將發口鼻出血煩燥者及風毒下疰痔腫疼痛腦氣衝心悶亂一切風熱壅氣並皆主之

杏仁（去皮尖炒） 大黃（各肆兩） 山梔子仁（拾兩）

右叁味煉蜜為圓每服叁拾圓至伍拾圓夜卧溫湯吞下利下赤毒膠涎為効服時隨意加減此藥甚穩善不損臟腑常服搜風順氣解毒治小兒驚熱以蜜湯化下叁伍圓極効

導赤散 治大人小兒心經內虛邪熱相乘煩躁悶亂傳流下經小便赤澀淋澀臍下滿痛

生乾地黃 木通 甘草（各等分）

右㕮咀每服叁錢水壹盞竹葉少許同煎至陸分去滓溫服不拘時服

三黃圓 治丈夫婦人三焦積熱上焦有熱攻衝眼目赤腫頭項腫痛口舌生瘡中焦有熱心膈煩燥不美飲食下焦有熱小便赤澀大便秘結五藏俱熱即生癰癤瘡痍及治五般痔疾糞門腫痛或下鮮血

黃連（去鬚） 黃芩（去蘆） 大黃（各拾兩）

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服叁拾圓用熱水吞下如藏腑壅實加服圓數小兒積熱亦宜服之

消毒犀角飲 治大人小兒內蘊邪熱咽膈不利痰涎壅嗽眼赤臉腫腮項結核癰腫毒聚遍身風疹痦瘟赤瘰及瘡癤已出未出不能快透並皆治療小兒瘡疹欲出及已出熱未解急進此藥三四服快透消毒應手神效

防風（去叉 捌兩） 荊芥穗（肆斤） 甘草（炙 各貳兩） 鼠粘子（炒 壹斤）

右為麤末每服叁錢水壹盞煎至柒分去滓食後溫服

碧雪 治一切積熱咽喉腫痛口舌生瘡心中煩躁熱物妨悶或喉閉壅塞水漿不下天行時疫發狂昏憒並皆治之

芒消 青黛 石膏（研 水飛） 寒水石（研 水飛）

朴消 消石 甘草 馬牙硝（各等分）

右將甘草煎湯兩升去滓却入諸藥再煎用柳木篦不住手攪令消熔得所却入青黛和勻傾入砂盆內候冷結凝成霜研為細末每用少許含化嚥津不拘時候如喉閉壅塞不能嚥物者即用小竹筒吹藥入喉中頻用神効

吹喉散 治三焦壅盛上衝頭目赤熱疼痛口舌生瘡咽喉不利嚥物有礙神思昏悶並皆治之

白殭蠶（炒 半兩） 山豆根 紅內消 黃藥子

甘草（炙） 黃連（各壹兩） 麝香（研） 龍腦（各貳錢）

右為末用糯米煮於飯上蒸候冷入麝香令勻煉蜜圓如雞頭大每服壹圓含化又用津唾於指甲上磨少許點赤眼立効

八正散 治心經積熱臟腑有熱小便不通風熱相搏淋瀝不宣或服補藥過多水道壅澀出少起數臍腹急痛攻注陰間或心肺壅熱面赤心忪口乾煩渴及癰腫發背血脈痞閉服此排膿內消膿毒又治心經邪熱壅內蘊風熱五般淋疾並皆治之

赤芍藥 茯苓（去皮） 滑石（各肆兩） 生乾地黃（焙）

木通（各拾兩） 大黃（煨 五兩） 山梔子仁（拾兩）

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服貳拾圓至叁拾圓食後用溫熱水吞下

五淋散 治證與前五淋散同

木通（去節） 滑石 甘草（炙 各壹兩） 山梔仁（炒 肆兩）

赤芍藥 茯苓（去皮 各半斤） 淡竹葉（肆兩） 山茵陳（貳兩）

右搗羅為末每服叁錢水壹盞煎至捌分空心服

導赤散 治丈夫婦人蘊積邪熱心胃煩悶咽乾口燥睡臥不安或大小腸不利口舌生瘡並皆治之

小草（去心） 黃連（去鬚） 升麻（去蘆） 犀角屑

甘草（炙） 枳殼（去瓤 炒） 黃芩 大青（去根 各半兩）

芒消（壹兩） 麥門冬（去心 五分）

右為細末每服叁錢水壹盞煎至柒分食後溫服

琥珀散 治丈夫婦人五臟積熱毒氣上攻心胸煩悶口乾舌燥精神恍惚心忪悶亂坐卧不寧並宜服之

[illegible]根末 琥珀 真珠粉 寒水石 鉄粉 朱砂研飛 甘草末生 川大黃 牙硝

右等分各搗為末拌勻每服壹錢以竹葉湯溫調下不拘時

龍腦圓 治一切風熱臟腑積熱毒氣上攻胸膈煩燥口舌乾澁心神躁悶咽嗌不利飲食無味並皆治之

烏梅去核 寒水石火煨 [illegible]根 石膏研 葛根 赤茯苓 麥門冬去心 龍腦

右搗羅為末入研藥令勻煉蜜圓如彈子大每服壹圓綿裹含化嚥津

治瀉痢 附 秘澁

鍾乳健脾圓 治男子婦人虛損羸瘦身體沉重脾胃冷弱飲食不消腹脹雷鳴泄瀉不止又治腸虛積冷下痢清穀或下純白腹中疞痛及久利赤白腸滑不禁少氣困不思飲食並宜服

肉桂去麤皮 人參 黃連去鬚 乾薑炮 龍骨 當歸去蘆 石斛去根 大麥蘗炒 茯苓去皮 細辛去苗土 神麴碎炒 赤石脂各貳兩煅 蜀椒去目及閉口者微炒出汗 附子炮去皮臍 鍾乳粉叁兩

右為細末入鍾乳粉勻煉蜜和圓如梧桐子大每服叁拾圓溫米飲下食前日叁服

[illegible]圓 治腸胃虛弱內受風冷或飲食生冷內傷脾胃泄瀉暴下日夜無度腸鳴腹痛手足厥寒

硫黃 朱砂 白礬

右合研勻用水浸蒸餅為圓如梧桐子大以朱砂為衣每服叁拾圓溫米飲下不計時候

[illegible]圓 治一切下痢無問新久及冷熱膿血腸滑裏急日夜無度臍腹絞痛不可忍者

阿膠 當歸 黃連去鬚 乾薑炮

右為細末以阿膠膏和丼手圓如梧桐子大每服叁拾圓食前溫米飲下日叁服凡小兒服圓如麻子大更量歲數加減

訶黎勒圓 治腸胃虛弱內受風冷水穀不化泄瀉注下腹痛腸鳴胸滿短氣又治腸胃積寒久利純白或有青黑日夜無度及脾胃傷冷暴瀉不止手足逆冷脉微欲絕並宜服之

訶黎勒皮 川烏頭炮去皮臍 縮砂仁 白礬煅 肉豆蔻去皮 木香 乾薑炮 龍骨 赤石脂各拾兩

右為末用粟米飯為圓如梧桐子大每服貳拾圓至叁拾圓溫粟米飲下食前服甚者可倍加圓數

大溫脾圓 治脾胃虛弱冷氣攻衝飲食不化心腹脹痛嘔吐吞酸痞噎不通腸鳴泄利水穀不分面黃肌瘦食減嗜臥並皆治之常服溫脾益胃消穀進食久虛損冷食少多傷尤宜常服

吳茱萸 大麥蘗炒 肉桂去麤皮 甘草炙 桔梗 人參 乾薑炮 附子炮去皮臍 細辛去苗 神麴 枳實

右為細末煉蜜和為圓如梧桐子大每服貳拾圓溫酒下米飲亦得日叁服空心食前

黃連阿膠圓 治腸胃氣虛冷熱不調下痢赤白狀如魚腦裏急後重臍腹疼痛口燥煩渴小便不利

阿膠炒 黃連去鬚 茯苓去皮

右黃連茯苓同為細末水調阿膠末搜和圓如梧桐子大每服貳拾圓溫米飲下食前服

[illegible]圓 治腸胃虛滑下利無度赤白相雜臍腹疞痛[illegible]

卷重減食羸瘦或經久未差並宜服之

胡粉　烏賊魚骨(以黑焦黃者)　阿膠(炒)

白礬(枯)　龍骨(各拾兩)　密陀僧(煅各拾兩)

右為末以粟米飯為圓如梧桐子大每服貳拾圓至叁拾圓溫粟米飲空心下

桃花圓 治腸胃虛弱冷氣乘之臍腹攪痛下痢純白或冷熱相搏赤白相雜腸滑不禁日夜無度

赤石脂　乾薑(炮各等分)

右為末水麪糊為圓如梧桐子大每服叁拾圓溫米飲送下空心食前日叁服

靈砂丹 治臟府怯弱內有積滯臍腹撮痛下痢膿血日夜無度裏急後重腸鳴腹脹米穀不化少氣困倦不思飲食或發寒熱漸至羸瘦

硇石(與砒霜並細研入瓷罐子內用石灰蓋口山灰火燒半日取出去火毒)　信州砒霜

膩粉(研)　粉霜(研各半兩)　黃丹(研)

朱砂(壹兩研飛)　乳香(研)　桂府滑石(各壹分)　枯礬(研各壹兩半)

右件藥研細為末用蒸餅貳兩肆錢和為圓如梧桐子大每服伍圓溫粟米飲下未愈加圓數每服小兒可服壹圓至兩圓量大小臨時增減服之

不二圓 治大人小兒一切瀉痢無問冷熱赤白連綿不差愈而復發腹中疼痛者宜服之

巴豆(去皮心膜出油)　杏仁([illegible])　黃蠟(壹兩叁錢)

砒霜([illegible])　白膠香([illegible])

黃丹(貳兩)　乳香([illegible])　朱砂([illegible])　木鼈子([illegible])

右合研勻鎔蠟和圓如黍米大每錢作壹伯貳拾圓每服壹圓小兒半圓水瀉新汲水下赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢甘草乾薑湯下並放冷臨臥服忌熱物一兩時辰

訶黎勒圓 治脾胃虛弱內挾冷氣心脇臍腹脹滿刺痛嘔吐惡心飲食減少腸鳴泄利水穀不化怠惰少力漸向瘦弱

青皮(去瓤)　訶子皮([illegible])　附子(炮去皮臍)　肉桂(去粗皮)

肉豆蔻仁([illegible])

右為末每服叁錢水壹盞半生薑叁片同煎柒分食前溫服

木香散 治脾胃虛弱內挾風冷泄瀉注下水穀不化臍下㽲痛腹中雷鳴脅肋虛脹及積寒久利腸滑不禁肢體羸困不進飲食

丁香　木香　當歸(去蘆洗焙)　肉豆蔻仁(炮)

甘草(炙)　附子(炮去皮臍)　赤石脂(各拾兩)

藿香葉([illegible])　訶子皮(拾伍兩)

右為末每服壹大錢水壹盞入生薑貳片棗壹箇同煎至柒分溫服空心食前

神功圓 治三焦氣壅心腹痞悶六府風熱大便不通腰腿疼痛肩背重疼頭昏面熱口苦咽乾心胸煩躁睡臥不安及治腳氣并素有風人大便結燥

大麻仁(別搗如膏)　人參(各貳兩)　訶黎勒皮　大黃(錦紋者[illegible])

右為細末入麻仁搗研勻煉蜜為圓如梧桐子大每服貳拾圓溫水下溫酒米飲皆可服食後臨臥如大便不通可倍圓數以利為度

麻仁圓 順三焦和五藏潤腸胃除風氣治冷熱壅結津液耗少令人大便秘難或閉塞不通若年高氣弱及有風人大便秘澀尤宜服之

枳殼(去瓤麩炒)　白檳榔(煨半生)　菟絲子(酒浸別研)　山藥

防風(去叉枝)　山茱萸　車前子　肉桂(去粗皮各壹兩半)

木香　羌活(各壹兩)　郁李仁(去皮別研)　大黃(半蒸半生)

麻仁(各別研肆兩)

右為細末入別研藥勻煉蜜和圓如梧桐子大每服拾伍圓至貳拾圓溫水下臨臥服之

脾約麻仁圓 治腸胃燥澁津液耗少大便堅硬或秘不通臍腹脹滿腰背拘急及有風人大便結燥又治小便利數大便因硬而不渴者謂之脾約此藥主之

厚朴去粗皮薑汁炙 芍藥 枳實麩炒

杏仁去皮尖麩炒 麻仁別研 各伍兩 大黃蒸焙 壹斤

右擣篩蜜和圓如梧桐子大每服貳拾圓臨卧溫水下以大便通利為度未利再服

七聖圓 治風氣壅盛痰熱結搏頭目昏重涕唾稠粘心煩面赤咽乾口燥精神不爽夜卧不安肩背拘急胸膈痞悶腹脇脹滿腰腿重疼大便秘結小便赤澁

川芎 肉桂去粗皮 木香生 羌活去蘆

檳榔生 各半兩 郁李仁去皮 大黃各壹兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服拾伍圓至貳拾圓溫熟水下食後臨卧服嵐瘴之地最宜服更量藏府虛實加減

七宣圓 治風氣結聚宿食不消兼砂石皮毛在腹中及積年腰腳疼痛冷如冰石腳氣衝心煩憒悶亂頭旋暗倒肩背重痛心腹脹滿胸膈閉塞風毒腫氣連及頭面大便或秘小便時澁脾胃氣痞不能飲食腳轉筋掣痛攣急心神恍惚眠卧不安等疾

柴胡去苗洗 枳實麩炒 木香 訶黎勒皮各伍兩

桃仁去皮尖麩炒 甘草炙各肆兩 大黃濕紙裹煨 拾伍兩

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服貳拾圓米飲下食後臨卧服稍增至肆伍拾圓取宣利為度覺病勢退服五補圓不問男女老少並可服餌量虛實加減

[illegible] 治脾胃虛弱內受寒氣泄瀉注下水穀不分腹脇脹滿臍腹㽲痛心下氣逆腹中虛鳴嘔吐惡心胸膈痞悶困乏少力不思飲食

茴香去土炒 川烏炮去皮 縮砂取仁 厚朴去粗皮薑汁炙

益智去皮 乾薑炮 甘草炙

右件為麤末每服貳錢水壹盞入大棗壹箇同煎至柒分去滓溫服食前空心服

胃風湯 治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下腹脇虛滿腸鳴㽲痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度並宜服之

白朮 芎藭 人參去蘆 白芍藥

當歸去苗 肉桂去粗皮 茯苓去皮 各等分

右為麤末每服貳錢以水壹大盞入粟米百餘粒同煎至柒分去滓稍熱服空心小兒量力減之

半硫圓 除積冷暖元藏溫脾胃進飲食治心腹一切痃癖冷氣及年高風秘冷秘或泄瀉等並皆治之

半夏湯浸洗焙乾為細末 硫黃明淨好者研令極細

右等分以生薑自然汁同熬入乾蒸餅末攪和勻入臼內杵數百下圓如梧桐子大每服空心溫酒或生薑湯下拾伍圓至貳拾圓婦人醋湯下

赤石脂散 治腸胃虛弱水穀不化泄瀉注下腹中雷鳴及冷熱不調下痢赤白腸滑腹痛遍數頻多脇肋虛滿胸膈痞悶肢體困倦飲食減少

赤石脂煅 甘草炙各伍兩 縮砂仁 肉豆蔻仁麫裹煨

右為末每服貳錢溫粟米飲調下食前空心服

純陽真人養藏湯 治大人小兒腸胃虛弱冷熱不調藏府受寒下痢赤白或便膿血有如魚腦裏急後重臍腹㽲痛日夜無度胸膈痞悶脇肋脹痛全不思食及治脫肛墜下酒毒便血諸藥不效者並皆治之

人參 當歸去苗 白朮焙

肉桂去粗皮 甘草炙 白芍藥 木香不見火

訶子去核 罌粟殼去蒂萼蜜炙 肉豆蔻麫裹煨

右件剉為麤末每服貳大錢水壹盞半煎至捌分去滓食前溫服

血痢老人孕婦小兒泉瀉悉宜服之立愈忌酒麪生冷魚腥
油膩如藏府滑泄夜起久不瘥者可加炮了附子叁肆片煎
服此藥的有神効不可具述

[illegible]圓 治證并方見一切氣類 [illegible]圓 治證并方見傷寒類

[illegible]湯 治久患痢疾或赤或白臍腹疞痛裏急後重發歇無時日夕無度及下血不已全不入食並皆主之

厚朴 去麤皮姜汁炙 拾兩　罌粟殼 蜜炙　白茯苓 去皮
甘草 炙 各伍兩　人參 去蘆　乾薑 炮 各貳兩半

右㕮咀每服叁錢水壹盞半生薑叁片大棗叁枚烏梅壹箇煎至壹盞去滓空心食前溫口服如年老及七八十歲每服貳大錢小兒每服壹錢半依前法煎更量兒歲加減

[illegible]圓 治腸胃氣虛冷熱不調泄瀉不止或下鮮血或如豆汁或如豚肝或膿血相雜赤多白少腹痛後重遍數頻併全不入食並宜服之 又方見後

石榴皮　黃連 去鬚　甘草 炒　罌粟殼 [illegible]

右為細末每服貳大錢水壹盞半生薑叁片煎至壹盞通口服不拘時候

[illegible] 治丈夫婦人室女小兒一切下痢無問新久冷熱不調日夜無度臍腹絞痛肢體困倦小便閉澀不思飲食漸加羸瘦又治傷生冷脾胃怯弱飲食不消腹脹雷鳴泄瀉不止連月不瘥並宜服之

陳皮 去白　車前子 炒　乾薑 炮
罌粟殼 去蒂 蜜炙 各半斤　甘草 炒

右為末每服貳大錢水壹盞棗[illegible]生薑貳片煎至柒分空心食前稍熱服或飯飲調下亦得 忌生冷油膩魚腥鮓醬毒物

[illegible]圓 治腸胃虛弱內挾生冷腹脹泄瀉暴時刺痛裏急後重下痢赤白或變膿血晝夜頻併經久不瘥

烏梅肉　黃連 去鬚 [illegible]　訶子皮 [illegible]

肉豆蔻 [illegible] 各半兩　當歸 [illegible]

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服叁拾圓至伍拾圓空心食前飯飲下如小兒作小圓煎甘草乾薑湯下

[illegible] 治榮衛氣虛風邪冷氣進襲臟腑之內或食生冷或啖炙煿或飲酒過度積熱腸間致使腸胃滲轉不聚大便鮮血臍腹疼痛裏急後重或肛門脫出或久患酒痢大便頻併並皆療之

敗椶 燒　木饅頭 燒　烏頭 去皮　甘草 各弍兩

右為細末每服弍錢水壹盞煎至柒分空心溫服

[illegible] 治八種毒痢腸痛腹痛膿血赤白或有五色相雜日夜頻併兼治禁口惡痢裏急後重大渴不止酒痢臟毒全不進食

乾薑 半斤　地榆 [illegible]　甘草 [illegible]　乾薑 [illegible]
當歸 [illegible]　黑豆 [illegible]　罌粟殼 [illegible]

右為細末每服弍錢水壹盞煎至七分溫服不拘時候 又方見後

[illegible]圓 治一切赤白膿血相雜裏急後重或臟腑滑泄晝夜無度或積寒久冷臍腹疼痛可思飲食 又方見後

當歸 [illegible]　訶子 [illegible]　木香 [illegible]　青皮 去白
甘草 [illegible]　罌粟殼 [illegible]

右為細末煉蜜圓如彈子大每服壹圓水一盞分煎至陸分空心食前溫服

[illegible]下圓 治臟腑停寒腸胃虛弱腹痛泄瀉全不思食

高良薑 去蘆　赤石脂　乾薑 炮　龍骨 各叁兩半
肉豆蔻 [illegible]　牡蠣 [illegible]　附子 [illegible] 去皮　白礬 枯
訶子 [illegible]　細辛 [illegible]　酸石榴皮 [illegible]

右為末醋煑麪糊圓如梧桐子大每服伍拾圓空心溫米飲下

[illegible]圓 治久患下痢臍腹疞痛所下雜色晝夜不止或其人久虛頻下腸垢謂之惡痢並能治之

赤石脂　敗椶 [illegible]　乾薑 [illegible]　肉豆蔻 [illegible]

附子炮去皮各壹兩 狗頭骨一具火煅存性

右為末醋糊圓如梧桐子大每服伍柒拾圓米飲空心下

水煮木香圓 治證與前水煮木香圓同

陳皮去白 甘草炒 青皮去白 木香各壹兩壹分

白芍藥 當歸去蘆各貳兩 乾薑炮壹兩半 訶子皮去核貳兩半

罌粟殼去蒂蓋蜜炒

右為細末煉蜜圓每壹兩作陸圓每服壹圓水壹盞煎至柒

分和滓空心溫服不拘時亦可

大香連圓 治丈夫婦人腸胃虛弱冷熱不調泄瀉煩渴米穀不

化腹脹腸鳴胸膈痞悶脅肋脹滿或下痢膿血裏急後重夜起

頻併不思飲食或小便不利肢體怠惰漸即瘦弱並宜服之

黃連去蘆須貳拾兩用茱萸拾兩同炒令赤去茱萸不用 木香肆兩捌錢不見火

右件為細末醋糊為圓如梧桐子大每服貳拾圓飯飲吞下

空心食前日進叁貳服

戊己圓 治脾受濕氣泄利不止米穀遲化臍腹刺痛小兒有疳

氣下痢亦能治之

黃連去鬚 吳茱萸去梗炒 白芍藥各伍兩

右為細末麪糊為圓如梧桐子大每服貳拾圓濃煎米飲下

空心日叁服

御米散子 治丈夫婦人遠年日近赤白休息等痢 又方見後

當歸去蘆 乾薑炮各貳兩 黃栢皮去粗皮 甘草炒

枳殼去瓤 御米即罌粟子炒各兩 罌粟殼去蒂蓋

右剉為麤散每服叁錢水壹盞半薤白貳條擘碎同煎至捌

分去滓食前稍溫服老人小兒加減服食忌生冷油膩之物

肉豆蔻圓 治丈夫婦人腸胃虛弱內受風冷水穀不化泄瀉注下

腹痛腸鳴手足逆冷服諸藥不效者此藥主之

肉豆蔻炮 白茯苓去皮 附子炮去皮臍各肆兩 木香不見火

乾薑炮 肉桂去粗皮各貳兩 丁香不見火

右為細末薑汁麪糊為圓如梧桐子大每服伍拾圓至壹百

圓用生薑湯吞下粥飲亦得空心食前進

溫中圓 治脾藏傷冷宿食不消霍亂吐瀉心腹膨脹攻刺疼痛

良薑去蘆 乾薑炮 青皮去白 陳皮去白各伍兩

右為細末用醋打麪糊為圓如梧桐子大每服叁拾圓米飲

吞下不拘時候又療丈夫小腸疝氣攻疼痛炒茴香少許細

嚼用鹽湯鹽酒任下日進貳服

肉豆蔻散 治脾胃氣虛腹脇脹痛水穀不消藏府滑泄腹內虛

鳴困倦少力口苦舌乾不思飲食日漸瘦弱並宜服之

蒼木米泔浸捌兩 茴香炒

川烏炮去皮 訶子皮各肆兩 乾薑炮 肉桂去粗皮

陳皮去白 肉豆蔻 甘草各 厚朴去粗皮薑汁炙

右為末每服貳錢水壹盞生薑貳片棗子壹枚煎柒分溫服

神應黑玉丹 治丈夫婦人久新腸風痔瘻著床頭痛不可忍者

服此藥不過三四次便見功效初得此疾發癢或疼穀道周回

多生硬核此是痔如破是瘻只下血是腸風皆因酒色氣風食五

事過度即成此疾人多以外醫塗治病在腸自有蟲若不去根

本其病不除此藥的有功效

刺猬皮剉 猪懸蹄貳百隻 牛角䚡剉 槐角

雷丸 脳麝各 亂髮皂角水洗淨焙

敗棕各剉 苦楝根伍兩

右剉碎用藥罐內燒存性候冷為細末入乳香貳兩麝香別研

研令和勻用酒打麪糊為圓如梧桐子大每服先細嚼

胡桃壹枚以溫酒吞下空心晚食前日貳服如病甚日叁服

切忌別藥不過三兩日永除根本

胃風湯 治腸胃氣虛冷熱不調或飲食生冷內傷脾胃或飲酒

過度臍腹疞痛泄瀉腸鳴下痢或赤或白裏急後重日夜頻併

飲食減少及腸胃受濕脹滿虛鳴下如豆汁或下鮮血並治之

艾葉去梗 黑豆炒去皮 陳皮去白 乾薑炮
甘草各炙各壹兩 罌粟殼去蒂蓋蜜炒四兩
右件剉為麄散每服叁錢水壹盞半煎至壹盞去滓溫服食
前忌生冷油膩毒物小兒量歲數加減與之

固腸散治脾胃虛弱內受寒氣泄瀉注下水穀不分冷熱不調
下痢膿血赤少白多或如魚腦腸滑腹痛遍數頻併心腹脹滿
食減少力並宜服之
陳米炒貳拾兩 木香不見火壹兩 肉豆蔻生用 罌粟殼去蒂蓋蜜炙各壹兩
乾薑炮 甘草炙各壹兩半
右件為細末每服貳錢酒壹盞生薑貳片棗壹枚同煎至柒
分溫服不計時候如不飲酒水煎亦得忌酒麵魚腥等物

麴朮圓治時暴瀉壯脾溫胃進美飲食及療飲食所傷胃膈
痞悶
神麴炒 蒼朮米泔浸壹宿焙乾各等分為末
右末麪糊為圓如梧桐子大每服叁拾圓不拘時米飲吞下

靈砂丹治大人小兒一切瀉痢無問冷熱赤白連綿不差愈而
復發腹中疼痛者宜服之
硇砂 乳香各壹錢 杏仁去皮尖 巴豆去皮心膜出油各
黃蠟 朱砂各壹兩 木鼈半兩 白膠香壹錢
黃丹壹兩半 砒霜
右件研為細末鎔蠟搜和為圓如麻子仁大每服壹圓小兒
半圓水瀉新汲水下赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢
甘草乾薑湯下並吃冷粥卧服孕婦莫服忌熱物一二時辰

縛虎圓治休息痢經一二年不瘥羸瘦衰弱兼治脾疼腰痛
砒成塊好者 黃蠟各半兩
右將黃蠟鎔開下砒以柳條攪逐旋攪頭焦即換候用盡
取丸旋圓如梧桐子大每服壹圓冷水下脾疼亦然腰痛
冷酒下並食前小兒圓如黍米大每服壹圓湯使同上

遇仙立效散治諸般惡痢或赤或白或濃淡相雜裏急後重臍
腹絞痛或下五色或如魚腦日夜無度或禁口不食不問大人
小兒虛弱老人產婦並宜服之
御米殼去蒂蓋蜜炙 川當歸洗 甘草各貳兩
赤芍藥 酸榴皮 地榆各半兩
右為麄散每服叁錢水壹盞半煎至柒分空心溫服小兒量
歲數加減以瘥為度忌生冷油膩腥臊等物

三神圓治清濁不分泄瀉注下或赤或白臍腹㽲痛裏急後重
並宜服之
草烏叁枚各去皮尖壹生壹炮壹燒作灰
右為細末醋糊圓如蘿蔔子大大人伍柒圓小兒叁圓水瀉
倒流水下赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下

地榆散治大人小兒脾胃氣虛冷熱不調下痢膿血赤多白少
或因腸胃乘虛為熱毒所滲下痢純血臍腹㽲痛裏急後重口
燥煩渴小便不利純下鮮血或先經下痢不瘥服熱藥而得服
熱藥蘊毒不散積於腸間滲而成血者並宜服之
地榆炒 乾葛各壹兩生片 茯苓去皮 赤芍藥各陸兩
乾薑炮 當歸去苗叁兩 甘草炙壹兩 罌粟殼去蒂蓋蜜炙貳兩
右搗羅為細末每服貳錢用溫熱水調下不拘時候小兒叁
歲可服半錢更量歲數加減與之若下痢純白或下紫黑血
腸滑不禁者不可服之

[illegible]散治八種毒痢臟府撮痛膿血赤白或下瘀血或成
片子或有五色相雜日夜頻併兼治禁口惡痢裏急後重久渴
不止全不進食他藥不能治者立見神效
黑豆炒去皮貳兩 乾薑炮肆兩 罌粟殼蜜炒半斤
地榆炒 甘草炙各叁兩 白芍藥叁兩
右為細末每服貳錢水壹盞薑叁片同煎至柒分溫服

肉豆蔻散治脾胃虛弱宿寒停積或飲食生冷內傷脾胃泄

瀉注下水穀不化臍痛短氣嘔逆惡心脇腹疞痛腸脇脹痛腹
內虛鳴飲食減少及積寒久痢純白或白多赤少日夜無度或
脾胃虛寒泄瀉日久愈而復發者並宜服之

京三稜炮　木香不見火　厚朴去粗皮薑汁製　芍藥
肉豆蔻炮　人參　乾薑炮　茯苓白者去皮各伍兩
吳茱萸湯洗七次焙　甘草炙　丁香各貳兩　蒼朮去皮米泔浸

右為細末每服叁錢水壹盞生薑叁片棗壹枚擘破同煎至
捌分空心食前溫服如不及煎入鹽少許湯點服亦得

[胃風湯]治脾胃虛弱內受風寒或飲食生冷傷於脾胃嘔吐泄
瀉腹脇疞痛腸脇脹滿腸內虛鳴及腸胃受濕臟血相雜下如
豆汁或下瘀血裏急後重日夜無度飲食減少漸至瘦弱並能
治之

陳皮去白　甘草半生半炙　罌粟殼去蒂蓋半生半蜜炙各等分

右為麄末每服肆錢先用沸湯泡盞熱又於盞內盛貳錢至
盞在內却抄藥末在盞內用沸湯泡至柒分盞上用盞蓋之
良久紗帛濾去滓空心食前溫服

[止瀉圓]治藏府虛寒脾胃受濕泄瀉無度腸鳴腹痛不進
飲食漸致羸瘦並宜服之

半夏湯洗七次去滑　蒼朮米泔浸去皮各半斤
川烏炮去皮臍　肉荳蔻　木香各貳兩

右為細末薑汁糊為圓如梧桐子大每服伍拾圓空心食前
飲吞下

[養臟湯]治大人小兒藏氣虛怯冷熱不調積在藏府作成
痢疾或下鮮血或如豆汁或如魚腦或下瘀血或下紫黑血或
赤白相雜或成五色裏急後重日夜頻併臍腹絞痛甚不可忍
及噤口惡痢諸痢無問新舊並能治之

白扁豆炒　人參　木香各貳兩　茯苓去皮
肉豆蔻去殼各四兩　陳皮去白　罌粟殼去蒂蓋各肆兩

右為細末每服叁大錢用溫米飲調下不拘時候立見神效

[□□散]治年高老人大便秘澀

綿黃芪　陳皮去白各半兩

右為細末每服叁錢用大麻仁壹合爛研以水投取漿壹盞
濾去滓於銀石器內煎候有乳起即入白蜜壹大匙再煎令
沸調藥末空心食前服秘甚者不過兩服愈常服即無秘澀
之　此藥不冷不燥其效如神

[□□散]治證同前

草果去皮　石菖蒲去毛　白茯苓　麻黃去根節
厚朴去粗皮薑汁炙　枳殼麩炒　藿香
獨活
白朮　細辛洗去葉　吳茱萸去梗　甘草炙
木豬苓去皮　蒼朮去皮　良薑去蘆　赤芍藥
附子炮去皮臍　藁本去蘆　柴胡去蘆　澤瀉
防風去蘆　半夏各等分

右剉為麄散每服叁錢水壹盞半薑白貳條葉同煎至捌
分去滓食前稍溫服老人小兒加減服食忌生冷油膩之物

太平惠民和劑局方卷之六

太平惠民和劑局方卷之七

治眼目疾

[illegible]圓 治肝經不足，風邪內乘上攻，眼暗淚出，怕日羞明，隱澀痒痛，瞻視茫茫，多見黑花，或生翳膜，並皆治之

草決明子 蕤仁去皮 羌活去蘆 人參各一兩
細辛去苗 牡蠣先火煅 黃連去鬚 杜蒺藜炒去尖角
防風去蘆 肉桂去麤皮 甘菊花[illegible] 白茯苓去皮[illegible]
斑鳩用一隻[illegible] 羚羊[illegible]
蔓菁子[illegible]

右拾伍味為末，煉蜜和搜伍百下，圓如梧桐子大。每服拾伍圓至貳拾圓，以溫水或溫酒下，空心、日午、臨臥，日叁服。如久患內外障眼，服諸藥未効者，漸加服伍拾圓，必効。暴赤眼疼痛，食後用荊芥湯下貳拾圓。

[illegible]圓 治肝腎俱虛，眼常昏暗，多見黑花，或生障翳，視物不明，迎風有淚，久服補肝腎，增目力。

車前子 熟乾地黃[illegible]各三兩 菟絲子[illegible]

右為末，煉蜜為圓，如梧桐子大。每服叁拾圓，溫酒下，空心、晚食前，日貳服。

[illegible]散 治風氣攻注，兩眼昏暗，眵淚羞明，瞼生風粟，隱澀難開，或痒或痛，漸生翳膜，視物不明，及久患偏頭疼，牽引兩眼，漸覺細小，昏澀隱痛，并暴赤腫痛，並皆療之

蜜蒙花[illegible] 石決明[illegible] 木賊[illegible]
杜蒺藜炒去尖 羌活去蘆 菊花[illegible]

右為細末，每服一錢，臘茶清調下，食後，日貳服。

[illegible]散 治大人小兒一切風熱毒上攻，眼目暴發赤腫，或生瘡疹，痛隱澀羞明

羚羊角[illegible] 黃芩 升麻 甘草[illegible]
車前子[illegible] 梔子仁 草龍膽[illegible] 決明子[illegible]

右為末，每服壹錢，食後溫熟水調下，日進叁服。小兒可服半錢。

[illegible]散 治大人小兒風毒赤眼，腫痛痒澀，眵淚昏暗羞明

秦皮 滑石[illegible] 黃連[illegible]

右為細末，每用半錢，沸湯泡，去滓，溫熱頻洗。

[illegible]圓 治肝經不足，內受風熱，上攻眼目，昏暗痒痛，隱澀難開，堆眵多淚，怕日羞明，時發腫赤，或生障翳，並宜服之

蔓荊子[illegible] 地膚子 人參 茺蔚子
決明子[illegible] 白茯苓去皮 遠志去心 防風去蘆叉
青葙子 地骨皮去土 柴胡去蘆 山藥
車前子 柏子仁[illegible] 玄參 甘菊
甘草炙各半兩 細辛去苗各壹分

右為末，蜜水煮麵糊圓，如梧桐子大。每服貳拾圓，米飲下，食後，日貳服。

[illegible]圓 治肝腎不足，眼目昏暗，瞻視不明，茫茫漠漠，常見黑花，多有冷淚，久服補不足，強目力。

枸杞子[illegible] 巴戟去心 甘菊花[illegible] 肉蓯蓉[illegible]

右為細末，煉蜜圓，如梧桐子大。每服叁拾圓至伍拾圓，溫酒或鹽湯下，空心食前服。

[illegible]散 治男子婦人風氣攻注，兩眼昏暗，眵淚羞明，瞼生腫痒，或時赤痛，耳鳴頭眩

荊芥穗[illegible] 蒼术[illegible]
防風[illegible] 甘草[illegible] 白蒺藜[illegible]各一兩

右並為細末，不拘時，入鹽少許，沸湯或酒調下壹大錢，神妙。

[illegible]散 治男子婦人風毒上攻，眼目昏暗，翳膜遮障，怕日羞明，多生熱淚，隱澀難開，眶痒赤痛，瞼眥紅爛，瘀肉侵睛，但是一切風毒眼疾，並皆治之

原缺

羌活　防風　柴胡　甘草各一兩

右為末每服貳錢水壹中盞煎至柒分食後臨睡時服薄荷茶調菊花苗湯下亦得忌炙煿醃藏鹽鮓醬濕麪炙煿發風毒等物

[illegible]治上焦受於風熱氣毒攻衝眼目暴赤澀羞明腫痛多眵迎風有淚翳膜攀睛胬肉隱痛並治之　又方見前

川芎不見火　香附各肆兩去毛　龍膽草去蘆　草決明子炒

甘草炙　木賊去節　菊花各壹兩

右為細末每服貳錢用麥門冬熟水入砂糖少許同調食後服或米泔調服亦得食後或臨卧時服之

[illegible]治肝經蘊熱風毒之氣內搏上攻眼目翳膜遮睛赤腫疼痛昏暗視物不明隱澀難開多生眵淚內外障眼

蟬蛻去土　穀精草洗去土　白蒺藜炒　菊花去梗

防風不見火　草決明炒　密蒙花去枝　羌活

黃芩去土　蔓荊子去白皮　山梔子去皮　甘草炒

川芎不見火　木賊草淨洗　荊芥穗各等分

右為末每服貳錢用茶清調服或用荊芥湯入茶少許調服亦得食後及臨卧時服

[illegible]治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗痒痛隱澀難開昏眩赤腫怕日羞明不能遠視迎風有淚多見黑花並皆療之

腦子二分半　蕤仁一兩去皮殼研

右用生蜜陸錢重將腦子蕤仁同搜和每用銅筋子或金銀釵股大小皆將搜少許點之及治連眶赤爛以油紙塗藥貼

[illegible]治肝經不足內受風熱上攻眼目昏暗視物不明常見黑花當風多淚怕日羞明推眵赤脈隱澀難開或生障翳倒睫拳毛眼眩赤爛及婦人血風眼及時行暴赤腫眼眼胞紫黑應作眼病並宜服之

大黃炮　川芎　菊花去梗　牛蒡子炒

細辛一兩　防風去蘆　山梔去皮　白蒺藜炒去刺

原缺

右為末每服參錢食後米泔調服茶清亦得忌食發風毒等物

[illegible]治男子婦人肝藏積熱肝虛目暗膜入水輪漏睛眵淚眼見黑花視物不明混睛冷淚翳膜遮障及腎藏虛憊肝受虛熱及遠年日近暴熱赤眼風毒氣眼並皆治之兼治乾濕腳氣消中消渴及諸風氣等疾由腎氣虛敗者但服此能補肝益腎驅風明目其效不可具述

生乾地黃洗焙　熟乾地黃洗焙各[illegible]　牛膝去蘆酒浸　石斛去苗

枳殼去瓤炒　防風去蘆　杏仁去皮尖麩炒別研

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服叁拾圓空心食前溫酒吞下或用飯飲鹽湯亦得忌一切動風毒等物

[illegible]治遠年日近翳膜遮障攀睛努肉昏暗淚多瞻視不明或風氣攻注瞼生風粟或連眶赤爛怕日羞明隱澀難開並能治之

朱砂別研　乳香別研　硼砂別研　赤芍藥

當歸去蘆洗　雄黃別研　麝香別研　黃連去鬚

右件為細末入研藥拌勻再擂煉蜜搜和為圓如皂莢子大每次用壹圓安淨盞內以沸湯泡開於無風處洗藥冷閉目少時候三兩時再暖令熱依前洗壹貼可洗叁伍次不得犯銅鐵器內洗如暴赤眼腫者不可洗之

[illegible]治眼暴赤腫痛風氣熱上衝睛疼連眶臉皆赤爛瘀肉侵睛時多熱淚及因叫怒逆損肝氣久勞瞻視役損眼力風砂塵土入眼澀痛致成內外障翳及一切眼患並皆治之

蒺藜子炒去刺　草龍膽去蘆　赤芍藥　甘草

羌活　防風去蘆　菊花去梗　茯苓去皮

右搗為末每服貳錢食後臨卧時溫酒調下

[illegible]治肝經不足受客熱風壅上攻眼目赤澀睛疼瞼爛怕日羞明夜卧多淚時行暴赤兩太陽穴疼頭旋昏眩視物不明漸生翳膜並皆治之

比金散 治大人小兒上膈壅毒口舌生瘡咽嗌腫塞疼痛妨悶每用少許掺貼患處嚥津小兒瘡疹毒氣攻口齒先用五福化毒丹掃後仍用此藥掺貼立効

朱砂(細研) □□□□ 生腦子(研)

右為末每日伍次用夜臥掺貼妙

如聖湯 治風熱毒氣上攻咽喉咽痛喉痺腫塞妨悶及肺壅欬嗽咯唾膿血胸滿振寒咽乾不渴時出濁沫氣息腥臭久久吐膿狀如米粥又治傷寒咽痛

苦桔梗(炒)壹兩 甘草(炒)貳兩

右為麁末每服貳錢水壹盞煎至柒分去滓溫服小兒時時呷服食後臨卧

□□圓 治大人小兒風壅膈熱咽喉腫痛舌頰生瘡口乾煩渴

麝香(研)壹兩 鵬砂(研)□兩 甘草(□)□兩 牙硝(研)□兩

梅花腦(研)□分 寒水石(□)□兩

右為末用甘草膏子和搜每兩作肆拾圓每服壹圓含化嚥津常服化痰利膈生津止渴

□□散 治牙齒動搖風蚛疼痛斷肉宣露及血臭氣常用令牙齒堅牢解骨槽毒氣

牛膝(去苗) 木律(□)肆兩 黃茄(細切) 郁李仁(□)拾兩

麝香 皂□子(去□)

已上伍味搗碎入罐子內上用瓦子蓋口留一竅小竅用鹽泥固濟燒令通赤候煙白色即住火取出以新土罨壹伏時取出後入下項藥

升麻 細辛(去苗)

右件為細末每用少許揩患處須臾溫水漱口臨卧更貼少許嚥津亦無妨

玉屑無憂散 治咽喉腫痛舌頰生瘡□□□□□□喉閉或因誤吞硬物諸骨□刺□□□□□□不省人事並皆療之

玄參(去蘆) 荊芥穗 滑石(研) 黃連(去須)

縮砂(去殼) 白茯苓 貫衆(去蘆) 甘草(炙)

山豆根 寒水石 鵬砂

右為細末每服壹錢先掺舌上後以新水嚥下不拘時候

□□□□ 治急喉閉纏喉風飛颺單蛾雙蛾結喉重舌木舌腮頷腫痛□□不能吞水粥者

流黃 小芎 臘茶 薄荷(去梗) 又方見後

川烏 硝石(研) 生地黃

右為細末烈生葱自然汁搜和為鋌每服先用新汲水灌漱吐出次嚼生薄荷伍柒葉微爛用藥壹鋌同嚼極爛以井水嚥下甚者連進叁服即愈重舌腮腫先服壹鋌次以壹鋌安患處其病隨藥便消又治冒暑伏熱不省人事用生薄荷水調研壹鋌灌下即甦如行路常含壹鋌即無伏熱之患口舌生瘡不能合口并食熱物如上法服若用水灌漱嚼薄荷拾葉如泥吐出再水灌漱嚼藥壹鋌含口內聚涎裹之覺痛方吐出如此服叁鋌便能食酒醋過食鹹酸炙煿咳中生泡須掐破吐血方省薄荷數葉以壹鋌同嚼井水吞下砂淋熱淋小便出血同車前草柒葉生嚼小研爛水調去滓嚼藥壹鋌以水送下此藥分陰陽去風熱化血為涎化涎為水常帶隨身備急每鋌可活壹人命小兒只服半鋌

□□□ 治大人小兒卒病喉痺閉塞不通腫痛生瘡語聲不快風壅咽喉□□鼻衄出血

山□□ 腦子 牙硝 麝香

甘草 鵬砂

右為細末每服半錢如茶點服

□□散 治風牙蚛牙攻疰皮痛晝夜不止痛不可忍睡卧不安牙斷宣露動搖欲脫或□□□□出血並能療之

良薑 草烏(去皮) 細辛 荊芥

右件肆味各貳兩碾爲末每用少許於痛處擦之有涎吐出不得吞嚥良久用鹽湯灌漱其痛即止常使揩牙用腐炭末看半相和常用止牙宣口氣并熱牙疾

吹喉散治三焦大熱口舌生瘡咽喉腫塞神思昏悶並能治之

蒲黃一兩　盆硝八兩　青黛一兩半

右件用生薄荷汁壹升將盆硝青黛蒲黃壹處用瓷罐盛慢火熬令乾研細每用壹字或半錢以之掺口內良久出涎吞之不妨或喉中腫痛用筒子入藥半錢許用力吹之無不立効

如聖勝金鋌治證服餌與前如聖勝金鋌同品味小異

朴消四兩　川芎一兩　硫黃一兩研　貫衆二兩

薄荷葉　荊芥穗　嫩茶各半兩

右件爲末製生蔥自然汁搜和爲鋌服餌湯使如前方

五香散治咽喉腫痛諸惡氣結塞不通急宜服之

木香　沉香　雞舌香　薰陸香各一兩

麝香一分別研

右除麝外爲末入麝香研令勻每服貳錢水壹中盞煎至陸分溫服不拘時候

如神散治風牙蚛牙攻疰疼痛日夜不止睡臥不安或牙斷動搖連頰浮腫不拘久近並皆治之

川椒去目及閉口者炒出汗　露蜂房微炙

右搗羅爲細末每用壹錢水壹盞入鹽少許同煎至捌分乘熱漱之冷即吐出當服立効

玉池散治風蛀牙疼腫痒動搖牙齦潰爛宣露出血口氣等疾

當歸去蘆　藁本　地骨皮　防風

白芷　槐花炒　川芎　甘草炙

升麻　細辛去苗

右爲末每用少許揩牙痛甚即取貳錢水壹盞半黑豆半合生薑叁片煎至壹盞稍溫漱冷吐之

荊芥湯治風熱肺壅咽喉腫痛語聲不出或如有物哽

荊芥穗半兩　桔梗二兩　甘草一兩

右爲粗末每服肆錢水壹盞薑三片煎至六分去滓食後溫服

細辛散治風蚛牙疼牙齦宣爛牙齒搖動腮頷浮腫皆能治之

紅椒去目炒　鶴虱　牙皂　蓽撥

縮砂去皮各十兩　荊芥去梗　細辛去苗各一兩　白芷

草烏各二兩

右搗爲細末每用少許於痛處擦之有涎吐出不得吞嚥少時用溫水漱口頻頻擦之立有神効

太平惠民和劑局方卷之七

治雜病

【耆婆萬病圓】療七種癖塊，五種癲病，十種疰忤，七種飛尸，十二種蠱毒，五種黃病，十二時瘧疾，十種水病，八種大風，十二種㾦痹，并風入頭，眼暗漠漠，及上氣欬嗽，喉中如水雞聲，不得臥，飲食不作肌膚，五藏滯氣，積聚不消，壅閉不通，心腹脹滿，連及胸背，鼓脹氣堅結，流入四肢，或腹又心膈氣滿，時定時發，十年二十年不差；五種下痢，疳蟲、蛔蟲、寸白、諸蟲，上下冷熱，久積痰飲，令人多眠睡，消瘦無力，蔭入骨髓，便成滯疾，身體氣腫，飲食嘔逆，腰腳酸疼，四肢沉重，不能久行久立；婦人因產，冷入子藏，藏中不淨，或閉塞不通，胞中瘀血冷滯，出流不盡，時時疼痛為患，或因此斷產；并小兒赤白下痢，及狐臭、耳聾、鼻塞等病。服此藥，以叁圓為一劑，服不過叁劑，萬病悉除，說無窮盡，故以萬病圓名之。○應病未發前服壹圓，未差，如前更服。

芎藭　肉桂去粗皮　芍藥　川椒去目及閉口者，微炒出汗
乾薑炮　防風去蘆　巴豆去心膜，出油　當歸去蘆
生犀角鎊　桔梗　芫花醋炒赤　茯苓去皮
桑白皮炒　人參去蘆　黃芩　黃連去鬚
禹餘糧醋淬　蒲黃微炒　前胡去蘆　大戟剉炒
葶藶炒　麝香研　細辛去苗　雄黃研飛
朱砂研飛　紫菀去蘆　甘遂　牛黃各研，壹兩
蜈蚣拾貳節，去頭足，炙　芫青貳拾捌枚，入糯米同炒，米黃去米
石蜥蜴去頭尾足，炙，肆寸

右為細末，入研藥勻，煉蜜為圓，如小豆大。若一歲以下小兒有疾者，令乳母服兩小豆大，亦以吐利為度。近病及卒病用多服，積久疾病即少服，常服微溏利為度。卒病欲死，服三圓，取吐利即差。卒中惡口噤，服二圓，漿一合下，利即差。五注鬼剌客忤，服貳圓。男女邪病，歌哭，腹大如妊身，服貳圓，日叁夜壹，間食服之。蠱毒吐血，腹痛如刺，服貳圓，不差更服。諸有痰飲者，服叁圓。冷癖，服叁圓，日叁服，皆間食，常令微溏利。宿食不消，服貳圓，取利。癥瘕積聚，服貳圓，日叁服。拘急，心腹脹滿，心痛，服叁圓。上氣嘔逆，胸滿不得臥，服貳圓，不差更服。大痢，服貳圓，日叁服。疳濕，以壹圓如杏仁大，和醋貳合，灌下部中。水病，服叁圓，日再服，間食服之，差止。人弱即隔日服。頭痛惡寒，服貳圓，覆取汗。傷寒天行，服貳圓，日叁，間食服之。小便不通，服貳圓，不差，明日更服。大便不通，服貳圓，又內壹圓下部中，即通。耳聾聤耳，以綿裹如棗核，塞之，差。鼻衄，服貳圓。癰腫丁腫破腫，內壹圓如麻子大，日壹傅之，根亦自出。犯丁腫血出，以豬脂和塗，有孔內孔中，差。癩瘡，以醋泔洗訖，取藥和豬脂傅之。漏瘡有孔，以壹圓內孔中，和豬脂傅上。痔瘡，塗綿箸上，內孔中，日別易，差。瘰癧，以醋和塗上，差。癬瘡，以布揩令汁出，以醋和塗上，日壹易，又服貳圓，差。諸冷瘡積年不差，以醋和塗之。惡刺，以壹圓內瘡孔中，即差。蝮蛇螫，以少許內螫處。若毒入腹，心煩欲絕者，服叁圓。蜂螫，以少許傅之。若婦人諸疾，胞衣不下，服貳圓。小兒驚癇，服壹圓如米許，以塗乳，令嗍之，看兒大小加減。小兒客忤，服壹圓如米，和乳塗乳頭，令嗍之，以意量之。蝎螫，以少許傅之，差。小兒乳不消，心腹脹滿，服壹圓如米許，塗乳頭，令嗍之，即差。

【如神圓】治腎經不足，風冷乘之，腰痛如折，引背膂，俛仰不利，轉側亦難；或因役用過多，勞傷於腎；或因寢臥濕地，氣傷腰；或因墜墮傷損，風寒客搏，皆令腰痛，並宜服之。

威靈仙去土　當歸去蘆　肉桂去粗皮，各等分

右為末，以酒煮麵糊為圓，如梧桐子大。每服拾伍圓，溫酒或煎茴香湯下，食前服。婦人，煎桂心湯下。加至貳拾圓。有孕婦

八不得服瓜食落

[化蟲圓]治因藏府虛弱或多食甘肥致蛔蟲動作心腹攪痛發作腫聚往來上下痛有休止腹中煩熱口吐涎沫即是蛔咬宜服此藥若積年不差服之亦愈又治下部有蟲生瘡疳痛

大黃（[illegible]） 木香（[illegible]） 檳榔 訶梨勒（[illegible]）

附子（[illegible]） 蕪荑（炒研） 鶴蝨（炒） 乾漆（[illegible]）

右為末煉蜜為圓如梧桐子大每服叁拾圓食前橘皮湯下婦人醋湯下

[乳香圓]治諸痔下血肛邊生肉或結核腫疼或生瘡癢痛或大便艱難肛腸脫出又治腸風下血無問新久及諸痔根在臟腑悉能治之

枳殼（[illegible]） 牡蠣（火煅） 蕪荑（[illegible]） 芫青（[illegible]）

大黃（[illegible]） 鵝[illegible]（[illegible]） 白丁香 乳香（[illegible]）

右為末粟米糊為圓如梧桐子大每服拾圓至拾伍圓如治腸風臘茶清下諸痔煎薤白湯下諸瘻煎鐵屑湯下並食前服

[illegible]治纏喉風及急喉痺卒然倒仆失音不語或牙關緊急不省人事

鬱金 雄黃（細研） 巴豆（[illegible]）

右為末醋煮麵糊為圓如菉豆大用熱茶清下七圓吐出頑涎立便蘇省未吐再服如至死者心頭猶熱灌藥不下即以刀尺鐵匙斡開口灌之藥下喉嚨無有不活吐瀉些小無妨又治上膈壅熱痰涎不利咽喉腫痛赤眼癰腫一切毒熱並宜服之如小兒患喉[illegible]赤腫及驚熱痰涎壅塞服二圓或三圓量兒大小加減

[illegible]治一切瘧病發作有時先覺伸欠乃作寒慄鼓振頭頷中外皆寒腰脊俱疼寒戰既已內外皆熱頭痛如破渴欲飲冷或痰聚胸中煩滿欲嘔或先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或熱多寒少或寒熱相半或但熱不寒或但寒不熱或一日一發或隔日一發或一發後六七日再發並能主之

甘草（炙） 菉豆末 訶黎勒（[illegible]） 定粉（研）

龍腦（研） 麝香（各研） 金箔（[illegible]） 信砒（[illegible]）

朱砂（[illegible]）

右為末煉蜜搜和每兩作貳拾圓捏扁以金箔為衣每服壹餅子以新汲水磨化日發者未發前服之間日者不發夜服隔數日發者前壹日夜服連日者凌晨服

[烏梅圓]治藏寒蛔蟲動作上入膈中煩悶嘔吐時發時止得食即嘔常自吐蛔有此證候謂之蛔厥此藥主之又治久痢

烏梅（[illegible]） 黃蘗（炙） 細辛（去苗） 肉桂（去粗皮）

附子（[illegible]） 人參（[illegible]） 蜀椒（[illegible]）

當歸（[illegible]） 乾薑（[illegible]） 黃連（[illegible]）

右異擣篩合治之以醋浸烏梅壹宿去核蒸之伍斗米下飯熟擣成泥和藥令相得內臼中與煉蜜杵貳阡下圓如梧桐子大每服拾伍圓溫米飲下食前服

[illegible]治十種水氣面目四肢遍身俱腫以手按之隨手而起欬嗽喘急不得安臥腹大腫脹口苦舌乾小便赤澁大便不利

澤瀉（[illegible]） 椒目（[illegible]） 豬苓（[illegible]） 黑牽牛（[illegible]）

葶藶（[illegible]）

右為細末每服以葱白叁莖漿水壹盞煎至半盞入酒半盞調藥叁錢絕早面向東服如人行十里久以漿水葱白煮稀粥至葱爛入酒伍合熱啜量人啜多少須啜壹升許不得喫鹽并麵自早至午當利小便叁肆升或大便利喘定腫減未分隔日再服既平之後必須大將息及斷鹽房室等三年

[illegible]治下焦結熱小便黃赤淋閉疼痛或有血出及大小便俱出血者亦宜服之

山梔子（[illegible]） 瞿麥穗（[illegible]） 甘草（[illegible]）

右爲末每服伍錢至柒分水一盞入連根葱白七莖燈心伍拾莖生薑伍柒片同煎至柒分時時溫服不拘時候

必效散 治男子婦人血妄流溢吐血衂血嘔血咯血

熟乾地黄　小薊并根用　人參　蒲黄微炒　當歸去蘆　芎藭　烏梅去核各乙兩

右件藥搗羅爲麄散每服伍錢水一盞半煎至七分去滓溫服不拘時候

胡桃散 治久新諸痔肛邊腫痛或生瘡痒時有膿血又治腸風下血及肛門脫出並宜服之

括樓貳枚燒存性　蝟皮兩箇剉碎炒　雞冠花乙兩微炒　胡桃取仁七箇入罐内燒存性不得過　白礬各微炒　綠礬枯　白附子生用　天南星生用　枳殻去穰麩炒　附子生去皮臍　訶子各半兩去核　半夏貳兩

右爲細末以醋煑麪糊爲圓如梧桐子大每服貳拾圓空心臨卧溫酒下遠年不差者服拾日見效久服永除根本小可腸風等疾一二年内者只拾服差永不發動

滑石散 治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不宣出少起數臍腹急痛蓄作有時勞倦即發或尿如豆汁或便出砂石並皆治之

芍藥　白术　滑石　瞿麥各二兩　石韋去毛　葵子　當歸去蘆　甘草炙各乙兩　木通乙兩　王不留行

右爲細末每服貳錢煎小麥湯調下食前日二三服

牡蠣散 治諸虛不足及新病暴虛津液不固體常自汗夜卧即甚久而不止羸瘠枯瘦心忪驚惕短氣煩倦

黄芪去苗土　麻黄根洗　牡蠣米泔浸刷去土火燒通赤

右三味爲麄散每服三錢水一盞半小麥百餘粒同煎至八分去滓熱服日二服不拘時候

灸膏肓腧 主灸百病

陳久宣箋文 [illegible]

右主灸百病世人着灸多無法度徒忍痛楚罕能愈疾今於聖惠千金外臺等方内摭取點穴分寸作炷大小壯數多少等法如後

定分寸法 [illegible]

點灸穴法 [illegible]

作艾炷法 [illegible]

點火法 [illegible]

下火灸時法 [illegible]

治灸瘡不發法 [illegible]

淋洗灸瘡法 [illegible]

壯數多少法 [illegible]

推人神所在法 [illegible]

[illegible]

[illegible]治瘧疾。凡瘧疾，蓋因外邪客於風府，生冷之物內傷脾胃，或先寒後熱，或先熱後寒，或寒熱獨作，或連日併發，或間日一發。寒則肢體顫掉，熱則舉身如燒，頭疼惡心，煩渴引飲，氣息喘急，口苦咽乾，背膂痠疼，腸鳴腹痛，諸藥不治，漸成勞瘧者，此藥治之。

知母　川常山　草果　甘草炙，各貳斤

良薑貳拾兩　烏梅去核，壹斤

右件為麄末。每服參錢，水壹盞半，薑伍片，棗子壹枚，煎至柒分，去滓溫服。

[illegible]治證并方見傷寒類

[illegible]治證并方見痼冷類

槐角圓治五種腸風瀉血。糞前有血名外痔，糞後有血名內痔，大腸不收名脫肛，穀道四面弩肉如奶名舉痔，頭上有孔名瘻瘡，並皆治之。

槐角去枝梗，炒，壹斤　地榆　當歸酒浸一宿，焙　防風去蘆

黃芩　枳殼去瓤，麩炒，各半斤

右為末，酒糊圓如梧桐子大。每服參拾圓，米飲下，不拘時候。此藥治腸風瘡內小蟲，裏急下膿血，止癢痛，消腫聚，驅濕毒，久服永除病源。

[illegible]治一切瘧病，發作有時，蓋因外邪客於臟腑，生冷之物內傷脾胃，或先寒後熱，或先熱後寒，或寒多熱少，或熱多寒少，或但熱不寒，或但寒不熱，或連日併發，或間日而發，或發後三五日再發。寒則肢體顫掉，熱則舉身如火，頭痛惡心，煩渴引飲，氣息喘急，口苦咽乾，背膂痠疼，腸鳴腹痛，或痰聚胸中，煩滿欲嘔，並皆治之。

檳榔[illegible]　常山[illegible]

右為末，水麵糊為圓，如梧桐子大。每服參拾圓，於發前壹日晚臨臥用冷酒吞下，便睡，不得喫熱物茶湯之類，至四更盡再用冷酒吞下拾伍圓。忌食一切熱羹湯粥食，午間可食溫粥，至晚方可食。忌一切生冷魚腥等物。[一方]用川常山拾陸兩，為末，雞卵清和伍煑為圓，治證服餌一如前法。

[illegible]治證與腸風黑散同

荊芥穗[illegible]　枳殼[illegible]　亂髮燒

槐花[illegible]　槐角[illegible]　甘草炙　蝟皮各壹兩半

右將合燒藥同入瓷瓶內，黃泥固濟，燒存參分性，出火氣，同甘草、枳殼搗羅為末。每服貳錢，水壹盞，煎至柒分，空心溫服。溫酒調下亦得。

[illegible]治證并方見瀉痢類

[illegible]療心腹諸卒暴百病，中惡客忤，心腹脹滿，卒痛如刀所刺，氣急口噤。

乾薑炮，壹兩　巴豆去皮心，研，出油　大黃各壹兩

右件為末，煉蜜為圓如梧桐子大。每服參圓，溫水下，不拘時。

[illegible]治大人小兒五藏積熱，毒氣上攻，胸膈煩悶，咽喉腫痛，赤眼癰腫，頭面發熱，唇口乾燥，兩頰生瘡，精神恍惚，心忪悶亂，坐臥不寧，及傷暑毒，面赤身熱，心躁煩渴，飲食不下。

寒水石研　石膏研　青黛[illegible]

右件細研如粉，入青黛和勻，[illegible]水調為圓如雞頭大。每服壹圓，食後新汲水化下，或細嚼，用生薑水下亦得。如中諸毒，並宜服之。及小兒驚風潮熱，痰涎壅塞，心胸煩躁，頰赤多渴，睡臥不穩，每服半圓，可服半粒，更量歲數加減與之。

[illegible]治元陽虛弱，寒氣攻衝，膀胱小腸發腫作痛，或在心脇，牽連小腹，連屬陰間，致身體增寒，攻擊痛。

檳榔子　川楝子[illegible]　巴豆[illegible]　全蝎[illegible]　當歸[illegible]

右為細末用浸藥酒打麪糊和圓如雞頭實大空心溫酒鹽湯吞下二圓至三圓併進二服

奪命丹 治遠年日近小腸疝氣偏墜搐疼臍下撮痛以致悶亂及外腎腫硬日漸滋長陰間濕痒抓成瘡

吴茱萸 [illegible]

澤瀉 去灰土 二兩

右為細末酒煮麪糊圓如梧桐子大每服伍拾圓空心食前鹽湯或酒吞下

茱萸內消圓 治腎經虛弱膀胱為邪氣所搏結成寒疝陰癩偏大上攻臍腹疼痛膚囊腫脹或生瘡瘍時出黃水腰腿沉重足脛腫滿行步艱辛服之內消不動臟腑

山茱萸 揀去核取肉　桔梗 [illegible]

白蒺藜 炒去刺　川烏 炮去皮　肉桂 去粗皮　茴香 炒 [illegible]

食茱萸　吳茱萸 [illegible]　青皮 去白 [illegible]　海藻 洗焙

五味子 [illegible]　大腹皮 [illegible]　玄胡索 [illegible]　桃仁 [illegible]

枳實 麩炒　陳皮 去白　川楝子 [illegible]　木香 [illegible]

右為末酒糊圓如梧桐子大溫酒下三拾圓食前服

胡蘆巴大戟圓 治陰癩腫脹或小腸氣痛

胡蘆巴 [illegible]　大戟 [illegible]　麝香 [illegible]　茴香 [illegible]

川楝子 [illegible]　檳榔 [illegible]　訶子 [illegible]

附子 [illegible]　木香 [illegible]

右為末獨留川楝子以好酒壹二升葱白柒枚長三四寸煮川楝子軟去核取肉和藥擣杵圓如梧桐子大空心溫酒下伍柒圓至拾圓葱湯亦得澀發痛炒茴香熱酒下拾伍圓

三白散 治膀胱蘊熱風濕相乘陰囊腫脹大小便不利

白牽牛 [illegible]　桑白皮 [illegible]　白朮　木通 去節

陳皮 [illegible]

右件為細末每服 [illegible] 空心服 [illegible] 未覺再進常服 [illegible]

和留器不洩藏氣

[illegible]圓 治大人小兒小腸氣墜腸氣奔豚氣疝氣偏墜陰腫小腹如卵上下痛不可忍或後結遠滑鼓刺噎惡悶亂並治之

葫蘆巴 [illegible]　吴茱萸 [illegible]　川楝子 [illegible]

大巴戟 [illegible]　川烏 [illegible]　茴香 [illegible]

右為細末酒煮麪糊為圓如梧桐子大每服拾伍圓空心溫酒吞下小兒伍圓茴香湯下

治瘡腫傷折

[illegible] 治一切瘡腫傷折等病

蜀椒 [illegible]　白芷　沒藥 研

赤芍藥　肉桂 去麄皮　當歸　臙脂花 研

麒麟竭 研　菖蒲　白及　芎藭

草龍膽　木香　白斂　防風 去芦叉

厚朴 去粗皮 [illegible]　麝香 研　桔梗　柴胡 去芦頭

松脂　人參　蒼朮 [illegible]　黃芩

夜合 用皮　乳香　附子 去皮臍　茯苓 去皮

高良姜 [illegible]　硇砂 研　甘草　雲母 [illegible]

桑白皮　水銀 [illegible]

柏葉 [illegible]　桃枝 [illegible]　陳皮 去白

清油 [illegible]　黃丹 [illegible]　黃芪 [illegible]

右除雲母硝石麒麟竭沒藥麝香乳香黃丹鹽花擱味別研外並剉如豆大用上件清油於瓷器中浸所剉藥柒日以物封閉後用文火煎不住手攪三上火三下火每上候匝匝沸乃下火候沸定再上如此叁次候白芷附子之類黃色為度勿令焦黑以綿或新布絞去滓却入鐺中再上火熬後下黃丹與別研藥擱味以柳篦不住手攪 [illegible] 至青黑色變 [illegible] 上候乃滴少許水中凝 [illegible] 不粘 [illegible]

止焚仍滴少許水中凝結不粘手爲度先炙壹茭時熱即歸藥在內候如人體溫熱彈水銀在上每用膏藥即先刮去水銀治發背先以貼膏壹斤用水三升煎五拾沸如人體溫與清水洗瘡拭乾貼藥壹兩分爲二服溫酒下未成膿者亦差於外貼之妳癰外貼瘰癧骨疽毒穿至骨用藥壹兩分作三服溫酒下甚者即瀉出惡物兼外貼差腸癰以藥半兩分爲伍服甘草湯下未成膿者當時消已有膿者隨藥下膿出後每日酒下五圓如梧桐子大待膿止即住服風眼貼兩太陽穴蠍螫蜘蛛咬外貼留瘡口發腦發鬢發眉發耳膿癤牙癰牙疼並外貼包裹即當時痛止箭頭所傷箭頭在內外貼每日喫少許爛煮豆箭頭自出虎豹所傷先以甘草湯洗然後貼膏每日換不過三次貼狗蛇咬生油下拾圓如梧桐子大仍須貼外難産三日不分免溫酒下壹分便生血運欲死以薑汁和小便半升溫酒下拾圓死者即返死胎在腹以榆白皮湯下半兩便生丈夫本藏氣茴香溫酒下壹分每日壹服不過二服差中毒藥酒洗護溫下壹分每日壹服不過痔瘻瘡出惡物差瘰癧外貼消之一切腫癤外貼立差但有所苦並皆溫之藥到即差已上主療只忌羊血餘無所忌如人收此藥防身以蠟紙裹不令風乾可三拾年不損藥力

小□□圓 治腸癰乳癰發背一切未破膿服之化爲水

巴豆（[illegible]）　大黃（[illegible]）　犀角（三兩）

黃連（去鬚）　梔子（去皮）　乾藍　升麻

黃芩　防風（去蘆）　人參　當歸（去蘆）

黃芪（去苗）　甘草（炙各壹兩）

右爲細末入巴豆勻煉蜜搜和爲圓如梧桐子大每服三圓溫湯下利三兩行喫冷粥止之不利加至四伍圓初服取快利後漸減圓數取微溏泄爲度老小以意加減瘡消及和潤乃止[illegible]黃水[illegible]是消候一切腫毒皆內消神驗不可論忌熱麪蒜豬肉蘆筍魚海藻菘菜生冷黏食

何首烏散 治脾肺風毒攻衝遍身癬疥瘙痒或生癮疹搔之成瘡肩背拘倦肌肉頑痹手足皴裂風氣上攻頭面生瘡及治紫癜白癜頑麻等風

荊芥穗　蔓荊子（去白皮）　蚵蚾草（去土）　威靈仙（淨洗）

何首烏　防風（去蘆叉）　甘草（炙）

右件各伍斤搗羅爲末每服壹錢食後溫酒調下沸湯亦得

樺皮散 治肺藏風毒遍身瘡疥及癮疹瘙癢搔之成瘡又治面上風刺及婦人粉刺

杏仁（[illegible]）　荊芥穗（各貳兩）

枳殼（[illegible]）　樺皮（[illegible]）　甘草（半兩）

右件藥除杏仁外餘藥都搗羅爲末却將杏仁別研令極細次用諸藥末旋旋入研令勻每服二錢食後溫酒調下日進三服瘡疥甚者每日頻服

大□□□丹 治男子婦人外傷內損狗咬蟲傷驢馬墜撲手足傷折一切疼痛腹中瘀血刺脇築心及左癱右緩走疰疼痛癧瘡痔漏婦人冷氣入腹血脉不通産後敗血灌注四肢吹妳腫痛血氣撮痛並宜服之

亂髮（[illegible]）　皂角刺（[illegible]）

栗楔（[illegible]）　桃桑枝（[illegible]）

大黑豆（[illegible]）

草麻仁（[illegible]）　乳香（[illegible]）

細墨（[illegible]）　硇砂（[illegible]）

右陸味爲末入乳香膏內和杵三千下圓如彈子大如乳香膏少更入醋煮麪糊痛甚者每服壹圓搥碎可者服半圓用無灰酒壹盞乳香壹豆大先磨香盡次下藥盡煎三五沸臨卧溫服以痛處就床卧如欲出汗以衣被蓋覆仍用藥塗磨損

忌一切動風物產婦人諸疾服者更用當歸末壹錢依法煎服有孕者莫服

[illegible]攣風止痛消腫化毒治一切傷折瘡腫

栝樓（大者壹枚去皮） 黃蠟（壹兩半） 白芷（半兩） 麻油（清者[illegible]兩）

麝香（壹錢另研） 松脂（壹兩半） 零香 藿香（各壹兩）

杏仁（去皮尖） 升麻 黃芪 赤芍藥

白及 白斂 甘草（各半兩）

右以油浸七日卻煎出油先煉令香熟放冷入諸藥浸火煎黃色用綿濾去滓入銀石鍋內入蠟并麝香松脂熬少時以瓷合器盛每用少許薄攤絹帛上貼若頭面風癬痒瘡腫疼痛並塗之令熟摸類用之如耳鼻中肉鈴用紙撚子每日點之至壹月即愈如治灸瘡及小兒瘤瘡塗之兼滅瘢痕神效

[illegible]治一切金刃箭鏃傷中及打撲傷損猫狗咬傷或至死者急於傷處摻藥其血化為黃水再摻藥便活更不疼痛如內損血入藏腑熱煎童子小便入酒少許調壹大錢服之立效若牛觝腸出不損者急內入細絲桑白皮尖茸為線縫合肚皮縫上摻藥血止立活如無桑白皮用生麻縷亦得并不得封裹瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤之然後摻藥婦人產後敗血不盡血迷血運惡血奔心胎死腹中胎衣不下至死者但心頭暖急以童子小便調壹錢取下惡物如豬肝片終身不患血風血氣若膈上有血化為黃水即時吐出或隨小便出立效

硫黃（[illegible]） 花蕊石（壹兩[illegible]）

右貳味相拌令勻先用紙筋和膠泥固濟瓦罐子壹箇內可容藥候泥乾入藥內密泥封口了焙籠內焙乾令透熱便安在四方塼上塼上書八卦五行字用炭壹秤籠疊周匝自巳午時從下生火令漸漸上徹有墜下火放夾火上直至經宿火冷炭消盡又放經宿罐冷定取出細研以絹羅子羅至細用瓷盒依前法使用

五行八卦之圖

[illegible]托裏內補十宣散（[illegible]）治一切癰疽瘡癤未成者速散已成者速潰敗膿自出無用手擠惡肉自去不犯刀杖服藥後疼痛頓減其効如神

黃芪（[illegible]）

人參（[illegible]）

當歸（[illegible]）

厚朴（[illegible]）

桔梗（[illegible]）

桂心（[illegible]）

芎藭（[illegible]）

防風（[illegible]）

甘草（生用） 白芷（各壹兩）

右拾味選藥貴精皆取淨曬焙極燥方秤除桂心外壹處搗羅為細末入桂令勻每服自叁錢加至伍陸錢熱酒調下日夜各數服以多為妙服至藥口合更服尤佳所以補前損杜後患也不飲酒人濃煎木香湯下然不若酒力之勝也或飲酒不多能勉強間用酒調并以木香湯解酒功効當不減於酒也大抵癰疽之作皆血氣凝滯風毒壅結所致治之不早則外壞肌肉內攻藏腑其害甚大纔覺便服倍加服數服之醉則其効尤速發散風毒流行經絡排膿止痛生肌長肉藥性平和老人小兒婦人室女皆可服之

[illegible]治打撲閃肭筋斷骨折攣急疼痛不能屈伸及榮

行病弱外受邪風內傷經絡筋骨緩縱皮肉刺痛肩背拘急身
體倦怠四肢少力

自然銅（火煅醋淬七次別研為末水飛過）　川烏頭（炮去皮臍）　骨碎補（燎去毛）

白芍藥　沒藥（別研）　乳香（別研）　當歸（各乙兩）

生乾地黃　川芎（各乙兩半）

右並生用為細末以生薑自然汁與蜜等分煉熟和圓每壹兩作肆圓每服壹圓搥碎水酒各半盞入蘇木少許同煎至八分去蘇木熱服空心食前

[illegible]治癰疽發背丹毒惡腫時行熱毒發作赤色癮疹初發頭目赤痛暴生障翳吹奶腫痛一切無名惡瘡雖發所若細微不可輕慢急服此藥並皆內消更不成膿若發背癰疽已成膿者當排日服之直至膿盡

漏蘆（去蘆）　麻黃（去根節）　升麻（剉）　赤芍藥（生剉）

黃芩（去皮）　甘草（生剉）　白斂（淨洗）　白及（去鬚）

枳殼（米泔浸去瓤麩炒）（各乙兩）　生大黃（[illegible]參兩）

右㕮咀每服肆錢水貳盞煎至壹盞紗帛濾去滓空心食前熱服以快利為度病人更自量增減服之立効

[illegible]治風邪客於肌中渾身瘙痒致生瘡疥及脾肺風毒攻衝遍身瘙疥皺裂乾濕發瘡日久不瘥並皆治之

[illegible]草（七兩）　輕粉（乙錢）

右為細末每用藥乾摻瘡乾用麻油調藥傅之

[illegible]治癰疽發背肘乳[illegible]名腫毒或作疼痛寒壯熱類若傷寒不問老幼虛人並皆治之

忍冬草（去梗）　黃芪（去蘆）（各五兩）　當歸（乙兩貳錢）　甘草（炙）

右為細末每服貳錢酒壹盞半煎至壹盞若病在上食後服病在下食前服少頃再進第貳服留滓外傅未成膿者內消已成膿者即潰

[illegible]治[illegible]斂瘡口生肌肉止疼痛去惡水不問日近年深並治之

寒水石（煅）　（各研）　黃丹（半兩）

右同研細乾摻瘡口內後用萬金膏貼每日乙上再上尤妙

[illegible]治癰疽發背諸般瘡癤從高墜墮打撲傷損脚膝生瘡遠年臁瘡五般痔漏一切惡瘡並皆治之

龍骨　鱉甲　苦參　烏賊魚骨

黃蘗　草烏頭　黃連　豬牙皂角

黃芩　白斂　白及　木鱉子仁

當歸（洗焙）　厚朴（去粗皮）　川芎　香白芷

沒藥（別研）　槐枝　柳枝（各乙分）

乳香（別研）（乙分）　黃丹（乙兩半）　清麻油（夏用十兩冬月用半斤）

右除黃丹外銀石器中將諸藥於油內慢火煎紫赤色去藥不用却入黃丹壹半於油內不住手攪令微黑更入餘黃丹不住手攪須是慢火熬令紫黑滴在水上不散及不黏手然後更別入黃丹少許再熬數沸如硬時却更入油些小以不黏手為度用時量瘡大小攤紙上貼之

[illegible]治從高墜下馬[illegible]傷折筋斷骨碎痛不可忍接骨續筋止痛活血

定粉　當歸（各乙分）　硼砂（乙錢半）

右為細末每服貳錢煎蘇木湯調下服訖後時時呷蘇木湯

[illegible]治久新諸瘡破傷中風項強背直[illegible]反折口噤不語手足抽掣眼目上視喉中沸聲

丹砂（乙兩）　草烏頭（[illegible]）

麝香（研）　生烏頭（各乙分）

右為細末和勻破傷風以酒壹小盞調半錢神効如出箭頭先用酒老藥調服半錢却以藥貼箭瘡上

[illegible]治濕疥侵淫流汁遍身大作瘙痒搔之水出小如粟粒痒痛難任肌膚燥澀經久不差

[illegible]粉　[illegible]　黃[illegible]　硫黃（[illegible]）

右為細末研勻以生油調藥塗之

[illegible]治重物壓迮或從高墜下作熱五內吐血下血出不禁止或瘀血在內胸腹脹滿喘麁氣短

當歸　大黃

右等分炒為末每貳錢溫酒調下不計時候

[illegible]治肺藏風毒攻發皮膚血風瘾疹生疥癬瘙痒搔之皮起作痂增長侵引連滯不差活血脉潤皮膚散風邪止瘙痒

蛇床子半兩　黃連去鬚叁分　胡粉乙兩研　水銀乙分與胡粉點水研令星盡

右件藥以生麻油和稀稠每用藥時先以鹽漿水洗瘡令淨後以藥塗之乾即便換不過三五度差

[illegible]治癰疽瘡瘍膿潰之後外觸風寒腫焮結硬膿水清稀出而不絕內膀空虛惡汁臭敗瘡邊乾急好肌不生及疳瘡瘻惡瘡連滯不差下疰臁瘡侵蝕不斂

檳榔　黃連去鬚各　木香各等分

右為細末每用乾貼瘡上

[illegible]治小兒丹毒肉色變異或着四肢或在胸背遊走不定焮熱疼痛拔毒消腫散熱定疼

石膏叁兩　甘草　黃蘗各乙兩　寒水石七兩

右為細末每用水調時後以雞翎刷掃以芭蕉自然汁調妙

[illegible]治頸項瘰癧及發腋下初如梅子腫結硬强漸若連珠不消不潰或穿穴膿潰肌汁不絕經久難差漸成疳疾並治之

琥珀乙兩　木通　桂心　當歸
白芷　防風　松脂　朱砂研
木鱉去殼各半兩　麻油弍斤　丁香　木香各乙

右件藥先用琥珀丁香桂心朱砂木香伍味搗羅為末其餘藥並細剉以油浸一宿於鐺中以慢火煎候白芷焦黃漉出次下松脂末濾去滓再澄清油却安鐺中慢火熬下黃丹壹斤以柳木篦不住手攪令黑色滴入水中成珠子不散看硬軟得所入琥珀等末攪令勻於瓷器內盛之每使時看大小用火煬紙上勻攤貼之

丹參膏治乳腫乳癰毒氣焮作赤熱漸成攻刺疼痛及治乳核結硬不消散通順經絡宣導壅滯

丹參　赤芍藥　白芷各等分

右細剉以酒淹叁宿入猪脂半斤微煎令白芷黃色濾去滓入黃蠟乙兩每用少許時時塗之

[illegible]治湯火傷初起瘭漿熱毒侵展焮赤疼痛毒氣壅盛腐化成膿斂瘡口生肌肉拔熱毒止疼痛

當歸　黃蠟各乙兩　麻油四兩

右件先將油煎令當歸焦黑去滓次入蠟急攪之放冷入瓷合內每使時故帛子攤貼之

[illegible]治風邪熱毒客搏皮膚身體生瘡疥痛及大疥作瘡焮赤疼痛侵淫潰長肌汁不絕拔熱毒止痛生肌肉斂瘡口神効

猪脂煉六兩　松脂半兩　膩粉　胡粉
黃連去鬚各乙兩　甘草乙兩剉

右件藥先以猪脂煎松脂次入黃蠟弍兩濾去滓次下膩粉并四味攪勻傾於瓷器中每用藥少許塗之日三四易

[illegible]治風邪毒氣外客皮膚熏發成腫所起不定遊走往來時發痒痛或風毒結盛攻注成瘡焮赤多膿痛楚緊急但是風腫並皆治之

吳茱萸　藁本　獨活　細辛
白殭蠶去絲觜炒　半夏　漢椒去目炒　防風
赤芍藥　當歸　桂心　川芎
香白芷各半兩　烏蛇　黃蠟弍兩　乾蝎
附子去皮臍各乙兩

右件細剉以煉臘月猪脂弍斤文火煎候白芷赤黑色看度綿濾去滓下臘入瓷器內盛每用取少許摩之令熱日叁服

[illegible]治內外諸痔腫核結硬或痒發熱時或痛不可忍或肛边生瘡赤腫侵淫或鼠乳附核久不消散

槐白皮　棘實各伍兩　甘草　白芷各貳兩

赤小豆壹合　桃仁陸拾枚　當歸叁兩

右並㕮咀以煎成猪膏壹斤微火煎白芷黃藥成每用摩瘡上日再用

[illegible]治八發癰疽一切惡瘡軟癤不問年月深遠已成膿未成膿貼之即效蛇虎蝎犬湯火刀斧所傷並可內服外貼發背先以温水洗瘡拭乾用帛子攤藥貼仍用水下血氣不通酒下赤白帶下當歸酒下咳嗽喉閉纏喉風並綿裹含化一切風赤眼貼太陽穴後用山梔子湯下打撲傷損貼痛處仍用橘皮湯下腰膝痛貼之鹽湯下唾血桑白皮湯下諸瘡先以鹽湯洗其諸瘡癤並量大小以紙攤藥貼之並每服一粒旋圓櫻桃大以蛤粉爲衣其藥可收十年不壞愈久愈烈神効不可具述

玄參　白芷　川當歸去蘆　肉桂去粗皮

大黃　赤芍藥　生乾地黃各壹兩

右剉用麻油貳斤浸春伍日夏叁日秋柒日冬拾日濾去滓油熬得所次下黃丹壹斤以滴油在水中不散爲度

[illegible]治墜馬落車被打傷腕折臂呼叫不絕服此藥呼吸之間不復大痛服三日筋骨即當相連神効

澤蘭熬　附子炮去皮　當歸炒　蜀椒炒去汗

甘草炙　桂心各三分　芎藭一兩一分

右爲細末貳錢温酒調下日夜服忌海藻菘菜熱猪

[illegible]治癰疽瘡癤方作焮赤初發疼痛及膿已潰未潰小腸氣腎癰便毒腰痰氣刺腹臍下癰及婦人吹妳

舶上茴香炒　川山甲炮　南木香不見火

延胡索去皮　白牽牛炒　陳皮去白　甘草各等分

右爲細末每服貳錢熱酒調病在上食後服病在下食前服不飲酒人煎南木香湯調下

[illegible]治一切瘡癤癰毒及腸癰背或赤腫而未破或已破而膿血不散渾身發熱疼痛不可堪忍者并治婦人妳癰一切毒腫並宜服之

地蜈蚣　赤芍藥　當歸　甘草各等分

右爲細末每服貳錢温酒調下不拘時候

[illegible]治瘡疥發於四肢臀髀痛痒不常甚至增寒發熱攻刺疼痛浸淫浮腫又癩風入臟陰下濕痒耳鳴眼痛皆治之

乾薑　熟枳殼　乾葛　熟蒼术

桔梗　升麻各乙兩　當歸　熟半夏

茯苓　白芷各乙兩　陳皮　甘草各乙兩半

芍藥柒錢半　大黃半兩

右爲剉散每服肆大錢水壹盞半姜叁片燈心拾伍莖煎至柒分去滓食前服

[illegible]治一切惡核瘰癧癰疽惡腫等病出[illegible]方

沉香不見火　乳香研　甘草生　舶上青木香不見火

連翹去蒂　射干　升麻　桑寄生[illegible]

獨活[illegible]　麝香[illegible]　木通各[illegible]分

丁香不見火　大黃[illegible]

右㕮咀每服肆大錢水貳盞煮取壹盞以上去滓取捌分清汁空心熱服半日以上未利再喫壹服以利下惡物爲度本生肉前服不妨以折去熱毒之氣[illegible]有竹瀝芒消恐泥者不能斟酌故刪之智者當自添減

[illegible]方甚多當以一二則爲正李氏方今皆存之

[illegible]

太平惠民和劑局方卷之八

太平惠民和劑局方卷九

治婦人諸疾

外有治婦人諸方互見各類

澤蘭圓 治婦人風虛勞冷一切諸疾或風寒邪氣留滯經絡氣血冷澀不能溫潤肌膚或風寒客於腹內則脾胃冷弱不能克消水穀或腸虛受冷大便時泄或子藏挾寒久不成胎月水不調乍多乍少或月前月後或淋瀝不止或閉斷不通結聚癥瘕面體少色飲食進退肌肉消瘦百節痠疼時發寒熱漸至羸損帶漏五色陰中冷痛時發腫癢月水將行臍腹先痛皮膚皺澀癮疹瘙癢麻痺筋攣面生䵟黯黃瘀目淚自出心忪目眩及產後勞損未復肌瘦寒熱顏色枯黑飲食無味漸成蓐勞並皆療之

熟乾地黃 五味子 柏子仁 芎藭

澤蘭 禹餘粮 防風

肉蓯蓉 白茯苓(去皮) 厚朴 白芷

乾薑(炮) 山藥 細辛(去苗) 卷栢(去根)

當歸 藁本 甘草 蜀椒

牛膝 人參 續斷 蛇床子

蕪荑(炒) 杜仲 艾葉 赤石脂

石膏 肉桂 石斛 白朮 紫石英

右件藥搗羅為末煉蜜和搗伍柒百杵圓如梧桐子大每服叁拾圓溫酒或米飲下空心食前服常服養血補氣和順榮衛充實肌膚調勻月水長髮駐顏除風去冷令人有子溫平不熱無毒妊娠不宜服之

[illegible]圓 治產後勞傷臟藏虛羸臍腹氣血不調肢體瘦弱困乏少力面色萎黃心常驚悸多汗嗜臥飲食不進產後百日內宜常服壯氣益血暖下藏進飲食

黃耆 澤蘭 牛膝 人參

赤石脂 附子 木香 萆薢

白茯苓 續斷 肉桂 芎藭

白朮 乾薑 當歸 甘草

熟乾地黃

右為末煉蜜圓如梧桐子大每叁拾圓溫米飲下空心食前

鍾乳澤蘭圓 補虛羸益血氣治衝任虛損月水不調臍腹疼痛腰腿沉重四肢倦怠百節痠疼心忪恍惚憂恚不樂面少光澤飲食無味除下藏風冷治帶下三十六疾崩中漏下五色子宮久冷無子及數墮胎或因產勞損衝任血氣虛羸肌瘦嗜臥久服補暖元藏潤澤肌膚長髮去䵟除頭風令人有子

鍾乳粉 澤蘭 蕪荑 麥門冬

山茱萸 艾葉 防風 柏子仁

人參 石膏 石斛 熟乾地黃

芎藭 甘草 牛膝 白芷

山藥 當歸 藁本

細辛 肉桂

右為細末煉蜜和為圓如梧桐子大每服叁拾圓至伍拾圓溫酒或米飲下空心食前日貳服

人參荊芥散 治婦人血風勞氣身體疼痛頭昏目澀心怔煩倦寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胸滿精神不爽或月水不調臍腹疞痛痃癖塊硬疼痛發歇或時嘔逆飲食不進或因產將理失節淹延瘦瘁乍起乍臥甚即著床

荊芥穗 羚羊角 酸棗仁 生乾地黃

枳殼 人參 鱉甲 肉桂

白朮 柴胡 甘草 芎藭

赤芍藥 牡丹皮 當歸 防風

右為麤末每服叁錢水壹盞生薑叁片煎至柒分去滓熱

附子（炮去皮臍）　黃耆

右為麤散，每服肆錢，水壹盞半，入生薑半分，棗壹枚擘破，煎至壹盞，去滓，食前溫服。

[illegible]治衝任不足，下焦久寒，臍腹疞痛，月事不勻，或來多不斷，或過期不來，或崩中去血，或帶下不止，面色痿黃，肌肉瘦瘁，肢體沉重，腳脇脹滿，氣力衰乏，飲食減少，一切血氣虛寒，並宜服之。

吳茱萸　安息香
栢子仁（炒）　山茱萸（去核）　延胡索
虎杖　當歸　杜仲　附子
木香　澤蘭葉　乾薑　肉桂
艾葉（醋炒）　黃耆（去蘆）　牡丹皮　肉蓯蓉
厚朴（去粗皮，薑汁炙令熟）

右為細末，以前安息香膏入白麵同煮作糊，和圓如梧桐子大，每服叁拾圓，食前以溫酒下，醋湯亦得。

[illegible]治婦人臟氣本虛，宿挾風冷，留滯腹內，攻刺腹痛，吐惡心，飲食減少，身面虛浮，惡寒戰慄，或泄痢不止，少氣羸困，及因產生產藏氣暴虛，邪冷內勝，宿疾轉甚，並宜治之。

桔梗　防風　乾薑　甘草
當歸　細辛　熟乾地黃　吳茱萸

右為麤散，每服叁錢，水壹盞，煎至柒分，去滓，熱服，空心食前。

伏龍肝散　治氣血勞傷，衝任脈虛，經血非時忽然崩下，或如豆汁，或成血片，或五色相雜，或赤白相兼，臍腹冷痛，經久未止，令人黃瘦，口乾，飲食減少，四肢無力，虛煩驚悸。

伏龍肝　赤石脂　熟乾地黃
艾葉　甘草　肉桂　當歸
乾薑　麥門冬

服，不拘時，日貳服。常服除一切風冷。

[illegible]治婦人衝任本虛，小腹挾寒，或因產勞損，子臟風寒搏於血氣，結生瘕聚，塊硬發歇，腹脇刺痛，腰腳疼重，拘急攣痛，背項強急，手足麻痹，或月水不調，或閉澀，或崩漏帶下，少腹冷疼，寒熱盜汗，四肢痠痛，面色痿黃，多生䵟黯，乏少力，心多驚悸，不欲飲食。

延胡索　縮砂仁　赤芍藥　牡丹皮
山茱萸　乾薑　龍骨　熟乾地黃
檳榔　羌活　藁本　五味子
人參　白芷　當歸　乾山藥
澤瀉　續斷　肉桂　白茯苓
白朮　附子　木香　牛膝
萆薢　石斛

右為細末，煉蜜和圓如梧桐子大，每服貳拾圓至叁拾圓，溫酒或醋湯下，空心食前，日貳服。姙娠不宜服。

[illegible]治婦人血氣不調，臟腑怯弱，風冷邪氣乘虛客搏，臍腹冷疼，脇肋時脹，面色痿黃，肌體羸瘦，怠惰嗜臥，不思飲食，常服補虛損，暖下藏，逐痼冷，進飲食。

沉香　莪朮　訶梨勒　檳榔
當歸　附子　白朮　麝香
丁香　肉豆蔻　高良薑

右為細末，入麝香勻，酒煮麵糊圓如梧桐子大，每服叁拾圓，用溫酒下，空心食前。

[illegible]治婦人勞傷血氣，臟腑虛損，風冷邪氣乘虛客搏，臍腹煩痛，頭目昏重，心多驚悸，寒熱盜汗，羸瘦少力，飲食不進。

丹參　防風　當歸　細辛
藁本　芎藭　人參　熟乾地黃
白茯苓　肉桂　白朮　續斷

右為麄散每服肆錢水壹盞半入棗叁枚擘破煎至柒分去滓食前溫服

〔溫經湯〕治衝任虛損月候不調或來多不斷或過期不來或崩中下血過多不止又治曾經損娠瘀血停留少腹急痛發熱下利手掌煩熱唇乾口燥及治少腹有寒久不受胎

阿膠炒 當歸去蘆 芎藭 人參
肉桂去麄皮 甘草炒 芍藥 牡丹皮各貳兩
半夏湯洗 吳茱萸湯洗焙炒 麥門冬去心伍兩半

右為麄末每服叁錢水壹盞半入生薑伍片煎至捌分去滓熱服空心食前服

〔禹餘糧圓〕治婦人帶下久虛胞絡傷敗月水不調漸成崩漏氣血虛竭面黃體瘦臍腹裏急腰膝疼重肢體煩痛心忪頭眩手足寒熱不思飲食

桑寄生 柏葉微炒 當歸 厚朴去麄皮
乾薑炮 白术 鱉甲醋炙 附子炮去皮臍
禹餘糧煅醋淬 白石脂 狗脊去毛
白芍藥各叁分 吳茱萸湯洗焙炒

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服叁拾圓溫酒或米飲下空心食前服

〔逍遙散〕治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪頰赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜臥及血熱相搏月水不調臍腹脹痛寒熱如瘧又療室女血弱陰虛榮衛不和痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸

甘草微炙半兩 當歸去苗剉微炒 茯苓去皮白者
芍藥白 白术 柴胡去苗各壹兩

右為麄末每服貳錢水壹盞入燒生薑壹塊切破薄荷少許同煎至柒分去滓熱服不拘時候

〔白薇圓〕補衝任溫暖子宮治胞絡傷損宿受風寒久無子息或受胎不牢多致損墮又服去下藏風冷令人有子

秦椒去目 白薇 熟乾地黃
當歸 藁本 牡蒙 黃芩
禹餘糧 人參 柏子仁
桑寄生 附子 肉桂去麄皮 五味子去枝
吳茱萸 石斛去根 甘草炙 牛膝去苗
防風去苗 芎藭各壹兩

右為細末入研藥勻煉蜜圓如梧桐子大每服叁拾圓至伍拾圓溫酒或米飲下空心食前服纔覺妊娠即住服已孕者尤不宜服之

〔陽起石圓〕治婦人衝任虛損子藏受寒久無子息及斷緒不產此因上熱下冷百病滋生或月水崩下帶漏五色腰腹疼重面黃肌瘦或因產乳不能將護路則太早或久坐濕地並冷風從下入血藏既虛風邪內乘或月水當行失於調攝傷動胞絡陰陽不和上焦虛陽衝下藏邪冷結伏致使胎孕不成久極傷敗月水不勻飲食減少夜多盜汗面生䵟黯肢體疼腳膝疼重舉動少力並宜服之

覆盆子去梗 白龍骨 熟乾地黃
川椒去目及閉口者微炒 白薇去苗 蛇床子炒
乾薑炮 細辛去苗 當歸去蘆 車前子
芎藭各半兩 遠志去心 桃仁去皮尖 白茯苓去皮
藁本去苗 人參 卷柏去根 白芷
肉桂去麄皮 麥門冬去心

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服叁拾圓溫酒或米飲下空心食前常服壯筋骨益血氣暖下藏除風冷令人有子

〔紫石英圓〕治婦人久冷絕子及數經墮胎皆因衝任之脉虛損胞內宿挾疾病經水不時暴下不止月內再行或月前月後及子藏積冷崩漏帶下

牡蠣八分　白朮　芎藭

右件爲散每服貳錢溫酒調服空心食前

[illegible]治勞傷血氣衝任虛損月水過多淋瀝漏下連日不斷臍腹疼痛及妊娠將攝失宜胎動不安腹痛下墜或勞傷胞絡胞阻漏血腰痛悶亂或因損動胎上搶心奔衝短氣及因產乳衝任氣虛不能約制經血淋瀝不斷延引日月漸成羸瘦

阿膠　芎藭

艾葉各二兩　白芍藥　甘草　當歸

熟乾地黃各肆兩

右爲麤末每服叁錢水壹盞酒陸分同煎至捌分濾去滓稍熱服空心食前日叁服甚者連夜併服

[illegible]養胎益血安和子藏治妊娠將理失宜或因勞役胎動不安腰腹痛重胞阻漏胎惡露時下子藏挾疾久不成胎或受妊不能因養痿燥不長過年不產日月雖滿轉動無力或致損墮及臨產節適乖宜驚動太早產時未至惡露先下胎胞枯燥致令產難或橫或逆痛極悶亂連日不產子死腹中腹上冰冷口唇青黑吐出冷沫新產惡血上衝運悶不省喘促汗出及瘀血未盡臍腹疼痛寒熱往來或因產勞損虛羸未復面黃體瘦心忪盜汗飲食不進漸成蓐勞入月常服壯氣養胎正順產理潤胎易產產後常服滋養血氣和調陰陽密腠理實臟腑治風虛除痼冷

大麻仁　黃芩　大豆黃卷

糯米　貝母　甘草　乾薑　肉桂

石斛　石膏　當歸半兩　秦椒

右爲細末煉蜜和圓如彈子大每服壹圓溫酒或棗湯化下嚼破併空心食前服

[illegible]滑胎易產治妊娠曾因漏胎去血或臨產驚動太早產時未至穢露先下致使胎胞乾燥臨產艱難並宜服之

冬葵子　榆白皮

瞿麥　木通半兩

白芍藥　食茱萸　厚朴各三分

右件搗羅爲末煉蜜爲圓如梧桐子大每服貳拾圓每服空心食前當歸酒研下

[illegible]治妊娠惡阻心中憒悶頭目眩運四肢怠墮百節煩疼胸膈痰逆嘔吐惡心嫌聞食氣好啖鹹酸多卧少起全不進食

旋覆花　陳皮　桔梗　白芍藥

人參　甘草　芎藭各半兩　熟乾地黃

赤茯苓各三分　半夏

右爲麤末每服貳錢水壹盞半生薑肆片同煎至捌分去滓稍熱服食前服次服茯苓圓即痰水消除便能食

[illegible]治妊娠惡阻病心中煩憒頭目眩重憎聞食氣嘔逆吐悶顛倒不安四肢困弱不自勝持常服此藥消痰水令能食強力養胎當先服半夏茯苓湯次進此藥

枳殼　白朮　甘草

赤茯苓　人參　乾薑　肉桂

陳皮　半夏

右爲細末煉蜜和爲圓如梧桐子大每服叁拾圓溫米飲空心下食前服

催生丹治產婦生理不順產育艱難或橫或逆並宜服之神效

麝香　乳香　母丁香

右件勻以兔腦和圓如雞頭穰大陰乾用油紙密封貼每服壹圓溫水下即時產下隨男左女右手中握藥出是驗

[illegible]治產後去血過多運悶不省及傷胎去血多崩中去血多金瘡去血多拔牙齒去血多不止懸虛心煩眩運頭重目暗耳聾滿塞舉頭欲倒並皆治之

當歸　芎藭

右爲散每服叁錢水壹盞煎至柒分去滓稍熱服不拘時

原缺

頭痛惡心經脉不調赤白帶下乳生惡氣胎臟虛冷數曾墮胎
崩中不定因此成疾室女經脉不、此並宜服之常服暖子宮和
血氣悅顏色退風冷消除萬病兼療丈夫五勞七傷虛損等病

澤蘭葉　石膏各一兩研　卷柏去根　白茯苓去皮
防風去蘆　厚朴去粗皮薑汁炙　細辛去苗　柏子仁微炒
桔梗　吳茱萸湯洗炒　五味子揀淨
人參　藁本去苗　乾薑炮　川椒去目閉口者微炒出汗
白芷　白术　黃芪去苗　川烏炮去皮臍
丹參各三分　蕪荑微炒赤　甘草炙　川芎
芍藥　當歸各一兩　白薇　阿膠碎炒燥各半兩
肉桂一兩一分　生乾地黃一兩半

右為細末每服貳錢空心臨卧熱酒調下若急疾有患不拘時候日參服

黑神散 治婦人產後惡露不盡胞衣不下攻衝心胷痞滿或臍腹堅脹撮疼及血暈神昏眼黑口噤產後瘀血諸疾並皆治之

黑豆炒半升去皮　熟乾地黃酒洒　當歸去蘆酒浸　肉桂去粗皮
乾薑炮　甘草炙　芍藥　蒲黃各四兩

右為細末每服貳錢酒半盞童子小便半盞同煎調下急患不拘時候連進貳服

[illegible]散 治婦人血風勞形容憔悴肢節困倦喘滿虛煩咳嗽氣發熱汗多口乾舌澀不思飲食

五加皮　牡丹皮　赤芍藥　當歸去蘆各一兩

右為末每服壹錢水壹盞將青銅錢壹文蘸油入藥煎柒分溫服煎不得攪喫不得吹日參服常服能肥婦人其効妙甚

[illegible]湯 治婦人勞傷過度致傷藏府衝任氣虛不能約制其經血或暴下謂之崩中或下鮮血或下瘀血連日不止淋瀝不斷形羸氣劣倦怠困乏並能治之　又方見後

赤石脂火煆　海螵蛸去殼　側柏去枝各伍兩

原缺

炒薑糯米飲下寒熱往來四肢煩疼煎青蒿湯下婦人室女經血不通煎紅花酒下血暈不省人事童子小便和暖酒下催生雞子清和酒下血氣血塊攻刺心腹疼痛溫酒下傷寒及中風口噤煎麻黃湯下用被蓋出汗即愈心驚悸及頭疼薄荷酒下咳嗽煎桑白皮湯下血風攻注渾身瘙痒頭面麻痺炒黑豆浸酒下產前產後常服不生諸疾神効

安胎飲 治妊娠三月四月至九箇月惡阻病者心中憒悶頭重目眩四肢沉重懈怠不欲執作惡聞食氣欲啖鹹酸多睡少起嘔逆不食或胎動不安非時轉動腰腹疼痛或時下血及妊娠一切疾病並皆治之　又方見後

地榆　甘草微炙赤　茯苓去皮　熟乾地黃洗酒蒸焙
當歸去蘆洗酒浸　川芎　白术　半夏湯洗七次
阿膠搗碎炒　黃芪去苗　芍藥各等分

右為麤散每服叁錢水壹盞半煎至捌分去滓溫服不拘時

如或惡食但以所思之物任意與之必愈按妊娠禁忌勿食雞鴨子鯉魚膾兎犬驢騾山羊肉魚子鼈卵雉雀桑椹又按胎教論云令母常居靜室多聽美言隱人講論詩書陳說禮樂耳不聽非言目不視惡事心不起邪念能令生子長壽福壽忠孝仁義聰明無疾斯乃聖人所留教論故附方末以警

神仙聚寶丹 治婦人血海虛寒外乘風冷搏結不散積聚成塊或成堅瘕及血氣攻注腹脇疼痛小腹急脹或時虛鳴面色萎黃肢體浮腫經候欲行先若重痛或多或少帶下赤白崩漏不止驚悸健忘小便頻數或下白水時發虛熱盜汗羸瘦此藥不問胎前產後室女並宜服之常服安心神去邪氣逐敗血養新血令人有子

沒藥別研　琥珀別研　木香　當歸洗焙
辰砂別研　麝香各一錢別研　滴乳香

右研令細和停滴冷熟水搗為圓作壹拾伍圓每服

原缺

原缺

或當歸酒下貳拾圓食前服

【琥珀黑龍丹】治產後一切血疾淋露不快兒枕不散積瘕堅聚按之攪手疼痛攻心困頓垂死者但灌藥無有不效驗不可言

五靈脂(去沙石) 當歸(去蘆) 川芎

乾地黃(生者) 良薑

已上各等分入沙合內赤石脂泯縫紙筋鹽泥固濟封合炭火拾斤煅通紅去火候冷開取合子看成黑糟乃取出細研入後藥 一本云用榰瓶沙合

花乳石(煅) 琥珀(各研) 乳香(別研) 硫黃(各壹分半)

百草霜(別研)

右同為細末米醋煮糊圓如彈子大每服壹圓炭火燒通紅投生薑自然汁與無灰酒各壹合小便半盞研開頓服立效

【[illegible]夫人[illegible]】治婦人血氣久冷無子及數經墮胎皆因衝任之脈虛損胞內宿挾疾病經水不時暴下不止月內再行或前或後或崩中漏下三十六疾積聚癥瘕臍下冷痛小便白濁以上疾證皆令孕育不成以至絕嗣治產後百病百日內常服除宿血生新血令人有孕及生子充實亦治男子亡血諸疾

秦艽 石斛(去根酒浸) 藁本(去蘆) 甘草(炙)

蠶布(燒灰) 桔梗(去蘆各壹兩) 京墨(煅醋淬) 茯苓(去皮)

人參(去蘆各兩) 木香(不見火各壹兩) 桃仁(去皮尖炒各壹兩) 熟乾地黃(洗過酒浸)

香附(炒去毛) 澤蘭(各壹兩去梗) 當歸(去蘆) 肉桂(不見火)

乾薑(炮) 細辛(去苗) 川芎 牡丹皮(各壹兩半)

山藥 川椒(去目炒各叁分) 蒼朮(米泔浸去皮炒) 大豆黃卷(炒半升)

糯米(炒壹升) 【一方】山藥川椒各云叁兩

右為細末煉蜜搜每兩作陸圓每服壹圓細嚼空心食前溫酒醋湯任下

【[illegible]散】治產婦一切疾病產前胎死產難橫生逆生產後胞衣不下衣帶先斷遍身疼痛口乾心悶非時不語如血暈眼花

大同煎至柒分去滓服之

【琥珀圓】治婦人或老或少產前產後百病及療三十六種血冷七疝八瘕心腹刺痛卒中癱瘓半身不遂八風十二痺等手足酸疼乳中毒結瘀血懷胎驚動傷犯不安死胎不出并衣不下並宜服之

琥珀(研) 辰砂(別研) 沉香 阿膠(碎炒)

肉桂(去粗皮) 石斛(去根) 附子(炮去皮) 五味子(揀淨)

川芎(各半兩) 牛膝(去苗酒浸) 當歸(去苗炒) 肉蓯蓉(酒浸各壹兩)

人參 續斷 沒藥(各研各叁分) 熟乾地黃

木香(各壹兩)

右為細末煉蜜為圓如彈子大每服壹圓空心暖酒調下午晚食前再服能生精血去惡血若人腹臍疼痛繞臍如刀刺及嘔逆上氣築心痰毒不思飲食用薑汁少許和酒服諸瀬及赤白帶血冷崩中下血漏胎下血用生薑與艾剉炒令赤色入酒同煎數沸去滓調服洩瀉不止陳米飲服遺尿諸淋煎通草燈心湯服血運不知人煎當歸酒調服上熱下冷煎人參湯服遍身虛腫水氣煎赤小豆湯服產內二毒傷寒及中風角弓反張身如板硬煎麻黃湯服使汗出汗了經不通或閉雜五色或併而下斷續不止飲食無味臍腹疼少面赤唇焦作寒作熱四肢煩疼五心燥熱黑點遍身血斑赤腫走疰及血風勞傷無力用童子小便入薑汁少許調服常服以小便為妙若惡心和以半酒如懷胎人於難月壹日壹服至產下不覺疼痛或病人服多者服拾服日倍效是藥功次矣其功不能具載略述其用湯使于前

【滋血圓】治婦人血海虛冷百病變生氣血不調時發寒熱或下血過多或久閉不通崩中不止帶下赤白癥瘕癖塊攻刺疼痛小腹緊滿脅肋脹痛腰重腳弱消瘦羸瘦減食少力成勞瘵及經脈不調胎氣多損產前產後一切病患並宜治療

原缺

延胡索　木香　琥珀　熟乾地黃（洗焙）
肉豆蔻　草果（各半兩）
右細剉，用烏雄雞壹隻，淡擣去毛及腸肚，將上件藥安放雞肚中，用新蘆餅好酒壹斗，同煮令乾，去雞骨，以油單盛焙乾，為細末，煉蜜為圓如梧桐子大。每服叁拾圓，胎前產後傷寒，蜜糖酒下；胎前氣悶壯熱，炒薑酒下；赤白帶下，生擣艾[illegible]酒下；產後敗血注心，童子小便炒薑酒吞下；產後血塊痛疼，心腹疼痛，燒胡索酒下；胎前嘔逆，薑湯下；催生，炒蜀葵子酒下；安胎，鹽酒下；室女紅脈當通不通，四肢疼痛，煎紅花酒下；血氣攻刺，心腹疼痛，煎當歸酒下；血逆，將棕櫚燒灰酒調吞下；血邪，研朱砂、麝香酒下；血閉，煎烏梅湯研朱砂下；子宮久冷，溫酒或棗湯下，空腹日三服；血風勞，人參酒吞下；小腹疼痛，炒茴香鹽酒下；血散四肢，遍身虛浮黃腫，赤小豆酒下；常服溫酒、醋湯任下，並空心食前服。

白堊丹 治婦人三十六病，崩中漏下，身瘦手足熱，惡風怯寒，咳逆煩滿，拘急短氣，心脅腰背腹肚與子臟相引痛，漏下五色，心常恐懼，遇恚怒憂勞即發，皆是內傷所致，並皆治之。
牡蠣（煅）　白堊　細辛（去苗）　禹餘糧（煅醋淬研）
烏賊魚骨（燒）　白石脂（煅）　龍骨（並煅，各壹兩半）　瞿麥穗
附子（炮去皮臍）　芍藥　石葦（去毛）　白歛
黃連（去須微炒）　茯苓（去皮）　肉桂（去粗皮）　白芷
當歸（去苗）　乾薑（炮）　人參　甘草（炙，各壹兩）
川椒（去目及閉口者，微炒出汗，半兩）
右為細末，煉蜜圓如梧桐子大，每服叁拾圓至伍拾圓，空心溫酒下。

暖宮圓 治證與前暖宮同
沙參（淨洗）　地榆　黃芪　桔梗
白薇（二兩）　牛膝（酒浸）　杜仲（去粗皮，薑汁炙）　厚朴（去粗皮，薑汁炙）

藁本（去苗）　白薑（炮）　甘草（炙，各叁兩）　吳茱萸（湯洗焙炒）
紅花（各炒，半兩）
右為末，煉蜜搜和杵數千下，圓如彈子大，每服壹圓。血瘕塊痛，綿灰酒下；催生，溫酒細嚼下；血勞血虛，桔梗酒下；血崩，棕櫚灰酒下；血氣痛，炒白薑酒下；血風，荊芥酒下；血暈悶絕，胎死腹中，胞衣不下，並用生地黃汁、童子小便、酒各壹盞煎貳沸調下；常服，醋湯、溫酒化下，並空心食前服。

人參[illegible]圓 治女人稟受怯弱，血氣虛損，常服補衝任，調血脈，宣壅破積，退邪熱，除寒痹，緩中下，堅筋脈，安神魂，潤顏色，通氣散悶，兼治婦人懷身，腹中絞痛，口乾不食，崩傷眩暈，及產出月羸瘦不復常者。
烏梅肉（壹兩）　熟乾地黃（伍兩）　當歸（去苗，貳兩）
川芎　赤芍藥　蒲黃（各炒，壹兩）　人參
右為細末，蜜搜杵數千下，圓如梧桐子大，每服伍拾圓至百圓，溫酒米湯下，食前服。

[illegible]圓 治血虛勞倦，五心煩熱，肢體疼痛，頭目昏重，心忪頰赤，口燥咽乾，發熱盜汗，減食嗜臥，及血熱相搏，月水不利，臍腹脹痛，寒熱如瘧；又治室女血弱，陰陽榮衛不和，痰嗽潮熱，肌體羸瘦，漸成骨蒸。
乾漆（炒）　蘇木　鬼箭　莪朮（各壹分）
甘草（炙，半兩）　當歸　桂心　牡丹皮
芍藥　陳皮（去白）　紅花　延胡索（炒）
沒藥（別研）　烏藥（各壹兩）
右為末，每服貳錢，水壹盞，煎至柒分，不拘時候。

紅花當歸散 治婦人血臟虛竭，或積冷血結，經候不行，或斷續不定，時作腹痛，腰胯疼重，攻刺小腹緊硬，室女月經不通，並宜服。
劉寄奴草（伍兩）　當歸（去蘆）　牛膝（酒浸）　甘草（炙）
紫葳　紅花　蘇木（各貳兩）　赤芍藥（玖兩）

〔調中湯〕治產後腸胃虛怯寒邪所侵及未滿月飲冷當風乘虛
襲留於肓膜散於腹脇腹痛作陣或如錐刀所刺流入大腸水
穀不化洞泄腸鳴或下赤白胠脇脹或走痛不定急宜服之
當歸　肉桂去粗皮　川芎　白芍藥
附子炮　良薑各壹兩　甘草半兩
右為剉散每服叁錢匕水壹盞半煎至壹盞去滓熱服
〔旋覆花湯〕治產後傷風感寒暑濕咳嗽喘滿痰涎壅盛坐臥不寧
旋覆花　五味子　前胡　麻黃去節
赤芍藥　半夏麴　杏仁去皮尖麩炒　茯苓去皮
甘草炙　荊芥去梗
右各等分為麁末每服肆大錢水壹盞半薑伍片棗壹枚煎
至柒分去滓食前服
〔琥珀黑龍丹〕治證品味與前琥珀黑龍丹同
〔人參當歸湯〕治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生內熱內熱
曰煩其證心胷煩滿吸吸短氣頭痛悶亂骨節疼痛晡時輒甚
與大病後虛煩相類急宜服之
乾地黃　人參　當歸　肉桂去粗皮
麥門冬去心各壹兩　白芍藥貳兩
右為麁散每服肆大錢水貳盞先將粳米壹合淡竹葉拾片
煎至壹盞去米葉入藥并棗叁枚煎柒分去滓食前服地黃
宜用生乾若虛甚則用熟者
〔延胡索散〕治產後惡血不散發歇疼痛及惡露不快脇腹堅
脹兼室女經候不勻赤白帶下心腹腰脚疼痛
當歸　牡丹皮　赤芍藥　延胡索炒各貳兩
肉桂壹兩
右為細末蜜圓如梧桐子大溫酒米飲下叁拾圓食前溫服
痛甚細嚼嚥下
〔□□□〕治產後留血不消積聚作塊急切疼痛猶如遁尸及心

半夏麴　桔梗炒　細辛去苗　吳茱萸
右為麁末每服貳錢水壹盞半煎柒分去滓食前熱服
〔熟乾地黃湯〕治產後虛渴不止少氣腳弱眼昏頭眩飲食無味
熟乾地黃　人參　麥門冬
栝樓根　甘草炙
右為剉散每服肆錢水貳盞糯米壹撮生薑叁片棗叁枚煎
柒分去滓食前服
〔阿膠枳殼圓〕治產後虛羸大便秘澀
阿膠　枳殼　滑石
右為末煉蜜圓如梧桐子大每服貳拾圓溫水下半日來未
通再服
〔失笑散〕治產後心腹痛欲死百藥不効服此頓愈
蒲黃炒香　五靈脂酒研淘去砂土各等分為末
右先用釅醋調貳錢熬成膏入水壹盞煎柒分食前熱服
〔當歸四物湯〕治婦人榮血不足四肢怠惰乏力少氣兼
治產後下血過多榮衛虛損陰陽不和乍寒乍熱並皆服之
當歸　川芎　人參
甘草炙　白芍藥各等分　乾薑炮
右㕮咀每服肆錢水壹盞半煎至柒分去滓熱服若產後衆疾
腹中刺痛則有敗血當用五積散加醋煎及大聖散服之若
所下過多猶有刺痛亦宜服此二藥〔一方〕治經血凝滯
血氣作疼用四物湯加莪朮官桂等分名六合湯〔一方〕治下
血不止及姙婦胎動加熟艾乾薑甘草阿膠等分名膠
艾湯〔一法〕治血崩止加膠艾治產後血搐口乾煩渴加栝蔞
麥門冬煩熱小便澀大便秘加大黃桃仁湯腸脹加厚朴枳
實虛煩不得睡加竹葉人參大渴煩燥加知母石膏〔一法〕治
婦人血虛心腹疞痛不可忍者去地黃加乾薑名四神湯大
率產後不問下血多少每日須空心服叁服下血少者加

許舉高十丈天符地軸入地十丈令此地空閑產婦某氏安
居無所妨礙無所畏忌諸神擁護百邪逐去急急如律令勑
禁草法 鋪草及氈褥訖即咒曰 鐵鐵湯湯非公所當是王一言
得之銅一言得之鐵母子相生俱蒙鐵急急如律令
禁水法 欲產時貯水咒曰 南無三寶水 水在井中為井水
水在河中為河水 水在器中為淨水 水在法中為真水
自知非真莫當真水
以淨持濁 以正治邪 日遊月殺 五土將軍 青龍白虎
朱雀玄武 招搖天狗 軒轅女妭 天吞地吞 懸尸閉肚
六甲禁諱 十二神王 土符伏神 各安所在 不得動靜
不得忌干 若有動靜 若有忌干 施以神咒 當攝汝形
阿佉尼阿毗羅莫多梨婆地梨沙訶 [illegible]

產前將護法

按諸家產論云凡產婦入月切忌飲酒恐產時心神昏亂臨
產之時不可令傍人喧擾大小驚怪恐致驚動心神祗可令
熟事產婆及穩審謹卓老成親密三兩人扶侍產母初覺腹
痛且宜任意坐卧勉強飲食恐致臨產氣力虛羸若腹痛漸
甚唯且熟忍仍可按節次漸服滑胎枳白皮散一二服服藥
之法慎勿太早須得其時又傍人不得逼迫且須令人扶策
徐徐而行若行步稍難即凭物而立須臾扶策再行直至腹
痛連腰相引作陣痛頻即服催生丹一服更且勉強扶行陣
痛轉甚難以忍認是產時將至即服催生符藥然後安詳上
草上產之時慎勿傷早若太早則子在腹中難以轉側又須
子細候直待兒頭欲生然後令抱腰也抱腰之人不得傾
斜則兒得順其理自然易產也又有卧產者亦待臥定背平
著席體不傴曲則子不失其道若或不能依此節適必致產
難或華貨必須變生諸疾

產後將護法

按經云婦人非止臨產須憂至於產後大須將息若以產
時無他乃縱心恣意無所不犯犯時微若秋毫感病重於嵩
岱且纔得分免切忌問是男是女看血下多少須證服藥蓋
遲藥良久嬰兒服四順理中圓便令人從心下按至臍腹日
伍七次若有疾苦即隨證服藥粥藥相間頻頻服餌且宜閉
目而坐背後倚物左右看承常令直立兩膝雖時眠睡頻令
喚覺過一復時方得上床亦須立膝高倚床頭厚鋪裀褥遮
圍四向勿令孔隙恐賊風一臘之內常聞醋煙以防運悶
一臘之後漸加滋味或以羊肉及雌雞煮取濃汁作糜粥食
至百晬常服當歸圓當歸建中湯四順理中圓日各一服
以養藏氣補血脉所減之後方得食糜爛肉食滿月之內尤
忌任意飲食觸冒風寒恣情喜怒梳頭用力高聲作勞工巧
之類及上圊便溺如此節養將攝以至百晬始得氣血和調
腑藏平復設不依此即致產後餘疾

胎神

正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	
床	戶	門	竈	舶	碓	方	廁	門	戶	竈	床	所直方位忌修造主損胎

催生符

右件符用水飛朱砂書之貼於房內北壁上遇坐草之時剝
於針上就燈燒之不得飛揚溫水調服

推婦人行年法

生氣方 產婦宜向之坐卧及向之開門大吉
反支月 遇此月內產婦 [illegible]
八莊方 產婦不得向之大吉
絕命方 不得於向之大凶 [illegible]
懸尸日 遇此日產不得攀繩 [illegible] 大凶
閉肚方 [illegible]
禍害月 向之大小便避之大吉

逐一排行年吉凶方于後按右件七神詳所吉凶

年歲	產母宜著衣	生氣方	禍害方	絕命方	閉肚方	八壯方	反支月	懸尸日
十三歲庚申	西南黃衣	坤	離	巽	辛	甲	正七	辰戌
十四歲己未	正南赤衣	離	坤	兌	壬	癸	二八	卯酉
十五歲戊午	正北黑衣	坎	乾	艮	癸	壬	三九	寅申
十六歲丁巳	正東青衣	震	艮	乾	甲	辛	四十	丑未
十七歲丙辰	東北黃衣	艮	震	坎	乙	庚	五十一	子午
十八歲乙卯	西北黑衣	乾	坎	震	丙	丁	六十二	巳亥
十九歲甲寅	正西白衣	兌	巽	離	丁	丙	正七	辰戌
二十歲癸丑	東南黃衣	巽	兌	坤	庚	乙	二八	卯酉
廿一歲壬子	西南黃衣	坤	離	巽	辛	甲	三九	寅申
廿二歲辛亥	正南赤衣	離	坤	兌	壬	癸	四十	丑未
廿三歲庚戌	正北黑衣	坎	乾	艮	癸	壬	五十一	子午
廿四歲己酉	正東青衣	震	艮	乾	甲	辛	六十二	巳亥
廿五歲戊申	東北黃衣	艮	震	坎	乙	庚	正七	辰戌
廿六歲丁未	西北白衣	乾	坎	震	丙	丁	二八	卯酉
廿七歲丙午	正西白衣	兌	巽	離	丁	丙	三九	寅申
廿八歲乙巳	東南青衣	巽	兌	坤	庚	甲	四十	丑未
廿九歲甲辰	西南黃衣	坤	離	巽	辛	乙	五十一	子午
三十歲癸卯	正南赤衣	離	坤	兌	壬	癸	六十二	巳亥
卅一歲壬寅	正北黑衣	坎	乾	艮	癸	壬	正七	辰戌
卅二歲辛丑	正東青衣	震	艮	乾	甲	辛	二八	卯酉
卅三歲庚子	東北黃衣	艮	震	坎	乙	庚	三九	寅申
卅四歲己亥	西北白衣	乾	坎	震	丙	丁	四十	丑未
卅五歲戊戌	正西白衣	兌	巽	離	丁	丙	五十一	子午
卅六歲丁酉	東南黃衣	巽	兌	坤	庚	乙	六十二	巳亥
卅七歲丙申	西南黃衣	坤	離	巽	辛	甲	正七	辰戌
卅八歲乙未	正南赤衣	離	坤	兌	壬	癸	二八	卯酉
卅九歲甲午	正北黑衣	坎	乾	艮	癸	壬	三九	寅申
四十歲癸巳	正東青衣	震	艮	乾	甲	辛	四十	丑未
四十一歲壬辰	東北黃衣	艮	震	坎	乙	庚	五十一	子午
四十二歲辛卯	西北黃衣	乾	坎	震	丙	丁	六十二	巳亥
四十三歲庚寅	正西白衣	兌	巽	離	丁	丙	正七	辰戌
四十四歲己丑	東南黃衣	巽	兌	坤	庚	乙	二八	卯酉
四十五歲戊子	西南黃衣	坤	離	巽	辛	甲	三九	寅申
四十六歲丁亥	正南赤衣	離	坤	兌	壬	癸	四十	丑未
四十七歲丙戌	正北黑衣	坎	乾	艮	癸	壬	五十一	子午
四十八歲乙酉	正東青衣	震	艮	乾	甲	辛	六十二	巳亥
四十九歲甲申	東北黃衣	艮	震	坎	乙	庚	正七	辰戌

逐日產母生子宜向方

子午卯酉日宜向南方

辰戌丑未日宜東南方

寅申巳亥日宜向西北方

逐月產母忌向方 忌日下兩方生產

月	雷公	招搖	咸池	軒轅大時	豐隆吳時	白虎	狂虎	天獄	天狗	夫人	力士運鬼
正	寅	寅	辰	卯	辰	戌	午	申	辰	酉	艮
二	亥	卯	丑	子	未	亥	酉	巳	巳	戌	乾
三	申	辰	戌	酉	戌	子	子	寅	午	亥	坤
四	巳	巳	未	午	丑	丑	卯	亥	未	子	巽
五	寅	午	辰	卯	辰	寅	午	申	申	丑	艮
六	亥	未	丑	子	未	卯	酉	巳	酉	寅	乾
七	申	申	戌	酉	戌	辰	子	寅	戌	卯	坤
八	巳	酉	未	午	丑	巳	卯	亥	亥	辰	巽
九	寅	戌	辰	卯	辰	午	午	申	子	巳	艮
十	亥	亥	丑	子	未	未	酉	巳	丑	午	乾
十一	申	子	戌	酉	戌	申	子	寅	寅	未	坤
十二	巳	丑	未	午	丑	酉	卯	亥	卯	申	巽
	犯之主兒癲癇	犯之主兒驚	犯之主兒啼	犯之主兒肚脹	犯之主兒驚	犯之主兒驚	犯之主兒攣	犯之主兒臚脹	犯之主兒口瘡	犯之主兒嘔吐	與諸曆書不載

藏胎衣吉方 出產須曆

月	天德	月德	月空	生氣
正	丁	丙	壬	子
二	坤	甲	庚	丑
三	壬	壬	丙	寅
四	辛	庚	甲	卯
五	乾	丙	壬	辰
六	甲	甲	庚	巳
七	癸	壬	丙	午
八	艮	庚	甲	未
九	丙	丙	壬	申
十	乙	甲	庚	酉
十一	巽	壬	丙	戌
十二	庚	庚	甲	亥
	宜藏胎衣吉	宜藏胎衣吉	宜安產室上吉	宜藏胞衣吉

逐日日遊神

癸巳甲午乙未丙申丁酉 在房內北　庚子辛丑壬寅 在房內南

癸卯 在房內西　甲辰乙巳丙午丁未 在房內東　六戊六己 在房內中央

餘日 在房外吉

增註太平惠民和劑局方卷之九

太平惠民和劑局方卷十

治小兒諸疾 外有治嬰孺諸方互見各類

[illegible] 治小兒諸風頻搐潮發，瘛瘲搐搦，口眼相引，項背強直，牙關緊急，目睛上視，及諸病久虛變生虛風，多睡昏困，荏苒不解，速宜服之

[illegible]

當歸 　烏犀 　乾姜 炮
白朮 　人參 去蘆 　木香 不見火 　枳殼 去瓤麩炒
丁香 不見火 　厚朴 　藁本 去土 　茯苓 去皮
敗龜 　荊子 去白 　桑螵蛸 　天竺黃 細研
白芷 　虎骨 　殭蠶 　何首烏 　縮砂仁 各三分
麻黃 去根節 　麝香 別研 　羌活 去蘆 　羚羊角
半夏 　川烏頭
防風 去蘆 　白花蛇 　白殭蠶
檳榔 　白附子 　天南星 　肉桂 去粗皮
藿香 　阿膠 　萆薢 　烏蛇
細辛 去苗 　陳皮 去白 　桃膠 　天麻
沉香 不見火 　乾蝎 　獨活 去蘆 　肉豆蔻
朱砂 研飛 　石斛 去根 　雄黃 水飛研
牛黃 別研 　龍腦 別研 　水銀 　附子
蟬殼 去土 　川芎 　烏鴉 　膩粉
狐肝 　硫黃 　金箔 為衣

右如法修事，搗研令細，煉白蜜合和入酥，再搗叁伍仟下，圓如梧桐子大。每壹歲兒服壹圓，溫薄荷自然汁化下，不計時候。

[illegible] 治小兒急慢驚風，天吊撮口，心驚搐搦，手足瘛瘲，壯熱昏塞不省

青黛 研 　蟾酥 　乾蝎
麝香 　白附子 　天南星

右件細研令勻，以粟米粥和圓如菉豆大，別以青黛為衣。每服乙圓，荊芥薄荷湯化下。後困睡無疑，但有患者，先化半圓滴入鼻中，嚔噴者必差。一本不用天南星

[illegible] 治小兒驚風壯熱，精神昏憒，嘔吐痰涎，驚悸恍惚，或發瘛瘲，目睛上視

甘草 炒 　天麻 去蘆 　朱砂 研飛 　天南星 牛膽製
牛黃 乙分 研 　膩粉 研 　雄黃 研飛 各乙分 　天漿子
銀箔

右為細末，入研藥勻，煉蜜為圓如豌豆大，以銀箔為衣。每服壹圓，壹歲兒服壹圓，薄荷湯化下。疾證未退，可再服之。更量兒大小加減，乳食後服。

太一銀朱丹 治小兒驚風壯熱，涎盛發搐，手足搐搦，目睛上視，及風涎壅實，心膈滿悶，嘔吐痰涎，大便秘澀

黑鉛 　水銀 　鐵粉 各二兩 　甘草 　天南星
朱砂 　膩粉 乙兩 研

右同研勻，以麵糊為圓如麻子大。每壹歲兒服壹圓，用薄荷蜜湯下，微利為度，未利再服。乳食後。

[illegible] 治小兒驚風壯熱，多睡驚悸，神昏憒，痰涎壅塞，手足搐搦，目睛上視，項背強硬，牙關緊急

使君子 　膩粉 各壹分 　胡黃連 　蟾酥 　青黛 細研
麝香 細研 　天漿子 七個

右合研勻，以白麵糊為圓如小豆大。每服乙圓，煎金銀薄荷湯化下。伍歲已上可服貳圓。更量兒大小虛實加減，不計時候。

[illegible] 治大人小兒風壅痰實，心膈不利，口乾煩渴，睡臥不安，及中暑頭痛躁渴[illegible]

麝香(貳兩半) 朱砂(研飛乙伯兩) 牙硝(枯研乙伯弍拾伍兩)
寒水石粉(壹伯壹拾兩) 甘草(炙為末叁伯兩)

右合研勻煉蜜搜和每壹兩貳錢作拾圓大人溫生薑水化下壹丸如治中暑入生龍腦少許同研細新水化下小兒壹圓分肆服更量大小加減又治小兒腑臟積熱心神不寧夜卧狂叫口舌生瘡用薄荷自然汁化下並食後服

定命丹 治一切驚風天吊目睛上視手足搐搦狀候多端用藥壹圓用溫水化滴鼻中令噴嚏參伍次更用薄荷湯下貳圓即愈如久患五疳腹脹頭大四肢瘦小好喫泥土可思妳食愛咬指甲時撏眉毛頭髮稀踈肚上青筋及久患瀉痢並用米飲下貳圓如久患疳蛔咬心發歇疼痛並以苦楝子煎湯下貳圓如鼻下赤爛口齒疳蟲并口瘡等用兒孩子妳汁研貳圓塗在患處疳眼雀目用白羊子肝壹枚以竹刀子批開入藥貳圓在內以麻線纏定用淘米泔煮熟空心食之仍令乳母常忌毒魚大忌雞鴨豬肉等

能膽([illegible]) 蘆薈(研) 膩粉(研) 朱砂(研飛各乙兩)
麝香(各中分) 蟾酥([illegible]) 龍腦(研) 鉛霜(各[illegible])
雄黃(研飛) 青黛(研) 胡黃連(各半) 白附子([illegible])
水銀(乙錢[illegible]同研)

右為末入研藥勻用熬過獖豬膽汁浸蒸餅為圓如黃米大湯使如前此藥退驚治風化蟲殺疳除百病進乳食若隔三兩日進壹服永無百病不染橫夭之疾凡有患與服必功効

定吐救生丹 治小兒伏熱生涎心膈煩躁壯熱霍亂乳食不下嘔噦噁心或發吐逆

山大戟([illegible]末乙伯伍兩) 乳香(別研) 丁香(為末各伍兩)
粉霜(研) 膩粉(研各兩半) 龍腦(研乙兩半) 水銀
黃蠟 黑鉛(各乙伯[illegible]兩半)

右件合研令勻每錢臈壹兩入蜜貳錢半和為圓如黃米大

[illegible]歲兒服壹圓如頻躁研生脂麻馬齒水下如吐逆煎丁香馬齒湯下更量虛實加減食後臨卧服之此藥除熱化涎下膈止吐逆若胃虛傷冷嘔吐不止者不可服凡小兒吐逆宜速療之久不止遂為慢驚常宜收此藥備急

五福化毒丹 治小兒蘊積毒熱驚惕狂躁頰赤咽乾口舌生瘡夜卧不寧譫語煩渴頭面身體多生瘡癤

桔梗([illegible]) 玄參(洗焙各陸兩) 青黛(研) 牙硝(枯各貳兩)
人參([illegible]兩) 茯苓(去皮各伍兩) 甘草([illegible]兩半) 銀箔(八片為衣)
麝香(研[illegible]) 金箔(八片為衣)

右為細末入研藥勻煉蜜為圓每兩作拾貳圓每壹歲兒壹圓分肆服用薄荷水化下及瘡疹後餘毒上攻口齒涎血臭氣以生地黃自然汁化壹圓用雞翎掃在口內熱疳肌肉黃瘦雀目夜不見物陳粟米泔水化下食後臨卧服

保命丹 治小兒蘊積邪熱潮熱不除頰赤口乾心膈煩躁痰涎不利睡卧不安或發驚癇涎潮搐搦又療積滯不消下利多日腹中疼痛煩渴嘔噦服藥調和不能愈者並可服之

巴豆([illegible]乙兩[illegible]) 膩粉([illegible]) 牛黃(研) 龍腦(研)
麝香(研) 辰砂([illegible]兩) 金箔([illegible])

右合研勻煉黃蠟陸兩入白沙蜜叁分同煉令勻為圓如菉豆大每服貳圓金銀薄荷湯下更量歲數加減如驚癇搐搦用龍腦膩粉蜜湯下服藥先以冷水浸少時服之見効尤速

大天南星圓 治小兒急慢驚風涎潮發搐目睛上視口眼相引牙關緊急背脊強直精神昏塞連日不省

龍腦(研) 牛黃(研) 乳香(各研一分) 天南星(牛膽製者[illegible]兩)
人參 天麻(去蘆) 防風(各壹分去蘆) 朱砂(研[illegible])
乾蠍([illegible]) 麝香(乙分半)

右件研杵令勻煉蜜和圓如大雞頭大每服壹圓用荊芥薄荷湯化下量兒大小以意加減服不計時候

【五疳保童圓】治小兒五疳蓋甘肥肉輕軟腸胃微細若乳哺有節則臟腑相調或乳母寒温失理飲食無常附飽喜怒及小兒百晬以後五歲以前乳食漸多不擇生冷好餐肥膩甘酸之物即成五疳一曰肝疳其候搖頭揉目白膜遮睛流汗遍身合面而卧目中澀癢肉色青黄髮立頭焦筋青腦熱腹中積聚下痢頻多久而不痊轉甚羸瘦二曰心疳其候渾身壯熱吐痢無常頰赤面黄胸膈煩滿鼻乾心躁口舌生瘡痢久不痊多下膿血有時盜汗或乃虛驚三曰脾疳其候腹多筋脉喘促氣麤乳食不多心腹脹滿多啼欬逆面色萎黄骨立毛焦形枯力劣胸膈壅悶水穀不消口鼻常乾好喫泥土情意不悅愛暗憎明腸胃不和痢多酸臭四曰肺疳其候欬嗽氣逆皮毛乾焦饑瀉多啼咽喉不利揉鼻咬甲壯熱憎寒口鼻生瘡唇邊赤癢腹內氣脹乳食漸稀大腸不調頻頻泄痢糞中米出皮上粟生五曰腎疳其候肌肉消瘦齒斷生瘡寒熱作時口鼻乾燥腦熱如火脚冷如氷吐逆既增乳食減少瀉痢頻併下部開張肛門不收疳瘡痒痛已上疾狀並皆治療

黄連去鬚 白鱔頭炙令焦黄，無，即以乾者代 草龍膽去芦
雄黄研飛 青橘皮去瓤 五倍子 夜明砂微炒
蟾頭乙枚炙令焦黄色 苦楝根 天漿子微炒 胡黄連
麝香 青黛研 熊膽研 蘆薈各研乙分

右爲細末都研令勻用糯米飯和圓如麻子大每服乙圓兒壹周不計時候温米飲下日進叁服尤妙（一方有蝸牛微炒乙分）

【退驚圓】殺疳退驚治壯熱昏情嘔吐痰涎頰赤面黄鼻乾目澀有時盜汗或即虛驚搐搦不除乳食不進

熊膽研 胡黄連 使君子去殼麵裹煨 天漿子麩炒各壹个
青黛乙錢研 寒食麪炙乙分 麝香乙分研 細墨燒乙分

右件壹處同研勻用白麪糊和圓如黍米大每服伍圓至柒圓米飲下不計時候

【[illegible]圓】治小兒驚風壯熱痰涎壅滯精神昏憒睡多驚啼或發搐搦目睛直視

茯神去木 天麻去苗 膩粉研 天竺黄研
胡黄連炒各五錢 朱砂研飛貳兩 麝香研 白附子炮各叁兩
天南星炮叁兩 青黛研半兩 使君子仁乙百 天漿子微炒四十个

右爲細末以麪糊爲圓如梧桐子大每壹歲兒服乙圓薄荷湯化下更量虛實加減乳食後服

【天麻防風圓】治一切驚風身體壯熱多睡驚悸手足抽掣精神昏憒痰涎不利及風濕邪熱並宜服之

白殭蠶去絲嘴炒 乾蝎各半兩 天麻去苗 防風去苗
人參各乙兩 朱砂研飛 雄黄研 麝香研
甘草炙乙分 牛黄乙分

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服壹圓至貳圓薄荷湯化下不拘時候

【化蟲圓】治小兒疾病多有諸蟲或因腑藏虛弱而動或因食甘肥而動其動則腹中疼痛發作腫聚往來上下痛無休止亦攻心痛叫哭合眼仰身撲手心神悶亂嘔噦涎沫或吐清水四肢羸困面色青黄飲食雖進不生肌膚或寒或熱沉沉嘿嘿不的知病之去處其蟲不療則子母相生無有休止長一尺則害人

胡粉炒 鶴虱去土 檳榔 苦楝根去浮皮各五十兩
白礬枯各十二兩半

右爲末以麪糊爲圓如麻子大乙歲兒服伍圓温漿水入生麻油壹兩點打勻下之温米飲下亦得不拘時候其蟲細小者皆化爲水大者自下

【消積丸】治乳食不消心腹脹滿壯熱喘粗嘔吐痰逆腸鳴泄瀉米穀不化或下利赤白腹痛後重及食癥乳癖痃氣痞結並宜治之

代赭石燒醋淬 當歸去蘆焙炒 朱砂研飛 枳殼去瓤麩炒黄

木香各半兩 麝香乙分研 巴豆霜一分
右件藥搗羅爲末入研藥勻麪糊圓如麻子大每壹歲兒
服壹圓溫米飲下更量虛實加減服之食後服
金箔鎮心圓治小兒風癎痰熱心神不寧驚悸煩渴唇焦頰赤
夜臥不安譫語狂妄
紫河車用黑豆煑軟切焙 山梔子仁 牙硝
甘草炙 人參去蘆 茯苓 朱砂
龍腦 麝香 金箔
右爲細末煉蜜爲圓每壹兩半作伍十圓以金箔爲衣每服
壹圓薄荷湯化下含化亦得食後臨卧常服安鎮心神散
邪熱涼咽膈止驚啼
[illegible]金圓治小兒驚風壯熱喘急涎嗽心忪頰赤大小便不利夜
臥不穩
滑石 膩粉 青黛研 天南星炮
巴豆去皮心膜出油
右爲細末以麪糊爲圓如麻子大每服壹歲壹圓薄荷溫水
下如急驚風頭熱足冷口禁面青筋脈抽掣上膈頑涎痰壯
甚者加壹兩圓煎桃符湯下疏利下蘊毒熱涎立便安愈小
兒瘡疹後餘毒不解宜與服食後
[illegible]連圓治小兒冷熱不調泄瀉煩渴米穀不化腹痛腸鳴或下
痢膿血裏急後重夜起頻併不思乳食肌肉消瘦漸變成疳
白石脂 龍骨 乾薑 黃連去鬚
白礬枯各半兩
右件藥搗羅爲末醋煑麪糊和圓如麻子大每壹歲兒服十
圓米飲下乳食前服如煩渴煎人參湯下更量兒大小以意
加減日叁併服
[illegible]消圓治乳哺失節宿滯不化胸膈痞滿嘔吐惡心便利不調
乳食減少又治傷寒溫壯內挾冷實大便酸臭乳食不消或已
得汗身熱不除及變蒸發熱多日不解因食成癎先寒後熱
代赭石 赤石脂
杏仁 巴豆
右合研勻湯浸蒸餅圓如黃米大兒生叁十日外可服壹圓
壹歲至叁歲並服貳圓至叁圓乳汁送下米飲亦得微利爲
度亦不虛人未利再服更量虛實加減乳食後服
[illegible]圓治小兒臟腑怯弱內受風冷腹痛脹滿腸鳴泄利或青
或白乳食不化又治臟冷夜啼胎寒腹痛
白芍藥 麝香 人參 木香
蓬莪朮 白朮 當歸
右件搗羅爲末都研令勻湯浸蒸餅和圓如黍米大每服十
伍圓溫米飲下新生兒腹痛夜啼可服伍圓並乳食前服
沒石子圓治小兒腸虛受熱下痢鮮血或便赤汁腹痛後重晝
夜不止遍數頻多
沒石子 地榆各半兩 黃蘗 黃連
酸石榴皮
右件搗羅爲細末以醋煑麪糊和圓如麻子大每服拾圓至
貳拾圓溫米飲下食前服
[illegible]圓治小兒驚風壯熱涎盛喘急或發搐搦目睛上視
及因乳哺不節胃滿嘔逆精神迷悶發癎瘛瘲並宜服之
黃明膠 膩粉 乾蝎
百草霜研 牛黃研 鉛霜研 青黛研
巴豆 黑鉛 水銀各乙兩 香墨
右爲細末入研藥勻以陳粟米飯爲圓如菉豆大捏褊每壹
歲兒服壹圓貳歲服貳圓叁歲服叁圓肆歲已上服肆圓用
乾柿湯下薄荷湯亦得更量虛實加減服利下青粘滑涎爲
度乳食後服此藥不得化破
[illegible]圓治驚化涎涼膈鎮心祛邪熱止痰嗽

原缺

蛤粉 牙硝（枯研） 朱砂（各研飛） 人參（貳拾五兩）
雄黃（研飛十五兩） 龍腦（研） 甘草（五拾兩） 金箔 銀箔（各…）
右為細末煉蜜搜和每壹兩捌錢作貳十圓以金箔銀箔為
衣壹歲兒每服如菉豆大薄荷溫水化下量歲數臨時加減
服之食後

金箔鎮心丸 治小兒心經邪熱頰赤多渴睡臥不寧譫語狂妄
痰涎不利精神恍惚及大人痰熱壅積心膈煩躁咽喉腫痛口
舌生瘡
牙硝（枯研） 鐵粉（各研半兩） 甘草（炙貳兩） 龍腦（研一分）
辰砂（研飛） 蛤粉（八兩） 人參（乙兩） 金箔（大二十片為衣）
右為細末煉蜜搜和每壹兩半作貳拾丸捏褊用金箔為衣
每服半皂子大大人壹圓分作兩服並用薄荷湯化下食後
臨臥服

[illegible]散 治小兒寒壅相交肺氣不利欬嗽喘急語聲不出
痰涎壅塞胸膈煩滿鼻塞清涕咽喉乾痛
貝母（去心麩炒） 杏仁（湯浸去皮尖麩炒） 麻黃（去根節）
人參（去蘆各貳兩） 阿膠（麩炒令黃燥） 桔梗（各半兩） 陳皮（乙兩）
甘草（炙乙兩）
右同杵羅為麁末每服壹錢水捌分煎六分去滓溫服食後

惺惺散 治小兒風熱瘡疹傷寒時氣頭痛壯熱目澀多睡咳嗽
喘粗鼻塞清涕
栝蔞根 人參 細辛（去葉） 茯苓（去皮）
白朮 甘草（炙） 桔梗（各乙兩半）
右件同杵羅為末每服壹錢水乙小盞入薄荷三葉同煎至
四分溫服如要和氣即入生薑煎服不計時

人參羌活散 治小兒寒邪溫病時疫瘡疹頭痛體疼壯熱多睡
及治潮熱煩渴痰實欬嗽
柴胡（去苗） 人參（去蘆） 芎藭 獨活（去蘆）

原缺

柴胡（去苗） 枳殼（去瓤麩炒）
右各等分搗為麁末每服貳錢水壹盞入青蒿少許煎至六
分去滓溫服食後兒小即分為二服

[illegible] 治小兒血脈壅實腑臟生熱頰赤多渴五心煩躁睡
臥不寧四肢驚掣及因乳哺不時寒溫失度令兒血氣不理腸
胃不調或溫壯連滯欲成伏熱或壯熱不歇欲發驚癇又治風
熱結核頭面瘡癤目赤咽痛瘡疹餘毒一切壅滯並宜服之
當歸（去蘆） 甘草（炙） 大黃（蒸焙） 赤芍藥
右等分為麁末每服壹錢水壹中盞煎至柒分去滓溫服量
兒大小虛實加減微溏利為度食後臨臥服

[illegible] 治大人小兒腑臟積熱煩躁多渴舌頰生瘡咽喉腫
痛面熱口乾目赤鼻衄丹瘤結核癰瘡腫痛又治伏暑躁熱瘡
疹餘毒及大便下血小便赤澀
川鬱金 甘草 大梔子仁
連翹 雄黃（飛研） 栝蔞根（十片）
右為細末每服乙大錢食後臨臥用新水調服小兒半錢
時更量兒大小以意加減

朱砂[illegible] 鎮心神化痰涎利咽膈止煩渴
鵬砂（研乙分） 朱砂（研飛） 麝香（研） 梅花腦（各半兩）
腦子（研） 牙硝（各壹兩） 甘草（五斤） 寒水石（兩）
右研勻用甘草膏和每兩作壹百圓每服一圓含化小兒夜
多驚啼薄荷水化下

[illegible] 治疳氣羸瘦面色萎黃腹脇脹滿頭髮作穗揉鼻咬甲
好喫泥土利色無定寒熱往來目澀口臭齒斷爛黑常服長肌
退黃殺疳虫進乳食
大皂角 乾蝦蟆 朱砂（研飛）
青黛（研乙分） 蘆薈（研） 麝香（研各乙分）
右合研勻用湯浸蒸餅和為圓如麻子大每三二歲兒服一二十

溫米飲下乳食前服

太一丹治小兒諸風驚癇潮發搐搦口眼相引項背強直精神昏困痰涎不利及一切虛風並皆治之

天南星炮 烏蛇酒浸 天麻去蘆 附子炮去皮臍

麻黃去根節各半兩 乾蝎微炒一分半 白附子炮三分 白殭蠶去絲嘴炒四分

已上為細末以水一升浸三日以寒食麪一斤拌勻踏作麴須六月六日以楮葉罨七日取出逐片用紙袋盛掛當風十四日可用每麴末一兩入下項藥

琥珀研乙分 辰砂研飛六分 雄黃研飛三分 甘草炙為末一分

右合研勻煉蜜和圓如雞頭大每服一丸溫水化下不計時

太[illegible]圓治驚風諸癇壯熱昏憒神志恍惚痰涎壅塞或發搐搦目睛直視並皆治之

蛇黃火煅醋淬九次研飛 青礞石研乙分 朱砂研飛三分

蝦蟆灰 雄黃各乙分半 鐵粉研二分半

右研勻以水浸征餅丸如桐子大每服一丸煎薄荷水磨剪刀股化下日二三服此藥治驚化涎不用銀粉小兒藏腑口齒觸胃柔弱先用銀粉藥切須慎之則無他苦

[illegible]丹治小兒驚邪風熱痰壅咽膈利夜卧不安睡中啼哭驚風搐搦

蛇黃火煅醋淬研飛 天南星為末用薄荷汁和為餅炙熟

茯苓去皮 鐵粉重羅 使君子仁

已上伍味搗羅為末各秤半斤

腦子別研半兩 麝香別研乙兩 銀箔研 金箔研各乙伯片

右前項伍味藥末入後項研藥拌勻糯米糊為丸如皂莢子大朱砂為衣用薄荷湯磨下伍歲兒一丸分二服三歲已下兒一丸分三四服更量無數加減常服安神鎮心定驚控痰

大[illegible]子[illegible]治小兒五疳脾胃不和心腹膨脹時復疠痛不進飲食漸致羸瘦並宜服之

厚朴去粗皮薑汁炙 陳皮去白 川芎各乙兩 使君子仁炮一兩

右為細末煉蜜圓如皂子大三歲已上壹粒已下半粒陳米飲化下大治小兒腹痛

[illegible]四君子[illegible]治小兒吐瀉不止可進乳食常服調胃進食

白扁豆蒸熟焙乾 藿香葉 甘草炙 黃芪去苗各乙兩

人參 茯苓去皮 白朮各四兩

右為細末每服一錢入鹽點服或用水七分盞煎伍分溫服

消[illegible]圓治證并方見前積熱類

肥兒圓治小兒疳病者多因闕乳食也太早所致或因久患臟腑胃虛蟲動日漸羸瘦腹大髮豎不能行步面黃口臭發熱面無精神此藥殺蟲進食

神麯炒 黃連去鬚各十兩 肉豆蔻麪裹煨 史君子去皮

麥蘖炒各五兩 檳榔不見火細剉二十個 木香二兩

右為細末豬膽為丸如粟米大每服三十丸量歲數加減熟水下空心服

寶[illegible]丹治小兒胎驚內吊腹肚堅硬目睛上視手足抽掣手角弓反張但是涎痰壅盛一切急慢驚風悉皆治之

全蝎十四個 白附子 天南星炮 白殭蠶直者炒

朱砂研 麝香研各一分 防風去蘆叉 天麻各一錢

金箔十片 蟬蛻去土乙分

右為細末入研藥和勻以粳米爛飯取中心軟者搜為丸每兩作四十丸初生兒半丸乳汁化下周歲兒一丸金銀薄荷湯化下十歲已上有急候者二丸薄荷湯化下常服鎮心安神化痰除一切驚風諸候

[illegible]圓治小兒脾胃不和宿滯不化腹脹腸鳴嘔噦惡心便利不調乳食減少或疳瀉積瀉大便酸臭亦治丈夫婦人胸膈不快酒積食積嘔噦惡心吐瀉脾疲

京三稜炮 丁皮不見火各三兩 丁香不見火 青皮去白各二兩

乾薑炮　巴豆各二分半去皮膜油
右件爲細末入巴豆拌勻麪醋糊爲丸如粟米大每服五十丸至六十丸二歲兒可服廿丸至十九生薑湯吞下熟水亦得不拘時候更量兒歲數加減與之此藥不用大黃硇砂粟粉之類並是性溫之藥常服消積滯進乳食退黃長肌

[illegible] 治小兒傷風鼻塞清涕酒調塗顖門上不可服方見諸風類同

助胃膏 治小兒胃氣虛弱乳食不進腹脇脹滿腸鳴泄瀉𠻳乳便青或時夜啼胎寒腹痛

白豆蔻仁　肉豆蔻煨　丁香　人參
木香各一兩　白茯苓去皮　官桂去麤皮　白朮
藿香葉　縮砂仁　甘草炙各二兩　橘紅去白
山藥各四兩

右爲細末煉蜜和成膏每服如雞頭實大一丸量兒大小加減米飲化下不拘時候

觀音散 治小兒外感風冷內傷脾胃嘔逆吐瀉不進乳食久則漸漸羸弱大抵脾虛則瀉胃虛則吐脾胃俱虛吐瀉不已此藥大能溫養脾胃進美飲食方見全嬰類吐瀉門

人參乙兩　茯苓乙分半　神麴炒一　石蓮肉乙分炒去心
綿黃耆　白芷　木香炮　白扁豆炒去皮黃去心各
甘草一分炙各

右爲細末每服一錢水一小盞棗一枚藿香三葉煎四分去滓溫服量兒大小加減

小抱龍丸 治傷風瘟疫身熱昏睡氣粗喘滿痰實壅嗽及驚風潮搐蠱毒中暑並可服之壯實小兒宜與服之

天竺黃乙兩　雄黃二分水飛　辰砂別研　麝香半兩別研各
天南星臘月釀牛膽中陰乾百日者如無只以生者去皮臍剉炒熟用四兩

右爲細末煮甘草水和丸如皂子大每服一丸溫水化下百晬內者作三服或用臘雪水煮甘草和藥尤佳

釣藤膏 治小兒胎寒胃冷腹肚疙痛夜間啼哭嘔吐乳食大便瀉青狀若驚搐時有冷汗

姜黃一分　沒藥別研　木香　乳香各四錢別研

右爲細末煉蜜和成膏每服三錢兒一丸如雞頭實大煎釣藤湯化下更量大小加減不拘時候

[illegible]丸 治小兒五疳入痢乳食不節寒溫調適乖違髮堅毛焦皮膚枯悴脚細肚大頭解胸陷漸覺尫羸時發寒熱盜汗咳嗽腦後核起腹內塊生小便泔濁膿痢瀉青搗指喫土甘酸吐食不化煩渴併頻心神昏瞀鼻赤脣燥小蟲既出蛔蟲咬心痟眼雀目名曰丁奚此藥救療效驗如神

白蕪荑去皮　黃連去鬚　蝦蟆酥炙　胡黃連各一兩半
青黛半兩研

右件碾爲細末猪膽汁麪糊丸如粟米大每服三十丸用飯飲吞下食後臨臥日進二服

高良薑散 治小兒冷傷脾胃不和腹脹氣悶不欲飲食

高良薑　草豆蔻去皮　陳皮去白　當歸酒浸炒
肉桂去粗皮各一分　人參半兩去蘆

右件搗羅爲散三歲兒每服一錢水一盞煎至五分去滓溫服不計時候量兒大小加減服之

人參丸 治小兒乳哺飲冷過度傷冷脾胃腸脇脹滿多吐痰涎

人參　丁香　陳皮去白　乾姜炮
白朮各一分半　半夏湯洗七次半兩

右件搗羅爲末煉蜜和圓如麻子大每三歲小兒服一十丸溫湯下不拘時日二服量兒大小加減

[illegible] 治脾胃氣不和腹脇虛脹不欲乳食困倦無力壯熱增寒並皆療之

訶梨勒皮煨　人參各三分　甘草炙乙分　白朮
茯苓去皮　藿香去梗　陳皮去白
木香

黃芪　桔梗各半兩

右件擣羅為散三歲兒每服乙分水盞入生姜分子大片准棗乙枚同煎至伍分去滓溫服不計時候量兒大小加減

白豆蔻散治小兒脾胃不和增寒壯熱腹痛嘔吐不納乳食

枇杷葉拭去毛炙　白豆蔻去皮　陳皮去白　芎藭　甘草各乙分炙　乾木瓜　人參　黃芪各半兩

右為麁散三歲小兒每服乙分水乙小盞生姜分子三片棗一枚同煎至七分去滓溫服不計時候量兒大小加減

[illegible]治小兒冷熱不調大便青黃心腹多痛或服中氣滿或時嘔逆不欲乳食

白芍藥　當歸炒　人參　芎藭各三分　白朮　甘草炙半兩

右件擣羅為末水煮麵糊圓如麻子大三歲小兒每服拾圓粥飲下日三服更量兒大小加減

厚朴散治小兒外感風冷壯熱增寒痛躰重中寒氣逆嘔吐惡心或手足厥冷及脾胃不和並皆治之

蒼朮米泔浸炒　厚朴去皮姜汁炙　陳皮去白各乙兩　乾薑炮半分　甘草半兩炙

右件為細末每歲小兒每服一分水乙小盞入生姜分弍片棗子乙枚同煎至伍分濾去滓熱服

[illegible]治小兒傷寒壯熱頭痛躰疼口乾煩渴

石膏　黃芩　甘草　赤芍藥　葛根各乙兩　麻黃去根節　柴胡去苗各半兩

右擣羅為散叁歲小兒每服乙分水乙小盞入生姜少許葱白叁寸豉弍拾粒同煎至伍分濾去滓溫服不計時候汗出為効量兒大小加減

[illegible]治小兒傷寒四肢煩熱頭疼躰痛心躁口乾煩渴

葛根　麻黃去根節　人參各半兩

肉桂去粗皮　甘草各一分

右件擣為麁散三歲兒每服一分水一小盞入生薑少許入棗子壹枚同煎至伍分濾去滓溫服量兒大小加減不計時候

人參散治小兒傷寒作熱常服調順陰陽和養脾胃定吐逆止煩渴　品味與前人參散同

右為散三歲兒每服乙分水一小盞煎伍分溫服量兒大小加減

[illegible]治小兒乳食不節腸胃虛弱冷熱之氣客於腸間下赤白痢腸內疞痛日夜頻併不欲食飲量大小加減服之

黃連去鬚微炒三分　肉豆蔻去殼　訶梨勒各半兩去核　丁香一分　木香

右擣羅為末以粟米粥和圓黍米大三歲兒服十圓粥飲下

[illegible]治小兒冷痢腹痛四肢不和飲食減少漸至羸瘦

訶梨勒炮去核　龍骨　厚朴去皮姜汁炙　當歸各半兩微炒　木香　乾薑炮　白朮各乙分

右擣羅為散三歲小兒每服一分以水一小盞入棗弍枚同煎至伍分去滓溫服食前量兒大小加減

[illegible]治小兒久患赤白痢日夜頻併腹痛羸弱不欲飲食

黃連去鬚微炒　黃蘗　白龍骨　訶梨勒皮炮去核　木香各三分　當歸微炒　乾薑炮　白礬枯研各半兩　胡粉三分微炒黃

右件擣羅為末煉蜜和圓如菉豆大五歲兒每服拾圓溫米飲下日叁服量兒大小臨時加減

[illegible]治小兒下痢後津液減少藏腑虛燥煩渴引飲及治諸痢煩渴引飲無度

烏梅肉微炒半兩　白茯苓　乾木瓜各乙兩

右擣羅為麁散五歲兒每服乙分水乙小盞入生姜分乙片煎至伍分去滓溫服不計時候服量兒大小加減

封囟散治小兒腎氣不成腦髓不足小兒年大骨縫合而不合
頭縫開者是也宜以藥塗之
白及　　栢仁　　防風去蘆　　細辛去葉各乙兩
右為細末每壹分以乳汁調塗在兒顖骨上每日壹次用之
附子散治小兒大腸虛冷肛門脫出多因下痢得之宜以藥傅
附子生去皮　龍骨各乙兩
右搗羅為細散每用壹錢傅在脫肛上按令入頻用之
[illegible]散治小兒因痢後躽氣下推出肛門不入
伏龍肝　　赤石脂各壹分
右件細研為散每用半錢傅腸頭上每日叁上用
[illegible]散治小兒斷臍後為水濕所傷或繃袍濕氣傷於臍中或
解脫風冷乘攻令小兒四肢不和臍腫啼哭不能乳哺宜速治
亂髮燒灰　釜下墨煤　黃蘗末各等分
右件藥同研令細每用少少傅之
紫菀散治小兒欬逆上氣心胷痰壅不欲乳食
紫菀洗去苗　五味子　半夏湯洗七次　甘草炙各五兩
肉桂去麤皮　細辛去苗各壹兩
右件為細末參歲兒每服乙分水乙盞入生姜乙片煎至伍
分去滓溫服不計時候量兒大小加減服
[illegible]散治小兒初生鵝口其舌上有白屑如米屑者鼻外亦有
并不能乳
朱砂細研　白礬枯各等分
右件藥研極細每用少許傅兒舌上每日叁次用之先使亂
髮頻揩舌上垢令淨即差
紫蘇子散治小兒嗽氣未定與乳飲之與氣相逆氣不得下
紫蘇子微炒　蘿蔔子微炒　訶黎勒皮　杏仁去皮尖麩炒黃
人參去蘆　木香各半兩　青皮去白　甘草炙各乙兩
右件搗羅為細散每服壹分以水乙盞入生薑錢少許同煎

至伍分去滓溫服不計時候量兒大小加減
[illegible]人參散治小兒虛熱及吐瀉煩渴不止及踈轉後並宜服
生犀壹兩　人參拾伍兩　茯苓貳兩　甘草炙壹兩
桔梗　乾葛各貳兩
右為細末每服壹大錢水壹中盞入燈心伍莖同煎陸分放
溫服不計時候煩渴者入新竹葉同煎
丁香散治小兒脾胃虛弱腹痛泄瀉不思乳食嘔吐不止因之
神懶心腹膨脹顏色青黃憔悴不醒
丁香不見火　陳皮去白貳兩　甘草炙　訶子炮去核
青皮去白各乙兩
右為細末每服壹大錢水柒分盞煎至伍陸分食前進量大
小加減與服此藥極有神效不可盡述
錢氏白朮散治小兒脾胃久虛嘔吐泄瀉頻併不止津液枯竭
煩渴多躁但欲飲水乳食不進羸困少力因而失治變成風癇
不問陰陽虛實並宜服之
人參　白朮不見火　木香不見火　白茯苓去黑皮
藿香去土梗　甘草炙各乙兩　乾葛貳兩
右為麁末每服壹錢水壹小盞煎至半盞去滓通口服不拘
時更量兒大小加減渴甚者併煎任意飲之
全蝎觀音散治吐瀉與前觀音散同
石蓮肉去心　白扁豆炒　人參各壹兩　神麴炒
全蝎　羌活　天麻去苗　防風去苗
木香炮　白芷　甘草炙　黃芪蜜炙各乙兩
茯苓乙兩半
右為細末嬰兒壹字貳歲半錢伍歲壹錢用水壹盞棗或
半錢棗子半箇或壹箇同煎至柒分去滓服不拘時候
[illegible]至寶丹治小兒一切驚風搐搦壯熱涎多魚口鴉聲眼睛
直視

天南星（炮）　白附子（炮）　雄黃（研）　乾蝎（各半兩）
白殭蚕（去絲嘴炒）　鬱金（各壹兩）　龍腦（研）　麝香（各壹錢半）
辰砂（貳分研）　膩粉（貳錢）　滑石（貳兩末）
右為細末，煉蜜為圓如皂莢子大，金銀箔為衣，每服壹圓，食後臨卧薄荷湯下，常服鎮心神，凉咽膈。

小黃連阿膠圓 治小兒乳食無度，冷熱不調，下痢赤白，或如急膈白多赤少，後重腹痛，煩渴引飲，小便不利，便圓頻數，食減少力。
肉豆蔻　茯苓（去皮）　訶子（炮去核各乙兩）　黃連（去鬚炒各貳兩）
右為細末，用阿膠壹兩，醋煎溶，搜為圓如粟米大，每服壹歲兒拾粒至拾伍、貳拾粒，用温飲下，隨乳亦得，更量歲數加減服，不計時候。

[illegible]圓 治小兒急慢驚風，手足抽掣，眼睛直視，角弓反張，證候危急者。
蛇含石（拾個[illegible]）　鐵胤粉
五靈脂（[illegible]）　神砂（[illegible]）　蝎梢　白附子（炮）
鬱金（各弍兩）　龍腦（半兩研）　麝香（乙兩）　花蛇頭（拾個[illegible]）
右為細末，麪糊為圓如雞頭大，每服壹圓，薄荷自然汁磨，以井花水化開，量兒大小加減與服。

五疳保童圓 治小兒五疳八痢，殺腹藏蟲，疳瘡疳勞，及走馬牙齒昏爛，肚大青筋，此藥大能進食，悅顏色，長肌膚。
麥蘗　使君子（[illegible]）　蕪荑
橘紅（焙）　草龍膽　黃連（[illegible]）
右等分為細末，粟米糊為圓如粟米大，每服貳叁拾圓，空心米飲吞下，不拘時候，量兒歲數加減。

[illegible] 治小兒夾驚傷寒，吐逆壯熱，表裏不解，氣粗喘急，面赤目汗，或狂言驚叫，或不語無汗，及瘾疹遍身赤痒，往來潮熱，[illegible]，[illegible]子餘毒未盡，渾身浮腫，痰涎欬嗽，或[illegible]手足搐搦，眼目上視，及傷風涎喘頭疼，並皆治之。
知母　地骨皮（[illegible]）　赤芍藥　甘草（炙）
石膏　葶藶子　白茯苓（去皮）　杏仁（去皮尖雙仁）
人參　滑石（各半兩）　麻黃（去根節各壹兩半）
右為細末，每服壹錢，麥子煎湯調下，如初生牙兒感冒風冷，鼻塞身熱，噴嚏多啼，每壹字許，並用麥子煎湯下。

[illegible] 治小兒急慢驚風，潮涎搐搦，手足抽掣，心膈煩躁，及痰壅啼哭不寧，帖腹中疞痛。
酸棗仁（去皮炒）　代赭石（[illegible]）　乳香（各壹錢別研）　茯神（去木乙兩半）
朱砂（半兩研水飛）　麝香（壹錢研）
右為細末，煉蜜為圓如雞頭大，每服壹圓，用金銀薄荷湯研下，更量歲數加減與服，常服鎮心安神定志，此藥比他驚藥大不同，温平不冷。

[illegible] 治小兒一切疳痰，皆因寒温不調，乳哺失節，或吹生冷果子粘食等物，脾胃微弱，不能消化，致五藏不利，三[illegible]腹內堅硬如石，或發作寒熱，有如瘧證，不能飲食，漸致羸瘦，急宜服之。
斑猫（[illegible]）　巴豆（去皮[illegible]）
右先將斑猫碾為細末，却入巴豆霜同研令勻，用米糊為圓如小菉豆大，小兒五歲已下每服叁圓，五更初茶湯下，更量歲數虛實加減與服，此藥神妙。

[illegible]圓 治小兒冷熱不調，或乳哺失節，泄瀉不止，或下痢膿血，或赤多白少，腹痛後重，腸胃虛滑，便數頻併，減食困倦，一切瀉痢，並宜服之。
當歸（[illegible]）　訶子（[illegible]）　乾薑（炮）　黃連（[illegible]）
右為細末，用阿膠壹兩叁分，水煎成汁，搜和為圓如粟米大，每壹歲兒服拾粒至貳拾、叁拾粒，温飲下，隨乳亦得，更量歲數加減與服。

[illegible]治小兒百病如搐驚搐搦用麝香飯飲調下[illegible]
用陳米飲調下驚吐不止丁香湯調下大拄倒[illegible]米飲調
下夾驚傷寒薄荷葱白湯調下疳氣肚脹氣急[illegible]百合湯
下渾身壯熱而赤驚叫金銀薄荷湯調下赤白痢不思乳食薑
錢三片棗子三枚煎湯調下吃食不知飢飽不長肌肉炒麥芽
一撮同生薑煎湯調下暴瀉紫蘇木瓜湯調下神形脫言語不
正及大人吐瀉藿香湯調下諸病後無精神少氣力不思食煎
生薑棗湯調下稟受氣怯小兒可每日一服最妙

升麻　知母　甘草炙　白扁豆炒

山藥　人參　茯苓去皮　白朮各等分

右為細末每服壹錢湯使如前常以沸湯點不計時

[illegible]治小兒五疳八痢腹脹面黃肌膚瘦瘁將作寒熱不思
乳食愛喫泥土揉鼻咬甲頭髮作穗不長肌肉多生瘡癬大便
無時小便如泔哯吐乳食痢色無定或喫交妳漸黃漸瘦變成
疳疾並宜服之

蝦蟆　史君子炒　皂角燒存性各[illegible]

青黛[illegible]兩半　龍膽草去蘆[illegible]兩　雄黃[illegible]兩

右為細末入研藥令勻水糊為圓如粟米大每一歲兒七粒
二歲十粒三歲二十粒隨乳下飯飲亦得不計時候

[illegible]治小兒臟腑怯弱內受積冷腸肋脹痛嘔吐痰逆腸鳴
泄瀉日夜頻併四肢困倦面無顏色肌肉消瘦不進飲食及疳
氣羸瘦肚大青筋口乾煩渴小便白濁食不生肌或發虛腫寒
熱往來或因食甘肥蟲動作痛叫哭合眼並能治之

乾漆炒　丁香[illegible]　青皮去白　京三稜[illegible]

蓬朮半斤

右為細末水糊為圓如粟米大每一歲兒可服五圓炒薑湯
吞下不拘時候更量歲數虛實加減與之

[illegible]治疳病發熱

龍膽草去蘆　黃連[illegible]炒　青皮去白　史君子[illegible]炒

右等分為細末豬膽汁和為圓如[illegible]子大每服二十粒以
意加減臨卧熟水下

諸湯

[illegible]治一切冷氣心腹脹滿胸膈痞滿噫逆嘔吐泄瀉虛滑
水穀不消困倦少力不思飲食

丁香枝杖[illegible]斤　甘草[illegible]乙斤　白麵[illegible]斤　肉豆蔻仁[illegible]斤

右炒鹽拾叁斤同為末每服壹錢沸湯點服食前

[illegible]治胸膈痞塞心腹刺痛脇肋脹滿飲食減少噫氣吞酸
嘔逆噎悶一切氣疾並皆治之

木香　青皮各[illegible]斤　薑黃

甘草炒　鹽炒各乙斤　蓬朮[illegible]斤　蓼蘗[illegible]各五斤

右為末每服壹錢沸湯點服不計時候

[illegible]治一切冷氣心腹刺痛胸膈痞悶脇肋脹滿嘔逆惡心
飲食無味

乾薑炮[illegible]兩　桂心　甘草各玖斤　縮砂仁[illegible]斤拾肆兩

右炒鹽拾肆斤同為末每服壹錢沸湯點服食前

[illegible]治一切冷氣攻心腹脇肋脹滿刺痛噫氣吞酸嘔逆惡
心胸膈噎塞飲食減少

青皮不去白　陳皮不去白　茴香[illegible]　杏仁去皮尖[illegible]乙斤

桂心各乙斤　良薑炒　薑黃　蓽澄茄

木香各[illegible]兩　甘草[illegible]斤　鹽炒[illegible]斤　丁香皮玖兩

右為末每服壹錢沸湯點食前服

[illegible]治一切冷氣痰逆惡心胸膈痞悶臍腹[illegible]痛口苦無味
飲食不美

阿魏[illegible]　茴香[illegible]　胡椒[illegible]兩

乾薑[illegible]斤半　杏仁[illegible]　白麵[illegible]

白麪六兩炒　甘草十兩　鹽炒十二斤半

右為末每服一錢沸湯點服食前

[illegible]湯 消風壅化痰涎治頭昏目眩鼻塞咽乾心胷煩悶精神不爽

荊芥穗　鹽炒三斤　雞蘇葉七斤半　瓜蔞根十二兩

縮砂仁二兩　甘草炙二斤

右為末每服一錢沸湯點食後服

[illegible]湯 調氣利膈消痰止嗽治心胷煩悶口乾多渴

紫蘇葉二斤　烏梅去核九斤　甘草炒二斤　杏仁去皮尖麩炒別研三斤

右炒焙十斤同為末每服一錢沸湯點服不拘時候

[illegible]湯 治脾胃不和乾嘔惡心腹脇脹滿不美飲食

棗去核　生薑　甘草

右三味拌勻以瓷器盛貯以布蓋器[illegible]宿焙乾搗為末

每服一錢入鹽少許沸湯點服常服建脾胃順氣進食

[illegible]湯 治冒暑引飲冷熱不調泄瀉多渴心腹煩悶痢下赤白腹痛後重

桂心去皮四斤　乾薑炮四斤　甘草炒四斤　杏仁去皮尖炒別研四斤

右為末每服一錢沸湯點服如傷暑煩渴新水調下不計時候

[illegible]湯 治脾胃虛冷腹痛泄瀉胷膈痞悶脇肋脹滿嘔逆惡心不思飲食

厚朴去粗皮薑汁炙　棗　丁香皮

甘草炒　丁香枝杖十二兩　鹽十五斤

右為末每服二錢水一盞入生薑三片棗一個同煎至

七分熱服常服溫中順氣進飲食每服二錢沸湯點服食前

[illegible]湯 溫中益氣治胷膈痞滿心腹刺痛短氣噎悶咳嗽嘔逆惡心不思飲食

五味子九斤　良薑炒　陳皮去白　茴香炒一斤

甘草炒

右為末每服二錢沸湯點服食前

仙术湯 辟瘟疫除寒濕溫脾胃進飲食

蒼术去皮十八斤　棗去核一斗四升　乾薑炮　杏仁去皮尖麩炒別研六斤

甘草炒　鹽炒十二斤

右為細末入杏仁和勻每服一錢沸湯點服食前常服延年

明目駐顏輕身不老

杏[illegible]湯 調肺氣利胷膈治咳嗽止痰逆

粟米炒六升　甘草炒十斤　鹽炒十陸斤　杏仁去皮尖麩炒別研十斤

右為末每一錢沸湯點服不拘時常服悅澤顏色光潤皮膚

生薑湯 治酒食所傷心胷煩滿口吐酸水嘔逆不定飲食無味

胷膈不快

乾生薑二斤　白麪炒六斤　甘草炒十斤　杏仁去皮尖麩炒別研十斤

右炒鹽[illegible]同為末每服半錢如茶點喫常服[illegible]消

食化痰寬利胷膈不拘時候

[illegible]湯 治一切冷氣嘔逆惡心臍腹脇肋脹滿刺痛胷膈痞悶

飲食減少

益智仁　京三稜煨　乾薑炮　青皮

蓬莪朮　陳皮　甘草炒　鹽炒

右為細末每服二錢沸湯點服不拘時候常服順氣寬中消

宿冷調脾胃

[illegible]湯 療元臟氣虛冷臍腹脹滿刺痛不思飲食一切冷

氣並皆治之

茴香　川楝子　陳皮　甘草炒　鹽炒

右為末每服二錢如茶點服常服溫中益氣利胷膈進飲食

茴香湯 治療與前茴香湯同

白芷　肉桂　桔梗　茴香　甘草

右為末每服一錢入鹽少許沸湯點食前常服寬中益氣溫胃

[illegible]湯 治精神不爽頭目昏眩心忪煩躁志意不定

川芎不見火 白芷不見火 桔梗去蘆 各[illegible]兩 檀香不見火 [illegible]兩
甘草六兩 炙
右為細末每服壹錢入鹽少許沸湯點服常服調中順氣安神定志清爽頭目

[illegible]湯 治一切冷氣心腹刺痛胸膈痞悶脇腹脹滿嘔逆惡心飲食無味脾胃不和酒食多傷嘔吐不止
縮砂仁[illegible] 甘草 各十二兩 桔梗 六十兩 丁皮 不見火 六兩
右為細末每服壹錢入鹽少許沸湯點服食前常服消痰氣[illegible]健脾胃進飲食止嘔吐

[illegible]湯 治脾胃受寒胸膈不利心腹疼痛嘔吐惡心常服溫暖脾胃去寒順氣
紅豆 肉桂 不見火 各[illegible]兩 胡椒 六兩 乾薑 三兩
桔梗 三十兩 甘草 炒 [illegible]兩
右為細末每服壹大錢入鹽少許沸湯點服不拘時

[illegible] 治脾胃不快宿酲留滯嘔吐酸水心腹脹痛可思飲食倒冷痰為並宜服之
麻油 四兩 良薑 十五兩 茴香 炒 [illegible] 甘草 十二兩 [illegible]
右件[illegible]同炒為細末每服壹錢白湯點下常服快氣大解中酒美進飲食

小理中湯 治脾胃不和中寒上衝胸脇逆滿心腹㽲痛飲酒過多痰逆惡心或時嘔吐心下虛脹隔塞不通飲食減少短氣羸困溫中逐水去濕又治腸胃冷濕泄瀉注下水穀不分腹中雷鳴霍亂吐利手足厥冷胸痺心痛逆氣結氣並皆治之
蒼术 [illegible] 生薑 [illegible] 甘草 [illegible] 鹽 [illegible]
右[illegible]同碾淹[illegible]焙乾碾為細末每服壹錢沸湯點空心服

[illegible]湯 治中熱五心煩躁霍亂嘔吐口乾煩渴津液不通
白梅 [illegible] 檀香 [illegible] 甘草 [illegible] 鹽 [illegible]
右為末每服壹錢攪生薑新水下酒後飲[illegible]惡心[illegible]茶[illegible]

[illegible] 治脾胃不和胸膈痞滿飲食不化嘔逆惡心或霍亂嘔吐心腹刺痛腸鳴泄瀉水穀不分
草果仁 [illegible] 甘草 [illegible] 生薑 [illegible] 鹽 [illegible]
右件拌和勻入瓷器內淹一宿焙乾為末沸湯點服

[illegible]湯 治胃氣不和心腹疼痛飲酒過度嘔噦惡心脾疼翻胃內感風冷腸鳴泄瀉婦人血氣刺痛並皆治之
香附子 [illegible] 桔梗 [illegible] 甘草 一斤 乾薑 半斤
肉桂 [illegible] 茴香 [illegible] 良薑 陳皮 各十二兩
右除肉桂外同炒為細末每服一分入鹽少許沸湯點下常服快氣不拘時候

[illegible]湯 大治脾胃虛冷酒食所傷胸膈不快嘔逆惡心吞酸吐水口淡舌澀可思飲食並宜服之
甘草 十八兩 乾薑 [illegible] 粟米 二十兩 桔梗 三斤
右炒鹽一百六十分重同為細末每服一分沸湯點食前

諸香

[illegible]香
沉香 [illegible]五兩 箋香 檀香 [illegible] 甲香 [illegible]
沙木炭 [illegible] 丁香 藿香 [illegible] 麝香 [illegible]
茯苓香 [illegible] 牙硝 各十兩 腦子 [illegible] 梅花腦 [illegible]
右除研藥外為細末用蜜十兩煉同研藥常法[illegible]

[illegible]香
甲香 [illegible] 沉香 [illegible] 箋香 各六兩 腦子 研
麝香 [illegible] 牙硝 十二兩 檀香 [illegible]
右為末入研藥用蜜拔和令勻如常法燒

[illegible]香
紫檀香 [illegible]
白[illegible]香 [illegible]

紫潤降真香四十兩 黃熟香 焰消
粉草五兩 瓶香二十兩 麝香末十五兩 甘松
丁皮 藿香各十兩 龍腦八兩 箋香二十兩
右為末入研藥拌蜜搜和如常法燒
玄參 香白芷 藿香二兩 香附子
甘松各十兩 麝香末半斤
[illegible]
降真香 茅香 丁香皮
右為末煉蜜搜和用如常

太平惠民和劑局方卷之十

[illegible] 許洪 編

論用藥法

夫處方療疾當先診知病源察其盈虛而行補瀉辨土地寒暑觀男女盛衰深明草石甘辛細委君臣冷熱或正經自病或外邪所傷或在陰在陽或在表在裏[illegible]皆其形候名異[illegible]不同[illegible]彼邪也知疾所起表實則瀉表裏實則瀉裏在陽則治陽在陰則治陰以五藏所納之藥於四時所用之宜加減得中利汗[illegible]誤則病無不差矣若不細明損益[illegible]不分反逆同用或病在表而知[illegible]在陰則瀉陽在陽則瀉陰不能瞭了自此端由[illegible]者湯可[illegible]也故為醫者必須澄心用意窮物造微[illegible]明[illegible]有揀與病相扶要妙之端其在于此凡療諸病四先以湯湯除五藏六腑開通諸脈理順陰陽令中破邪潤澤枯朽悅人皮膚益人氣力水能淨萬物故用湯也若四肢病久風冷發動次當用散散能逐邪風氣濕痺表裏移走居無常處散當平之次當用丸丸藥者能逐風冷破積聚消諸堅癥進美飲食調和榮衛[illegible]可謂上工故曰醫者意也大抵養命之藥則多君養性之藥則多臣療病之藥則多佐當而用之則百不失一矣

夫療寒以熱藥療熱以寒藥飲食不消以吐下藥鬼疰蠱毒以蠱毒藥癰腫瘡瘤以瘡瘤藥風濕以風濕藥各隨其宜[illegible]藥有三品病有三階藥有甘苦輕重不同病有新久寒溫亦異夫重熱膩滑鹹酸藥石并飲食等於風病為治餘病非對輕冷甘苦澀草石飲食等於熱病為治餘病非對[illegible]苦澀藥飲食等於冷病為治餘病非對其大綱略顯其源流其餘觀其病狀可知臨事制宜當識斯要矣

論合和法

凡合和湯藥務在精專甄別新陳辨明州土修製合度分兩無差用得其宜病無不愈若真假非類冷熱相乖草石昧其甘辛炮炙失其[illegible]

醫者分劑既無定而已還不得以俗人今據修合非依方少不等亦以失本方意撮和之家妍醜難明衆口嘈嘈紛紜之精況一方都盡而於療病難得效蓋為於合和之處虛不得其醫方之漫拙且加減分兩文字少揀味多以銖兩多用水皆言升數年代綿遠傳寫轉見訛謬或分兩少而水數多或水數多而分兩少輕重不等難以全憑若不別其精粗何以明其取捨今則加減合度分兩得中削舊方之參差合今時之行用其方中凡言分者即二錢半為一分也凡言兩者即四分為一兩也凡言斤者即拾陸兩為一斤也凡言等分者非分兩之分即諸藥斤兩多少皆同為等分也凡煮湯云用水大盞者約一升也一中盞者約五合也一小盞者約三合也務從簡易庶免參差俾修合煎調臨病濟急不更冗繁易為曉了也凡草有根莖枝葉皮骨花實諸蟲有毛翅皮甲頭足尾骨之屬有須燒煉炮炙生熟有定一如其法順方者福逆方者殃或須肉去皮或須皮去肉或須根莖或須花實依方揀鍊事擇理削極令淨潔然後秤定分兩勿得參差藥有相生相殺氣力有強有弱君臣相使若不廣通諸經則不知有好有惡或醫自以意加減不依方分使諸藥石強弱相欺入人腹中不能治病更相攻擊草石相反使人迷亂力甚刀劍若調和得意雖未能去病猶得安和五藏於病無所增劇也

凡煎湯常以井花水極令淨潔其水數多少不得參差常令文火小沸令藥味出煮之調和必須用意然則利湯欲生少水而多取補湯欲熟多水而少取用新布絞之服湯寧小熱即易消下若冷即令人嘔逆云分再服三服者要令勢力相及并視人之強弱病之輕重為進退增減之不必悉依方說也

凡搗羅丸藥用重密絹令細於蜜中和則易熟若羅草藥為散以輕細絹於酒中調服則不泥其石藥亦用細絹羅然後研理數百過視色理和同為佳也

凡湯酒中用諸石藥皆細搗羅之如粟米亦可以葛篩令調並新綿別裹內湯酒中同煎凡合丸散藥先細切曝燥乃搗之有各搗者有合搗者並隨方所言其潤濕藥如天門冬乾地黃之類並細切曝燥搗之若值陰雨即微火烘之既燥小停冷乃搗之

凡合丸藥蜜大約當一斤煉得十二兩為佳其中不須如此也

凡浸藥酒皆須細切生絹袋盛之乃入酒密封隨寒暑日數視其濃烈便可瀝出不必待酒盡也滓可暴燥微搗更漬飲之亦可為散服

凡合膏藥初以酒或醋漬令淹浹不用多汁密覆勿泄從今旦至明旦亦有止一宿者煎之時上之三上三下以泄其熱勢令藥味得出上之使帀帀沸乃下之使沸靜良久乃止寧欲小生其中有薤白者以兩頭微焦黃為度有白芷附子者亦令小黃色也豬肪皆勿令經水臘月者彌佳絞膏以新布絞之若是可服之膏膏滓亦可酒煮飲之可摩之膏膏滓則宜以傅病上此蓋欲兼盡其藥力故也膏中用雄黃朱砂麝香乳香等皆別研如粉候膏畢乃可投中以物疾攪至於凝強勿使沉聚在下不調有水銀胡粉者於膏中研令消散胡粉亦爾

凡修煉神仙延年丸散皆須先淨其室燒香掃灑勿令浪語慎使童子搗之務令細熟杵數可至千萬過以多為佳勿令婦女小兒喪孝產婦及痼疾六根不具之人及六畜見之皆不效也其逐急諸小湯丸則不在此例

論服餌法

夫藥有君臣佐使人有強弱虛實服餌之法輕重不同少長殊途強羸各異或宜補宜瀉或可湯可丸加減不失其宜藥病相投必獲其驗若病在胸膈已上者先食而後服藥病在心腹已下者先服藥而後食病在四肢血脈者宜空腹而在旦病在骨髓者宜飽滿而在夜凡餌藥與食氣不欲相逢食氣消即進藥藥氣散而進食如此消息即得五藏安和也但服藥之後多方其節適服後須調理令所宜先後之義也

凡服湯欲得稍熱服之則易消下若冷則嘔吐不下若大熱則傷人咽喉務在用意湯必須澄清若濁則令人心悶不解中間相去如

步行十里久更服若太促者前湯未消後湯來衝必當吐逆仍
問病者腹中藥消散否乃更進服
凡服丸藥者如梧桐子大以二十丸為始從一服漸加至四十
丸為限過多亦損人云一日三服者欲得引日多時不闕藥氣漸
積熏蒸五臟積久為佳不須頓服為善徒棄名藥獲益甚少也
凡服酒藥欲得使酒氣相接無得斷絕斷絕則不得藥力多少皆
以知為度不可令大醉及吐大損人也
凡服毒藥治病先起如黍粟病去而止不去倍之不去十之取去為
度今依中行兩種有毒之藥只如巴豆甘遂之輩不可令至
盡劑如經所說一味一毒服一丸如細麻二味一毒服二丸如
大麻三味一毒服三丸如胡豆四味一毒服四丸如小豆五味一
毒服五丸如大豆六味一毒服六丸如梧桐子以數為丸而毒中
又有輕重只如狼毒鉤吻豈同附子芫花之輩耶凡此之類皆須
量用也
凡餌湯藥後其粥食肉菜皆須大熟大熟則易消與藥相宜若生則
難消復損藥力仍須少食菜於藥為佳亦少進鹽醋乃善亦不得
苦心用力及於喜怒是以療病用藥力為首若在食治將息得力
太半於藥所以病者務在將息節慎至可以長生豈止愈病而
已哉

論用藥法

夫濟時之道莫大於醫療疾之功無先於藥人居五行四氣病生暑
濕風寒藥分三品七情性有溫平冷熱凡於行用不得差殊庶欲
立方便須憑據疾之所理病無不愈若自昧新陳莫分真偽用之
偏僻使之稀謬若以別名求於市肆不諳體性妄說功能率自胸
襟深為造次也以醫不三世不服其藥斷言信有之矣豈不深思
者哉又不得用土地所無貴價難市珠珍諸寶希罕所聞縱異貴
而無與設貧下而資財不及或於遠邦求藥或則雖就古方
不能變通務於救拯病既深矣藥何療焉緣是醫者以須於拯從
長去繁就簡卷舒自有盈縮隨機斟酌其宜增減充當務病輕重
用藥者[illegible]之矣

凡藥有君臣佐使以相宣攝合和宜一君二臣三佐五使又可一
君三臣九佐使也又有陰陽配合[illegible]子母
兄弟根莖花實草石骨肉又有單行
者有相須者有相使者有相畏者有相惡者有相反者有相殺者
凡此七情合和之時用意視之當用相須相使者良勿用相惡相
反者若有毒宜制可用相畏相殺者不爾勿合用也[illegible]
[illegible]
有酸鹹甘苦辛五味又有寒熱溫涼四氣及
有毒無毒陰乾暴乾採造時月生熟土地所出真偽新陳并各
有法也
凡採藥時月皆是建寅歲首則從漢太初後所記也其根物多以二
月八月採者謂春初津潤始萌未衝枝葉勢力淳濃故也至秋枝
葉乾枯津潤歸流於下今即事驗之春寧宜早秋寧宜晚華實莖
葉乃各隨其成熟耳歲月亦有早晏不必都依本文也
凡本草說陰乾者謂就六甲陰中乾之又依遁甲法甲子旬陰中在
癸酉以藥著酉地也實謂不必然正是不露日暴於陰影處乾之
耳所以亦有云暴乾故也[illegible]
[illegible]若幸可而用益當為善

論三品藥畏惡相反

含靈物之性有離合虎嘯風生龍吟雲起磁石引針琥珀拾芥漆
得蟹而散麻得漆而涌桂得葱而軟樹得桂而枯戎鹽累卵獺膽
分盃其氣爽有相關感多如此類其理不可得而思之至於諸藥
尤能遞為利害先聖既明有所說何可不詳而避之時人為方皆
多漏略若舊方已有此病亦應改除假如兩種相當就其輕重擇
而除之傷寒赤散吾常不用藜蘆斷下黃連丸亦去其乾姜而施
之無不效何忽強以相憎苟令共事乎相反為害深於相惡相惡
者謂彼雖惡我我無忿心猶如牛黃惡龍骨而龍骨得牛黃更良
此有以制伏故也相反者則彼我交讎必不宜合今畫家用雌黃

[illegible]
藏[illegible]所以不効人多輕之今按方與治必然[illegible]難[illegible]
更從[illegible]覽略[illegible]易可知勢而本經有[illegible]
各皆無以辨山吳天參之異故宜各顯其條人有[illegible]
蛤之類鮀甲[illegible]近[illegible]便[illegible]須[illegible]從[illegible]
如此不知何者是非須用辨記當更服[illegible]經相使
正各一種兼以藥對參之有[illegible]三[illegible]其
母其猪[illegible]訪遊[illegible]不復疏出
上藥一百二十種為君主養命以應天無毒多服久服不傷人欲輕
身益氣不老延年者本上經[illegible]
[illegible]之物[illegible]歲月常服必獲大益病既愈矣命亦兼申天道
仁育故云應天一百二十種者當謂寅卯辰巳之月法萬物生榮
時也
中藥一百二十種為臣主養性以應人無毒有毒斟酌其宜欲遏病
補虛羸者本中經[illegible]輕身[illegible]於服之者
祛患當速而[illegible]為緩人懷性情故云應人一百二十種者當謂
午未申酉之月法萬物成熟時也
下藥一百二十五種為佐使主治病以應地多毒不可久服欲除寒
熱邪氣破積聚愈疾者本下經[illegible]中
和[illegible]服[illegible]所[illegible]地體收殺故云應地一百二十五種者當
謂戌亥子丑之月法萬物枯[illegible]時也兼以閏之餘數加之[illegible]本
經三品合三百六十五種法三百六十五度一度應一日以成一
歲也今所[illegible]以[illegible]之品數[illegible]本草中[illegible]所[illegible]
用加添之藥不在此例也

論服藥食忌

有朮勿食桃李及雀肉胡荽大蒜青魚鮓等物
有藜蘆勿食狸肉
有巴豆勿食蘆笋羹及野猪肉
有半夏菖蒲勿食飴糖及羊肉
有細辛勿食生菜
有甘草勿食菘菜及海藻
有地黃勿食蕪荑
有天門冬勿食鯉魚
有[illegible]勿食[illegible]
有常山勿食生葱生菜
有茯苓勿食醋物
有商陸勿食犬肉
有空青朱砂勿食生血物
有鱉甲勿食莧菜
服藥不可多食生胡荽及蒜雜生菜又不可食諸滑物果實等又不
可多食肥猪犬肉油膩肥羹魚膾腥臊物
服藥通忌見死尸及產婦淹穢物

玉石部

論[illegible]家三品藥石類例

丹砂 雄黃 雌黃 [illegible]
石鍾乳 [illegible] 白礬 [illegible]
赤石脂 白石脂 [illegible]
陽起石 [illegible] 硫黃 [illegible]
[illegible] 磁石 [illegible]
石[illegible] 黑鉛 [illegible]
[illegible] 黃丹 [illegible]
[illegible] 硝石 [illegible] 食鹽 [illegible] 石灰 [illegible] 伏龍肝 [illegible]
滑石 [illegible] 百草霜 [illegible] 白堊 [illegible]
禹餘糧 紫石英 寒水石 代赭石 [illegible]
太陰玄精石 [illegible]
花蕊石 [illegible]
[illegible]然銅 [illegible]

草部

菖蒲 [illegible] 菊花 [illegible]
人參 [illegible] 天門冬 麥門冬 [illegible]
甘草 [illegible]
熟乾[illegible]

獨活 羌活 柴胡 前胡 等 川牛[illegible]

車前子

木香 薏苡仁 遠志

山藥 川芎

石斛 黄連 一草龍膽

葳蕤 黄芩

黄芪 巴戟

防風

細辛

蛇床子

王不留行

五味子

山茵陳

乾薑

當歸

紫參

仙靈脾

狗脊

苦參

麻黄

木通

黄芩

萆薢

石韋

白[illegible]

[illegible]

商陸

百部

天麻

茴香

附子 天雄 等

半夏

大黄

常山

馬兜鈴

旋覆花

天南星 白附子

骨碎補

[illegible]

大延胡索

肉桂

巴戟

牽牛子

使君子

川芎 白芷

茯苓

蔓荊實

茯神

黄蘗

杜仲

乾漆

酸棗仁

沉香 檀香

桑白皮

梔子

枳實 枳殼

厚朴

山茱萸

大腹皮

巴豆

蜀椒

[illegible]

[illegible]……訶梨勒……[illegible]……脂

等[illegible]……髮[illegible]……

[illegible]……麝香……韭[illegible]……骨[illegible]……阿膠及諸膠……[illegible]

[illegible]……白蜜……蠐螬……珍珠……[illegible]

[illegible]……蟬蛻……白[illegible]

[illegible]……蜈蚣……烏蛇……白花蛇……蝎……天雄……[illegible]

[illegible]……地龍……[illegible]……五靈脂……陳皮……青皮……[illegible]

[illegible]……烏梅……木瓜……杏仁……桃仁……[illegible]……胡

[illegible]……黑豆……赤小豆……大豆黃卷……麩麴……扁豆……胡麻……[illegible]

太平惠民和劑局方指南總論卷上

太平惠民和劑局方指南總論卷中

論中風證候

論曰：[illegible]……天地清濁之氣……[illegible]……生長萬物……[illegible]……邪風……[illegible]……入臟……[illegible]

[illegible]……中風……[illegible]……五臟……[illegible]……及緩……

[illegible]……痺……[illegible]……性……[illegible]……其中人也……

[illegible]……人也……[illegible]……故推……[illegible]……長聖人先此

[illegible]……以……[illegible]……所以首論中風也

[illegible]……中風……[illegible]……臟腑氣……[illegible]……失度……[illegible]

[illegible]……中於人也……[illegible]……虛

[illegible]……不能……[illegible]……不省人事……[illegible]

[illegible]……可與……[illegible]……人不伺與服……只與

[illegible]……中風半身不遂口眼喎斜……[illegible]

[illegible]……中風邪氣入臟……[illegible]

[illegible]……與排風湯……[illegible]……手足……[illegible]

[illegible]……可與三五七散……中風手足……[illegible]

[illegible]……至寶丹……[illegible]……高腳弱者可與黃芪丸

[illegible]……

[illegible]……中風……[illegible]

[illegible]……七氣湯……[illegible]

[illegible]……骨節……[illegible]

[illegible]……血丹

[illegible]……

[illegible]

論[illegible]：皆因小腸積熱，膀胱[illegible]

[illegible]和散[illegible]

痛皮膚木不仁或[illegible]風湯[illegible]

[illegible]人[illegible]風[illegible]散、腳軟不[illegible]

[illegible]者趁痛散、三和散[illegible]

神[illegible]一和散[illegible]

論[illegible]：皆因[illegible]痰壅上盛，可與三生丸、白丸子

頭目昏[illegible]者可與[illegible]砂化痰丸[illegible]香餅可與半夏丸、天

南星丸[illegible]

多涎[illegible]者可與川芎丸[illegible]若舌乾可與[illegible]水丹[illegible]

龍防風丸[illegible]心松[illegible]清心丸[illegible]

天南星丸

論[illegible]：皆因氣血不順，血[illegible]行，臂[illegible]者可

可與排風湯[illegible]散、消風散、四生丸[illegible]

烏[illegible]散

論[illegible]：皆因風邪氣上攻，頭目[illegible]可與川芎丸[illegible]

[illegible]頭痛者可與[illegible]風散、追風散[illegible]

[illegible]行人風寒入腦，頭痛發眩者與[illegible]

[illegible]大陽穴及眉[illegible]痛[illegible]

論[illegible]：[illegible]可與

[illegible]胡麻散、何首烏散[illegible]

[illegible]可與追風散

論[illegible]：[illegible]不足入於[illegible]

[illegible]心丹、平補鎮心丹[illegible]

論[illegible]：[illegible]內氣[illegible]

[illegible]大[illegible]散[illegible]

論[illegible]：[illegible]風初發時痰涎[illegible]吐者可與

[illegible]散嘔吐者[illegible]山[illegible]常服

論[illegible]：皆因風虛[illegible]無力可與

[illegible]人降氣[illegible]不[illegible]而痛者可與流風散

[illegible]

[illegible]不

論[illegible]：[illegible]上攻咽喉口閉不得[illegible]下與

[illegible]入[illegible]黃解毒丸[illegible]

論傷[illegible]

論[illegible]：[illegible]一十六[illegible]

[illegible]外證一十六[illegible]內外六證[illegible]

[illegible]與傷寒[illegible]人[illegible]即傷

[illegible]反掌之間

[illegible]

論[illegible]：凡傷寒初得病便不進飲食，發熱一向不止，頭

[illegible]乃是傷寒[illegible]

[illegible]須用子細審問[illegible]

不[illegible]

一[illegible]與[illegible]

論[illegible]：凡傷[illegible]

[illegible]自汗者乃是傷風[illegible]

[illegible]證也

論[illegible]：傷寒初得病一二日頭痛身體痛[illegible]寒或鼻喘者

[illegible]可與[illegible]

[illegible]散[illegible]

[illegible]中暑[illegible]

[illegible]散、人參輕骨散[illegible]

[illegible]一二日頭痛發熱[illegible]

[illegible]散[illegible]

[illegible]可與升麻葛根湯[illegible]

[illegible]散和解散[illegible]

[illegible]

[illegible]中[illegible]至六七日不[illegible]

[illegible]大便[illegible]

[illegible]只服[illegible]

[illegible]可與[illegible]

[illegible]用平補[illegible]可與[illegible]子湯

[illegible]木散

論[illegible]：[illegible]傷寒[illegible]往來寒熱[illegible]脇間痛乾嘔及大便秘者

[illegible]

[illegible]

[illegible]比兵或池可与理中丸理中湯[illegible]

狂[illegible]大便[illegible]

[illegible]使投[illegible]時

[illegible]一法[illegible]可用紫苑[illegible]

寒內[illegible]冷[illegible]當[illegible]可[illegible]味湯

理中[illegible]加[illegible]理中[illegible]服

[illegible]靜不[illegible]前[illegible]理中[illegible]

[illegible]躁不[illegible]不可投

[illegible]前作小柴胡湯[illegible]

[illegible]五七日至十日已[illegible]

[illegible]有不大便不通二三日或[illegible]若与

小柴胡湯三五服中若五七服以大便[illegible]若可

五苓散[illegible]損[illegible]加[illegible]

[illegible]頭痛不止者[illegible]每[illegible]攻頭

[illegible]五七日[illegible]大便[illegible]小便

[illegible]

[illegible]便[illegible]与小柴胡湯[illegible]

大便如[illegible]

[illegible]黃湯[illegible]

[illegible]皆可服也

[illegible]湯二[illegible]

[illegible]花[illegible]

[illegible]下甚者可与三黃丸

[illegible]

[illegible]皆可與

[illegible]可与五順飲[illegible]皆可服

[illegible]不通[illegible]

[illegible]乃胃中有燥糞[illegible]

[illegible]大便[illegible]

腹中痛手足冷者可[illegible]理中[illegible]

[illegible]加甘[illegible]

[illegible]小便[illegible]

[illegible]五苓散[illegible]

[illegible]散加小麥同煎

[illegible]理中丸[illegible]

[illegible]小便不利或頭上汗出

[illegible]

虛中之

[illegible]……傷寒……可與

[illegible]……霍亂傷寒……小便次用木……

[illegible]……不可用大溫藥……

[illegible]……可與

[illegible]……用嘉禾散……理……

[illegible]……中暑……

[illegible]

[illegible]……可與

[illegible]

○及妊娠者不可服，自宜斟酌

○孕婦患瘧疾，難為用藥，只可與草果飲兼用平胃散入烏梅[illegible]

○諸瘧[illegible]用溫藥誤服[illegible]

[illegible]

傷寒十勸

一　傷寒頭疼及身熱，便是陽證，不可服熱藥。傷寒傳三陰三陽共六經，內太陰病頭不疼身不熱，少陰病雖發熱而脈沉[illegible]

二　傷寒當直攻毒氣，不可補益。邪氣在經絡中，若隨證攻之，三四日痊安。若妄投補益熱藥，毒氣流注，必多致殺人。

三　傷寒不思飲食，不可服溫脾胃藥。傷寒不思飲食，自是常事，終無餓死之理。如理中丸之類不可輕服，若陽病服之，致熱氣增重，或至不救。

四　傷寒腹痛亦有熱證，不可輕服溫暖藥。難經云：痛為實，故仲景論腹滿時痛之證，有曰痛甚者加大黃。夫痛甚而反加大黃，意可見也。惟身冷厥逆而腹痛者[illegible]

頭汗出[illegible]便投抵當[illegible]殺人

傷寒自利當看陰陽證不可例服補藥及止瀉藥

自利惟身不熱手足溫者屬太陰身冷四逆者屬少陰厥陰其余身熱下利皆是陽證當隨證依仲景法治之每見[illegible]緣下利便投暖藥及止瀉藥而致殺人

傷寒胸脅痛及腹痛不可妄用艾灸

常見村落間有此證無藥便用艾灸多致毒氣隨火而盛膨脹發喘以死不知胸脅痛自屬少陽腹脹滿自屬太陰此外惟陰證可灸

傷寒手足厥冷當看陰陽不可一例作陰證

治有陽厥有陰厥醫者少能分辨陽厥而投熱藥殺人速於用刃蓋陽病不至於極熱不能發厥仲景所謂熱深則厥深是也熱浮而更與熱藥寧有復活之理但看初得病而身熱至三四日後熱氣已深大便秘小便赤或譫語昏憒及別有熱證而反發厥者必是陽厥也宜急用承氣湯下之若初得病身不熱大便不秘自引衣蓋身或下利或小便數不見熱證而厥逆者即是陰厥也方可用四逆湯之類二厥所以使人疑者緣其脈皆沉然陽厥脈沉而弱又陽厥時復指爪却溫陰厥常冷此可為可別

傷寒病已在裏即不可用藥發汗

傷寒病須看表裏如發熱惡寒則是在表正宜發汗如不惡寒反惡熱即是裏證若醫者一例發汗則所出之汗不是邪氣皆是真氣邪氣未除而真氣先涸死者多矣又有半在表半在裏之證及無表裏之證不惟皆不可下仍不可汗當[illegible]息之

傷寒飲水為欲愈不可令病人恣飲過度

病人大渴當與之水以消熱氣故仲景以飲水為欲愈人見此說遂令病者縱飲因而為水停為喘為噦為逆為下利為腫為水結為小便不利者多矣且如病人欲飲一碗只可與半碗飲之常令不足為善矣

傷寒病初瘥不可過飽及勞動或食羊肉行房事與食諸骨汁及飲酒

病方愈脾胃尚弱食而過飽不能消化病即再來謂之食復病方愈血氣尚虛勞動太早病即再來謂之勞復又傷寒食羊肉行房事者必死食諸骨汁飲酒者再病

太平惠民和劑局方指南總論卷中

太平惠民和劑局方用[illegible]卷下

[illegible]

論小腸氣證 小腸氣膀胱氣奔豚[illegible]皆因腎氣虛弱膀胱受冷風[illegible]之傷於腎經氣不散小腹刺痛時發[illegible]未可[illegible]服藥須先用[illegible]可與

蘇子降氣湯(五苓散)[illegible]散八味散大沉香丸茴香丸仍炒茴香燒鹽細嚼熱酒送下或五苓散[illegible]之類。小便不通者與[illegible]或五苓散如痛[illegible]只用[illegible]散送下茴香丸調理

論[illegible]積氣塊皆因氣虛及寒氣熱氣怒氣[illegible][illegible]結積聚堅硬如杯心腹疼痛不思飲食用[illegible]痛不能宣利可與

七氣湯丁香丸青木香丸木香推氣丸[illegible]蓬煎丸。積氣不散病時腹脹可與積氣丸(三稜煎丸)心下堅硬結塊者可與溫白丸服滿不思食者與養脾丸[illegible]

論[illegible] 久病脾泄腸滑不禁日夜[illegible]平胃散空心[illegible]下[illegible]可與[illegible]散不效者可多與[illegible]。更有一證大便如[illegible]是每日早晨水瀉一兩行日間[illegible]無事可服[illegible]即住。

論心[illegible] 婦人心脾疼及血氣刺痛者可與[illegible]痛丸[illegible]痛丸[illegible]不可輕用如[illegible]可用之[illegible]散[illegible]如[illegible]可[illegible]用。[illegible]痛或小腸氣刺痛及[illegible]老人宜大沉香丸[illegible]丸[illegible]又夫[illegible]下婦人醋湯下如不[illegible]酒[illegible]湯下更可與[illegible]

[illegible]人參[illegible]
[illegible]
溫白元[illegible]或蘇合香元[illegible]平胃散人參[illegible]大沉香元[illegible]
[illegible]元[illegible]之類
[illegible]可與[illegible]紅元[illegible]沉香[illegible]青木香元、七氣湯、和氣散、人參元[illegible]順氣散、三稜散[illegible]青木香元。○腰痛者可與[illegible]
[illegible]不下者可與[illegible]異功散、人參木香散、參苓白朮散、五[illegible]中散。○[illegible]
[illegible]積聚[illegible]久[illegible]不常者不可取積[illegible]次消導可與

感應元[illegible]小理中元[illegible]常服[illegible]消[illegible]和脾散、嘉禾散、參苓白朮散、四君子湯、思食元、建脾湯、建中散、平胃散之類，助其脾胃，久而能去其根。○若痛有休止，或往來上下，腹中痛，時吐冷沫，中脘不快，嘔惡惡心者，恐是虫痛，可與集效元，或[illegible]元，其元痛元有[illegible]性，不可多服。○若卒然心腹絞痛，腹悶不得息，任其攻衝，悶亂惡心者，恐是疰忤鬼氣，可與蘇合香元。若虛弱臟寒人，可將蘇合香元挼作餅子，用火[illegible]盞之，將藥餅安臍中，上以[illegible]以去其臍中[illegible]，依法服之。○若痛而不休，背[illegible]悶嘔吐不定，飲藥不下者，可與順氣散，送下青木香元，如元順氣散、五積散送下，亦得。及元痛元、三稜散、大沉香元。

論心腹脹滿

腹脹若[illegible]因傷寒[illegible]或吐利，或瀉痢，大病之後，只是喚氣[illegible]脹，心腹不美，飲食[illegible]，此小[illegible]脹者，切不可用[illegible]食[illegible]化之藥，若用藥動下，轉加困重，未[illegible]使速也，但可服[illegible]正氣散[illegible]木香[illegible]參苓白朮散、四君子湯[illegible]平胃散、人參[illegible]散[illegible]元[illegible]可與人參[illegible]散[illegible]但得氣壯自能飲食，加倍膨脹自愈。

論痰飲咳嗽

[illegible]痰飲不化，留滯胸脘，令頭目昏眩，痞悶不快，腹中[illegible]

[illegible]小兒[illegible]

可與[illegible]元降氣湯、[illegible]人參[illegible]散[illegible]
白术散[illegible]可與[illegible]心丹[illegible]正元丹○[illegible]
養[illegible]丸[illegible]○金[illegible]可與[illegible]正元丹○[illegible]
[illegible]老[illegible]用[illegible]丸[illegible]
[illegible]丸[illegible]黃芪[illegible]○[illegible]
[illegible]安[illegible]丸[illegible]木香[illegible]白术[illegible]
[illegible]人參當[illegible]有血[illegible]人參
[illegible]○因[illegible]用力太過吐血不[illegible]氣湯、或[illegible]
[illegible]氣[illegible]加人參煎服[illegible]
[illegible]與人參黃芪散、[illegible]老人可與黃芪[illegible]湯常服。[illegible]
[illegible]氣[illegible]者可與[illegible]止汗[illegible]大山[illegible]
人參[illegible]散加小參煎服。自汗不止者朮附湯、正元散。心
熱[illegible]可與[illegible]砂[illegible]香散

[illegible] [illegible]回元氣[illegible]下，令上盛致水火不交，陰陽失序，手足厥[illegible]霍亂轉筋，下痢久瀉，脈微沉者可與
[illegible]金液丹、附子理中丸、[illegible]正元丹、四神丹。

[illegible] 三焦壅熱證候 **[illegible]** 咽喉口齒 眼目
上焦壅熱，心經煩渴，頭頷結核者可與
[illegible]丸、牛黃涼膈丸、[illegible]角飲[illegible]解毒丸[illegible]
[illegible]○口舌生瘡可與[illegible]玉屑無憂散、甘露飲[illegible]
[illegible]可與[illegible]
[illegible]小便不利者可與導赤[illegible]五淋散。大便不[illegible]

[illegible] 天心散

咽喉風證 自其風邪客於咽間，氣鬱而[illegible]則[illegible]生於脾胃，風毒[illegible]則[illegible]為喉痺，其證[illegible]
[illegible]不[illegible]咽喉[illegible]
[illegible]病不[illegible]皆能殺人也
[illegible]風者可與[illegible]毒[illegible]無憂散[illegible]

[illegible] 牙齒疼痛，其證不一，有[illegible]
[illegible]若有[illegible]皆因[illegible]氣上攻而痛者風
[illegible]者須用[illegible]細辛[illegible]方同服[illegible]
[illegible]而動[illegible]證也可與
[illegible]飲[illegible]心散[illegible]
[illegible]以[illegible]小不[illegible]
[illegible]人[illegible]者可與黃芪丸[illegible]
[illegible]之以升麻[illegible]
者可[illegible]吐[illegible]
雄[illegible]即吐[illegible]神丸[illegible]香丸[illegible]

水[illegible]
[illegible]眼目[illegible]
內[illegible]
只可[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]金[illegible]雪膏○[illegible]
[illegible]明[illegible]不可洗只可與[illegible]洗心散
洗肝散[illegible]睛痛不可[illegible]者與[illegible]
[illegible]風痛[illegible]
[illegible]可與[illegible]
[illegible]家[illegible]散[illegible]明散[illegible]金膏[illegible]

[illegible] [illegible]丸、吐血[illegible]不[illegible]服目黃者可與
[illegible]湯加荊芥[illegible]

[illegible] [illegible]水瀉[illegible]二證[illegible]間多有之，皆因飲食所傷及
食[illegible]之物[illegible]不[illegible]須用子細詢問[illegible]香[illegible]
者此是傷食也，可與
感應丸、二陳湯、與理中丸、人參[illegible]守中金丸、來復丹、溫胃丸
已上草性[illegible]者與附子理中丸、理中丸、四柱散、已寒丸、溫中
良薑丸、三[illegible]丸、火輪散、[illegible]丸、正元散、金液丹、二氣丹。已上並
性熱[illegible]丁香豆蔻散。[illegible]須用仔細審而與之。傷食者不可
與[illegible]丸、便用止瀉藥○吐[illegible]有脹痛者可服一木香[illegible]氣丸、
沉香丸、丁香丸、感應丸○久病虛怯年高及氣弱人藏府泄瀉
久不止者可與人參豆蔻散、厚腸丸、參苓白术散、金不換正
氣散、四君子湯之類是也 已上凡二十三論[illegible]

太平惠民和劑局方用藥指南總論卷下

增廣和劑局方圖經本草藥性總論卷上

丹砂

玉屑

玉泉

雲母

石鍾乳

朴消

芒消



消石



礬石



滑石

空青



曾青



石膽

信州



綠青

信州

赤石脂

潞州

白石脂

潞州

白石英

澤州



味甘辛微溫無毒主消渴陰痿不足欬逆胸膈久寒益氣除風濕痺

紫石英

越州

味甘辛溫無毒主心腹欬逆邪氣補不足女子風寒在子宮絕孕十年無子療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心氣不足定驚悸安魂魄填下焦止消渴除胃中久寒

禹餘粮

潞州



之赤石脂禹餘粮各一斤並碎之以水六升煮取二升去滓分再服

無名異

廣州

宜州



婆娑石

南海

雄黃

階州



水窟

石硫黃

廣州

[illegible]

黃礬

[illegible]

食鹽

[illegible]

水銀

[illegible]

石膏

[illegible]

金屑



[illegible]

銀屑

[illegible]

石蟹



[illegible]

玄石

[illegible]

凝水石



[illegible]

陽起石

[illegible]

密陀僧

[illegible]

生□

[illegible]

銅鐵



石蟹

長石

味辛苦寒无毒

明目去翳眇下三蟲殺蠱毒

太陰玄精石



珊瑚樹



味甘平无毒

硇砂

味辛酸溫有毒

鉛

石黑



礜石

味辛甘大熱 [illegible]

代赭石

味苦甘寒無毒 [illegible]

石燕

[illegible]

白堊



味苦辛溫無毒 [illegible]

青琅玕



[illegible]

自然銅

味辛平無毒 [illegible]

金牙



味鹹無毒 [illegible]

金星石



味甘寒無毒 [illegible]

花蕊石

味酸平無毒 [illegible]

蛇黃



[illegible]

蓬砂



味苦辛暖無毒 [illegible]

黃精



味甘平無毒 [illegible]

菖蒲

味辛溫無毒 [illegible]

草部

菊花

[illegible]

人參



[illegible]

天門冬

[illegible]

甘草



[illegible]

乾地黃

[illegible]

白朮



[illegible]

兔絲子

[illegible]

牛膝

[illegible]

茺蔚子



[illegible]

萎蕤

[illegible]

防葵



[illegible]

羌活

[illegible]



[illegible]

薏苡仁



[illegible]

麥門冬

[illegible]

升麻 廣州

[illegible]

車前子



[illegible]

澤瀉



[illegible]

木香 廣州

[illegible]

署預 明州

[illegible]

遠志 泗州



[illegible]

細辛 華州

[illegible]

石斛 温州



[illegible]

巴戟天 滁州



[illegible]

赤箭



菴閭子

卷柏 兗州

龍膽草 襄州

黃連 宣州

蓍實



芎藭

絡石

蒺藜子



黃耆 憲州



肉蓯蓉

漏蘆



茜根



防風

蒲黃



[illegible]

續斷

[illegible]

丹參

[illegible]

五味子



[illegible]

旋花

[illegible]

蛇床子

[illegible]

地膚子

[illegible]

沙參

[illegible]

茵陳蒿



[illegible]

天名精



[illegible]

決明子

[illegible]

王不留行

[illegible]

乾薑

[illegible]

生薑



[illegible]

[illegible]根 成州

苦參 成德軍



栝樓根 均州

當歸 文州



芎藭



[illegible]

麻黃



通草 解州



瞿麥 絳州

秦艽 石州



百合 滁州

知母

貝母

玄參 江州

[illegible]

芷 □州



□□ 淄州

狗脊 成德軍



黃芩 潞州

[illegible]

石龍芮 兗州

紫草 單州



紫菀 泗州

前胡 絳州

[illegible]

□□ □府



秦艽 寧化軍



石韋 福州



萆薢 成德軍

[illegible]

白薇 □州



大青 □州



白□ □州



[illegible]

艾 明州



地筍 江寧府

木笋



大小薊 冀州

天麻 郡州

澤瀉 州



訶梨勒



高良薑 州



州

旋覆花

京三稜 州

黃 州

金沸 州



款冬花 秦州



紅藍花



[illegible]

牡丹 滁州

[illegible]

蓽撥 州



[illegible]

[illegible] 州

[illegible]

肉豆蔻 廣州

[illegible]

補骨脂 梧州

[illegible]

零陵香 蒙州

[illegible]

縮砂蜜 新州

[illegible]

胡黃連 廣州



[illegible]

白[illegible] 泰州



[illegible]

蓬莪朮 [illegible]州

[illegible]

莎草根 澧州

[illegible]

[illegible] 黃州



[illegible]

白前 舒州



[illegible]

使君子 眉州

白豆蔻 廣州

薺苨

莽草

茅香花

鱧腸



附子

天雄

側子

半夏



大黃 蜀州





旋覆花
隨州

[illegible]

虎掌
冀州


[illegible]

草蒿


[illegible]

桔梗
和州

[illegible]

藜蘆
單州

[illegible]

射干
滁州

[illegible]

蛇含
興州


[illegible]

常山
海州

[illegible]

白斂
滁州


[illegible]

甘遂
江寧軍

[illegible]

青葙子
州


[illegible]

白芨
興州


[illegible]

大戟
信州

[illegible]

[illegible]（[illegible]州）

貫衆（[illegible]州）



羊躑躅（潤州）

茵芋（絳州）

[illegible]

味苦辛平有毒[illegible]

治一切冷風[illegible]太山

何首烏（西京）

味甘平無毒主心腹積聚[illegible]

威靈仙（[illegible]化軍）

味苦溫無毒主諸風宣通五藏去腹內冷滯[illegible]

[illegible]花（[illegible]州）

蓖麻子（[illegible]州）



天南星（[illegible]州）



狼毒（石州）



[illegible]

甘蕉根



大寒主癰腫結熱[illegible]

馬兜零（信州）



味苦寒無毒主肺熱欬嗽痰結喘促[illegible]

骨碎補（[illegible]州）



味苦溫無毒主破血止血補傷折[illegible]

連翹（岳州）



[illegible]

續隨子 □州





金星草



鶴虱 成州

蚤休 滁州



預知子

[illegible]

木賊 秦州



海金沙 黔州

味甘寒無毒……主通利小腸……治小便不通……脬中……入……

桂皮 桂陽

松脂



高郵 [illegible]實

[illegible]

枸杞



竹實



茯苓

榆白皮



酸棗

辛夷

黃蘗木

楮実

枳殻

蔓荊実

五加皮



桑寄生

杜仲

[illegible]枝



楓[illegible]脂

沉香 廣州

味辛，溫，無毒。[illegible]

主風水毒腫，去惡氣。[illegible]

[illegible]

薰陸香



金櫻子 泉州



[illegible]

桑白皮

味甘，寒，無毒。[illegible]

[illegible]

海桐皮 雷州



味苦，平，無毒。[illegible]

竹葉

[illegible]

檳榔 廣州

味辛，溫，無毒。[illegible]

梔子 建州



[illegible]

龍腦香 廣州

味辛，苦，微寒。[illegible]

吳茱萸 越州



味辛，溫，大熱，有小毒。[illegible]

食茱萸 蜀州



秦椒 歸州

枳殼 汝州



松實

蕪荑

騏驎竭

厚朴 商州

山茱萸 兗州

紫葳



茗苦搽



虎杖 [illegible]州



豬苓



沒藥 廣州

烏藥 信州



海桐皮

秦皮 成州

五倍子 澤州

密蒙花 簡州

味甘平微寒無毒主青盲膚翳赤澁多眵淚消目中赤脈小兒麩豆及疳氣攻眼

巴豆 戎州

訶梨勒 廣州

蜀椒



郁李仁 隨州

楝實 梓州

益智子

接骨木



[illegible]

南藤

味辛溫……一名丁公藤……

木鱉子

[illegible]

釣藤

[illegible]

芫花



[illegible]

椶櫚

[illegible]

人屎

[illegible]

龍骨

[illegible]

麝香



[illegible]

牛黃

[illegible]

熊脂



[illegible]

阿膠

[illegible]

鹿茸



[illegible]

羖羊角

[illegible]

羚羊角

[illegible]

虎骨



[illegible]

犀角

[illegible]

兔頭骨



[illegible]

豚卵



[illegible]

狐陰莖

[illegible]

鱖魚 / 胆 / 烏雄雞 / 烏鴉 / 石蜜 / 真珠 秦州





味甘平 無毒 [illegible]

[illegible]

石決明 / 鯉魚 / 蝟皮 / 露蜂房 / 牡蠣 萊州 / 桑螵蛸 / 鼈甲







[illegible]

鼈甲

味鹹平，無毒。[illegible]
[illegible]
一名[illegible] 色青[illegible]
[illegible]

蚱蟬 蟬花

[illegible]
味鹹甘寒，無毒。[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

烏賊魚



[illegible]

白殭蠶



味鹹辛平，無毒。[illegible]
[illegible]

原蠶蛾

[illegible]

樗雞



味苦平，有小毒。[illegible]
[illegible]

蝦蟇

味辛寒，有毒。[illegible]
[illegible]

蚌蛤



[illegible]

白頸蚯蚓

味鹹寒，無毒。[illegible]
[illegible]

蜈蚣



味辛溫，有毒。[illegible]
[illegible]

斑猫

味辛寒，有毒。[illegible]
[illegible]

貝子

味鹹平，有毒。[illegible]
[illegible]

白花蛇

味甘鹹溫，有毒。[illegible]
[illegible]

五靈脂



味甘溫，無毒。[illegible]
[illegible]

蠍
青州

[illegible]

鯪鯉甲

[illegible]

甲香
東州

[illegible]

果部

豆蔻
宜州

味辛溫無毒 [illegible]

藕實

味甘平寒無毒 [illegible]

橘皮

[illegible]

大棗

味甘平無毒 [illegible]

龍眼

[illegible]

雞頭實



[illegible]

梅實
郢州



[illegible]

芰實



味甘平無毒 [illegible]

木瓜



[illegible]

枇杷葉
石州

[illegible]

甘蔗



[illegible]





胡麻



生大豆



赤小豆

小麥



藊豆

新補……

冬葵子

味甘寒無毒主五藏六府寒熱羸瘦五癃利小便……

瓜蒂

味苦寒有毒主大水身面四肢浮腫下水殺蠱毒……

[illegible]

葱實

味辛溫主明目補中不足其莖可作湯主傷寒寒熱出汗中風面目腫……

[illegible]

蒜

味辛溫有小毒……

[illegible]

薄荷



味辛苦溫無毒……

[illegible]

[illegible]

香薷

味辛微溫……

荊芥



味辛溫無毒……

[illegible]

增廣和劑局方圖經本草藥性總論卷終

世醫得效方二十卷

（元）危亦林撰

元至正五年陳志刻本（卷十九至二十配鈔本）

世醫得效方二十卷（兩淮鹽政採進本）

元危亦林撰。亦林字達齋，南豐人，官本州醫學教授。是編積其高祖以下五世所集醫方，合而成書。一曰大方脈科，分子目九十有一。二曰小方脈科，分子目七十有一。三曰風科，分子目十。四曰產科兼婦人雜病科，分子目三十有三。五曰眼科，分子目十二。六曰口齒兼咽喉科，分子目六。七曰正骨兼金鏃科，分子目二十九。八曰瘡腫科，分子目二十四。其十九卷附以孫真人養生法節文一卷。其總目鍼灸一科，有錄無書。校檢其文，皆散附各科之中。蓋標題疎外，實非闕佚。自序稱始於天歷元年，迄功於後至元三年，其用力亦云勤篤。前有至元五年太醫院題識，備列院使十一人、同知院事二人、僉院事二人、同僉院事二人、判官二人、經歷二人、都事二人、掾史一人銜名。蓋江西官醫提舉司以是書牒醫院，下諸路提舉司重校，覆白於醫院，而後刊行，亦頗矜慎。序中稱其高祖遇仙人董奉二十五世孫傳其祕方，雖技術家依託之言，不足深詰，而所載古方至多，皆可以資考據，未可以罕所發明廢之也。

南豐危亦林[illegible]
效方、錦次[illegible]、科自
五世遺、江西提舉司
校正之際、上于院、下
諸路提舉司重校、復
白于院、院之長貳
僉屬皆曰善、付其屬
俾一鋟梓焉、噫是方
之效、豈以此一言而
遂傳歟、至元五年
太醫院識

掾史賀智
奉直大夫太醫院都事郭毅

承直郎太醫院都事阿老丁
奉直大夫太醫院經歷田守信
奉直大夫太醫院經歷顏帖木兒
成和郎太醫院判官郎師顏
承直郎太醫院判官齊顯
成和郎同僉太醫院事胡
成安郎同僉太醫院事弓叔正
承直郎僉太醫院事曹文炳
承務郎僉太醫院事馬文瑾
奉訓大夫同知太醫院事許文美
奉議大夫同知太醫院事趙良
嘉議大夫太醫院使趙惟寅
嘉議大夫太醫院使趙權
嘉議大夫太醫院使馮適
院使
中奉大夫太醫院使張元珪
資善大夫太醫院使張元澤
資善大夫太醫院使張翼
資善大夫太醫院使伴哥
資善大夫太醫院使五十四
資善大夫太醫院使石卜泥
資政大夫太醫院使哈剌歹

危氏世醫得效方序

語云醫不三世不服其藥醫何以貴世業也謂其更嘗多而險危劇易皆得之年開目見較之臆決嘗試者得失何啻倍蓰且藥進醫手而方傳古人古方之行于世者何算一證而百方具將為所適從哉夫病者懸命醫師方必對脉藥必療病譬之抽關啓鑰應手而決斯善之善者矣若中無定見姑徐徐焉取古方歷試之以度幾一遇焉雖非有心殺人而人之死於其手者多矣醫所以貴專門方所以貴經驗也南豐危亦林先世遇古名醫董奉遠孫東受醫術其後世業之且徧參諸科至亦林五葉而學益備技益工所全活者益衆乃取平昔所用古方驗而無失者并

與其祖父以來得之師授者類萃成書倣聖濟摠錄以十三科編次名曰世醫得效方將鋟梓以廣其傳余觀世之人得一方輙靳〻焉莫肯示人往〻以射後千金為解今危氏以益世所得之秘一旦盡以諸公人其過人遠矣昔許叔微未達時人勸以樹陰德許念貧而樹德惟醫為可乃攻醫以活人其後

託致顯宦造物之報施如此矣余以為以身種者有限以書種者無窮今危氏能公其術於人使家有其書即人無夭死其所種者不已多乎陰德之報在其身在其子孫余知其必有過於許氏者矣後至元四年八月承事郎同知永新州事 王充耘與耕書

世醫得效方序

工欲善其事必先利其器器利而後工乃精醫者舍方書何以為療病之本自難經湯液靈樞傷寒論等篇出而後之醫師著述非殆如

[illegible]

百家叢說指示俾對病而劑證因證而得藥其用心亦仁矣哉僕幼而好學弱冠而業醫重念先世授受之難由鼻祖自撫而遷于南豐高祖雲仙遊學東京遇

[illegible]

董奉廿五世孫京授以大方脈還家而醫道日行伯祖子美復傳婦人正骨金鏃等科大父碧崖復傳小方科於周氏伯熙載進學眼科及療瘵疾至僕再參究瘡腫咽喉口齒等科及儲積古方并近代名醫諸方由高祖至僕凡五世矣隨試隨效然而方書浩若滄海卒有所索目不能周乃於天曆初元以十三科名目依按古方參之家傳昕夕弗

急刻若凡十稔編次甫成為十有九
卷名曰世醫得效方以論脈病証
治次由大方脈雜醫科以遞至
瘡腫科而終編分門析類一劑卷
開綱舉而目張由博以見約固非
敢求異於昔人宜不過取便於
觀覽云耳欽惟
國朝念群黎之疾苦惠民有局
設教有學於醫尤切然自愧山林
鄙陋見聞不博妄意纂集殊
謬惟多尤冀當道縉紳醫師進
而教之訂其譌補其偏俾續諸
梓則庶幾廣
聖皇好生之仁於無窮豈不韙
歟仍至元三年丁丑七月既望
嘉禾後學達齋危亦林拜手謹書

達齋危先生亦林世醫以効方蓋以其先世秘傳及平昔所治療所經驗者繳聖濟摠錄十三科之目類而編之計十二帙進之本道官醫提舉司、上之大醫院以加稱賞付所屬俾刊而傳焉先生家世江西之南豐擢科由醫學教授故用心之勤矣歲在壬午先生過予書肆因以北面師之且以全帙見授嗟乎千方易得一効難求

觀乎此方則知先生家以其傳世守其學用無不驗療無不愈以得効名方這猶影響之於形声也活人陰德其有涯哉予又安敢私有故命工繡梓以廣其傳庶乎先生惠濟之心得以見於當世嘉與民生同躋壽域不亦宜乎至正三年歲在癸未仲夏建寧路官醫提領陳志 頓首謹書

皇帝聖旨裏江西等處官醫提舉司至元三年十月初二日據南豐
州醫學教授司狀申准本學學正甘宗禮關該切見本州
前官醫副提領危亦林儒學淵源醫書博覽家居豐邸世
精良醫自天曆元年充本州醫學學錄轉充官醫副提領
以昕夕之餘考之古方參以家傳集成一書名曰世醫得
效方以
太醫院官降一十三科名目編排有序方藥至明貫名布
有似此可見其活人之心甚至理宜言衆今其綉梓廣行
庶傳永久以濟生民然此關請備申
上司參訂可否施行准此施行間又准南豐州前官醫副
提領危亦林關該幼讀儒書長習醫業由高祖自撫州遷
于南豐高祖雲仚游學東京遇董奉二十五世孫京名威
業授以大方脈科還家醫道日行伯祖子美進傳臨江劉
三點建昌路新城縣五路陳姓婦人科杭州田馬騎正骨
金鏃科大父碧崖復傳黎川大磜周氏小方科伯熙再傳
福建汀州路程光明眼科南城嚴國復進治瘵疾至亦林
復進傳本州斤竹江東山瘡腫科臨川范叔清咽喉口齒
科及諸積古方并近代名醫諸方由高祖至亦林凡五世
矣隨試隨效益不敢負先代傳授之難亦不敢自秘所學
遂於天曆元年歲首以本到
太醫院所頒一十三科名目除祝由科不曾習學外依按
古方參之家傳十年刻苦編次成書名曰世醫得效方始
自大方脈雜醫科小方脈科風科産科兼婦人雜病科眼
科口齒兼咽喉科正骨兼金鏃科瘡腫科鍼灸暑附各科
外附編孫真人養生書通一十二卷自愧山林鄙陋見聞
不博舛誤惟多敢求校正間又蒙本州醫學甘學正關保
舉行今綉梓以廣其傳爲此今將編到世醫得效方分列
各科諸方綱目治證詳細方藥明白裝成一十二帙完備
見在煩爲申解
上司委官參考如可觀采乞賜行下與亦林刊行少盡活
人濟世之心允符
國朝一視同仁之美關請依上施行准此照得官醫副提領危亦林
性行純謹醫儒兼通所編世醫得效方委依
太醫院官行一十三科綱目至明方藥可用如蒙本官校
勘發付本官刊行實爲便益據此今將本官編到世醫得
效方一十二帙隨此申解前去保結申乞照詳施行得此
照得南豐州醫學教授司申解本州前官醫副提領危亦
林編到世醫得效方一十二帙未經校正關委本司官余
提舉不妨司事依上校正明白保結關報以憑施行去後
今准余提舉關該前事除將發到南豐州官醫副提領危
亦林所編世醫得效方一十二帙各科治證方藥再三披
閱詳覆考校的見危亦林廣覽醫經深明脈理兼有君臣
佐使之辨方術合古南北之宜議論詳明證治精審委有
活人之念宜爲當世之需仍慮當職見或差謬未明至理
如蒙申解
太醫院重行委官參考訂正發下刊行庶傳永久可裨於
聖化下有濟於斯民然此今將校正過危亦林所編世醫得效方一
十二帙隨此發回保結關請照驗施行准此卑司看詳南
豐州官醫副提領危亦林學有淵源出自家庭之訓術精
藥石見諸方冊之明志已願於活人書宜刊以濟世代應
本司官余提舉參考未詳校對周備致以已見恐多差誤
宜依本官所言申解
上司并行委官三復校正如可觀采鋟梓以傳上明
國朝好生之德下便醫士編集之勞爲此今將本司官余提舉已校
正南豐州前官醫副提領危亦林世醫得效方一十二帙
隨此申解前去合行保結申覆伏乞

照詳乞賜
明降付下以憑遵奉施行須至申者
右申
太醫院
至元三年十一月　日抄白申行

世醫得効方綱目

大方脉雜醫科 九十一類
小方脉科 七十一類
風科 十類
産科兼婦人雜病科 三十三類
眼科 十二類
口齒兼咽喉科 六類
正骨兼金鏃科 二十九類
瘡腫科 二十四類
針灸科 畧附各科
孫眞人養生書 節文附正骨科後

綱目 畢

世醫得効方目錄

建寧路官醫提領陳　志　刊行
南豐州醫學教授危　亦林　編集
江西等處官醫副提舉余　賜山　校正

卷之一

大方脉雜醫科

集脉說　集病說　集證說
集治說

傷寒　攝要

發汗法　轉下法　取吐法
水漬法　熨法　蒸法[illegible]

陽證

麻黃湯　升麻葛根湯　金沸草散
小柴胡湯　大柴胡湯　小承氣湯
大承氣湯　調胃承氣湯　三拗湯
敗毒散

陰證

治中湯　五積散　人參養胃湯
藿香正氣散　四逆湯　四逆散
順元散　三建湯　瓜蒂散
茯苓甘草湯　麻黃升麻湯　灸法

和解

香蘇散　香葛湯　參蘇飲
沖和散　小柴胡湯　神术散
二香散

相類

痰證　金沸草散　大半夏湯　瓜蒂散
稀涎散　食積　治中湯　五積散
人參養胃湯　香蘇散　虛煩　竹葉石膏湯
橘皮湯　溫膽湯　脚氣　加減小續命湯

通治

五積散　雙解散　麻黃桂枝湯
白虎湯　大青龍湯　小青龍湯
溫粉　真武湯　桂枝二越婢湯
小建中湯　梔子升麻散　解肌湯
漢防己湯　白虎加蒼朮湯　葛根湯
小續命湯　大承氣湯　敗毒散
附朮散　附子防風散　八物白朮散
竹葉石膏湯　附子細辛湯　附子湯
四逆湯　人參養胃湯　葛根湯
脾約圓　附子散　返陰丹
四逆湯　當歸四逆湯　升麻湯
梔子仁湯　大陷胸湯　小陷胸湯

大陷胸圓　治結胸灸法　枳實理中圓
桔梗枳殼湯　三黃湯　半夏瀉心湯
近効方　丁香柿蒂散　百合知母湯
滑石代赭湯　雞子湯　百合洗方
玄參升麻湯　知母麻黃湯　黑奴圓
無憂散　桃仁湯　白頭翁湯
黃連阿膠圓　黃連解毒湯　黃連犀角湯
雄黃兑散　四逆湯　白虎湯
大承氣湯　黃連阿膠湯　文蛤散
三物白散　十棗湯　抵當湯
吳茱萸湯　苦酒湯　牡礪湯

陰旦湯　大白朮散　回陽丹
正陽散　肉桂散　陽毒　升麻湯
大黃散　五柔圓　葛根橘皮湯
知母桂心湯　增損四物湯　化班湯
黃連橘皮湯　陽旦湯　竹皮湯
乾薑湯　竹青茹湯　當歸白朮湯
知母麻黃湯　應手方　白朮散
又方白朮散　蜜煎導法　猪膽汁方
蜜漬柏皮　灸法

卷之二

○大方脉雜醫科

傷風

桂枝湯　杏子湯　柴胡加桂湯
桂枝芍藥湯　桂附湯　八物湯

傷暑

五苓散　縮脾飲　卻暑散
香薷圓　桂苓甘露散　六和湯
冷香飲子　潑火散　枇杷葉散
香薷散　小黃龍圓　來復丹
小柴胡湯　竹葉石膏湯　二陳湯
濯熱散　通苓散

傷濕

香蘇散　黃耆建中湯　朮附湯
不換金正氣散　茵陳湯　腎著湯
滲濕湯　瓜蒂搐鼻法

中寒

附子理中湯　薑附湯

中暑

大黃龍圓　益元散　消暑圓
皂莢湯　來復丹　白虎湯
橘皮竹茹湯　竹葉石膏湯　五苓散
香薷散　白虎加人參湯　小柴胡湯

中濕

加味朮附湯　白朮酒　甘草附子湯
　四氣兼中
附子湯　防風湯　生附白朮湯
附子麻黃湯　芩朮湯
　四氣相感
麻黃白朮湯　桂枝附子湯　防己黃芪湯
朮苓乾薑湯　茯苓白朮湯　羌蘇湯
　瘧疾
風瘧 加減桂枝湯　白朮散　寒瘧 五積散
養正丹　暑瘧 香薷散　小柴胡湯
清脾湯　消暑圓　濕瘧 朮附湯

五苓散　食瘧 二陳湯　小清脾湯
紅圓子　七情 四獸飲　痰瘧 枳梗半夏湯
半夏圓　瘴瘧 附子湯　小柴胡湯
地龍飲　觀音圓　勞瘧 芎歸鱉甲散
瘧母 消癖圓　熱瘧 八正散　白虎湯
虛瘧 分利順元散　四將軍飲　七棗湯
理脾飲　果附湯　黑錫丹
冷附湯　久瘧 丁未日長散　大已寒圓
橘皮煎圓　通治 草果平胃散　人參養胃湯
小柴胡湯　藿香正氣散　柴胡桂薑湯
加味二陳湯　截瘧 勝金圓　又方

露星飲　辰砂圓　又方
灸法
　痰厥
順元散　星香飲　單方
　眩冒
白薇湯　倉公散
　卒厥尸厥
追魂湯　內鼻散　硫黃散
又方二　灸法
　沙證
艾湯　鹽湯　又方

又法
　時疫
十神湯　不換金正氣散　大柴胡湯
桂枝黃芩湯　敗毒散　五苓散
五積散　柴胡石膏散　蘇合香圓
又方
　傷寒戒事
戰汗四證　急下兩證　三陰可汗
傷寒傷風當下後證　差後昏沉
飲酒復劇　循衣摸床　傷寒別名
傷寒戒忌　臨治警省　傷寒篤證

○大方脈雜醫科

諸氣

縮砂香附湯 沉香降氣湯 木香檳榔圓
歸氣湯 木香流氣飲 秘傳降氣湯
蘇子降氣湯 分心氣飲 推氣圓
神保圓 導氣枳殼圓 三稜煎圓
三和散 五香連翹湯 神仙九氣湯
蟠氣散 參附正氣散 破塊圓
灸法

中氣

蘇合香圓 獨香湯 朮附湯
回陽湯 八味順氣散

諸疝

【風寒】烏頭桂枝湯 【寒疝】倉卒散 木香烏鱗散
【十疰】聚香飲子 【熱證】加味通心飲 八正散
【風冷】五積散 蟠葱散 【血疝】荊芥散
硇砂圓 奪命散 五苓散
青木香圓 又法 三茱圓
失笑散 葫蘆巴圓 玄胡湯
立效散 金鈴圓 去鈴圓
三增茴香圓 消堅圓 川練子圓

海藻圓 敷法 灸法

腰痛

獨活寄生湯 五積散 腎着湯
薑附湯 敗毒散 舒筋散
人參順氣散 木香流氣飲 小七香圓
神麯酒 安腎圓 青蛾圓
八味圓 二至圓 牽牛圓
趂痛圓 熟大黃湯 二效方
又方趂痛圓 導引法 針灸法

眩暈

【風證】川芎散 【感寒】三五七散 【痰證】消風圓
【中濕】芎朮散 【七情】茯神湯 【痰飲】加味二陳湯
【失血】芎歸湯 【下虛】增損黑錫丹

身疼

【風證】烏藥順氣散 【寒證】香葛湯 【血虛】當歸建中湯
【濕證】除濕湯 【勞傷】秦艽鱉甲散 【虛損】十補湯

臂痛

【風證】烏藥順氣散 五靈脂散 【濕證】活絡湯
【寒證】五積散敗毒散 【七情】白芥子散
流氣飲子 【痰證】茯苓圓 芎活湯
控涎丹 【氣證】神保圓 【血氣】舒經湯
【熱證】防風通聖散 敷貼藥 針灸法

脇痛
【傷寒】小柴胡湯 【風證】神保圓 【七情】枳殼煮散
【通治】推氣散 枳芎散 枳殼散

腹痛
【風證】胃風湯 【寒證】五積散 藿香正氣散
【暑證】香薷散 五苓散 【濕證】香蘇散
不換金正氣散 【熱證】四順清涼飲 大柴胡湯
小三黃圓 八正散 大麻仁圓
【冷證】撥附圓 【氣證】木香勻氣散 木香流氣飲
分心氣飲 青木香圓 三和散
木香檳榔圓 【積證】香蘇散 三稜煎圓
紅圓子 神保圓 【氣證】化氣圓
【虛證】當歸建中湯 【通治】小理中圓 三稜煎圓
蘇合香圓 神保圓

諸痺
【風寒濕合痺】附子湯 烏頭湯 理中湯
黃耆酒 蒼耳散 薏苡粥
【寒證】五積散 【痰飲】茯苓湯 【血氣痺】三痺湯
【熱證】羚羊角湯 【熱證】升麻湯

諸疸
【風證】艾煎圓 麻黃酒 【暑證】五苓散
茵陳湯 【濕證】礬石滑石散 【熱證】梔子圓
【黃汗】苦酒湯 桂枝黃耆湯 【穀疸】茵陳散
小半夏湯 單方 【穀疸】苦參圓
【酒疸】龍膽圓 紅圓子 【酒疸】葛根湯
酒蒸黃連圓 六物飲 人參散
辰砂妙香散 土瓜方 如神散
【女勞疸】石膏散 【表疸】一清飲 【虛勞】秦艽飲
【久黃】苦參散 【通治】無忌紫金圓

五噎
五噎散 沉香散 嘉禾散
大七氣湯

五膈
寬中散 五膈散 五膈圓
寬膈圓 瓜蔞實圓

卷之四
○大方脉雜醫科

諸積
【肉積】三稜煎圓 阿魏圓 【血積】抵當圓
【氣積】木香流氣飲 分心氣飲 神保圓
【水積】十棗湯 【涎積】妙應圓 控涎圓
【魚蟹積】香蘇散 【果菜積】平胃散 阿魏圓
【酒積】平胃散 香蘇散 麴蘖圓
【茶積】磨積圓 【[illegible]】粉積麪積 阿魏圓

熱積 加味青木香圓 紅圓子
虛 沉積 盧氏感應圓
通治 太乙神明再造感應圓 縮砂香附湯
平胃散 五積散 香蘇散
撥宗宣積 利藥湯積 萬金圓
五積
肝積 肥氣圓 心積 伏梁圓 脾積 痞氣圓
肺積 息賁圓 腎積 奔豚湯 灸法
六聚
散聚湯 荆蓬煎圓
息積
痞積圓 化氣湯 導引法
癥瘕
大消石圓 小三稜煎 三聖圓
宅握七圓 妙應丹 灸法
心痛
氣證 蘇附湯 寒證 加味麻黃湯 加味四七湯
七情 七氣湯 沉香降氣湯 分心氣飲
食證 香蘇散 感應圓 熱證 氣鍼圓
通心飲 虛證 卻痛散 大已寒圓
紫沉煎圓 加味建中湯 卒痛 雞舌香散
玄胡索散 又方二 木香調氣散

蘇合香圓 金鈴散 無憂散
真心痛 手拈散 香附散
訶子散 九痛圓 撞氣阿魏圓
失笑散 浮椒圓 附朮湯
九氣湯 三和散 神保圓
奪命抽刀散 參朮散 加味茴沉湯
單方 大理中圓 神効散
荳蔻湯 單方 灸法
嘔吐
藿香散 寒證 理中湯 枳梗半夏湯
暑證 加味香薷散 香薷散 二陳湯
五苓散 消暑圓 濕證 加味治中湯
宿食 大藿香散 痰證 大半夏湯 半夏圓
養正丹 加味理中湯 氣證 二陳湯
血證 茯苓湯 當歸湯 茱萸人參湯
藿香正氣散 加減七氣湯 熱證 竹茹湯
通心飲 小柴胡湯 三乙承氣湯
四逆湯 金液丹 藿香正氣散
香白圓 炮附子圓 快氣湯
勻理湯 木香勻氣散 理中湯
人參散 丁香煮散 灸法
霍亂

【風證】桂枝湯　理中湯　香蘇散
【暑證】香薷散　除濕湯　七氣湯
胃風圓　紅圓子　木瓜湯
茯苓滲濕湯　麥門冬湯　水浸丹
又方　止瀉湯　藿香正氣散
訶子散　加味治中湯　養正丹
胡椒湯　許方　又方
熏洗法　鹽熨方　灸法

痰飲

【懸飲】十棗湯　五苓散　防己桂枝湯
茯苓五味湯　大青龍湯　小青龍湯
參蘇飲　丁香五套圓　四七湯
二陳湯　加味壽星圓　白圓子
星香飲　芎辛散　枳殼半夏湯
順元散　黑錫丹　靈砂丹
八味圓　暖胃圓　靈白圓
二賢湯　茱苓圓　快活圓
茯苓圓　倍朮散　桂辛湯
丁香半夏圓　二陳湯　青州白圓子
控涎圓　一生湯　破痰消飲圓
破飲圓　導痰湯　二陳湯
荊蓬煎圓　理中湯

欬逆

丁香柿蒂散　木香調氣散　沉香降氣湯
橘皮乾薑湯　羌活附子湯　蓽澄茄散
小柴胡湯　橘皮竹茹湯　灸欬逆法

卷之五

○大方脈雜醫科

脾胃

丁沉透膈湯　穀神嘉禾散　四君子湯
附子建中湯　參苓白朮散　千金養脾圓
治中湯　平胃散　胃丹
補真圓　進食散　瀉黃散
枳殼圓　橘皮竹茹湯

翻胃

安脾散　薤白粥　熟水草果飲
桂苓散　三稜煎圓　正胃散
粉霜砂　青金丹　大學小金
丁附散　大倉圓　小半夏圓
六丁圓　香朴飲　鹽參圓
溫胃散　治翻胃　又方
治吐逆不止　灸法　導引法
乾食方

咳嗽

風證 神朮散　三拗湯　杏蘇湯
人參荊芥散　寒證 金沸草散　小青龍湯
華蓋散　暑證 六和湯　濕證 白朮散
不換金正氣散　七情 團參飲子　分心氣飲
熱證 枳殼半夏湯　貝母散　紫菀膏
玉芝圓　金沸草散　黃連阿膠圓
小柴胡湯　洗心散　冷證 藿香正氣散
理中湯　杏子湯　丁香半夏圓
胡椒理中圓　黃芪建中湯　養榮湯
斂肺圓　時行 人參飲子　服散
敗毒散　勞嗽 蛤蚧散　風痰 白圓子散

痰證 當歸飲　酒證 澄清飲　百金丹
人參清肺湯　蠟煎散　神效散
參蘇飲　寧肺散　杏仁煎
二陳湯　款冬花散　單方葶藶散
又方 三　噙藥防己散　星砂圓
捷徑方　滴油散　灸法

喘急

風證 麻黃散　溫肺湯　金沸草散
寒證 加味三拗湯　杏葛湯　參蘇飲
藿香正氣散　七情 四磨湯　四七湯
紫蘇子湯　熱證 洗心散　八正散

葶藶散　小柴胡湯　金沸草散
枳殼半夏湯　加味控涎圓　虛證 蘇子降氣湯
鍾乳圓　胡椒理中圓　安腎圓
紅椒圓　實證 人參定喘湯　九寶湯
杏參飲　分心氣飲　秘傳降氣湯
加味白朮散　水煮木香圓　神保圓
玉液散　神應丹　胡桃湯
葶藶圓　炙肝散　人參清肺飲
清膈散　灸法

泄瀉

風證 香[illegible]蘇散　不換金正氣散　胃風湯

火炊圓　寒證 理中湯　加味治中湯
暑證 香薷散　胃苓湯　通靈散
六和湯　水浸丹　濕證 藿香正氣散
胃苓湯　白朮附子湯　麴芎湯
七情 加味藿香正氣散　木香散　熱證 黃連香薷散
五苓散　黃連阿膠圓　升麻葛根湯
[illegible]皮湯　調胃承氣湯
冷證 去麻黃五積散　豆附圓　薑附湯
大巳寒圓　加味四柱散　加味三建湯
來復丹　參[illegible]斷下圓　豬臟圓
豬肚圓　椒艾圓　參連湯

大理中圓　八君子湯　養正丹
[illegible]木調癸連圓　戊己圓　乳豆圓
草撥圓　固腸圓　[illegible]硫黃散
卓前散　針頭圓　神麯圓
肚蒜圓　粟殼圓　單方
[illegible]真人養臟湯　香連圓　人參散
[illegible]安腎圓　震靈丹　金鎖正元丹
[illegible]灸肝散　和氣散　朴附圓
[illegible]木香散　二神圓　[illegible]香蘇散
縮砂香附湯　[illegible]香茸圓　平胃散
[illegible]又名瀉湯　香茸散　五味子散

[illegible]大斷下圓　豆蔻飲　灸法

卷之六

○大方脉雜醫科

下痢

[illegible]神木散　露宿湯　胃風湯
[illegible]人參敗毒散　不換金正氣散　[illegible]六和湯
五苓散　蘗皮湯　酒蒸黃連圓
[illegible]加味除濕湯　苓苔圓　苫散
[illegible]小承氣湯　小柴胡湯　敗毒散
烏梅圓　地榆散　蘗皮湯
芍藥蘗皮圓　三黃熟艾湯　酒蒸黃連圓

白頭翁湯　[illegible]當歸圓　水煮圓
豆蔻散　附子理中湯　[illegible]附湯
朮附湯　玉華白丹　靈砂丹
鍾乳健脾圓　五積散　木香散
椒艾圓　四柱散　赤石脂散
[冷熱不調]養臟湯　香連圓　駐車圓
[illegible]牛乳湯　木香流氣飲　五膈寬中散
異香散　木香勻氣散　[illegible]感應圓
蘇合香圓　蠟匱圓　[illegible]敗毒散
真料參苓白朮散　又方二　燥鯽魚方
[休息痢]加味養臟湯　神効散　炒五積散

駐車圓　秘方養臟湯　大已寒圓
薑茶圓　[illegible]茜根圓　魚鮓湯
[illegible]羖羊角圓　玉華白丹　參附湯
[illegible]薑茶方　香連圓　木香調氣散
[illegible]六和湯　[illegible]加味敗毒散　大防風湯
郁李圓　又方　[通治]木香散
黑豆散　當歸散　獨神圓
神應散　又方　秘方養臟湯
大阿膠圓　四物湯　駐車圓
九聖圓　立效散　大斷下圓
沒石子圓　荊芥湯　香茸圓

平胃散　橘皮散　百中散
酸石榴皮散　乳香散　來復丹
加減木香煮散　加味四君子湯　蒲黃散
單方　又方　灸法
秘澁
【小便不通秘澁】八正散　五苓散　通心飲
葵子散　【虛證】八味圓　琥珀散
附子散　利氣散　參苓湯
【精滯】滑石散　八味圓　葱白湯
洗方　又法　葱熨法
【大便不通風秘】脾約麻仁圓　皂角圓

又方　疎風散　枳殼圓
又方　順氣圓　搜風散
二仁圓　【氣秘】三和散　四磨湯
蘇子降氣湯　橘杏圓　蘇麻粥
小通氣散　【積滯秘結】脾積圓　木香逐氣圓
感應圓　【虛秘】半硫圓　金液丹
威靈仙圓　五仁圓　潤腸圓
又方　葱白散　胃氣圓
黃耆圓　【熱秘】神功圓　檳榔圓
四順清涼飲　小三黃圓　小柴胡湯
【濕秘】檳榔散　香蘇散

【臟熱大小便不通】甘遂散　又方 四
八正散　推車散　又掩臍法
【通治大小便不通】大潤腸圓　獨棗湯
熨藥　蜜兌法　罨臍方
熏方　老人臟腑秘方
脹滿
【寒氣脹滿】大正氣散　平肝飲子　五膈寬中散
木香流氣飲　附子粳米湯　溫胃湯
沉香降氣湯　【熱脹】大異香散　蓽澄茄圓
【水脹】大半夏湯　青木香圓　【血脹】人參芎歸湯
【穀脹】七物厚朴湯　推氣圓　【氣脹】朴附湯

順氣木香散　【食脹】強中湯　溫中散
桂香圓　獨聖散　感應圓
比食圓　溫白圓　【蟲脹】嘉禾散
四柱散　厚朴橘皮煎　三稜煎圓
青木香圓　四炒枳殼圓　氣針圓
丁香透膈湯　導氣圓　熨法
敷藥　【通治】沉香飲　小檳榔圓
灸法

醫林卷之七

○大方脈雜醫科

消渴

【肺燥】澄源丹　真珠圓　蓯蓉圓
生地黄膏　【肺消】薑粉散　附子猪肚圓
白朮散　茯神圓　【腎消】加減八味圓
天王補心丹　鹿茸圓　雙補圓
【丹石毒】瓜蔞散　石子薺苨湯　黄連猪肚圓
罌粟湯　加減三黄圓　【熱渴】烏梅木瓜湯
枳椇子圓　三神湯　龍鳳圓
萬連圓　朱砂黄連圓　酒蒸黄連圓
【通治】玄兔丹　清心蓮子飲　六神湯
子童桑白皮湯　梅花湯　文蛤散
羊乳圓　白虎湯　益元散

去桂五苓散　生地黄飲子　栝樓粉
聯心湯　蠟苓圓　辰砂妙香散
神效膏　三痟圓　浮萍圓
白朮散　參耆湯　雞蘇圓
麥餅圓　忍冬圓　牡礪散
單方　繅絲湯　煞蟲方

漩濁

【心濁】瑞蓮圓　加味清心飲　寧志膏
十四友圓　香苓散　桑螵蛸散
蠟苓圓　遠志圓　心腎圓
【腎濁】秘精圓　震靈丹　鎖精圓

茯菟圓　固精圓　地黄圓
四精圓　蒜圓　入藥靈砂圓
小兔絲子圓　四五湯　安腎圓
山藥圓　【脾腎】蒼朮難名丹　【七情】四七湯
芡實圓　【通治】還少丹　分清飲
蠟苓圓　玉鎖固真丹　小溫金散
子午圓

漩多

川方五子圓　又方二　兔絲子圓
橘皮煎圓　萆薢圓　縮泉圓

遺尿

家韭子圓　雞內金圓　又方
秘元丹　桑螵蛸散　補脬飲

遺精

桑螵蛸圓　仙方固真圓　鎖陽丹
辰砂妙香散　三仙圓　清心圓
猪苓圓　理脾圓

失血

【風證】桂枝栝樓根湯　胃風湯　【寒證】麻黄升麻湯
犀角地黄湯　小柴胡湯　【暑證】五苓散
枇杷葉散　【濕證】除濕湯　【七情】木香勻氣散
蘇合香圓　止衄散　歸脾湯

天門冬湯 (聖惠)加味理中湯 又方
桂附湯 加味四物湯 (易簡)大薊散
犀角地黃湯 茆根散 萬金散
龍腦雞蘇圓 三黃圓 白朮散
([illegible])雞蘇散 蓮心散 大阿膠圓
([illegible])奪命散 花蕊石散 雞鳴散
加味芎藭湯 茯苓補心湯 (直指)立效散
單方 麝香散 黑神散
川芎三黃散 取毒散 蘇子降氣湯
衄血方 又方 四 天門冬圓
龍骨散 白及散 黃耆建中湯

[illegible]草汁 側柏散 特效方
灸法 (大便下血諸證) 酒蒸黃連圓
槐角圓 人參敗毒散 防風散
黃連阿膠圓 加減四物湯 ([illegible])腸風黑散
黑玉丹 加味[illegible]湯 卷柏散
聖金圓 神丹 小烏沉湯
震靈丹 玉華白丹 理中湯
香梅圓 斷紅圓
([illegible])黃連香薷散 香連圓 芎歸湯
眞人養臟湯 消風散 (直指)單方
又方 二 灸法

([illegible])五苓散 酒蒸黃連圓 茯苓調血湯
薑蜜湯 鹿角膠圓 髮灰散
[illegible]散 單方 又方 四

脫肛

文蛤散 木賊散 槐花散
釣腸圓 蝟皮散 香荆散
灸法

諸痔

([illegible])釣腸圓 黑玉丹 橘皮湯
立效圓 黑圓子 ([illegible])逐瘀湯
白玉丹 黃連阿膠圓 槐角圓

乾葛湯 寬腸圓 ([illegible])[illegible]方
又方 五灰膏 熏方
洗方 又方 連子散
木鱉散 ([illegible])熊膽膏 [illegible]散
消石散 青黛散 又方 二
蝸牛散 灸法 二

卷之八

○大方脉雜醫科

諸淋

([illegible])生附湯 八味圓 ([illegible])八正散
地膚子湯 石韋散 清心蓮子飲

火府丹 膏淋 鹿角霜圓 海金砂散
氣淋 香散 血淋 髮灰散 柿灰散
犀角地黃湯 乳石散 小薊飲子
導赤散 白薇散 通秘散
沙石淋 石燕圓 又方 瞑眩膏
苦杖散 通治 透膈散 地髓湯
豬苓湯 五淋散 通草湯
單方 淡竹葉湯 葵子湯

虛損

養榮湯 參香散 黃芪益損湯
正元散 萬安圓 增益歸茸圓
增損樂令湯 薯蕷圓 茴香圓
還少丹 天真圓 地仙丹
補骨脂散 宮方瑞蓮圓 無名丹
大建中湯 黃芪建中湯 人參黃芪散
安腎圓 雙和湯 青娥圓
十四味建中湯 十全大補湯 秦艽鱉甲散
沉香鱉甲散 小安腎圓 橘皮煎圓
生犀散 壯真丹 鹿茸大補湯
養腎散 巴戟圓 十補圓
白圓 鹿圓 芡實圓
天地煎 一秤金安腎圓 青鹽圓

無比山藥圓 拱辰丹 兔絲子圓
大固陽湯 又方二 正氣補虛湯

痼冷

金栗黃芽丹 聚寶養氣丹 黑錫丹
靈砂 歲丹 三建湯
金液丹 附子理中圓 震靈丹
來復丹 養正丹 玉華白丹
金鎖正元丹 四柱散 薑附湯
斂陽丹 沉附湯 耆附湯
參附湯 茸附湯 桂附湯
元陽秋石丹 陰煉法 陽煉法
灸法

五疸

加味四斤圓 麋角圓 芎桂散
藿香養胃湯

積熱

三黃圓 荊黃湯 凉膈散
洗心散 八正散 甘露飲
消毒犀角飲 青金丹 薄荷煎
玄明粉 天竺黃散 神芎圓
四順清凉飲 大連翹飲 解毒雄黃圓
牛黃凉膈圓 防風通聖散 灸法

心恙
[熱證]朱砂圓　洗心散　瀉心湯
甘遂散　辰砂妙香散　[虛證]引神歸舍丹
茯神圓　驚氣圓　鎮心圓
[illegible]鐵粉散　十四友圓　寧志圓
抱膽圓　一醉散　又方藥茯圓
鬱金散　朱雀圓　陳艾湯
歸神丹　平補鎮心丹　苦亭香散
灸法
怔忡
益榮湯　龍齒丹　茯苓飲子
排風湯　加味壽[illegible]圓　[illegible]靈砂
薑朮湯　五苓散
驚悸
十味溫膽湯　遠志圓　十四友圓
驚氣圓　加味四七湯
怔忪
還魂湯　桃奴圓　蘇合香圓
灸法
卷之九
大方脈雜醫科
健忘
小定志圓　菖蒲益智圓　加味茯苓湯
朱雀圓
虛煩
淡竹茹湯　溫膽湯　酸棗仁湯
小草湯　地仙散　清心蓮子飲
自汗
[風證]桂枝湯　[暑證]五苓散　消暑圓
卻暑散　[濕證]朮附湯　防己黃耆湯
[illegible]牡蠣散　黃耆湯　[illegible]湯
建中湯　防風散　白朮散
茯苓湯　大建中湯　止汗溫粉
止汗紅粉　[illegible]正元散　三建湯
芪附湯　桂附湯　[虛勞]麥煎散
青蒿散　[illegible]大蒜圓　青蛾圓
治陰汗濕痒方　治陰汗不止方　洗方
宿食
香蘇散　大感應圓　縮砂香附湯
穀神圓　紅圓子　三稜煎圓
勞瘵
總說　尸蟲遊食日辰及治法
觀尸蟲色知病淺深法
六代傳病及治部蟲形狀　取蟲防護法

神効散　攻蟲青桑枝飲　雄黃圓
神授散　虛損 凝神飲子　劫勞散
薯蕷飲子　十全大補湯　養榮湯
黃芪益損湯 骨蒸 生犀散　枳梗半夏湯
淸金散　鱉甲地黃湯　阿膠圓
地仙散　黃連飲　四美圓
黃芪鱉甲散　沉香鱉甲散　秦艽鱉甲散
青蒿鱉甲散 通治 太上混元丹　蘇合香圓
青蒿散　加減黃芪建中湯　淸骨散
團魚散　蛤蚧圓　灸法三

陰癩

茱萸內消圓　大戟圓　煉陰丹
兼金圓　應痛圓　三白散
金鈴圓　金鈴子散　牽牛圓
荔核散　橘核圓　牡丹散
竹皮湯　灸法

脚氣
傷寒實證 二香散　神秘左經湯　加味敗毒散
發表 五積散　加味獨活寄生湯　四蒸木瓜圓
川膝煎　十全丹　八味圓
神應養真丹　乳香宣經圓 通治 紫蘇子湯
茱萸圓　搗烏散　應痛圓

二仙散　捲柏散　大腹皮散
秘方換腿圓　石南圓　檳榔湯
木瓜茱萸湯　三將軍圓　杉木節湯
木瓜牛膝圓　木通散　蒼朮散
濟骨丹　烏藥酒　三和散
朮附湯　敗毒散　淋洗方
脚氣蒸法　脚氣塗法　脚氣洗法
近效方　灸法

腫滿
虛腫 復元丹　禹餘粮圓　實脾散
加味腎氣圓　木香流氣飲 通治 神助散

加味控涎圓　踈鑿飲子　通苓散
赤小豆湯　三仁圓　分心氣飲
三和散　涂臍膏　五皮散
麻黃甘草湯　檳榔八方芫花圓　牽牛湯
葶藶散　烏鯉魚湯　郁李仁散
川活散　紅豆散　紫金圓
防風散　茯苓散　治脚腫方
背腫方　烏梅酣法　腿腫方
陰腫方　婦人陰腫堅硬方　灸法

頭痛
風熱芎芷香蘇散　消風散　寒濕連須葱白湯
葛根葱白湯　濕證茵陳散　痰厥小芎辛湯
熱證防風散　太陽丹　流氣散
茶調散　芎犀圓　神芎圓
萊菔汁　加減芎辛散　氣虛大芎辛湯
如聖餅子　消風散　大附圓
四川圓　硫黃圓　胡蘆巴圓
又方點頭散　附子湯　蓽撥散
至靈散　一字輕金散　川烏散
天香散　白附子散　備急圓
四柱散　二陳湯　青州白圓子
八帝散　都梁圓　灸法
眞頭痛
面病
柏連散　治面上肺風瘡　硫黃膏
指爪破面　治粉刺　玉盤散
滑石散　又方　得法染鬚方
又方四　洗面藥
耳病
秘傳降氣湯　小清肺飲　排風湯
塞耳丹　治耳卒風腫毒起乾蝎散
解倉飲子　羊肝圓　蠟彈圓
安腎圓　黄芪圓　清神散
蓯蓉圓　犀角飲子　八味圓
小柴胡湯　雞蘇圓　地黄圓
芎芷散　芍藥散　治耳久聾
耳鳴方　耳熱出汁方　久聾方
又方　耳痛方　又方
蠟膏　立効散　麝香散
治耳内痛方　百蟲入耳　耳中出血
蒼蠅入耳　通耳法　透耳筒
飛蟲入耳　蟻入耳　蜈蚣入耳
治耳中有物不可出
鼻病
茶調散　辛夷散　川椒散
南星飲　細辛膏　治久患鼻膿
芎藭散　人參順氣散　白芷散
白龍圓　大風油　又方
凌霄花散　又方　硫黃散
白圓散　梔子仁圓　酒齄
齆鼻細辛散　通草膏　雄黃末
鼻瘡甘露飲　又方敷藥　瓜丁散
消鼻痔方　灸法

腋氣
蜘蛛散　六物散
中毒
石刻方　解毒圓　泉僧方
礬灰散　保靈丹　萬病解毒圓
青黛雄黃散　丹砂圓　單方
薺苨湯　國老飲　解諸毒
又方　獨勝散　升麻湯
又方　奇方　雄黃圓
參苓白朮散　又方四　解射罔毒
解巴豆毒　解天雄附子烏頭毒

解毒丹　解一切蠱毒　又方
又解諸毒　中諸藥毒　解鼠莽毒
又方二　治猘犬傷　又方
灸法　蜈蚣毒　又方
蜂蠆毒　斑猫毒　解蟹蝦蟆毒
河豚魚毒　蛇傷毒　又方四
虎傷　蜘蛛咬　狗咬
又方　狗咬入涎瘡　又方
馬咬　蚯蚓咬　猫咬　蠶咬　壁虱
鼠咬　守宮咬　蝎螫
入腳蟲傷方　灸法

諸蟲
烏梅圓　集效圓　化蟲散
貫衆酒　下寸白蟲
救急
救自縊　救溺水　又法
又方　又法三　救凍死
又法　救魘寐　灸法
破棺散　又方二　單方三
備急散　雄朱散　又方二
朱犀散　又方三
骨鯁

骨鯁入喉　又方二　玉屑無憂散
蜜錦法　又方三　神效解毒圓
魚骨鯁　又方　獸骨鯁
備急圓　誤吞蜈蚣　誤吞銅物
怪疾
得效四十六方

新編[illegible]氏小兒方

活幼論
初生
拭穢法　刺泡法　回氣法
通便法　貼顖藥　奇方
又方二
噤風
辰砂膏　益脾散　單方
臍風
天麻圓　立聖散　寶金散
治臍腫　安臍散
撮口
僵蚕方　天麻圓　蝎梢散
不乳
奇方　又方　茯苓圓
川白薑散
變蒸
惺惺散　紫霜圓　人參散
當歸散　調氣散
通治
乳哺法　護養法六　四君湯

相兒命短長法
驚候
大安神圓　星香散　來復丹
又方安神圓　奪命丹　小驚圓
通心飲　大青膏　蟬退散
利驚圓　人參湯　涼肝圓
胎驚方
急驚
通心飲　涼肝圓　大青膏
加減壽星圓　羌活湯　鈎藤散
塗顖法　浴體法
慢驚
白朮散　益黃散　安神圓
南星飲　防風圓　觀音散
五苓散　鈎藤飲　南附湯
丁附湯　蘇合香圓　灸法
慢脾
黑附湯　川烏散　金液丹
青州白圓子　生附四君子湯　蝎附散
靈砂　震靈丹
截風
蛇頭圓　大風膏　奪命散

防風溫膽湯　人參羌活散　銀白散
開關散　嚏驚散
諸癇
人參羌活散　牛黃清心圓　蛇頭圓
小驚圓　南附湯　紫霜圓
得効方　養正丹　豬膽南星散
肥兒圓　灸法
外感
麥湯散　惺惺散　香蘇飲
參蘇飲　柴胡散　人參羌活散
[illegible]香薷散　五苓散　[illegible]香蘇散

不換金正氣散　理中湯　平胃散
諸熱
[illegible]通心飲　甘露飲　天竺黃散
通靈散　[illegible]大青膏　小驚圓
通心飲　涼肝圓　[illegible]葱湯圓
白朮散　虞氏感應圓　[illegible]參蘇飲
惺惺散　變蒸熱方　[illegible]白朮散
蟾酥圓　[illegible]羌活散　[illegible]釀乳方
生地黃湯　[illegible]生犀散　又方
[illegible]導赤散　瀉白散　瀉黃散
涼肝圓　寒水石散　豆卷散

八正散　洗心散　皂角膏
葱涎膏　[illegible]地骨皮散　甘露飲子
人參黃芩散
痰嗽
半夏圓　[illegible]皮圓　參蘇飲
秘傳降氣湯　蘇子降氣湯　金沸草散
華蓋散　人參清肺湯　澄清飲
靈白圓　紫蘇飲
瘡疹
[illegible]參蘇飲　惺惺散　[illegible]如聖湯
人參羌活散　香葛湯　三豆飲

[illegible]紫草飲　加味四聖散　紫草木香湯
紫草木通湯　快斑散　人參羌活散
活血散　黃附湯　黃芩甘草湯
鬱金散　奇方　又方
[illegible]調解散　藿香正氣散　龍膽膏子
[illegible]加味宣風散　獨聖散　五福化毒丹
人齒散　靈砂酒　民望方
[illegible]犀角地黃湯　如聖湯　[illegible]神應膏
加味四物湯　蟬菊散　決明散
羌菊散　奇方　治豌豆瘡入目方
密蒙花散　決明圓　又方

通聖散　決明散　密蒙
洗方　塞耳丹　消毒 加味犀角飲
射干湯　連翹飲　五福化毒丹
甘露飲　瘡爛成片方　活血散
敗草散　搽方　通治 木香散
異功散　白朮散　人參門冬散
消風散　五苓散　四順清涼飲
大如聖湯　枳殼桔梗湯　二陳湯
理中湯　豆蔻圓　蘇合香圓
捷效化毒散　二參飲　木筆花散
減瘢散　又方　縮[illegible]散

瘧疾
通治 香蘇養胃散　十神湯　五苓散
人參湯　草果平胃散　截瘧驗金圓
蕩脾圓　截瘧通神餅　參苓白朮散

瘴氣
紅圓子　又方　木澄膏
灸法

痞結
枳實理中圓　桔梗枳殼湯

客忤
蘇合香圓　雄麝散　犀角散

黃土散

卷之十二

○小方科

癰毒
平血飲　犀角消毒飲　內托散
敗毒散　通治 平血飲　又方四
洗方三　又方　蜞針法

諸瘡
大安神圓　益黃散　生熟地黃湯
清肺湯　地黃圓　胡黃連圓
五福化毒丹　至聖圓　銅青散

下蟲圓　大蘆薈圓　龍膽圓
保童圓　白朮散　木香圓
褐圓子　黃芪湯　鱉血圓
蚵蚾圓　又方　通治 蟾酥圓
肥兒圓　六神圓　五珍圓
小黃連阿膠圓　疳瘂不能發聲方　豬肚黃連圓
洗方　又方　傅藥
針法

丁奚哺露
十全丹

魃病

龍膽湯
積熱
葱湯圓　消積圓　化鐵丹
鄭氏感應圓　紅圓子　蘇感圓
異香散　綿紗茶附湯
殺蟲
史君餅　四君子湯　化虫圓
烏金散　安蟲散
嘔吐
驚吐　安神圓　熱吐　硫黃散　冷吐　益黃散
熱吐　通心飲　冷吐　半夏圓　積吐　益黃散

風吐　大青膏　白朮散　理中湯
掌中金　丁香散　藿香正氣散
[illegible]不時嘔吐　香薷湯　香蘇散
積吐　四君子湯　又方
吐乳不止恐成脾風方
霍亂
總說　白朮散　五苓散
六和湯　香薷圓　來復丹
金液丹　單方　灸法
泄瀉
[illegible]　安神圓　小驚圓　白朮散

[illegible]　白朮散　蟠酥圓　史君餅
積瀉　消積圓　益黃散　平胃散
香附湯　[illegible]　五苓散　通心飲
[illegible]　理中湯　又方　豆蔻散
[illegible]　不換和安散　枇杷葉散　來復丹
香薷湯　香連圓　[illegible]　靈砂丹
[illegible]　香薷湯
下痢
地榆散　又方　四生散
小黃連阿膠圓　大柴胡湯　木香散
朴附圓　香連圓　養臟湯

小駐車圓　罌粟飲　石蓮散
眞料參苓白朮散　等佳圓　小駐車圓
必效雞子　感應圓　靈砂圓
牛乳湯
脾胃
白朮散　史君子圓　六神湯
益黃散　醒脾散　勻氣散
觀音散
腹痛
四順清涼飲　七氣湯　蘇合香圓
六氣湯　枳殼桔梗湯

疝氣
金鈴散　紅圓子　小擒撫圓
金鈴子圓　沉苓散　當歸散
鉤藤膏　魏香散
吐衄
蒲黃散　生地黃汁方　鼻衄方
腫滿
五苓散　分氣飲　五皮散
神助散　奇方　三黃散
單方
盜汗
白朮散　安神圓　小驚圓
又方　黃耆建中湯　牡蠣散
奇方　又方
項軟
天柱圓　五加皮散　健骨散
生筋散
語遲
菖蒲圓
聤耳
明礬散　月蝕耳瘡方　又方
重舌

傅藥
木舌
紫雪　又方二
滯頤
溫脾散　通心飲　口角瘡爛方
咽喉
射干湯　咽喉腫痛方
夜啼
導赤散　六神散　蒜圓
安神圓　[illegible]把蒜[illegible]啼方　黃土散
顖陷
單方
顖填
集說
解顱
地黃圓　三辛圓　又方二
手拳不展
薏苡圓
腳拳不展
海桐皮散
行遲
地黃圓　又方虎骨圓　五加皮散

鶴節

地黃圓

龜胸　龜背

百合丹　松蕊丹　灸法

髮不生

蓯蓉圓

齒不生

芎黃散　又方

瘡毒

平血飲　敗毒散　犀角消毒飲

五福化毒丹　苦參圓　角無辜殘毒

諸般惡瘡

鯽魚方　如聖黑膏

疥瘡方　魚膽瘡方　蜘蛛瘡方

癬方　浸淫瘡方　炙甲散

漏瘡方　白斂散　三物散

生附湯　陰瘡方　胎毒瘡方

即效方　瘡目瘡方　諸惡瘡方

口瘡

瀉心湯　連翹飲　洗心散

傳藥　貼藥　又方二

軟癤

豬頭散　又方三　斂瘡口方

脫肛

釣腸圓　人參圓

痢瀉脫肛黑色生散方　龍骨散

洗方　又方二　貼方

水聖散子　紫霞膏　又方

灸法

遺溺

雞腸散　又方　家白茯苓散

又方

淋閉

葵子散　導赤散　順經散

大便秘

沒藥散

陰腫

三白散　桃仁圓　蟬退散

傳藥地龍骨　又方　牡礪散

又方　遇仙方

孚熱

捷方　又方三

斷乳

畫眉膏

○風科

風狀論雜　中風死證　中風要訣

虛證

通氣驅風湯　加減續命湯　大省風湯
順元散　二香三建湯　一粒金丹
萬金湯　八寶回春湯　真珠圓
禦風膏　又方三　虎骨酒

熱證

金沸草散　人參羌活散　星香飲
防風通聖散　三黃湯　小省風湯

洗心散　四順清涼飲　小通聖散
清神散　茶調散　川芎石膏湯
消風散　透冰丹　解毒雄黃圓
大秦艽散　通關散

通治

解語湯　加味壽星圓　排風湯
蝎麝白圓子　救急稀涎散　芎辛香散
禹功散　又方　神柏散
法風丹　豆淋酒法　枳皮酒
蒺藜膏　一得散　又方
獨行散　又方　趂風膏

乳靈圓　追風獨活散　仙桃圓
古方　治暗風倒地方　神應方
烏犀圓　四神圓　腎瀝湯
麝香天麻圓　牛黃清心圓　烏荊圓
許州[illegible]圓子　蘇青圓　蛇黃圓
琥珀圓　辰砂圓　妙應圓
大九[illegible]　烏附圓　威靈仙圓
鎮肝圓　皂角六一圓　金朱靈丹
香附湯　正舌散　仙茅散
活絡丹　黑龍圓　左經圓
川芎散　枳實酒　[illegible]花散

天仙膏　洗方　燒竹瀝法
灸法　又法

癘風

得効第一方　仙方　解毒雄黃圓
浴法　換骨丹　遇仙丹
疎風散　佛手膏　去毒丹
甘草散　解毒圓　福神丹
木香[illegible]　通天再造散　三濟圓
八葉湯

癱風

排風湯　小續命湯　蘇合香圓

不換金正氣散　一粒金丹　大鐵彈圓
大四斤圓
歷節風
羌活湯　趂痛圓　附子八物湯
烏頭湯　虎骨散　麝香圓
獨活寄生湯　蘇黃散　神授圓
歷節痛風方　又方二　搜風酒
白虎風走注方
癘風
何首烏散　如聖膏　又方三
灸法

卷之十四
產科兼婦人雜病科
濟陰論
護胎
驗胎法　參蘇飲　香蘇散
石膏湯　加減安胎飲　桑寄生散
治漏胎　治胎動　急救方
黃芪湯　小安胎飲
加味二陳湯　小紫蘇飲　木香圓
白朮散　紅圓子　保生圓
參苓白朮散　杜仲圓　歸涼節命散

內補圓　竹茹湯　竹葉湯
知母圓　榆白皮散　知母飲
保氣散　冬葵子散　大腹皮散
鯉魚湯　八味圓　赤小豆湯
腎著湯　安胎和氣散　紫蘇飲子
安榮散　桑螵蛸散　二白散
當歸芍藥湯　蒙薑黃連圓　雞黃散
生料平胃散　羚羊角散　人參養胃湯
清脾湯　消風散　天門冬飲子
治傷寒熱病方　罩胎散　妊娠咳嗽方
又方　苦參圓　八味圓

治妊娠大便秘方　治妊娠小便淋方　八正散
治妊娠失音方　產前喘嗽方　大聖茯苓散
救生散　枳殼散　治鬼胎方
轉女為男法　治兒在腹中哭方
保產
收生法　補中湯　神效佛手散
神應黑散　龍蛻散　遇仙雄黃丹
加味芎歸湯　勝金散　應急方
催生湯　催生丹　烏金散
香桂散　奪命圓　養正丹
備急圓　蛇蛻散　七聖散

乳珠丹　神驗散　如意散
一字神散　療難產方　又方
治横逆方　治死胎不下方　單方
治產難胞衣不出方　如聖膏
存命丹　牛膝湯　花蘂石散
灸法　方產戒忌

產後

黑神散　黑龍丹　血竭散
芸薹散　奇效方　半夏茯苓湯
牡蠣散　芎歸湯　又方四
加味五積散　玉露散　逍遙散

知母湯　增損四物湯　五苓散
黃芪益損湯　竹葉防風湯　陽旦湯
柴胡地黃湯　神効白散子　大調經散
枳朮湯　奪魂散　小調經散
大聖散　蘇合香圓　如香湯
又大聖散　大豆紫湯　獨活寄生湯
加味壽星圓　濟危上丹　麻黃根散
立効方　七珍散　孤鳳散
愈風散　交加散　趂痛散
如神湯　五香連翹湯　抵聖湯
產後嘔吐不止方　產後霍亂二方　芎附散

川芎茶調散　川烏散　二母散
旋覆花湯　小參蘇飲　四物湯
大料煑芎藭湯　牡蠣散　延胡索散
又方　紫金圓　羊肉湯
經効方　人參當歸散　蒲黃散
熟地黃湯　當歸芍藥散　草果飲子
生熟飲子　石子湯　人參鼈甲散
人參散　黃芪散　小溫經散
丁香散　石蓮散　固真圓
加味五積散　四君子湯　的奇散
黃連阿膠圓　理中湯　真人養臟湯

阿膠枳殼圓　又方二　蘇麻粥
木通散　灸法治產後小便不通
茅根湯　桑螵蛸散　蒲黃散
當歸散　硫黃散　熨法
桃仁膏　硫黃湯　桂枝散
又方二　當歸養血圓　四神散
當歸黃芪湯　四順理中圓　當歸建中湯
濟陰丹　人參養血圓　單方
捷徑方　內灸散

下乳汁

奇效方　漏蘆散　成煉鍾乳

母猪蹄湯　青桑膏

卷之十五

○產科兼婦人雜病科

通治

四物湯　莪术散　加味五積散
當歸湯　通真圓　白薇散
大烏雞煎圓　大效内補圓　小莪术散
勝金丹　大聖散　大玄胡索散
灸法

感冒

麻黄湯　解肌湯　人參湯
桂枝紅花湯　海蛤散　三黃圓

喘嗽

人參散　噙化圓　貝母湯
金不換散　千緡湯

調經

香附圓　滋血湯　凉血飲
紫石英圓　當歸散　通經圓
茱萸鹿茸圓　三稜圓　没藥散
治經脉不利方　撞氣阿魏圓　大聖散
艾煎圓　濟陰丹　杜牛膝散
大油煎散

血氣

抽刀散　二神圓　没藥散
玄胡索湯　琥珀散　三神圓
失笑散　奇方　手拈散
香附圓　三稜煎圓

血瘕

桃仁煎　琥珀圓　通經圓
黑神圓

血蠱

木香散　溫白圓

血癖

紅圓子　大麝香圓　神效方
小烏雞煎　葱白散

腸覃

烏喙圓

食積

三稜煎　紅圓子

腸氣

五膈寬中散　分心氣散　沉香降氣湯

血風

人參荊芥散　單方　黑神圓
大芎藭散　羚羊角散

歷節
麝香圓
血虛
加味補陰湯　靈砂丹　蔥白湯
桂香散
癲狂
加味逍遙散　小柴胡湯
煩熱
油煎散　逍遙散　清心蓮子飲
春雪膏　朱砂膏　敗毒散
黃耆散

心痛
九痛圓　奇方　又方
腹痛
北亭圓　奇方
脇痛
木通散　賺氣散
風痺
三痺湯
臂痛
舒經湯　交加散　神保圓
四物湯

拔溺
白薇圓　澤瀉圓
滋濁
二豆散　勝金圓　餘粮散
烏金散　又方
白濁
金鎖正元丹　秘精圓　四七湯
青州白圓子
崩漏
鎮宮圓　柏子仁湯　秘方龍骨圓
平胃散　滋榮圓　加味四物湯

熟附圓　金華散　黃芩湯
又方二　梅飲子　又方
五倍子散　奇效四物湯　豆花散
又方　灸法
帶下
白斂圓　當歸煎　卷柏圓
紫金散　香附散　白芷圓
白芍藥散　秋霜丹
求嗣
溫經湯　暖宮圓　抑氣散
小溫經湯　秦桂圓　陽起石圓

濟陰丹　炙法

雜方

厚朴圓　芎歸湯　撥攬圓
橘歸圓　八味圓　鹿茸圓
芍藥湯　虎骨散　補心湯
狼牙湯　雄黃兌散　洗搨湯
藿香養胃湯　放癰瘡　又方
治茄子疾　又方　洗方
伸藥　下疳瘡方　又方
礬石散　銕粉散　熏洗方
托藥　熁藥　敷藥

治腫不收　膏髮煎　治腳赤腫
治陰瘡　又方三　治痔瘡
治陰中生瘡　黃芩散　治陰門腫方
月經不行諸　洗心散　三茱圓
一捻金圓　四物湯　又方

卷之七十六

○眼科

總論　五輪八廓　七十二證方

虛證

加味磁朱圓　補肝圓　養肝圓
錦鳩圓　駐景圓　育瑩圓

巴戟圓　花草膏　椒目圓
黑神散　加味參附正氣散

熱證

八珍散　聖效散　地黃圓
決明散　收淚散　羊肝圓
五行湯　地黃膏　又方
黃連湯　蔓荊散　春雪膏
穿針散　又方二　石決明散
食治方　貼藥

風證

消風散　白蒺藜散　蟬花無比散

流氣飲　菩薩散　驅風散
聖草散　偶得方　洗方
又方二

氣證

木香流氣飲　分氣飲　石膏羌活散

翳障

退翳散　搐藥　觀音夢授方
羊肝圓　點藥　呂仙翁方
單方　重明散　五退散
麥門冬圓　還睛圓　龍腦膏
神仙照水膏　照水丹　撥雲膏

洗方　水淋法　明上膏
治赤眼後生翳膜方　洗眼藥
小決明散　浮萍散　黃連膏
點眼膏　通天散　運氣法
飛絲入眼腫痛方灸法　針法
拾遺十六方

卷之十七

○口齒兼咽喉科

總說

口病

洗心散　四順清涼飲　甘露飲

雞蘇圓　黃連阿膠圓　秘傳降氣湯
龍石散　綠雲膏　升麻散
碧雪　換金散　赴筵散
傅方　杏粉膏　青金散
芎芷膏　益智散　鵬砂圓
又方　遠志散　又方二
獨勝散　立效散　茱萸散
貼足方　濯足法

唇病

菊花散　瀉黃飲子　薏苡仁湯
擷攬散　白灰散　灸法

舌病

柴胡升麻湯　金沸草散　正舌散
五福化毒丹　礬石散　治木舌方
又方　黑散子　薄荷蜜
文蛤散　必勝散　又方
酣飲喉舌生瘡方　治重舌方　舌強腫起方
舌無故出血方　治舌腫脹方
烙腫法　治失音

齒病

安腎圓　八味圓　嘉禾散
玉池散　蟾酥圓　蝎附散

細辛散　二陳湯　靈脂醋
甘露飲　荊槐散　鬱金散
治牙宣三方　搐鼻方　塞耳方
揩牙方　治牙齒痛方　乳香膏
治風蚛牙疼方　治牙痛方　逡巡散
牢牙散　莽草散　防風散
消風散　又法　香椒散
川芎散　秘方　牙痛四證
取蟲方　揩漱方　巴豆方
甘松香散　秘方　小薊散
芫花散　治蛀牙疼　治風蛀牙痛

治溢風蚛牙　又方三　亂蛀牙齒方
敷藥退腫方　常用齒藥方　牙齒藥
齒間肉痛方　灸法　又法二
又方　導引方　輔車開方
灸法
喉病
秘傳咽喉科　一十八種喉風證針灸法
實熱　虛熱　虛實通用藥
咽喉生瘡方　奪命散　防風散
玄明粉　追風散　死候
重舌木舌方　帝鍾風方　煮針法

含痰上方　又方　破毒膿方
雄黃散　又方二　取喉中涎方
開關潤喉[illegible]　開喉關方　去涎方
又開關喉方　宣利方　通後補助方
乾喉風方　搶食風方　潤關什痛方
治誤吞銅錢方

卷之十八

正骨兼金鏃科

秘論　正骨金鏃脈候　十不治證
用藥加減法　腸肚傷治法　用麻藥法
又麻藥加減法　傷破肚皮用藥法
用撚藥法　打擷及損木壓痛不止痛者
打退血法　用藥湯使法
通治
斷撲刀傷接骨方又方二　清心藥方
自然銅散　又方　導滯散
純陽散　活血丹　大紅活血丹
當歸散　花蕊石散
內損
紫金散　沒藥散
打撲傷損
加味芎藭湯　木香匀氣散　雞鳴散

平胃散　雙烏散　救急方
洗心散　黑神散　墜馬方
蘇合香圓　接骨散
刀斧棒杖傷
禁瘡斂子　龍骨膏　奪命散
單方
取箭鏃
一字散　神仙刀箭藥　又方
治箭鏃入骨方
針灸傷
內托黃耆圓

消爛
四聖散　傅藥
活血散　治刀傷方　治傷損方
治折骨傷筋方　地黃膏　罨方
又方　劉寄奴　又方
鬆粉散　白灰散　又方
黃丹散　又方七
治血聚皮不破方　滅瘢方　又方
洗方
荊葉散

玉真散　破傷風　香膠散　急風散
破傷濕
牡蠣散
舒筋
舒筋法
退腫
蒼朮散　紫金皮散
麻藥
草烏散
合瘡口

松皮散　又方二　太乙膏
止血收瘡口方　又方二　乳香膏
潤肌
小香膠散
止痛
乳香散　應痛圓　尋痛圓

癸卷之十六
〇瘡腫科
總說　五發形圖　秘傳十方
通治
車螯散　單煮大黃湯　五香散

五香連翹湯　平補散　加味十全湯
真方不換正氣散　阿膠飲子
忍冬酒　蠟礬圓　粉乳托裏散
五味子湯　神白膏　乳香膏
追毒丹　太乙膏　善應膏
玄武膏　金絲膏　貼膏法
蜞鍼正法　追毒餅　內追毒丹
新羅乾葛飲　蘇子降氣湯　人參敗毒散
六乙湯　八味圓　蒼朮散
乳香圓　黑附圓　禁腫法

乳癰　又方二　○脇癰
又方三　吹乳　妳頭裂方
又方二　灸法
心癰
涼血飲　內托散　加味十奇散
腎癰
八味圓　加味十奇散
肺癰
桔梗湯　葶藶散　牡丹散
補肺散　理肺膏　加味小[illegible]散
內[illegible]排膿散　薏苡湯　五香白朮散
雲母膏　加味十奇散　肺癰說
灸法
腸癰
敗醬散　牡丹湯　薏苡湯
蠟礬圓
附骨疽
蟾蜍膏　黑鯉膏　赤朮圓
便毒
雙解散　五香連翹湯　復元通氣散
五苓散　蠟礬圓　四順清涼飲
木香流氣飲　[illegible]湯　[illegible]
又方　灸便毒法
偏癰
秘方　又方二
癮疹
清肌散　加味羌活散　加味烏荊圓
麴朮散　消風散　茶調散
胡麻散　治癮疹方
傳藥　又方　洗方
諸痔
〔錢氏〕平血飲　小牛黃圓　牛黃清心圓
天麻煎　酒蒸黃連圓　地黃湯
當歸飲　連翹飲　赤小豆湯
蟬蛻散　〔虛證〕四生散　黃耆圓
增益四物湯　五香連翹湯　五苓散
〔聚寶〕合掌散　〔通治〕多年惡瘡方　赤小豆方
殺蟲方　惡瘡方　又方
葛滑末　葵花散　松脂散
一掃散　殺疥藥　真平胃散
二黃膏　神異膏　淨肌散
又方　烏梅膏　苦綠膏
青黛散　〔洗方〕苦參湯　驅風散
指縫搔痒成瘡　冷氣入瘡　浸淫瘡

疵瘡　凍瘡　又方
人面瘡　白癩瘡　甲疽瘡
月蝕瘡　癩頭瘡　頭上風屑
外腎甘瘡　陰莖瘡　陰囊上瘡
陰頭生瘡　妒精瘡　又方
津調散　呷一　蛇纏瘡
瘑子痒痛方　洗方　又方
癬瘡
胡粉散　烏頭圓　昨葉荷草散
遍身牛皮癬方　又方二　灸法
臁瘡
牛黃金虎丹　應効三聖散　又方八
檳榔散　單方　粉霜散
牡礪散　秘方二　洗藥
熏藥
手足裂腫
白及膏　秘方　又方
浸足行腳心腫痛　又方　黃蠟膏
傅藥
漏瘡
蠟礬圓　溫解散　猪腎酒
食治方　桂附圓　乳香砒霜膏

安腎圓　山藥圓　代赭石圓
雄黃膏　黑靈散　又捷效方
血竭散　洗方　久冷漏瘡方
瘰癧
白花蛇散　四聖散　牽牛圓
連翹圓　三聖圓　必勝圓
旱蓮子圓　破毒雄黃圓　已驗方
海藻圓　經効方　立應散
皂角散　粉乳托裏散　蠟礬圓
蝸牛散　燒灰散　洗傅方
又傅方　斂瘡口方　灸法
瘤贅
南星膏　治小瘤方　消瘤圓
繫瘤法　黃丹末
丁瘡
秘方二　酒煎散　通利藥
大通藥　連翹散　角蒿白方
蟬蛻散　蟾酥膏　水沉膏
灸法
簽刺瘡
單方　又方　敷藥
湯火瘡

傳方　又方　蠲痺湯方
又方　黃柏散　至聖膏
近効方　四黃散　搽藥
項癭　灸法
破結散
卷之二十
○孫真人養生書
養性序　道林養性　居處法
按摩法　調氣法　服食法
黃帝雜忌法　房中補益法
古得効目録尾終

世醫得効方卷第一

建寧路官醫提領陳志　刊行
南豐州醫學教授危亦林　編集
江西等處官醫副提舉余賜山　校正

○大方脉雜醫科

○集脉說

人之有生血氣順則周流一身脉息和而諸疾不作氣血
逆則運動滯澀脉息亂而百病生然脉之精微心中了了
指下難明故西晉王叔和猶為切慮凡診之際須先正中靜
慮以呼吸息數定病人之脉其兩手各三部分寸關尺
左三部心肝腎小腸膀胱為腑右三部肺脾命
脾命大腸胃與三焦為腑每部浮按消息之次中按消息
之又沉按消息之浮以診其腑見六腑之盛衰沉以診其
臟見五臟死生盈虛中則診其胃氣蓋胃乃衆穀之海人
以食為命有胃氣則生無胃氣則死每三部三三如九乃
為九候復有七表八裏九道脉風寒暑濕中傷之脉七情
虛損冷熱之脉當析而論之七表屬陽浮芤滑實弦緊洪
浮如指按葱葉則中空有兩頭謂似流珠實則從而有
力弦如琴絃緊如弦急則舉指極大八裏屬陰微沉緩
濇遲伏濡弱微於指下如細絲沉若爛綿按之至骨緩則
來往不急不慢為遲小則尋之隱隱伏潛於骨

重按乃得為濡指遲似怯弱而去來無力九道之脉長短虛促結代牢動細長促屬陽短虛結代牢動細為陰長脉三関通度促脉過之極數短脉按之不及虛脉過之不足舉之有餘結脉指下聚而却還代脉動中一止停久乃還有疾者難治若氣逆得之則無憂牢脉因結不移之狀三部若見皆死候也動脉再再動之不離其處細脉細細如絲來往極微凡此二十四脉分別錙銖總而括之浮沉遲數也至於傷寒温疫其脉緊促兼復見風則浮而緩或感之脉沉大若太陽少陰沉反者陽明太陰沉弦者少陽厥陰陽病見沉濇弱弦微者及陰病見浮大數動滑者生陽毒之脉擽浮洪數陰毒之脉附骨取之方有按之即無

陰陽二厥脉皆沉所以使人疑之陰厥脉沉遲而弱陽厥脉沉伏而滑發熱下利脉沉弦者下重也脉大者為未止脉微弱者自愈雖發熱不死中寒之脉亦緊但肝中沉弦心中加洪脾中加緩肺中加濇腎中加沉滑傷濕則遲散氣其脉浮復見寒則浮而緊中風之脉亦浮五臟所中脉與中寒頗也大抵遲浮則虛實大弦數則難治傷於氣血消散脉虛弱無力中則濡弱浮虛微遲鬱乱傷濕之脉濡而弱若沉而細微中之明之七情喜怒憂思悲恐驚喜則脉散怒則脉促憂則脉結思則脉俱泣愛則脉濇驚則脉動皆生於氣也虛損者血虛氣浮大而無力或沉細而微弱實熱者則脉指下弦數洪或細數緊實虛而緩

之脉弦夏鈎秋毛冬石濡弱而長曰弦來疾去遲曰鈎輕虛以浮曰毛沉濡而弱曰石此四時之常脉也其有太過不及有覆有溢有関有格太過者氣有餘寸脉本浮又加實大是為陽太過也尺脉本沉又加實大是為陰太過也不及者氣不足浮之損小者是陽不及也沉之損小者是陰不及也覆溢二脉者溢自関前進上於魚際為外関内格陰乗之脉也覆脉自関後退下入於尺澤為内関外格此陽乗之脉也見如此者乃諸臟相乗四時相剋雖未病病即死不可治也又曰三関通度過於洪大則或風或痰設若沉細則為之不痊六部相貫按之不及極浮微者殂再再至之至骨不絶若夭年有水矣至於衆病生死之脉

若諸氣脹滿浮大可療虛小難保下痢宜微小不宜洪大恍惚顛狂者實大為順沉細為逆消渴數大者生虛小難愈水氣浮大則宜沉細則愈而復作霍亂浮洪可救微遲不語形小難瘥鼻衄吐血利於沉細不利於浮大心腹痛宜見沉細不宜見浮大頭痛浮滑易除短濇不愈上氣浮腫浮滑可安微細難瘵中惡緊細易治浮大難痊金瘡出血虛細則宜實大則傾中毒洪大則存細微則亡亡病脉若奔湧魚翔彈石解索屋漏蝦遊雀啄偃刀轉豆麻促釜沸如湧泉浮數俱無乃三陽數極無陰之候旦見夕死夕見旦死魚翔來浮膚泛泛三陰數極又曰亡陽當以死斷彈石脉來辟辟湊指急促而堅乃腎經真臟脉現遇戊

已日則不治。解索脉散散無序，此與命門之氣皆亡，戊己日篤，庚辛日不治。屋漏之脉如水下滴濺地貌，胃氣榮衛俱絕，七八日間危矣。蝦游狀如蝦游水面，杳然不見，須臾又來，隱隱然不動，依前又去，醒者七日死，沉困者三日不治。雀啄之脉，指下來三去一，如雀啄食之狀，脾元穀氣已絕於內，醒者十二日死，困者六七日。偃刀之脉，尋之如手循刀刃，無進無退，其數無准，由心元血枯，衛氣獨居，無所歸宿，見之四日難療。轉豆形如豆，周旋展轉，並無息數，臟腑空虛，正氣飄散，象曰行尸，其死可立待也。麻促之脉，應指如麻子之紛亂，細微至甚，蓋衛枯榮血獨澀，輕者三日，重者一日殂矣。又論四十五動一止，脉以二十四氣七十二候應死期之准的。孟春立春日十五動一止，明年東風解凍，蟄蟲始振，魚陟負冰時；二十動一止，一年雨水，獺祭魚，鴻雁北；三十動一止，二年草木萌動，驚蟄桃始華時；四十動一止，四年倉庚鳴，鷹化為鳩時。且如仲春驚蟄桃始華日脉二十動一止，明年春分，玄鳥至，雷乃發聲時；三十動一止，三年春分始電，桐始華時；四十動一止，四年季春清明，田鼠化為鴽，虹始見，萍始生，鳴鳩拂其羽，戴勝降于桑時，以下倣此。[illegible]

[illegible]若時疫之脉，則無定據，隨時審思，乃得未可輕議。故知此歪心脉虛散，肝脉洪盛，或浮沉長短大小無定，或錯雜不倫，尤宜加意。凡此諸脉，因鄙見莫之敢遺，然其或逆或順，猶在詳審而消息之，毋固執而有終通，則可得之矣。

○集病說

傳曰：名不正則言不順。病之名狀，其類至多，原其所由，似是而非者尤多，若昧認之，明辨其所因之的，則何患其多也。夫傷寒六經之病：足太陽膀胱經，頭項強，腰脊痛，無汗；足陽明胃經，身熱目疼鼻乾；足少陽膽經，胸脇痛耳聾；足太陰脾經，自利不渴，腹痛；足少陰腎經，口燥舌乾，背惡寒；足厥陰肝經，煩滿囊縮。傳變不一，或愈或死，愈者多出旬日之外，死則在六七日之間。獨寒獨熱亦難治，世號為大病。陽毒之為病，乃陽氣獨盛，陰氣暴絕；陰毒之為病，本因腎氣虛寒，或因冷物傷脾胃，內既伏陰，外又感寒所致。陽厥初病身熱頭痛，至二三日四五日方發厥，半日卻身熱，蓋熱深方能發厥。陰厥初得病便四肢厥冷，乃陰勝於陽也。厥者，陰陽不相順接。厥少熱多者，其病當愈；厥多熱少者，其病為進。或加以上氣腳縮，則為六腑氣先絕於外也。至於下利清穀，不可攻表，汗出必脹滿。下利有微熱而渴，自愈。中之者皆因下虛，氣弱受犯，積鬱久曾風

又 本文作

霧中行所致傷風之病在表在經絡中循經流注以日傳變中之者非正順長養萬物之風乃八方偏邪之風肥偉人多得之盖因性發暴喜行數變其中人也卒其眩人也暈溺人從浮傷人神形所以推爲百病長傷暑者乃三伏時月炎熱大行暑蒸河涸日灼氣沮之人偶或傷之病在頃刻中之則名中暍輕則名傷暑重則爲中傷濕乃坐臥卑濕或爲霧露所襲或汗出衣裏衝濕漬染之其有中者乃脾元久虛或爲泄疾土不制水因茲而得復有四氣伏於人身隱微而不知覺作爲百端之病綿延歲月不已必須深思求其所以爲病之因然人之平居神靜則寧情動則亂故喜則氣緩怒則氣上悲則氣下憂則氣沉思則氣結恐則

氣消驚則氣亂故有所謂七情之病也若五氣所致而氣不貫復啗生冷冰雪之屬致腸胃虛寒或大病未復便合陰陽或疲役筋力或飢飽失節或刻意苦思耗神疲魂叫呼走氣而虛損病所由生也精血既衰臟腑多燥三焦煩壅復餌丹石酒醴炙煿致腸胃蘊毒而發熱病所由生也以諸病總而論之中氣有類中風中風而以中氣治之亦無所傷中氣而以中風藥投之負不旋踵矣然先代醫師許學士張子和以親故痛念醫之不明所以述其條而凡於著述也若痰瘧之病未有不由四季所感風寒暑濕及飲食勞役瘴癘之氣爲之亦白則疾古人所謂濕瘧者是也究疾之原無非外感五邪之氣內傷生硬冷熱之食不能

尅化致令積滯而成亦有久虛傳變而成下之不禁五者手足不仁則五臟氣將絕於內也失血之病十種是矣皆人重於此皆因四氣所傷或調養失宜所致時疫流行則當審其春合暖而寒夏合熱而冷秋合涼而熱冬合寒而暖是皆六氣愆和而生斯疾大則流毒天下小則蔓延一鄉一家必辨其各季所因不可以尋常微病目之故重則禍至滅門輕則病至危篤外此觀形候聽聲而知病之可治不可治經中所謂視精明者盖五臟精明聚於目精全則目明神定則視審視不瞭精明敗矣又云目赤色者病在心白在肺黑在腎黃在脾青在肝黃色不可明病在胸中所謂五色者乃氣之華也赤欲如帛裹朱不欲如赭

白欲如白璧之澤不欲如堊青欲如蒼璧之澤不欲如藍黃欲如羅裹雄黃不欲如黃土黑欲如重漆色不欲如炭五臟精敗壽不久矣五聲者臟之音中之守也中盛則氣盛中衰則氣衰聲如從室中言者氣濕也言而微終日乃復言是氣之奪也言語善惡不避親疏者神明之亂也鄭聲言語不相續陰陽失守也得守者生失守者死六府強弱以候形之盛衰頭者精明之府頭傾視深精神將奪矣背者胸中之府背曲肩隨府將壞矣腰者腎之府轉搖不能腎將憊矣膝者筋之府屈伸不能筋將憊矣骨者髓之府行則振掉骨將憊矣倉廩不藏者腸胃不固也水泉不止者膀胱不藏也得強者生失強者死又云言而明之又如五臟已奪神明

不守声嘶身冷循衣譫語摸床面赤如衃血白如枯骨黑
如炲煤面青目白面黑目白面黄目青面赤目白耳鼻有
黑色起入口耳目顴頰赤者黑色出于額上髮際直鼻脊
兩顴上黑色出天中下至鼻上顴上面忽如馬肝色望之
如青近之如黑目直視惡風面黑唇青面青唇黑面黑兩
脇下滿不能自反轉頭目久痛卒視無所見陰結陽絶目
精光脫恍惚陰陽竭絶目眶陷口如魚口不能復閉氣出
不返唇反齒齦乾枯天柱骨倒指持拳攣縮汗出不流舌卷
黑髮直髮如乾麻善怒髮與眉衝起爪甲青大肉白潰不
膏身熱喘息脇下硬如鐵裂鼻黑舌根強硬四肢逆冷汗
出如油不流尸臭不可近目睛直視不回一日病人健人
黑色或白色起入目及口鼻一日陰陽俱絶失音不能言
三日半口張唇青人中滿三日目無精光若土色不受飲
食四日面赤目青六日面黑目白爪甲下黑八日齒忽變
黑十三日肝病以黑庚辛日心病目黑壬癸日脾病唇青
甲乙日肺病頰赤目腫丙丁日腎病面腫唇黄戊己日以
上俱不可治也面目黄色起其病方愈面黄目青面黄目
赤面黄目白面黄目黑面黑目青面目俱黄面黑目白均
可治也大抵言病動以百計雖積蕭言莫能盡述但當留
心殷勤學之博通乃得不可以粗解一二為之果其然而
正其名庶不誤投湯劑則何患病之不瘳矣

○傷寒證訣

古之醫者有云外病自經絡入內病自五臟發發熱當求
所以證驗無差失如傷寒有陰陽表裏陽證多語陰證
無聲陽證則晝劇陰證則夜甚陽證似陰黄黑而脈滑陰
證似陽面赤而脈微手身重背疼煩悶狂言奔走咽痛身
斑斑若錦文或下利赤黄多因妄服燥藥熱毒陽毒是也
背強腹小絞痛身如被杖燥渴嘔泄冷汗鄭聲多因胃
虛寒重感於寒陰毒明矣陰陽二厥若陽厥則指爪時温
或畏熱或飲水或揚手擲足煩躁不得眠大便秘小便赤
外證多昏憒陰厥則指爪常冷足多攣卧惡寒自引衣蓋
覆不飲水或下利或清便如常小便數外證惺惺而靜表
證多惡寒不渴發熱而身疼痛裏證多揭口惡熱而喘滿
口燥咽乾手心腋下濈濈汗出大便難譫語復有傷
寒初證發熱惡寒無汗其色慘悽復見風則多寒手足微
厥發熱下利手足温暖者生手足厥逆者死不過發之極矣
中寒則口噤四肢強直失音不語或卒然暈倒吐涎
手足搐搦或如傷風或復燥熱傷風有汗惡風面色光而
不慘復見寒手足微温發熱多煩其或中者半身不遂手
足癱瘓涎潮昏塞口眼喎斜肌膚不仁歸於六腑者特為
偏緩可尚延歲月歸於五臟者眼閉口開手撒聲如鼾
睡遺尿惡證迭出朝不及夕傷暑身熱惡寒頭痛或煩而
渴脈虛背寒面垢或嘔或泄其中入心使人噎悶昏不知
人入肝則眩暈頑痺入脾則昏睡不覺入肺則喘滿痿躄

入腑則消渴利小便至於傷暑身熱關節重痛發熱證候
大便泄而小便澀腰脚冷而腿膝浮或自利不渴者寒不
平中之亦使人半身不遂口眼喎斜從斯而害又如七情
喜傷心者不可疾行不可久立怒傷肝者上氣不可忍熱
來盪心短氣欲絕不得息憂傷肺者心系急上焦閉榮衛
不通夜卧不安思傷脾者氣留不行積聚中脘不得飲食
腹脹滿四肢怠惰悲傷心胞者善忘不識人置物在處還
取不得筋攣四肢浮腫恐傷腎者上下氣閉不行下焦回
還不散猶豫不決嘔逆惡心驚傷膽者神無所歸慮無所
定說物不意而迫此此七者證雖不同本乎一氣臟氣不
行鬱而不舒結成痰涎隨氣積聚堅大如塊在心腹間或

塞咽喉如粉絮梅核樣咯不出嚥不下每發欲絕逆害飲
食若諸痰積證則眩暈嘈雜多生清涕濁遺或冷消渴
泄水穀不化洒淅自汗嘔吐清痰陽虛陰虛泄瀉貧競
則五臟積熱口苦咽乾唇裂生瘡腸胃乾澀煩燥喜冷涎
唾稠實咳淚眼赤或遍身瘙癢或於總說則痰瘧證惟多
先寒後熱名寒瘧先熱後寒名溫瘧但熱不寒名暑瘧寒
熱身重煩疼脹滿名濕瘧寒多不熱名牝瘧若一日一發
則易愈一日一發猶可三日一發則難痊且斯疾俗作忠
醫之列然得其所因倘忌其難時疫證雜發熱腰痛強急
脚縮不伸腑中欲折目中生花或渾渾增寒復熱名曰溫
疫身熱頭痛不能自持或內熱口乾舌破咽塞聲出名曰

濕疫頭面頸直皮肉強痹或蘊而結核起於咽喉頸項之
側布熱毒於皮膚分肉之中名曰寒疫乍寒乍熱損肺傷
氣暴嗽嘔逆或體熱發斑喘咳引氣名曰濕疫四時之感
其證百端宜當因其時而詳辨則得之喘無吐痰續
續則生自汗譫語目直視則亡失血諸證有暴吐鼻衄泄
出或一二升至斗餘皆因感四氣流傳經絡陰陽相勝或
怒氣傷肝風入腸胃故血得寒則凝泣得熱則淖溢妄循
臟腑經絡流注停留曾因即滿悶或吐或衄或泄下復
有咳嗽中見紅絲者為雜食無故物然隔下黑血名心絕
痛欬之證得之者多諱而不言求醫殊不知其根有蟲咽
其心肺可不深治蟲蠱毒之候令人心腹絞痛如物嚙狀

吐下血如爛肉若欲驗其證狀先令病人唾於水中若沉
即其實矣消渴與消渴為消中其作三證等證鮮有安之
日矣至於下利身凉能食小便通易安體熱多汗渴甚小
便不利或手足厥冷灸不溫兼微喘不食者死二便秘澀
之證者秘小遊還有點滴利者易愈若秘日久腹上心胸
切痛氣促身冷面色黑前後俱無名曰氣秘難腫而强脹
滿得之未久或脹或消腹皮軟不泄不喘隨治隨瘥若
臍心突起利後復脹急久病羸乏喘息不得安名曰脾腎
俱敗無有愈期腫滿若證男從上腫下女從下腫上所患
未久利遊退腫定喘則愈矣若證不善則手足皺骨腫臍
與掌心俱凸喉咳失聲青筋紋横肚上及爪甲青黑腫頭

甚者患嘔吐頭重豈復能救霍亂一證猶爲卒暴之最者
人之起居無常攝調不善揮霍之至傾至變亂悶絕不救
甚爲可畏臨深履薄縱蹈虎尾不足以諭其危其如癘風
名大風惡疾故其色敗軀列裂瘡潰眉面白皮如蛇蛻又則
鼻梁關壞又名風癩十無一生者癥瘕之爲病癥者堅也
堅則難破瘕者假也假物成形能動者是至於蛟龍蛇鱉
肉髮蟲米之證初非定名偶因食物相感而致斯患夢寐
不祥多生恐怖爲異感證寄乎內外之證其發萬端皆須
細辨且須刻之變無定一有所作其可忽諸

○集治說

嘗謂用藥如用刑一有所誤人命繫焉故書曰言之非艱
行之惟艱如張仲景傷寒一百一十三方猶缺其一三百
九十七法僅指未即周知益謂此也夫處方大法則有七
方十劑七方者奇方耦方大方小方緩方急方復方十劑
者宣通補瀉輕重滋濇燥濕以積學而用之則可矣傷寒
之病太陽屬膀胱非發汗則不愈必用麻黃之類蓋其性
能通陽氣卻外寒也陽明屬胃非通泄不能愈須用大黃
芒硝以利之少陽屬膽無出入道柴胡半夏能利能汗佐
以黃芩則解矣太陰屬脾性惡寒濕非乾姜白朮不能燥
少陰屬腎性畏寒燥非附子不能溫厥陰屬肝藏血養筋
非溫中之藥不能潤外此有汗下吐三法毫釐不可差謬
經云桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛以亡故在表宜

汗在裏宜下在胸宜吐半表半裏宜和解表裏俱見隨證
滲泄無表裏證則宜下之利清穀身體疼痛急當救裏身
體疼痛清便自調急當救表身熱不渴爲表有熱汗而煩
悶爲裏有熱傷寒見風大青龍湯爲治之最陽毒內外結
熱輕則白虎湯重則承氣湯之屬陽厥亦用舌卷焦黑鼻
中如煙煤非水漬法不可陰毒狀貌困重面黑四肢厥冷
則理中湯四逆湯投之未効則灼艾法惟良復以葱熨法
佐之陰厥同此法治之發熱下利白頭翁湯黃連阿膠湯
最爲的切中寒則急撥胃煖之藥以新火向之令遍身煖
透或置於熱炕上令有力人扶策仍以手附火或入懷令
熱吸摩病人手足肯腹間續用姜附湯併服若猶未省則
依上法灸傷風寒治之法汗出惡風者當解其肌裏證雖
具惡風未罷亦須先解其外也傷風見寒大青龍湯均爲
調理中風皆閉先須通關散探鼻令噴嚏次以蘇合香圓
行其氣仍須分辨冷熱爲治不可泥滯五臟正中者乃當
不及掩耳手足偏中者但徐服順氣疎風豁痰等藥不宜
用大風藥急治則不得盡其天年其有牙關緊閉亦用通
關散搐鼻噴嚏即開矣傷暑者耆氣耗血消氣生痰速用
解暑之劑仍服熟湯得汗即愈若中之者急扶在陰涼處
不可與冷當以布巾浸物揉熱湯熨臍中及氣海以湯淋
布上令透徹臍腹暖即漸醒矣如倉卒無湯處則掬道上
熱土置臍上以多溺溲之即是古法道途無湯即掬熱

土於脾中仍撥開作窩令人溺其中以代湯淋筋骨解易毒藥作急嚼生姜一大塊冷水送下如已迷悶則嚼大蒜一二瓣冷水送下如不能嚼即用水研灌之立蘇凡治渴無湯處則嚼生葱二寸許津嚥下可抵飲水二升傷濕中濕只宜利小便忌不得以火攻并轉利之若濕家下之額上汗出微喘小便不利者死下利不止者亦死治濕不利小便非其治也七情之患惟當利氣消痰寬中進食仍須俗養以和平之藥調之如伯血滯氣停凝結為癥瘕腹中堅塊堅硬作楚當以破氣藥伐之或以類相從如敗梳治蝨瘕銅屑治龍瘕麴蘖治米瘕石灰治髮瘕等類所謂醫者意也氣積膨痛至甚或有熱痞結聚須宣泄之虛積滯治

宜大作湯劑峻補者烏附天雄薑桂之屬不可無潤補者鹿茸當歸蓯蓉之類安可缺清補則天門冬麥門冬人參地黃之類宜用也至於諸熱為治者泛熱有實熱治熱者剉芥薄荷梔子黃芩等投之正其所宜實熱者非大黃芒硝則不能劾者夫總說為治之備要如南北風土之殊人物厚薄之異北方土厚水深水性沉下人肦多實而少虛且所食無非肉麪爨則衣重裘坐暖炕若有所治則宜多以清涼之劑如南方用大黃巴豆之屬其分兩皆當倍而用之或用水漬法或尋甜水一二碗飲之即頓開有所窒稍弱不自保借勞役致虛則亦但當倍補之無有不愈南方屬火火性輕炎人肦多虛而少實況所食不過蔬餐而

已亦須投以溫和之藥以調之兵有君尚北方之風宜酒終日非至醉不已煩煿肥鮮恣其厭飫偶有所患亦須以平昔所嗜施以涼劑氣虛者亦不可爰施疫瘴熱多者投以半冷半熱解散分陰陽滅寒熱之劑度其所作之日先一時進以截之藥去其痰水則收效矣寒多者投以半生半熟和脾進食之劑次以抵截之藥則瘧癖去而疾愈矣猶須令其戒慎飲食謹起居則無復攻之患若久瘧而復作虛浮不食者未之有瘳時投之亦須以詳斟酌不可偏執治之者須辨其所因而投之以藥不可以日滿自差遂至狂亡良可太息至於病愈必須調以飲饒進折甚勢不可令病氣攻人則稱息矣或有六氣疾之召或溝渠不

泄積塵久滲透蒸而成者或地多死氣鬱發而成者或官吏枉抑怨讟而成之者如永州治以六合劑穿地深至三尺闊亦如之取淨沙三斛實之以醇酒三升沃其上俾使君祝之所亦消除疫癘之良術苟併見之喘急虛者升降鎮墜藥為清心涼膈未有不食辛下痢感於四氣者先須隨其所感解散分利陰陽次須辨其冷熱手足和煖則為陽中和之劑可用手足厥冷則為陰濕癖之藥可行無不切効大法虛者補之實者瀉之滑者澀之閉者通之有積者推之熱則涼之冷則溫之冷熱不調者平之或用其所因辨其冷熱如血下鮮紅則治以涼清和紀下紫色則當昌溫養二便秘則須潤滑以行之脹滿則須正氣以虛實平治之

脹滿實者利水虛者壯脾元兼用消浮等劑自有奇效仍須戒鹹斷慾庶不再復霍亂須明辨虛實所因出治無遺遲則須命至於乾霍亂則猶為難治也三痞治法滋腎為主抑心火兼之然須多服湯圓俾水升火降而引飲無度莫之見矣真心痛者手足青至節不在治療之數真頭痛者上穿風府陷入泥丸非藥能愈至瘡主治備見後科用藥之工誠可嘉嘆中蠱毒之法以敗鼓皮燒灰為末飲服一匕則病人自呼蠱家姓名可語令呼喚將去則愈矣瘵疾一染人當其未深入之時則宜先取其虫不爾則損於心肺蓋心主血肺主氣人身含氣血之本其能生乎取虫而後相忘世處和以潤養樂食庶幾可療傷說則不及也

瘋癲産乳自縊壓溺諸暴絶須乎時勢記後府救治法併痊瘳一科臨用應不會曾屢驗在頃刻間不然則甘棄良醫枉死者半是也痛風初發則宜宣泄風毒于而病斷愈矣久之惟當幽隱林泉依法亟治庶乎可愈不惟愈疾亦或可因此而至仙道矣或為祟害者移精變氣祝由不可則宜外尋禁避厭禳法以除之外此病有六不治驕恣不論於理一不治也輕身重財二不治也衣食不能適三不治也陰陽并臟氣不定四不治也形羸不能服藥五不治也信巫不信醫六不治也生候尚有形色不改病未深入腠裏針藥及時能將息調理委以良醫病無不愈至於五味亦可對治五臟之病肝酸心苦脾甘肺辛腎鹹用之中

病則止過則酸走筋鹹走血辛走氣苦走骨甘走肉則無發矣又如以所宜而治者肺燥咳嗽宜芝麻啗油餅瘥疾脾吟糟鯉魚糟蒸瓜久冷荊野鷄餛飩等類是也瓜果亦可隨冷熱施之愈疾必矣若夫炮製之法又當以相需相冷相反相惡相畏者以桂得蔥而軟相合者磁石引針相反者大戟芫花等反甘草之類也相畏者如牛黃惡龍骨是也且方中各有避忌此亦與其各或以合草擊起芫花之性而用者猶任斟量更須斟別藥味新陳選擇用土所生採取時月分君臣佐使俾分兩無差炙煿炮爁精審不苟斯為治之善矣其有自恃己長不肯訪問以意臆度攻寒以寒療熱以熱妄施一匕遂為己功僥或中之實非的見未過僥倖於萬一其或不中則十手所指十目所視所謂一匙之藥誤入於咽五臟俱裂生可再復可不戒之況為醫者人之司命有病者名慎勿以遠近寒暑而拒之若至病家尤須敬謹勿為他務以敗正事給藥亦量其多寡表汗宜四吐下宜一加二極矣補藥愈多愈効餘則隨證為之輕重明辨湯引病若未痊嗚乎再來庶病可瘳而治有方矣僕少而學之長而行之所謂治病之道盡在是矣故

凡日治病推此個因生既明此方以備人用之

○傷寒

○撮要

【發汗法】凡發汗，欲令手足俱周，濈濈然一時許為佳，不欲如水淋漓。服湯中病即已，不必盡劑。然發汗須如常覆腰以上，厚衣覆腰以下，蓋腰以上淋漓而腰以下至足心微潤，病終不解。凡發汗病證仍在者，三日內可二三汗之，令腰腳周遍為度。

【下法】凡轉下須體認得合下之證明白，在陽明胃經則不拘日數。過時失下則氣血不通，四肢便厥，不識者反疑是陰厥，復進熱藥，禍如反掌。若少陰腎經、太陰脾經下證悉具，湯已更衣者止，不須盡劑。陽明病得利，瘥後不中服補藥，熱氣得補復成，更復下之，故重困也，亦消息安養之。

【吐法】凡服吐藥，服吐藥後不大吐，則當以手指擿之便吐矣。不吐，稍增藥，以吐為度。若吐少病不除，明日再服吐藥，可至再三，但虛人宜少吐。藥力過時不吐者，啜熱湯一升以助藥力。不必盡劑，吐訖便可食，無復餘毒。若服藥過多者，飲水解之。

【水漬法】以疊布數重，新水漬之，稍捩去水，搭於胸上，須臾蒸熱，又漬令冷，如前用之，仍數易新水，日數十易。熱甚者置病人於水中，熱勢然退則已，亦良法也。

【熨法】以葱一束，以索纏如餅餤大，去根葉，惟存白二寸許，先以火熁一面令通熱，勿至灼，乃以熱處著病人臍下，以上熨斗盛火熨之，令葱餅熱氣透入腹中，更作三四餅，遇一餅壞不可熨，則易一餅，俟病人醒，手足溫，有汗乃止。

【蒸法】以薪火燒地，良久掃除去火，可以水洒之，取蠶沙、柏葉、桃葉、糠麩皆可用，相和鋪燒地上，可側手厚，上鋪草席，令病人當上臥，溫覆之。夏月熱，只布單覆之，汗移時立至，俟周身至腳心自汗漐漐，乃用溫粉撲止汗，移上床。最得力者，蠶沙、桃葉、柏葉也。無蠶沙亦得，單桃單柏葉亦得，楮葉亦可用。糠麩乃助添，令隨多少，不用亦得。此極急，則可如治病得愈，明年斯時慎莫再作，或不治矣。

凡熱證數之時，或用鐵石器，或以火熨，或覆不可太過。凡下之藥，每服止可至八分，劑病若盡，至七分盡，補與煎劑。六分不可極，極亦不可盈。火劫恐傷藥力，去滓服後留，併再煎。

○陽證

【麻黃湯】治足太陽膀胱經發熱，頭痛，身疼，惡風，無汗而喘。陽明合病，喘而胸滿。太陽病八九日不解，以此發汗，必衄乃解。及治不得汗，發衄。陽明脈浮，無汗而喘，宜服。脈但浮，無餘證者，與服。若不溺，腹滿加噦者不治。

麻黃去節，三兩　桂枝二兩　甘草壹兩　杏仁七十箇，去皮尖

右剉散，每服五錢，水一盞半，煎八分，去滓，食前服，覆取微汗。夏至後加知母半兩，石膏一兩，黃芩三分。或汗出後無

大熱而喘者去桂加石膏壹兩春冬依正方

升麻葛根湯 治傷寒時疫頭痛增寒壯熱肢體痛發熱惡寒鼻乾不得睡小兒大人瘡疹已發未發皆可服兼治寒暄不時人多疾疫乍暖脫衣及暴熱之次忽變陰寒身體疼痛頭重如石及解傷酒胸膈熱口瘡咽疼

升麻壹兩 白芍藥壹兩 甘草壹兩 葛根貳兩

右剉散每服四錢水一盞半不拘時潮熱頭痛生薑三片葱白二根煎咳嗽涎盛生薑三片桑白皮七寸煎上膈熱薄荷黃芩各少許身發斑瘡小兒加紫草茸根各半錢葱白貳根煎夜熱酒後傷風感寒痰盛氣促金沸草散方見後合和生薑三片薄荷七葉桑白皮七寸烏梅壹箇煎小兒量度多少老人加人參倍白芍藥各伍錢大段寒即熱服熱即溫服[illegible]

金沸草散 治風壅痰盛頭目昏痛頸項強急往來寒熱肢節煩疼胸膈滿悶痰涎不利咳嗽喘滿涕唾稠粘時行寒疫壯熱惡風有汗寒邪則汗出風盛則解利

金沸草去梗四兩 荊芥穗四兩 麻黃去根節 甘草炙壹兩 半夏湯洗七次壹兩 赤芍藥壹兩 前胡去蘆

右剉散每服三錢水一盞半入生薑三片桑白皮七寸烏梅壹箇煎服痰熱煎淮嗽諸風及大腑風秘左脇刺痛每料加枳殼壹兩去穰風熱結在臟腑煩燥氣逆腹痛大便秘以葱白研爛微炒過布包盛熨臍後加大黃朴消薄荷各五錢服速效諸風發散並用姙婦傷寒頭痛旋疼肚熱心燥加白朮人參黃芩生石膏各壹兩熱嗽加甜葶藶馬兜鈴薄荷生桑白皮各半兩烏梅肆錢仍就本半夏圓方見後咳嗽類咽喉焦燥加朴消五錢食后服

小柴胡湯 治傷寒四五日寒熱胸脇滿痛默默不欲食心煩或喘渴或腹痛或脇下痞硬或心下悸小便不利或不渴身有微熱或咳或過經未解潮熱未除半表半裏非汗非下之證瘥後勞復發熱婦人傷風經水適斷此為熱入血室故使如瘧狀產後傷寒頭疼發熱小兒寒熱並治之

柴胡去蘆 半夏湯洗七次 黃芩 人參去蘆 粉草各

右剉散每伍錢水一盞半薑五片棗一枚煎至六分食前服腹痛去黃芩每料加芍藥三分心下悸小便不利去黃芩加伏苓壹兩不渴外寒裏熱去人參加桂叁分溫服覆取微汗愈咳嗽加五味子潤者三錢胸中煩加括蔞伍錢渴加人參括蔞各伍錢脇下痞鞕去棗加牡蠣粉枳實各伍錢過經不解日晡發熱已而微利加芒消伍錢引飲有汗加伏苓桂枝各伍錢身熱臟腑微溏加厚朴五錢煩熱每服加白茅根二根白竹青一塊如大指頭大麥門冬半錢熱服痰加白竹葉七皮赤芍藥枳殼各壹錢鼻衄加生地黃二錢白茅花一握痰盛

或嘔加桑白皮七寸烏梅少許同煎服 夏熱外寒加桂半兩

大柴胡湯 治傷寒十餘日邪氣結在裏寒熱往來大便秘澀腹滿脹痛語言譫妄心中痞鞕飲食不下或心下急鬱鬱微煩或口生白胎或不大便五六日繞臍刺痛時發煩躁及汗後如瘧日晚發熱或發熱汗出或六七日目中不了了睛不和無表裏證身微熱者裏實也兼臟腑實脈有力者可服之輕則小柴胡重則承氣

枳實半兩去瓤麩炒 柴胡半斤去蘆 大黃貳兩 赤芍藥參兩

半夏貳兩半湯洗 黃芩參兩去心

右五味剉散入半夏拌勻每服三大錢水一盞半入生薑三片紅棗一枚或加苦竹葉十皮煎至一中盞去滓溫服食後臨睡服大熱用苦竹瀝一合此藥治傷寒內熱裏實若身體疼痛表證未解不可服之春合溫而清涼夏發燥疾此方妙

小承氣湯 治傷寒日深恐有燥屎腹中轉失氣乃可攻之不轉失氣者必初硬後溏未可攻之攻之則腹滿不能食飲水而噦其後發熱大便復硬若腹大滿不通或陽明多汗津液外出腸胃燥熱大便必硬而譫語脈滑吐下微煩小便數大便結或下利譫語自得病二三日脈弱無太陽證柴胡證煩躁心下結至四五日雖能食少少與承氣湯和之令小安

大黃肆兩 厚朴去皮薑製貳兩 枳實大者參枚去瓤麩炒

右剉散每服五錢水二盞煎至八分去滓溫服以利為度未利再服

大承氣湯 治表裏俱熱病勢更甚者陽明脈遲汗出不惡寒反惡熱身重短氣往語如見鬼狀劇者發則不識人循衣摸床惕而不安微喘直視陽明裏熱或吐下後不解大便五六日不利日晡潮熱心胸煩熱而懊憹復如瘧狀脈沉實或小便不利或腹滿實痛而渴脈實數而沉腸胃燥長日結不散臍腹高起痛不可忍但嘔冷涎大渴反不能飲強飲不能止喘急悶者

大黃酒洗肆兩 芒消參合 厚朴半斤炙去麁皮 枳實壹兩麩炒

右剉散每服五錢水二盞先煮厚朴枳實至一盞餘下大黃煮取八分去滓入消再煎一沸溫服以利為度未利再服

調胃承氣湯 治諸發汗和解不惡寒但發熱蒸蒸然者或日深心下溫溫欲吐胸中痛大便溏腹滿鬱鬱微煩先此時吐下者或日深裏熱譫語法當下之以銀粉巴豆燥熱大毒圓藥下之致真陰損瘵邪熱轉甚因而協熱下利不止及表裏熱下之太早乘虛而入不成結胸但為熱利不止心下滿鞕或痛煩渴咽乾脈滑數而實諸腹滿實痛者煩渴譫妄小便赤大便鞕脈滑實緊

大黃 芒消 甘草各等分

右剉散每服五錢水一盞煎至六分去滓下消再煎一沸溫頓服之

【三拗湯】治感冒風寒鼻塞聲重語音不出頭痛拘倦方見咳嗽類

【敗毒散】治傷寒時氣頭痛項強壯熱惡寒肢體煩疼咳嗽鼻塞聲重風痰頭痛嘔噦寒熱

人參去芦　赤茯苓去皮　甘草　前胡去苗

川芎　羌活去芦　北柴胡去苗　枳殼去穰麩炒

桔梗去芦已上各等分

右㕮咀散每服四錢水一盞半生薑三片薄荷葉五皮同煎熱服不拘時候傷濕腰疼加白术木瓜各等分脚痛加天麻一兩脚氣壅盛多熱赤腫加大黃少蒼术各等分不過一二服立愈瘟疫傷寒頭痛目昏發熱增寒腰疼甚多風多痰多氣或處卑濕脚弱亦効傷寒鼻塞

得効方一　卅四　十

加白茅根生地黃各壹兩瘡疹痘瘡加蟬蛻十箇去足防風五錢癰疽初發赤腫寒熱用升麻葛根湯方見前合和加生地黃紅內消麥門冬去心各一半煎熱服立散尋常風寒濕氣流入經絡腰脚疼痛或痺弱五積散方見驗對合加木瓜川牛膝去蘆檳榔切碎各一半煎立効冬合寒而溫燠春發瘟疫大効

○陰證

【治中湯】治太陰傷寒手足溫自利不渴腹滿時痛咽乾其脉尺寸俱沉細

人參　乾薑炮　白术　甘草炙

陳皮　青皮各等分

右㕮咀散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服

【五積散】調中順氣除風冷化痰飲治脾胃宿冷腹脇脹滿胸膈停痰嘔逆惡心或外感風寒內傷生冷心腹痞悶頭目昏暈肩背拘急肢體怠惰寒熱往來飲食不進及婦人血氣不調心腹撮痛經候不調或閉不通及口中冷痺背心惡寒並宜服之除麻黃又名異功散

白芷壹兩半　陳皮去白　厚朴去粗皮薑汁製

桔梗　枳殼去穰麩炒　川芎　甘草炙

白茯苓去皮各壹兩半　蒼术米泔浸

當歸去蘆各壹兩半　麻黃去根節　芍藥　乾薑炮

半夏湯洗七次　肉桂去粗皮

右除白芷肉桂二味為散另入外一十三味同為㕮咀散慢火炒令色轉攤冷次入肉桂白芷令勻每服三錢水一盞半入生薑三片煎至一中盞去滓稍熱服如冷氣奔衝心脇臍腹脹滿刺痛反胃嘔吐泄利清穀及痃癖癥瘕膀胱小腸氣痛即入煨生薑三片鹽少許同煎如傷寒時疫頭痛體疼惡風發熱項背強痛入葱白三寸豉七粒同煎若但覺惡寒或身不甚熱肢體拘急手足厥冷即入炒茱萸七粒鹽少許同煎如寒熱不調咳嗽喘滿入棗二枚煎服寒濕氣交互頸項強直或半身偏疼或復麻痺及卒中風重者多加麝香末寒濕腰痛每服加桃仁七枚去皮尖滿身疼加白膠香太陰經傷寒

手足逆冷或積聚腹痛及虛汗不止脈細痰面青嘔吐加熟附子數片炒茴香壹拾粒煨薑五片鹽少許煎婦人經候不調或腹中血塊加醋米醋壹合難産亦加米醋壹合腳氣冷者每服加茱萸五十粒木瓜三片大便秘加大黃二錢腳氣下疰焮然赤腫增寒壯熱亦加大黃壹錢利之久病脾泄傷食腹痛冷瀉不止每用罌粟過茄陳米壹撮烏梅壹箇煎名和氣散特效心腹膨脹不食亦效乳癰初作加川牛膝生地黃各二根産後或尋常血氣痛並加木香玄胡索半錢醋炒陳艾葉七片烏藥半錢婦人外虛腳疼加生川烏去皮臍切四片鹽香少許同煎合熟寒氣折之秋發寒疫大効

人參養胃湯 治外感風寒內傷生冷增寒壯熱頭目昏疼肢體拘急不問風寒二證均可治療須令漉漉微汗自然解散若先有汗則溫服不須更汗兼治飲食傷脾或外感風寒濕氣發爲瘧疾及山嵐瘴瘧常服尤佳

厚朴 去粗皮切薑汁炒乾　蒼朮 米泔浸洗切

半夏 湯洗十次 各壹兩　白茯苓 去皮　甘草 炙 各半兩

人參 去蘆　草果 去皮　藿香 去土 各半兩　橘紅 三錢半

右剉散每服叁錢水壹盞半生薑三片紅棗二枚煎空心熱服虛寒加炮附子數片脾虛寒瘧加肉桂炮附子各一錢重兼紅圓子每服三十五粒

藿香正氣散 治傷寒頭疼增寒作熱上喘咳嗽五勞七傷五般風疾五般膈氣心腹冷痛反胃嘔惡氣瀉霍亂臟腑虛鳴山嵐瘴瘧遍身虛腫婦人産前産後血氣刺痛小兒疳傷並宜服之

大腹皮 洗　藿香 去土 各三兩　厚朴 去粗皮薑汁炙

白朮　陳皮 去白　白芷　苦梗

白茯苓 去皮 各壹兩　甘草 炙 二兩　半夏 湯洗　紫蘇 去土 各貳兩

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片紅棗一枚同煎熱服如欲出汗加葱白二根以衣被蓋再煎服冷嗽喘滿每服加人參一錢烏梅一箇杏仁七粒去皮尖北五味子十粒就吞青州白圓子三十五粒效氣促氣壅加人參一錢沉香半錢心腹痛加木香半錢玄胡索七粒切痛嘔惡甚加生薑五片木瓜二片痰嘔加烏梅一箇寒濕腰痛腹心膨滿加生薑三片木瓜二片蒼朮切炒枳殼煨去瓤切各半錢檳榔半箇切片上方治憂怒鬱氣流走遍身刺痛緊滿加木香一錢縮砂五粒名增減

正氣木香散

四逆湯 治陰證傷寒自利不渴嘔噦不止吐利俱作小便或澁或利脈微欲絕汗出過多腹痛脹滿手足厥冷或熱或傳內寒外熱下利清穀四肢沉重汗出熱不去者一切虛寒厥冷傷寒病在表誤下藥利不止雖覺頭疼體痛發熱惡寒四肢拘急表證悉具未可攻表先服此藥助陽救裏少陰病背惡寒口燥咽乾此主之

甘草壹兩炙　乾薑弍兩　附子大者一枚生用去皮臍
右剉散每服四錢水一盞半煎六分去滓溫服服此藥
利止而無血者加人參半兩面赤加連根葱白九莖嘔
煎熟旋入腹痛去葱白加芍藥二兩呕者加生薑二兩
咽痛去芍藥加苦梗一兩利止脉不出者去苦梗加人
參二兩霍亂吐瀉後不宜服此大汗出熱不去內拘急
四肢疼下利厥逆惡寒大下利厥冷者主之

四逆散 治少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹
中痛或泄利下重者此主之
甘草炙　柴胡　枳殼去白麩炒黃　芍藥各壹兩
右爲末米飲調下二錢日三服欬者加五味子乾薑各

半兩下利悸者加桂半兩小便不利者加茯苓半兩腹
中痛者加附子半枚炮裂泄利下重先濃煎薤白湯內
藥末三錢匕再煮一二沸溫服

[illegible]散 此藥能溫內外感寒脉遲細沉伏手足冷毛髮戰
慄傷寒裏證大啜數盃手足溫汗出乃愈治氣亦效退血
脉和一切氣無出此藥冒風濕手足緩弱不能動轉倒頭
須數人扶策二服後次日能步履脫然 方見[illegible]

三[illegible]湯 方見霍亂門 脉微身躰冷重自汗嘔吐加丁香
胡椒各半兩

[illegible]散 治手足厥冷脉下緊邪結在胸中心中滿而煩飢
不能食病在胃中當須吐之 方見後

茯苓甘草湯 治厥而心下悸宜先治水却治厥不爾水漬
入胃必作利
茯苓　桂枝各弍兩　生薑弍兩　甘草壹兩各細切
右四味以水四升煮取二升去滓溫分三服

麻黃升麻湯 治傷寒六七日大下後寸脉沉而遲手足厥
逆下部脉不至咽喉不利唾膿血泄利不止爲難治此方
主之
麻黃弍兩半　升麻壹兩壹分　當歸壹兩壹分　知母
黃芩　萎蕤各十八銖　石膏　白朮
乾薑　芍藥　天門冬去心　桂枝
茯苓　甘草各六銖細剉

右十四味以水一斗先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥
煮去三升去滓分溫三服相去如三斗米頃令盡汗
出愈

灸法 治陰毒傷寒灸臍下一寸半氣海穴二七壯小作艾
炷於臍心以鹽填實灸七壯立效二寸丹田三寸關元皆
可灸

○和解

沉香散 一方加沉香名沉香飲子 治四時傷寒傷風傷濕
傷食大人小兒皆可服
香附子五兩炒去毛　紫蘇去根　陳皮弍兩半　甘草弍兩
蒼朮弍兩切米泔浸炒黃

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑三片葱白二根煎不拘時候得汗為妙頭痛加川芎白芷北細辛荊芥穗每服各半錢咳嗽声重痰多涕稠加半夏苦梗烏梅各半錢桑白皮七寸心疼加石菖蒲半夏各半錢泄瀉木瓜藿香各半錢傷湿自汗前行恭湯生薑三片車前子一撮或用香附子陳皮各一兩以石器滴酒炒黃色為散煎辣風寒湿日久腰脚疼行步難酒煎服或湿氣久留脾疼身躰與手足倦怠腹脹浮或有氣上衝消類癧擦實非癧損此主之食積腹痛泄瀉葱白二根烏梅一箇併吞服盧氏感應圓菉豆大三七粒脚氣每服檳榔木瓜大腹皮枳殼木香各少許鹽酒水煎空心服感

得効方一　二十

風宿食不化淵寒腹痛作瀉惡風四肢拘急生薑三片烏梅一箇葱白二根就服盧氏感應圓癨疾桃柳枝七寸葱白二箇頭痛作惡加鹽少許男女冷氣加茱萸一撮食鹽少許婦人血氣加莪朮茴香烏藥當歸所加量病人虛實增減除香附子紫蘇加厚朴桔梗蒼朮各四兩名和解散乃平和之劑隨病用之

香葛湯 治四時感冒不正之氣頭痛身疼項強寒熱嘔惡痰嗽腹痛泄瀉不問陰陽兩感或風寒濕瘴服之大效

紫蘇去根　白芍藥　香附子炒去毛　川升麻

白乾葛　薄陳皮各壹兩　白芷　大川芎各半兩

蒼朮米泔浸切炒黃色壹兩　大甘草半兩

右㕮咀每服四大錢水一盞半生薑三片煎熟服不拘時候如發熱無汗遍身疼痛加葱白二根豆豉七粒煎熱服得汗即解嘔惡去蒼朮加白朮數片藿香數葉中脘脹滿大便秘加枳實檳榔各半錢有痰加半夏半錢咳嗽加五味子七粒烏梅一加桑白皮三寸腹痛加枳殼半片上攢切泄瀉加木瓜二片老人產婦嬰兒皆可服如傷寒不分表裏以此藥導引經絡不致變動其功非淺如熱多只瀉心煩燥口乾或加前胡無汗可加麻黃汗太過加麻黃根時行寒湿泄瀉頭疼發熱自汗大效

人參飲 治一切發熱頭疼躰痛服之皆效不必拘其所因小兒室女亦得其宜用藥致和而且平故也痰飲停積中

得効方十　其

脘閉塞眩暈嘈煩忪悸噎嘔逆不食有如氣隔痰氣停滯關節不利手足嚲曳筋脉攣急類乎中風食已即吐發熱頭痛百節煩疼狀似傷寒但連日頻進此藥以病退為期不可預止。本方乃集二陳湯半夏茯苓湯枳實半夏湯也

人參去芦　白茯苓去皮　紫蘇葉　半夏湯洗

乾葛去皮　前胡去芦各七錢半　枳殼去穰麩炒　陳皮去白

桔梗去芦　粉草各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑三片紅棗二枚同煎熱服不拘時候發熱頭疼每服加川芎半錢葱白二根咳嗽加五味子七粒桑白皮七寸煩燥麥門冬二十粒

去心痰嘔口燥咽乾烏梅一箇男子婦人虛熱發熱加麥門冬二十粒去心氣盛或氣虛人痰氣上壅咽喉不利哮呷有声氣息短急上盛下虛加木瓜半錢北五味子五粒乾桑白皮七寸毒傷感冒風寒鼻塞流清涕頭目昏重加川芎白芷各一錢葱白二莖去痲氣初發必先增寒壯熱甚者嘔逆惡心每用此藥加木香半錢寒熱必退腹痛加楊芍藥一錢

和解散 治寒溫不節將理失宜乍暖脫衣甚熱飲冷坐臥當風居處暴露衝冒風雨行路衝冒霜冷凌晨早起呼吸冷氣久晴暴煖忽變陰寒久雨積寒致生陰濕如此之候皆為邪厲侵傷肌膚入于腠理使人身體沉重肢節酸疼項背拘急頭目不清鼻塞聲重伸欠淚出氣壅上盛咽渴不利胸膈凝滯飲食不入凡此之證若不便行解利伏留經絡傳變不已

蒼朮壹兩　荊芥穗弍兩　甘草壹兩炙

右㕮咀散每服三錢水一盞半煎至八分去滓熱服不拘時候并滓再煎纔覺傷寒及覺勞倦亦須服之不問虛實老幼悉皆治之

小柴胡湯 為用最多而諸家屢稱述之蓋以柴胡半夏能利能汗凡半表半裏之間以之和解皆可用也抑不知小柴胡非特為表裏和解設其於解血熱消惡血誠有功焉蓋傷寒發熱一二日間解散不去其熱必至於傷血不問男女皆然此藥內有黃芩柴胡最行血熱所以屢獲奇功但藥性差寒用之貴能加減今推明活法凡表發熱裏又有燥渴表裏熱證者是為內外俱熱小柴胡加大黃煎表無熱證止發熱在表者小柴胡加桂枝主解表可以溫血所謂陽盛惡寒者辛甘發散者此也大黃主攻裏可以湯滌血熱所謂陽盛內熱酸苦湧泄者此也是又別其解表以溫攻裏以寒之義若遇少陽本證及無表裏證或表裏未分之證但依本方用之並不須加減此為正訣虛者少與恐在酌量治瘧傷寒輔用當歸其音盃為調血既不忌滯中脘二作痰發三況胃氣而血熱又非當歸之所能除之甚矣否則熱入血室張氏特以小柴胡主之何其識然均是和解耳為方以和解散平穩之劑為和解兼可以小柴胡差寒之劑為和解意安在哉蓋為方和解散為尋常感冒和平解散設也若夫熱在半表半裏既不可汗又不可下非小柴胡一劑孰能內和而外解之乎淋家衄血家法不可汗亦不可以此和解然而學者僅以小柴胡收效不遵格法輕用大柴胡立意一差禍不旋踵吁可畏哉又今人但聞小柴胡之藥多見畏而不服殊不知陰證似陽浮熱於外用之則誤人多矣的是陽證或半表半裏用之無不伐病所慨者醫之不審陰陽致使病家之惑間有悮當責之於醫不當輕議於藥方見前

神朮散 治四時瘟疫頭痛項強發熱增寒身體疼痛傷寒

暑寒濕頭疼證皆治之

藁本去土　羌活去蘆　甘草炙　香白芷

細辛去葉洗土　川芎各壹兩　蒼术五兩米泔浸切焙

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片葱白三寸煎七分

溫服不拘時候傷風鼻塞為末葱白茶清調下

二香散 治四時感冒冷濕寒暑嘔惡泄利腹痛瘴氣飲冷

當風頭疼身熱傷食不化

紫蘇　陳皮　蒼术各壹兩　香薷去土壹兩

香附子弍兩半炒去毛　厚朴去粗皮薑汁拌炒

甘草　扁豆各壹兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑三片木瓜二片葱白

二根煎熱服外感腫滿先以此多加車前子木瓜煎效

○相類

痰證 人參敗毒散 治增寒發熱惡風自汗寸口脉浮胸脇

滿氣上衝咽不得息頭不疼項不强方見前

大半夏湯 治膈間有寒痰

半夏湯洗去滑切焙乾　白茯苓　生薑各壹兩

右㕮咀水貳盞半煎至一盞去滓臨睡溫呷如有熱痰

加炙甘草一分脾胃不和去甘草入陳橘皮壹分

瓜蒂散 治胸有寒痰當吐之諸亡血虛家不可與服

瓜蒂炒黄　赤小豆各半兩

右為末取一錢匕豉一合湯七合煎去滓取汁和末頓

服藥下咽便卧欲吐且忍良久不吐取三錢匕湯二合

和服之立便吐食卒無藥摘瓜蒂煎吐亦吐

稀涎散 治涎結胸膈作為寒熱飲食減少

猪牙皂角　圓白半夏各壹兩

右㕮咀每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服入咽

便吐去涎即愈

[illegible]湯 治頭疼脉數發熱惡寒滿身不痛左手脉平

和[illegible]方見前

[illegible]散 人參養胃湯均可服方見前

[illegible]散 取五錢水一盞半煎去滓任意服或[illegible]圓三

七粒未效再服[illegible]方見[illegible]

虛煩 竹葉石膏湯 治惡寒身不痛頭不疼脉不緊但煩熱

名虛煩非有熱不宜大攻之熱去則寒起止宜服此方見

橘皮湯 治動氣在下不可發汗發之反無汗心中大煩骨

節疼痛目運惡寒食則反惡穀不得入宜服此

橘皮壹兩半　甘草炙半兩　人參壹分　竹茹半兩

右㕮咀每服五錢水一盞半薑三片棗一枚煎食前服

[illegible]湯 治虛煩方見雜病虛煩類

脚氣 [illegible]湯 治身熱肢節痛頭疼大便秘或嘔逆

但卒起脚弱為異耳名脚氣方見風科脚氣類

[illegible]五積散 性溫 [illegible] 性涼凡遇此感冒對半雜和

煎服名交加散亦多驗小小感冒因風雨寒冷所襲發熱

得之正氣未虧邪氣未深用此先以助其正氣使益壯則邪氣自當屏散若倉卒藥未能辦只以葱白連鬚數莖豆豉一撮生薑數片水煎熱啜連進三兩盞亦能發散若邪氣已入經絡及時行疫癘則須依經按法表裏汗下不可差殊戒之（二方見前）

雙解散 治風寒暑濕飢飽勞役內外諸邪所傷無問自汗汗後雜病但覺不快便可通解得愈小兒生瘡疹使其出快亦能氣通宣而愈

益元散（方見中暑類 叁兩半）　防風通聖散（方見風類 [illegible]兩半）

右一處和勻名雙解散每服三錢水一盞半生薑三片葱白五寸豉二十粒煎至一盞溫服此方此藥一效

麻黃桂枝湯 治厥陰傷寒煩滿發熱惡寒往來如瘧或囊縮其脉尺寸俱微緩者主之其人沉知其囊必縮急以承氣湯下之可保五死一生承氣湯乃利陽明經可若病到厥陰其勢已甚盡陽明養宗筋為熱毒所攻乃以承氣湯瀉其能養故利陽以救陰此猶假虞以伐虢圍魏救趙之意也太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便自可一日二三度發脉微緩者為欲愈也脉微惡寒者此陰陽俱解也以其不能得少汗出身必痒（宜服）

桂枝（壹兩半去皮）　芍藥　麻黃（去節）　杏仁（拾弍個去皮尖）

甘草（各半兩 炙）

右剉散每服五錢水一盞半入生薑三片紅棗一枚煎八分去滓食前服

白虎湯 治傷寒大汗出後表證已解心胸大煩渴欲飲水及吐或下後七八日邪毒不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者宜服之又治夏月中暑毒汗出惡寒身熱而渴及治口中不仁背上惡寒發三陽合病腹滿身重面垢譫語遺溺並不可汗下但少與服之效

石膏（壹斤）　知母（陸兩）　甘草（弍兩）

右剉散每服三大錢水一盞半加入粳米五十餘粒同煎至一盞去滓溫服小兒量力少少與之或加人參少許同煎亦得食後服此藥立夏後立秋前可服春時及立秋後并亡血虛家並不可服不惡寒反惡熱大便不秘者亦服

大青龍湯 治太陽中風傷寒脉浮緊發熱惡寒身疼不汗出而煩渴或脉浮緩身不疼但重乍有輕時或傷寒見風脉傷風見寒脉兩證俱傷煩躁則用若脉微弱汗出惡風者不可服之服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也

桂枝（去皮 壹兩）　甘草（炙 壹兩）　石膏（如半雞子大 碎）

杏仁（去皮尖 拾枚）　麻黃（去節 叁兩 [illegible]）

右剉散每服五錢水一盞半生薑四片棗子一枚煎至八分去滓溫服取汗為度若汗周身潤止後服未周身潤可停待相次服盡不欲汗汗多恐亡陽故也若汗多

不止用溫粉撲之方見右

小青龍湯 治傷寒表未解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利小腹滿而喘者

麻黃去節　細辛去苗　乾薑炮　甘草炙

桂枝　芍藥各去兩　半夏湯去滑　五味子[illegible]

右剉散每服五錢水二盞煎食前溫服噎去麻黃加熟附子一錢小便不利小腹滿加茯苓一錢喘加杏仁七枚去皮尖

溫粉 凡發汗不欲多多則亡陽宜用此粉撲之而復[illegible]效

白朮　藁本　川芎　白芷

右為末一兩入米粉三兩均和撲之

真武湯 治傷寒數日以後發熱腹疼頭目昏沉四肢疼痛大便自利小便或利或澁或嘔或咳並宜服之已經汗不解仍發熱者心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者此由渴後飲水停留中脘所致

白茯苓　白芍藥　白朮各壹兩　熟附子炮去皮

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片煎六分食前溫服小便利者去茯苓大便利去芍藥加乾薑二兩咳者加五味子三分細辛乾薑各一兩嘔者去附子每服加生薑五片又云水飲內蓄上乘於肺為喘為咳因水而咳病在陽明則用小青龍湯主之病在陰則此藥主之

桂枝二越婢湯 太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者此無陽也不可發汗宜服之屬太陽

桂枝　芍藥　甘草各半　石膏八錢

麻黃半兩湯泡去節

右剉散每用五錢水一盞半生薑四片棗子一枚煎八分溫服

小建中湯 治陽脈濇陰脈弦腹中急痛服此不差者小柴胡湯主之方見前

芍藥參兩　甘草炙壹兩　桂枝去皮壹兩半

右剉散每服五錢水一盞半生薑三片棗子一枚煎八分去滓下膠飴一兩許再煎化溫服兼治熱多寒少尺脈遲弱氣不足血少故也加黃耆一兩半尺脈尚遲再作一劑

梔子升麻散 治晚發傷寒三月至夏為晚發 加人參黃芩各壹兩半

梔子十枚　升麻壹兩半　生地黃半斤　柴胡

石膏各弍兩半

右剉散每服五錢水一盞半煎八分頓服病不解更作若頭面赤去石膏入乾葛二兩無地黃以豉代之

解肌湯 治傷寒溫病天行頭痛壯熱

葛根壹兩　黃芩　芍藥各半兩　甘草炙一分

右剉散每服五錢水一盞半棗子一枚煎八分日三服三四日不解脈浮者宜重服發汗脈沉實者宜下之

漢防己湯 治風濕脈浮身重汗出

甘草炙　黃耆蜜炙各弍兩　漢防己四兩　白朮叁兩

右㕮咀散每服五錢水一盞半生薑四片棗子一枚煎一中盞飲訖乃坐被中汗出如蟲行或被臥取其汗

白虎加蒼朮湯 治濕溫多汗

知母六兩　甘草弍兩炙　石膏壹斤　蒼朮叁兩

粳米叁兩

右㕮咀散每服五錢水盞半煎至八分取六分清汁溫服

葛根湯 治傷風項背強急身體反張屬太陽經先因傷風又感寒濕而致痙病其證發熱惡寒與傷寒相似但其脈沈遲弦細項背反張強硬如發癎之狀無汗惡寒名剛痓有汗不惡寒名柔痓此藥主之葛根

得效方一　十

小續命湯 治剛柔二痓有汗去麻黃加葛根

大承氣湯 治剛痓胸滿口噤其人臥不著席腳攣急咬齒與服得利則減極熱作痓者難治 方見傷寒科

敗毒散 治剛痓加防風天麻黃芩全蝎各五錢生薑三片薄荷七葉煎 方見前 仍用**加味芎歸圓**薑汁竹瀝湯服累用有效 方見風科通治類

附朮散 治傷寒手足逆冷筋脈拘急汗出不止項強直搖頭口噤脊發時止不食下瀉者難治

附子炮　白朮各壹兩　川芎叁錢　獨活半兩

桂心弍錢

右㕮咀散每服三錢水一中盞棗子二个煎至五分溫服

不拘時候

附子防風散 治傷寒柔痓閉目合面手足厥冷筋脈拘急出汗不止

白朮一兩　五味子一兩　白茯苓　川芎

乾薑炮裂　甘草炙微　附子炮裂去皮臍　防風去蘆各叁分

桂心半兩　柴胡去苗各兩半

右㕮咀散每服三錢水一盞生薑四片煎至六分去滓溫服不拘時候

八物白朮散 治傷寒柔痓三日不瘥手足厥冷筋脈拘急汗不出恐陰氣內傷

白朮　白茯苓　麻黃去節湯泡焙　五味子

得效方一　十一

羌活各半兩　良薑壹分　附子炮去皮臍　桂心各壹分

右散每服四錢水一盞薑四片煎至五分不拘時溫服

竹葉石膏湯 治傷寒時氣表裏俱虛遍身發熱心胸煩悶得汗已解內無津液虛羸少氣胸中煩滿氣逆欲吐諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不疼頭不痛脈不緊數不可汗下宜服

石膏　半夏弍錢半湯泡七次　人參弍錢去蘆

麥門冬去心五錢半　甘草弍錢炙

右㕮咀散入石膏末研勻每服四錢水兩盞入青竹葉生薑各五片煎至盞半入粳米一百餘粒再煎米熟湯成去米溫服不拘時候

麻黄細辛湯 治少陰傷寒口中和而背惡寒反熱倦怠自汗而渴其脉尺寸俱沉而緊者

麻黄去節 細辛 附子炮去皮臍各半兩

右剉散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前服手足厥者去麻黄細辛加乾薑半兩甘草一分或口燥舌乾而渴宜多下之

附子湯 治少陰病得之一二日口中和而背惡寒者即當灸之少陰病身體痛手足寒骨節疼脉沉者並宜服之

茯苓 芍藥各一兩半 人參壹兩 白朮貳兩

附子炮去皮臍壹枚

右㕮咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓溫服日進三服

四逆湯 治傷寒表裏俱病名兩感一日與太陽少陰俱病頭痛口乾咽滿而渴二日陽明與太陰俱病腹滿身熱不食譫語三日少陽與厥陰俱病耳聾囊縮而厥兩病俱作治有先後先宜救裏臟氣內正急宜攻表救內固宜急而表亦不可緩也救裏宜四逆湯身體疼痛清便自調急當救表宜桂枝湯兩感傷寒古無治法惟證治論并活人書解仲景治有先後之說皆云治有先後者宜先救裏內纔溫則可醫矣然後救表亦不可緩也以上所論並先救裏然後救表如下利不止身體疼痛則先救裏如不下利身體疼痛則先救表此亦謂之治有先後也兩感病亦有可治之理而不可必也方見前

[illegible]方見前 每用四錢生薑三片棗子二枚煎吞服

[illegible]方見前 每服五十粒調和陰陽其病頭疼世無不可治之病醫者不當輕信乎

葛根湯 治太陽病項背強几几然無汗惡寒并治三陽合病自利

葛根壹兩 麻黄去節 桂心 甘草炙

芍藥各半兩

右剉散每服五錢水一盞半生薑五片棗一枚煎七分去滓食前溫服三陽合病不下利但嘔者加半夏六錢

脾約圓 治太陽陽明脾約是也大便硬小便利者其脾為約

大黄酒浸 厚朴去粗皮 枳殼去穰 白芍藥

麻子仁另研 杏仁另研

右為末煉蜜和丼一千下圓如梧桐子大每服二十圓溫水下不拘時候未效加五圓十圓至五十圓止利後服糜粥將理

附子散 治陰毒傷寒為病手足冷腰背強頭疼腹痛或煩渴精神恍惚額與手背時出冷汗聲鄭重爪甲唇面色青黑多因脾腎虛寒伏陰重感於寒所致或因服冷藥過多心腹脹滿昏不知人

附子炮去皮臍 桂心 當歸去尾 白朮各半兩

半夏湯洗 乾薑炮各壹分

右剉散每服三錢水一盞生薑三片煎至六分不以時

熱服衣覆取汗

返陰丹 治陰毒傷寒心神煩燥頭痛四肢逆冷面青腹脹脉沉伏者

硫黃（透明者五兩別研） 消石（別研） 太陰玄精（各二兩別研）

乾薑（炮） 桂心（各半兩） 附子（半兩炮）

右用鐵銚先鋪玄精次下消末各一半中間鋪硫黃末又將二石餘末蓋上以小盞合著熟炭火三斤燒令得所勿令煙出急取瓦盆合著地上四面灰盍勿令煙出候冷取出研細入後藥為末同研勻米糊圓梧桐子大每服二三十圓煎艾湯下頻服汗出為度未退乃大艾炷灸臍下丹田氣海更不退則以葱熨之其法亦

治氣虛陽脫體冷無脉氣息欲絕不省人事及傷寒陰厥百藥不效其法見前

四逆湯 治陰毒要藥方見前

當歸四逆湯 治手足厥寒脉細欲絕者亦治陰毒要藥

當歸（去蘆） 桂枝 芍藥 細辛（各叁兩）

大棗（五枚） 甘草（炙） 通草（各貳兩）

右剉散以水八升煮三升去滓溫服一升日三服內有久寒者加吳茱萸生薑主之

升麻湯 治陽毒傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下後變成陽毒腰背痛煩悶不安面赤狂言或走或見鬼或下利面赤斑斑如錦紋咽喉痛下膿血脉浮大數五日可治七

日不可治大抵宜早發汗

升麻（二兩） 犀角屑 射干 黃芩

人參 甘草（各炙一分）

右剉散每服五錢水一盞煎至七分熱服併進三四服溫覆汗出為度（[illegible]加木通甘草大[illegible]方見前）

梔子仁湯 治陽毒傷寒壯熱百節疼痛

梔子 赤芍藥 大青 知母（各壹兩）

升麻 黃芩 石膏 杏仁

柴胡 甘草（各半兩）

右剉散每服四錢水一盞薑三片豉二十粒煎至七分不拘時候服

大陷胸湯 治傷寒表未解醫反下之膈內拒痛兩手不可近短氣煩躁心中懊憹心下鞕大便不通舌燥而渴熱實脉沉而緊又治身無大熱有水結在胸脇間者

大黃（半兩） 芒硝（四兩） 甘遂（半兩）

右剉散用水三盞先煎大黃至一大盞入芒消煮一沸入甘遂末煮一沸分二服得利止

小陷胸湯 治結胸病正在心下按之則痛脉浮滑者

黃連（壹分） 半夏（湯洗七次[illegible]） 括樓實（[illegible]）

右剉散水二盞先煎括樓至一盞半入前藥煎至六分去滓分二服利黃涎沫即安（一方加枳實[illegible]）

大陷胸圓 治熱實結胸潰發於陽而反下之熱入因作結

胸以下之太旱故也其病項強如柔痓狀下之則和
大黃二兩　葶藶炒　杏仁去皮尖炒　芒消各五分
右前二味為末將杏仁芒消合研為泥和散取如彈子大一枚別研甘遂末一錢白蜜一大匕水二盞煎至七分頓服之一宿乃下如不下更服取下為效甘遂性猛宜斟酌虛實入之

治結胸灸法
巴豆十四粒　黃連七寸去皮用
右為末用津唾和成膏填入臍心以艾灸其上腹中有聲其病去矣不拘壯數病去為度纔灸了便以溫湯浸手帕拭之恐生瘡

枳實理中圓治寒實結胸及傷寒諸吐利後胸痞欲絕胸高起急痛手不得近
枳實去瓤麩炒　茯苓　人參　白朮
乾薑炮　甘草炙各等分
右為末蜜和一兩作四圓熱湯化下渴加栝樓根下利加牡蠣粉各等分為末服亦可

桔梗枳殼湯治傷寒氣痞胸滿欲死
枳殼去瓤麩炒　桔梗去蘆　甘草炙各等分
右剉散每服五錢水一盞半煎七分食前服痰多加半夏生薑有熱加黃芩

三黃瀉心湯治傷寒陰證下之太早致心下痞按之軟其脈關上浮者主之若未解未可攻宜先服風寒二證杖桂枝麻黃湯表解已即服此
大黃蒸　黃連　黃芩去心
右剉散每服五錢沸湯二盞熱漬之一時久去滓分二服暖服或汗出惡寒加附子別煎汁入一合同服

半夏瀉心湯治心下痞滿而不痛者
半夏湯泡七次壹錢　黃芩去心　人參去蘆
甘草炙　乾薑炮各兩半　黃連半兩
右剉散每服四錢水一盞半薑五片棗一枚煎七分溫服或傷寒中風醫反下之下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩者加甘草半兩人參一兩名甘草瀉心湯或汗出解後胃中不和心下痞鞕乾噫食臭脇下水鳴下利者加生薑一兩減乾薑一兩餘如正方名生薑瀉心湯二方治痰熱心胃煩痞半夏圓酒蒸黃連圓合和每服三十五圓食飲下特效方見痰瘧門及下翻胃門

蜜煎導法治陽證結胸死無可療者曲鱔活者十一條細切擂爛用蜜半盞水半盞攪濾服無蜜用砂糖

三黃梔豉湯治發逆諸方並見後第四卷

百合知母湯治病人欲食復不能食常默默欲臥復不能臥欲行復不能行有寒如無寒有熱如無熱飲食或美或不美如強健人而卧不能行口苦小便赤藥入口即吐利此因虛勞大病之後不平復變成此疾名百合候此主

之發汗後者服

百合擘七枚　知母洗三兩

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎知母取一升去滓後合和煎取一升五合分溫再服

滑石代赭湯 治百合病下之後者

百合擘七枚　滑石三兩碎綿裹　代赭如彈子大一枚碎綿裹

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎滑石代赭取一升去滓後合和重煎取一升五合分溫服不拘時候

雞子湯 治百合病吐之後者

百合擘七枚　雞子黃一枚

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓內雞子黃攪勻煎五分溫服

百合洗方 治百合病一月不解變成渴者

百合一升水一斗漬一宿以洗身已食煮餅勿以鹽豉

玄參升麻湯 治傷寒失下不當下而下之熱毒在胃發斑如錦紋甚則煩躁譫語兼治喉閉腫痛

玄參　升麻　甘草各半兩

右剉散每服五錢水一盞半煎七分去滓溫服溫毒亦能發斑也

知母麻黃湯 治壞傷寒及傷寒差後或十數日以來精神不守言語

錯謬或潮熱頰赤寒熱如瘧皆由汗下不止毒在心胞間所致也

知母壹兩半　麻黃去節　甘草炙　芍藥

黃芩去心　桂心各半兩

右剉散每服五錢水一盞半煎七分溫服日三四服若心煩欲飲水稍稍與之

黑奴圓 治傷寒調理失序醫所不治及時行疫病七日不汗脈洪數面赤目瞪身熱煩躁狂言欲走大渴或口噤不精魄已散但心下暖斡開灌藥下咽即活亦治陽毒發斑

麻黃去節　大黃各二兩　芒硝　釜底煤別研

梁上塵別研　小麥奴　竈突墨各壹兩別研

右為末煉蜜為圓彈子大新汲水研下壹圓渴者與冷水盡飲之須臾當寒寒竟汗出便瘥若日移五尺不汗依前法服一圓差須病人大渴乃可與之不渴者勿服

[illegible]散 治傷寒調理失序毒氣內結胸腹脹滿坐臥不安日久不瘥狂言妄語大小便不通或復吐逆

臘月黃牛膽以天南星為末入膽內縛令緊當風處懸之候乾取用

右為末以人參半兩煎湯七分盞調末二錢乘熱服遲頃更以熱人參湯投之或睡便溺下黃黑惡物是效

桃仁湯 治狐惑默默欲眠目不瞑惡飲食面目乍赤乍白乍黑齒無色舌上白聲嗄咽乾此因大病後腸胃虛矣三虫求食食人五臟食其喉則為惑其聲嗄食下部則為狐

其咽乾當看上脣有瘡虫食其府下脣有瘡虫食其肛

桃仁去皮尖 槐子碎 艾各壹兩

右剉散每服五錢水一大盞薑三片棗二枚煎七分食前服之

白頭翁湯 治熱利下重及欲飲水者

白頭翁弍兩 黃連 黃柏 秦皮各叁兩

右剉散水七升煮取二升去滓溫服一升不愈更飲一升即效

黃連阿膠圓 治同上方見泄痢類

黃連解毒湯 治時疾三日已汗解或因飲酒復劇苦煩悶乾嘔口燥呻吟錯語不得臥

黃連去鬚 黃蘗半兩 梔子擘 黃芩各壹兩

右剉散每服五錢水一盞半煎取一湯盞去滓服未知再服進粥以此漸差外臺云凡大熱盛煩嘔呻吟錯語不得眠者傳此方諸人用之亦效此直解毒熱除酷熱不必飲酒劇者

黃連犀角湯 治傷寒及諸病後人有䘌瘡出下部

黃連半兩 烏梅十枚 犀角若無以升麻代 木香各壹兩

右剉散每服五錢水一盞半煎七分食前服

雄黃兌散 治下部䘌瘡

雄黃研 青葙子 苦參 黃連各弍兩

桃仁去皮尖研壹分

右為末以生艾搗汁和如棗核大綿裹納下部菴竹汁更佳無艾只用綿裹散子納下部亦得

四逆湯 治傷寒寒厥或表熱裏寒下利清穀食入則吐或大汗大吐大下之後四肢冰冷五內拘急方見陰病門

白虎湯 治熱厥腹滿身重難以轉側面垢譫語遺溺手足厥冷自汗脉沉滑裏有熱也方見前

大柴胡湯 亦治熱厥當觀病淺深量多寡飲之方見前

黃連阿膠湯 治少陰病得之二三日已上心中煩不得臥者

黃連壹兩 阿膠叁分 雞子黃半个 黃芩壹分 芍藥半兩

右剉散每服四錢水二盞煎取一盞去滓內膠消盡內雞子黃攪令和溫服日三服

文蛤散 病在陽應以汗解之反以冷水潠之灌之其熱被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者宜服若不差者與五苓散身熱皮粟不解欲引衣自覆者與三物白散

文蛤五兩

右為散沸湯和服方寸匕湯用五合

三物白散 治寒實結胸無熱證者屬太陽

貝母叁分 桔梗去蘆叁分 巴豆去心皮熬黑研如脂壹分

右為散內巴豆研和以白飲和服強人半錢匕羸人可減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一盃利過不止進冷粥一盃身熱皮粟不解欲引衣自覆者以

水渠之洗之益令熱郄不得出當汗而不汗則煩假令汗出已腹中痛與芍藥三兩如上法

十棗湯 太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人漐漐汗出發作有時頭痛心下痞鞕滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也宜服 方見痰飲類

抵當湯 太陽病六七日表證仍在脈微而沉反不結胸其人發狂者以熱在下焦小腹鞕滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也或太陽病身黃脈沉結小腹鞕小便不利者為無血也小便自利其人如狂者血證諦也或傷寒有熱小腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之不可餘藥宜服 屬太陽 陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞕大便反易其色必黑者宜此藥下之或病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者可下之假令已下脈數不解合熱則消穀喜飢至六七日不大便者有瘀血宜服 屬陽明

大黃 三兩 水蛭 虻蟲 桃仁

右㕮咀散作二服水二盞煎七分去滓溫服

吳茱萸湯 食穀欲嘔屬陽明也此主之得湯反劇者屬上焦也 少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者或乾嘔吐涎沫頭痛者此並主之 屬少陰

人參 壹兩 吳茱萸 壹兩八錢半

右為散每服四錢生薑四片棗子一枚水一盞半煎八分去滓分二服

苦酒湯 治少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者

半夏 雞子 一枚

右內半夏著苦酒中以雞子殼置刀環中安火上令二三沸去滓少少含嚥之不差再服

牡蠣湯 治發汗多頭眩汗出筋惕肉瞤

白朮 牡蠣粉 防風 各等分

右為末每服二錢以酒調下米飲亦可日二三服汗止便服小建中湯 方見前

黃芩湯 治傷寒臍節疼痛內寒外熱虛煩

芍藥 貳兩 甘草 炙貳兩 乾薑 炮壹兩 黃芩 叁兩

桂 四兩

右剉散每服五錢棗二枚水一盞半煎八分去滓溫服日三夜一覆令小汗

大白朮湯 治陰毒傷寒心悶煩躁四肢逆冷

白朮 附子 炮去皮臍 川烏頭 炮去皮臍 桔梗 去蘆

細辛 各壹兩 乾薑 半兩炮

右為末每服二錢水一中盞煎至六分不拘時稍熱服

回陽丹 治陰毒傷寒面青手足逆冷心腹氣脹脈俱沉細

蓽澄茄 木香 乾蠍 附子 炮去皮臍

硫黃 細研 吳茱萸 湯浸七遍焙乾 乾薑 壹分

張口

右為末，湯浸蒸餅圓如梧子大，每服三十圓，不計時候，
生薑湯下，頻服三服後，以熱酒壹盞投之，厚衣蓋取汗。

正陽散 治陰毒傷寒，面青，張口出氣，心下硬，身不熱，只額
上有汗，煩渴不止，舌黑多睡，四肢俱冷。

甘草 炙，壹分 麝香 壹分，細研入 附子 壹兩，炮裂
乾薑 壹分，炮 皂莢 壹挺，去皮，塗酥炙黃，去子

右為末，每服二錢，水一中盞，煎至五分，不拘時熱服。

肉桂散 治傷寒服冷藥過度，心腹脹滿，四肢逆冷，昏沉不
識人，變為陰毒。

肉桂 去麤皮 高良薑 剉 厚朴 去皮，薑汁炙令香熟
白朮 木香 各叁分 人參 去蘆頭 赤芍藥
陳橘皮 吳茱萸 湯洗，炒黃，半兩 附子 炮裂，去皮臍 前胡 去蘆頭 當歸 各壹兩

右剉散，每服四錢，水一中盞，棗三枚，煎六分，去滓，不拘
時稍熱頻服。

升麻湯 治傷寒一二日便成陽毒，或服藥吐下之後
變成陽毒，腰背痛，煩悶不安，面赤狂言，或走或見鬼，或下
利，脈浮大數，面赤斑斑如錦紋，咽喉痛，下膿血，五日可治，
七日不可治。此方見朱肱活人書

升麻 弍兩 犀角屑 射干 黃芩
人參 甘草 各壹兩

右剉散，每服四錢，水一盞半，煎至一盞，去滓，飲半盞，食
頃再服，溫覆手足，出汗，出汗則解，不解再服。

[illegible]散 治陽毒傷寒未解，熱結在內，恍惚如狂。

甘草 炙微赤，剉 木通 剉 大腹皮 剉，各壹兩 桂心 叁分
川芒硝 弍兩 川大黃 兩半，剉碎，微炒 桃仁 三十枚，湯浸，去皮尖、雙仁，麩炒微黃

右剉散，每服四錢，水一中盞，煎至六分，不拘時候溫服，
通利為度。

五柔圓 老人虛人臟氣亡津液，虛秘，大便結，調補三焦。

大黃 四兩 前胡 壹兩 半夏 洗七次 蓯蓉 酒浸
芍藥 茯苓 去皮 細辛 當歸
葶藶 炒，各半兩

右為末，煉蜜為圓如梧桐子大，溫水下二十圓，以通
為度。

葛根橘皮湯 治冬溫未即病，至春被積寒所折，不得發，至
夏得熱，其寒解，冬溫始發，肌中斑爛癮疹如錦紋，而欬，心
悶，但嘔吐清水，服此湯即靜。

葛根 橘皮 杏仁 去皮尖，研炒 知母
黃芩 麻黃 去節，湯泡 甘草 炙，各半兩

右剉散，每服五錢，水一大盞，煎至一中盞，去滓溫服。

知母桂心湯 治傷寒後不差，朝夕有熱如瘧。

麻黃 去節，壹兩 甘草 炙，壹兩 知母 弍兩 芍藥
黃芩 各壹兩 桂心 弍兩

右為散，每服四錢，水一盞半，生薑三片，煎一盞，去滓，取
八分，溫熱服，日三服，令微汗。若心煩不眠，其人欲

飲水當稍稍與之令胃中和則愈

□□四物湯 治少陰下利手足冷無熱候者

甘草炙二兩　人參　龍骨各二兩　黃連

乾薑各壹兩　附子壹枚炮去皮臍

右剉散每服三錢水一盞煎七分日三服不差復作下利腹痛加當歸二兩嘔者加橘皮一兩

化斑湯 治斑毒

人參　石膏各半兩　萎蕤　知母

甘草各壹分

右剉散每服五錢匕水一盞半入糯米一合煎八分取米熟為度去滓溫服

黃連橘皮湯 治溫毒發斑

黃連四兩去毛　陳橘皮　杏仁二兩去皮尖　枳實炒

麻黃去節湯泡　葛根各二兩　厚朴薑汁炙　甘草炙各一兩

右剉散每服五錢水一小盞半煎至一盞去滓服下利當先止

陽旦湯 治中風傷寒脈浮發熱往來汗出惡風項強鼻鳴乾嘔

桂心　芍藥各三兩　甘草　黃芩各二兩

右剉散每服五錢水一盞半棗子一枚生薑三片煎至一盞取八分清汁溫服自汗者去桂心加附子一枚炮渴者去桂心加栝樓三兩利者去芍藥桂加乾薑三兩心下悸者去芍藥加伏苓四兩虛勞裏急者正陽旦湯主之煎時入膠飴為佳若脈浮而無汗發熱者不可與

竹皮湯 療交接勞復卵腫腹中絞痛欲絕

刮竹青皮壹升

右用水三升煮取一升半絞去滓分服立愈

乾薑湯 療婦人得溫病雖差未復未滿一百日不可與交合為陰易之病必拘急手足拳皆死丈夫病以傷婦人名為陽易速當汗之滿一百日不可療也宜服此藥

乾薑壹分剉

右剉散水二盞煎六分溫服汗出得解止手足伸遂愈

青竹茹湯 婦人病未平復因有所動致熱氣上衝胸手足拘急搐搦如中風狀

栝樓根無黃者二兩　青竹茹刮半升淡竹者

右水二升煮取一升二合去滓溫溫作二三服哭立效

當歸白朮湯 婦人未平復因有所動小腹急痛腰胯疼四肢不任舉身無熱發者

白朮　桂枝去皮　甘草炙　人參

黃耆蜜炙　芍藥各壹分　生薑半兩　當歸壹兩

附子壹枚炮去皮八片

右剉散水三升煮取一升半去滓通口服一半食頃再服一半溫服微汗便差

知母麻黃湯 傷寒全後或十數日或半月二十日終不惺

妄言譫語說似失精神言語錯謬又無寒熱或醫或作鬼祟或
作風疾多般治不差或朝夕潮熱頰赤或有寒熱似瘧都
是發汗不盡餘毒在心胞絡間所致

知母壹兩半　麻黄去節　甘草炙　芍藥
黄芩各半兩　桂枝去皮不可見火兩匹若中桂枝作壹分

右剉散每服五錢水一盞半煎八分去滓溫服半日可
相次二三服溫覆令微汗若心煩不眠欲飲水當稍稍
與之令胃中和即愈未汗再服

□舌方 治傷寒舌出寸餘連日不收
以梅花腦子為末摻舌上應手而收當用五錢病方愈

白朮散 治傷寒氣脈不和增寒壯熱鼻塞腦悶涕唾稠粘
痰咳壅滯或冒涉風濕增寒發熱骨節煩痛或中暑嘔吐
眩暈及大病後將理失宜食復勞復病證如初悉主之又
五勞七傷氣虛頭眩精神恍惚睡卧不寧肢體倦怠潮熱
盜汗脾胃虛損面色萎黃飲食不美口吐酸水臟腑滑泄
腹內虛鳴反胃吐逆心腹絞痛久瘧久痢及膈氣咽塞上
氣喘促坐卧不安或飲食所傷胸膈痞悶腹脇膜脹婦人
產前產後血氣不和霍亂吐瀉氣厥不省人事並宜服之
常服辟四時不正之氣及山嵐瘴疫

白芷　甘草炒　青皮去白　白茯苓去皮
桔梗去蘆　山藥　香附子以上各叁兩去毛
乾薑半兩　白朮去蘆壹兩

右剉散每服二錢水一盞薑三片棗一枚木瓜一片紫
蘇葉二三皮煎七分食前服若吐瀉入白梅煎喘加桑
白皮杏仁傷寒勞役入薄荷脚氣木通三寸麝香少許
中暑嘔逆入香薷產前產後血氣不和入荊芥霍亂入
藿香氣厥入鹽煎服

又方白朮散 治傷寒雜病一切吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱
保養衰老及治酒積嘔噦

白朮　茯苓去皮　人參各半兩　甘草炙壹兩半
木香壹分　藿香半兩　葛根壹兩

右為末白湯調服二錢煩渴加滑石二兩甚者加薑汁
續續飲之

蜜煎導法 陽明病自汗出若發汗小便自利者此為津液
內竭雖鞕不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之
若土瓜根及大猪膽汁皆可為導
右蜜四兩銅器中微火煎之稍凝如飴狀攪之勿令焦
著欲可丸捻作鋌如指許長二寸當熱時急作令頭銳
內穀道中以手急抱欲大便時乃去之

猪膽汁方
右以大猪膽一枚瀉汁和法醋少許以灌穀道中如一
食頃當大便

□□蘗皮 治口瘡舌黃□□
右以大蘗去粗皮蜜漬一宿含之吞汁勿絕差或□

灸候黃色研爲末每服半錢匕

灸法初得病或先頭痛身寒熱或濇濇欲守火或腰背強直面目如飲酒狀此傷寒初得一二日但烈火灸心下三處第一處去心下一寸名巨闕第二處去心下二寸名上管第三處去心下三寸名胃管各灸五十壯然或人形大小不同恐寸數有異可繩度隨其長短寸數最佳取繩從心頭骨名鳩尾頭度取臍孔中屈繩取半當繩頭名胃管又中屈半繩更分爲二分從胃管向上度一分卽是上管又上度取一分卽是巨闕大人可灸五十壯小兒可三壯亦隨其年紀之大小以意斟量之若病者三四日以上宜先灸胷上二十壯以繩度鼻正上盡髮際中屈繩斷去半便從髮際入髮中灸繩頭名曰天聰又灸兩顳顬穴在耳前動處又灸兩風池穴在項後髮際陷中又灸肝腧穴在第九椎下兩旁相去各一寸半百壯餘處各二十壯又灸太衝穴在足大指本節後二寸或一寸半陷中三十壯神驗

世醫得效方卷之一終

世醫得効方卷第二

○大方脉雜醫科　●傷風

桂枝湯治足太陽膀胱經傷風脉陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔又太陽證宜汗其人失血及下利則頻與服使體潤漐漐連日當自解

桂枝去皮　芍藥各一兩半　甘草一兩

右剉散每服二錢水一盞半生薑三片棗一枚擘破共煎至七分去滓溫服不拘時惟冬春初可行自春及夏至以前可加黃芩半兩夏至以後加知母半兩石膏二兩或升麻半兩若病人素虛寒者不用加減無汗者不宜服之

杏子湯治足陽明胃經傷風惡風自汗口苦咽乾腹滿微喘發熱惡風自汗嗜卧身重小便難潮熱而噦其脉浮弦長而數悉主之

杏仁去皮尖　半夏湯洗去滑　五味子各二錢半　芍藥　桂心　細辛　乾薑炮　大黃蒸　甘草炙各三分　茯苓去皮四分

右剉散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前服

柴胡加桂湯治足少陽膽經傷風四五日身熱惡風頸項

漬脇下滿手足溫口苦而渴自汗其脉陽浮陰弦或發汗
多言陽譫語可以此和其榮衛通其津液自愈
柴胡壹兩叁分　半夏湯洗七次分壹字　甘草炙叁分
芍藥　黄芩　人參　辣桂各半兩
右剉散每服伍錢水一盞半薑五片棗一枚煎至七分
去滓空心溫服
桂枝芍藥湯治足太陰脾經傷風自汗咽乾腹滿自利不
渴四肢倦怠手足自溫其脉弦大而緩者
桂心半兩　白芍藥叁兩
右剉散每服五錢匕水一盞半薑三片棗一枚煎七分
去滓溫服腹痛甚者加大黄一兩

桂附湯治足少陰腎經傷風自汗惡心煩悶咽喉痛自汗腰疼
連胻骨酸痛嘔吐涎沫頭疼其脉沉弦者
附子生去皮臍　桂心　乾薑　芍藥
甘草炙　茯苓　桃仁去皮尖麩炒各壹兩
右剉散每服四錢水二盞煎七分去滓食前服或咽喉
痛加桔梗半兩
八物湯治足厥陰肝經傷風惡風而動自汗小腹急痛寒
熱如瘧骨節煩疼其脉尺寸俱微而遲者
桂心　當歸　川芎　前胡
防風各叁分　芍藥壹兩半　甘草炙　茯苓各半兩
右剉散每服四錢水一盞半薑五片棗二枚煎至八分

去滓空心服

●傷暑

五苓散治傷暑煩渴引飲無度兼治傷寒溫熱表裏未解
煩渴引水水入即吐或小便不利及汗出表解煩渴不止
又治霍亂吐利黄疸瘟疫
澤瀉貳兩半　桂心壹兩　猪苓去皮　赤茯苓去皮
白朮各壹兩半
右為末每服貳錢沸湯調下不拘時候服訖多飲熱湯
汗出即愈濕熱病加甘草一兩冬發熱在裏身發黄疸
濃煎茵陳湯食前服疸病發渴及中暑引飲白水調服
小兒加白朮末少許發虛熱每料錦黄芪人參麥門冬
去心各壹兩分陰陽退表熱加茵陳車前草每服三
根止瀉加紫蘇陳米各少許姜汁半匕久痢加肉豆蔻
伍錢每服鹽梅一枚赤痢烏梅一枚粟殼二枚去蒂赤
腹醋炒白痢粟殼二枚蜜炙同上粟米一撮腹痛南木香
半錢渴烏梅一箇枇杷葉二皮去白毛糯米一撮伏暑
鼻衄白茅花一握小便血以生料煮每服加梔子三个
車前子一撮煩熱心神恍惚朱砂一字燈心二十莖麥
門冬二十粒去心淡竹葉十皮車前草二根傷暑吐血
白茅花一握熱瀉車前子一撮麥門冬二十粒去心暑
濕瀉紫蘇五葉木瓜三片車前子一撮傷暑頭痛濃煎
葱白湯大便水瀉小便不利加車前子末少許又方

治燥渴去桂心加人參謂之春澤湯　熱瀉身痛加蒼朮
少許　秋多淫雨人患濕泄在冬時服之效

縮脾飲　治伏暑熱燥煩渴霍亂乾嘔霍亂
草菓去皮　縮砂去殼　烏梅肉　炙甘草各四兩　乾葛
白扁豆　生薑炒片曰乾各壹兩重
右剉散每服五錢水壹盞煎至八分浸冷服或欲溫欲
熱亦可　凡酌傷暑發熱頭目痛用以香薷圓方見右

中暑類

却暑散　治冒暑伏熱頭目眩暈嘔吐泄利煩渴背寒面垢
赤伏苓去皮　甘草生各　寒食麵
生薑各乙斤和切

右為末每服貳錢新汲水調下或湯點服不拘時候

香薷圓　治大人小兒傷暑伏熱燥渴瞀悶頭目昏眩胸膈
煩滿嘔噦惡心口苦咽乾肢體困倦不思飲食或發霍亂
吐利轉筋並宜服之
香薷去梗　紫蘇去梗　乾木瓜各壹兩　丁香
甘草炙　檀香　白茯苓去皮　藿香各半兩
右為末煉蜜圓彈子大每一圓至二圓熟水嚼下或新汲
水化下亦得小兒半圓

桂苓甘露飲　治傷寒中暑冒風飲食中外一切所傷
受濕熱內甚頭痛口乾吐瀉煩渴　及飲冷小便赤澀大便
急痛濕熱霍亂吐下腹滿痛悶及小兒吐瀉驚風
茯苓去皮乙兩　甘草炙貳兩　白朮半兩　澤瀉乙兩
桂去皮半兩　石膏貳兩　寒水石貳兩　滑石肆兩
豬苓半兩
右為末每服叁錢溫湯調下新水亦得生姜湯尤良小
兒每服壹錢

六和湯　治心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔吐泄瀉寒熱
交作痰喘咳嗽胸膈痞滿頭目昏痛肢體浮腫嗜臥倦怠小
便赤澀並傷寒陰陽不分冒暑伏熱煩悶或成痢疾中酒
煩渴不食婦人胎前產後並宜服之
人參　縮砂　甘草炙　杏仁去皮尖
半夏湯洗七次各壹兩　白扁豆姜汁略炒　赤伏苓去皮　藿香葉拂去塵
木瓜各貳兩　香薷去梗　厚朴姜汁製各肆兩
右剉每服四錢水一盞半生姜三片棗子一枚煎至八
分去滓不拘時候服

冷香飲子　老人虛人伏暑煩燥引飲無度惡心疲倦服涼
藥不得者
草果仁叁兩　附子炮去皮臍　橘紅各乙兩　甘草炙半兩
右剉散每服一兩水二盞生薑十片煎半盞去滓沉冷
旋旋服不拘時

[illegible]散　傷暑煩燥發渴口乾及治血痢婦人熱崩
青皮去白　赤芍藥　黃連去鬚　地榆各等分
右為細末每服一錢冷水調下如著熱而氣血妄行加

甘草等分
〔枇杷葉散〕治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目昏眩或
陰陽不和致成霍亂吐利轉筋煩燥
枇杷葉去毛炙半兩　香薷三分　白茅根
甘草炙　麥門冬去心　乾木瓜各一兩
陳皮去白焙　丁香　厚朴去皮薑汁炙各半兩
右剉散每服伍錢水一盞半生姜三片煎服煩燥沉冷
服如脾虛感暑嘔吐不食以此藥煎去滓吞消暑圓六
七粒立効緣本虛嘔吐昏倦手足冷除茅根麥門冬加
附子炮用
〔香薷散〕治臟腑冷熱不調飲食不節或食腥膾生冷過度
起居不節或露臥濕地或當風取涼而風冷之氣歸於三
焦傳於脾胃脾胃得冷不能消化水穀致令真邪相干腸
胃虛弱飲食變乱於腸胃之間致吐利心腹疼痛霍亂氣
逆者有心痛而先吐者有腹痛而先利者有吐利俱發者有
發熱頭痛體疼而復吐利虛煩者或但吐利心腹刺痛者
或轉筋拘急疼痛或但嘔而無物出或四肢逆冷而脉欲
絕或煩悶昏塞而欲死者此藥悉能主之
香薷去土斤兩　厚朴去皮姜汁炒　白扁豆各式兩
右剉散每服五錢水一盞酒一分同煎七分去滓水中
沉冷連喫二服立效不拘時候治中暑複傷風搐搦不
省人事者宜先服蘇合香圓候其甦省却以此藥加黃
連羌活各一錢暑濕腫滿香蘇散合和加生姜三片木
瓜二片車前草二根伏暑頭疼小便澁濁加山茵蔯車
前草各二根霍乱吐利加木瓜二片藿香少許生姜三
片傷暑腹痛加陳大蓼三寸陳壁土一指頭大木瓜二
片臟腑有熱便血加黃連厚朴烏梅各一錢小便血
加瞿麥穗一錢車前子一撮灯心二十莖感暑濕手足
結痛痺冷合和香蘇散每服四錢姜三片木瓜二片陳
大蓼三寸煎服留滓再加葱葉橘葉椒葉陳大蓼各一
握水一斗煮七分先熏後洗立效腳氣作痛行步艱辛
每料加入木瓜羌活炒蒼术枳殼去穰陳皮半夏甘草
各一兩成十味每服加生姜三片葱白二根脾胃不和
嘔逆惡心冒暑心腹脹滿去羌活加藿香烏梅各一錢
兆熱大渴去厚皮熱或五心熱加灯心二十莖麥門冬去
心白茅根各一錢淡竹葉十皮晚禾根淨洗一握每服時
感冒嘔油亦合和香蘇散每服四錢加生姜五片木瓜
二片諸熱毒小便赤濁每服四錢加車前子黃連去頭
各一錢則清利以上皆溫服暑月煩燥潮熱甚加茵蔯
車前草各二莖苦竹葉七片小梔子三枚擘破心胷煩
燥只依本方宜清便冷服暑月瀉瀉亦加烏梅車前
子一錢陳米一撮暑月虛人腹痛嘔泄加丁香白木炮
附子木瓜各半錢生姜五片亦名六和湯解暑和脾胃
加人參陳皮白术白茯苓黃耆木瓜甘草每料各一兩

亦名十味香薷散傷暑單有頭痛止方加山茵陳多服
取效以上並熱服常服消暑健脾或為末煉蜜為膏酒
服亦妙江浙大暑以家園種者則不用

小黃連圓 治伏暑發熱作渴嘔吐惡心及年深暑毒不差
黃連壹斤 酒弍升
右將黃連以酒煮乾為度焙為末用麪糊圓如梧子大
每服三十圓熟水吞下又治傷酒過度臟毒下血或泄
瀉米飲下食前日二服酒及熱物過度吐血茅花湯下

來復丹 治上盛下虛裏寒外熱伏暑泄瀉如水及治中暑
方見后痼冷類

小柴胡湯 治傷暑外熱內渴於內更加生薑三片烏梅一

得效方二　一八

箇麥門冬三十粒去心煎服不拘時候 方見前傷寒類

竹葉石膏湯 治伏暑內外熱熾煩燥大渴 方見前傷寒類

二陳湯 治傷暑復感冷及內傷生冷嘔吐 方見痰飲類

縮脾飲 治傷暑泄瀉及泄瀉霍亂作渴立效亦能解諸毒
白礬 五倍子 烏梅去核 甘草各乙兩
右為末入飛羅麪四兩拌勻每服二錢新汲水調下雖
平日不敢飲冷者服之不妨真有奇功為圓如彈子大
陰乾冷水調下亦可

五苓散 治傷暑潮熱煩渴小便不利 方見后大小便類
每服三錢水壹盞半燈心二十莖麥門冬二十粒去心
淡竹葉十皮車前穗五莖煎不拘時候服渴甚晚米根

少許白茅根五莖枇杷葉二皮去白毛蜜塗微炙煎服

● 傷濕

除濕湯 加蒼术川芎白芷木瓜對合各用四錢生薑三片
煎服日近遠年傷濕倦弱如虛損多服取效 方見前和解類

黃芪建中湯 治傷濕鼻塞身痛
黃芪蜜炙 辣桂各弍兩 甘草炙弍兩 白芍藥六兩
右剉散每服三錢姜五片棗一枚煎食前服

不換金正氣散 治傷濕益脾順氣加伏苓壹兩生薑三片
冬二斤 方見后時疫類

五苓散 治傷濕大小便自利 方見后中濕類

茵陳湯 治濕氣蒸熱發黃小便秘澁渴引水漿
茵陳乙兩半 大黃斗兩 小紅梔子拾枚

得效方二　十九

右剉散每服三錢水煎服

腎著湯 治身重腰冷痺如坐水中形如水狀反不渴小便
自利飲食如故病屬下焦從身勞汗出衣裏冷濕久而得
之腰以下冷痛腰重如帶五千錢
甘草炙 白术各弍兩 乾薑炮 茯苓去皮各四兩
右剉散每服四大錢水一盞半煎十分去滓食前服

滲濕湯 治坐臥濕地或為雨露所襲身重腳弱關節重疼
發熱惡寒或小便秘澁大便泄或汗出衣裏濕漬得之
腿膝或腫小便利反不渴
蒼术米泔浸 白术去芦 甘草炙各乙兩 乾薑炮

茯苓各肆兩 陳皮　丁香各半兩

右剉散每服四錢用水壹盞半生薑叁片紅棗二枚煎至七分去滓溫服或腹脹腰脚重滯煎木香湯兼服方見諸氣門

瓜蒂搐鼻法 治傷濕鼻塞頭疼瓜蒂不以多少㕮咀為細末口含水搐一字許入鼻中流出黃水即効

● 中寒

附子理中湯 治五臟中寒口噤四肢強直失音不語

大附子炮去皮臍 人參 乾薑炮 甘草炙 白朮各等分

右為剉散每服肆大錢水一盞半煎七分去滓不以時服口噤則斡開灌之

姜附湯 治中寒卒然暈倒或吐逆涎沫狀如暗風手脚攣搐口噤四肢厥冷或復燥熱

乾薑炮 附子炮去皮臍各乙兩

右為剉散每服肆錢水壹盞半煎七分去滓食前服入肝加木瓜入肺加桑白皮入脾加白朮入心加茯苓[illegible]謹加之挾風加防風兼濕多加白朮筋脈牽急加木瓜腹節疼痛加桂心人參白朮各等分仍須暖室密衣被火等圍護

● 中暑 又名中暍

大黃龍圓 治中暑或暈或昏不知人身熱惡寒頭疼狀如傷寒或往來寒熱煩燥渴甚嘔吐泄瀉常服去暑毒分陰陽

硫黃 消石各乙兩 雄黃通明者 滑石 白礬各半兩 寒食麪肆兩

右為末滴水為圓如梧桐子大每服五圓至七圓漸加至二十圓新汲水下昏塞不知人事以水化開灌之中暑忌得冷此藥却以冷水下之乃熱因寒用疑者釋之

益元散 治中暑身熱嘔吐泄瀉赤痢癃閉淋痛利小便益精氣通九竅六府消畜水止渴除煩熱心燥百藥酒食毒解疫癘及汎風傷寒及婦人下乳催生兼吹乳乳癰孕婦莫服

白滑石陸兩 甘草乙兩炙

右為極細末每服三錢蜜少許溫水調下無蜜亦得日三服欲冷新汲水調下發汗煎葱白豆豉湯并三四服

此藥解散熱甚多服無害有益

消暑圓 治中暑煩渴暈眩寒熱煩燥悶亂或似欲絕者

半夏乙斤醋五升煮乾 茯苓去皮 甘草生各半斤

右為末姜汁麪糊為圓如梧桐子大每服三十圓新汲水下中暑為患藥下即甦夏中常服止渴利小便若痰飲停滯中脘不快頭眩喜嘔姜湯吞下一名伏暑圓

皂莢湯 治中暑不省人事

豬牙皂莢乙兩燒灰 甘草乙兩微炒

右為細末每服貳錢溫熱水調下

來復丹 方見痼冷類 治中暑昏迷霍亂吐瀉每服五十

末飲吞下，五苓散調下亦得。丸見傷暑類。或水研灌下亦效。

香薷湯　治中暑手足微冷，煩渴，四肢不痛。方見霍亂嘔吐類。

縮脾飲　治中暑發熱惡寒。方見后咳逆類。

竹葉石膏湯　治中暑不惡寒，煩渴。方見前傷寒通治類。

五苓散　治中暑頭疼，惡心煩躁，心下不快。方見傷暑類。

香薷散　治中暑霍亂吐瀉。方見傷暑類。

人參湯　治中暑煩熱，口乾喉燥，冷服之。方見傷寒陽證類。

白虎加人參湯　治太陽中暍，其脈弦細芤遲，小便已洒然毛聳，口前開板齒者，何故洒然毛聳？為腠理司開闔，若皮膚急，腠理閉，熱則皮膚緩，腠理開，開則洒然寒，閉則熱而悶。方見傷寒通治類。

● 中濕

加味朮附湯　治中濕脈沉而微緩，濕喜歸脾，流於關節，中之多使人腹膜脹，倦怠，四肢關節疼痛而煩，或一身重著，久則浮腫喘滿，昏不知人，挾風眩暈，嘔噦，兼寒則攣拳掣痛。治之不得猛發汗，灼艾通泄，惟利小便為佳，此方主之。及治大小便皆自利。

白朮去芦　甘草炙，乙兩　附子炮，去皮臍，乙兩　赤茯苓乙兩

右剉散，每服伍錢，姜五片，棗二枚，煎，日三服。纔見身痺，又三服，當如冒狀，勿怪，蓋朮、附並行皮中，逐水氣，故爾。法合加桂一兩，大便堅，小便利，則勿加。

白朮湯　治中濕，口噤不知人。

白朮半兩，去芦

右酒三盞，煎一盞，頓服。不能飲酒，以水代，日三服，夜一服。

甘草附子湯　治中濕，小便不利，大便自利。

附子炮，去皮臍，七錢半　甘草炙，各二兩　桂心去粗皮，二兩

右剉散，每服三錢，水一盞半，姜七片，煎，食前溫服。汗出加防風，悸氣加赤茯苓，各二錢。

四氣兼中

附子湯　治五臟中風寒，手足不仁，口面喎斜，昏暈失音，眼目瞤動，牙車緊急，不得轉動。

附子炮，去皮臍　桂心各半兩　細辛去苗　防風去叉

人參去芦　乾姜炮，各六錢

右剉散，每服四錢，水一盞半，姜五片，棗一枚，煎七分，食前服。或為末，酒調二錢服。

防風湯　治中風挾暑，卒然暈倒，面青，四肢緩弱，喜伸欠，口喎斜，四肢不仁，好笑。

防風去叉　澤瀉　桂心　杏仁去皮尖，炒

乾姜炮　甘草炙，各等分

右剉散，每服四錢，水一盞半，煎七分，食前服。

生附白朮湯　治中風濕，昏悶恍惚，脹滿身重，手足緩縱，漐漐自汗，失音不語，便利不禁。

附子生，去皮臍　薑各半兩　白朮壹兩　甘草炙，壹分

右剉散，每服四錢，水一盞半，煎七分，食前服。

附子麻黃湯 治寒濕所傷身重疼弱或腰脚強痛嘔噦語音混濁心腹膜脹氣上喘不能動轉

附子炮去皮臍 麻黃不去節 白木去芦 乾薑 甘草炙 人參去芦各等分

右剉散每服四錢水一盞半煎七分食前服

參朮湯 治中濕者遍身疼痛四肢不仁半身不遂骨節離解緩弱不收或入浴暈倒口眼喎斜手足嚲曳皆宜服之

附子炮去皮臍 茯苓 白木 乾薑炮 澤瀉 桂心各等分

右剉散每服四錢水一盞半煎七分食前服

〇四氣相感

麻黃白朮湯 治寒濕身體煩疼無汗惡寒發熱者

麻黃去節 桂心貳兩 甘草炙壹兩 杏仁七十粒去皮尖 白木四兩去芦

右剉散每服四錢水一盞半煎七分食前溫服

桂枝附子湯 治風濕相搏身體煩疼掣痛不得屈伸汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫

桂枝四兩去皮 白木去芦 附子炮去皮臍各三兩 甘草炙二兩

右剉散每服四錢水一盞半薑五片棗二枚煎七分空心溫服或大便秘則去桂小便不利悸氣加茯苓三兩痺加防己四兩腹痛加芍藥四兩

防己黃芪湯 治傷風濕脈浮緊細身重汗出惡風方治風水脈浮身重不渴

防己四兩 黃芪去芦四兩 甘草炙二兩 白木去芦參兩

右剉散每服五錢水盞半生薑五片棗二枚煎七分去滓空心服喘者加麻黃一兩胃中不和加芍藥二兩氣上衝加桂一兩有陳寒加細辛一兩服後當如虫行皮中從腰以下如氷後坐被上又以被遶腰以溫下微汗差

白木茯苓乾薑湯 治伏暑中風濕煩渴引飲心腹疼燥悶口乾面垢洒洒惡寒淅淅惡風微汗飢不能食者

白木去芦 乾薑 茯苓 細辛 桂心 乾葛 甘草炙 橘皮 烏梅 京豉

右等分為末每服二錢白湯點下

茯苓白朮湯 冒暑暑毒加以着濕或汗未乾即浴皆成暑濕

茯苓 乾薑炮 甘草炙 白木 桂心各壹兩

右剉散每服四錢水一盞半煎七分食前服

葳蕤湯 治風溫兼療冬溫及春月中風傷寒發熱頭眩痛咽喉乾舌強胸內疼痛痞滿腰背拘急

葛根 麻黃湯泡焙乾 甘草炙 白薇 川芎 羌活 杏仁去皮尖各半兩 石膏碎一兩 葳蕤去三分 青木香壹分

右剉散每服五錢水一盞半煎七分食前服青木香冬
用一兩春半兩渴加栝樓根二片

○瘧

風證 加減桂枝湯 治先熱後寒煩躁自汗惡風名溫瘧
石膏四兩半 知母一兩半 甘草半兩炙 桂枝一兩
粳米一合
右剉散每服四錢水一盞半煎七分未發前進三服

白朮散 治傷風不留經絡與衛氣相併病以日作寒熱交
麻黃去節 白朮去蘆 茯苓 桂心各一兩
陳皮 青皮去白 桔梗去蘆 白芷
甘草 半夏麯 紫蘇 烏梅以上各三分去核
乾薑半兩
右剉散每服四錢水二盞薑三片棗二枚煎七分當發
日空心一服臨發一服尤妙亦治時疫

寒證 五積散 治身虛作瘧先寒後熱寒則湯火不能溫熱
則冰雪不能冷惡寒無汗方見傷寒陰証類
養胃湯 方見脾胃類 四獸湯 理中湯 方見中寒類 總治寒瘧

暑證 香薷湯 治但熱不寒陰氣孤絕陽氣獨發少氣煩冤
手足熱而欲嘔兼渴方見傷暑類
一方加黃連每料二兩名黃連香薷散治暑瘧獨熱燥
煩大渴引飲小便不利或背寒面垢每服加燈心二十
莖麥門冬去心二十粒淡竹葉七皮車前草二根晚禾
根一握擂一箇切片煎不拘時候

柴胡湯 治傷暑發瘧熱多寒少或但熱不寒咳嗽煩渴
小便赤每服加生薑三片烏梅一箇麥門冬二十粒去心
地骨皮少許煎溫服不拘時候熱盛大腑不通加大黃枳
殼各一錢一服立效方見傷寒陽証類

清脾湯 治瘧疾脉來弦數但熱不寒或熱多寒少膈滿能
食口苦舌乾心煩渴水小便黃赤大腑不利
青皮去白 厚朴去粗皮薑汁炒 白朮去蘆 草果仁
柴胡去蘆 茯苓去皮 半夏湯洗七次 黃芩
甘草炙各等分 或加人參亦可
右剉散每服四錢水一盞半薑五片煎七分不拘時溫服

消暑圓 治傷暑發瘧渴多煩悶眩暈每服五十圓淡薑湯
吞下方見中暑類暑多加服取效

濕證 朮附湯 治寒熱身重骨節煩疼脹滿濈濈自汗善嘔
因汗出復浴濕舍皮膚及冒雨濕所致

除濕湯 治同上方見中濕類

五苓散 治傷濕小便不利發瘧方見傷暑類

食證 二陳湯 治傷食發瘧痰多
陳皮 半夏制各五兩 白茯苓三兩 甘草炙一兩
右剉散每服三錢薑五片烏梅一箇煎服寒多者加草
果熱多加前胡青皮檳榔縮砂白豆蔻之類隨意增減

小清脾湯 治胃瘧發作有時先覺伸欠乃作寒慄鼓振頤

領中外皆寒腰背俱痛寒戰既已內外皆熱頭疼如破渴欲飲冷或痰聚胸中煩滿欲嘔或先熱後寒先寒後熱寒多熱少寒少熱多或寒熱相半或但熱不寒但寒不熱或隔日一發或一日一發或三五日一發者悉主之

厚朴 烏梅 半夏 青皮

良薑 草果 甘草

右剉散每服四錢水二盞薑三片棗一枚煎七分去滓未發前并三服忌生冷油膩時果此藥溫脾化痰治胸膈痞悶心腹脹滿噫醋吞酸自可常服

[illegible]丸 治食瘧食積氣滯腹脹

京三稜 蓬莪朮 青皮去白

陳皮 胡椒 乾薑

右為末米醋煮米粉糊圓梧桐子大黎紅為衣每服五十圓淡姜湯下或二陳湯下

七情四獸飲 治五臟氣虛喜怒不節勞逸兼并致陰陽相勝結聚痰飲與衛氣相搏發為瘧疾

人參 白朮 白茯苓 甘草

橘紅 半夏 草果 烏梅

紅棗 生薑

右等分剉散每用半兩以鹽少許淹少時厚皮紙裹水濕慢火煨香熟取出用水二盞煎未發前服

痰瘧祛瘧半夏湯 除痰下氣治胸膈脹滿寒熱嘔噦心下堅痞短氣煩悶痰逆惡心飲食不下

桔梗 陳皮 半夏 枳實

右剉散每服二錢水一中盞生姜五片烏梅一个煎至七分溫服不拘時候

半夏圓 治瘧多嗽涎盛痞滿煩悶咽膈不利嘔吐惡心神思昏憒心忪面熱並皆治之

半夏 白礬

右為末生薑自然汁為丸梧桐子大每服三十丸至五十丸食后臨臥淡姜湯吞下

瘧疾[illegible]子湯 治瘧疾經久不瘥正氣衰弱身熱如火極寒極熱連日方醒發時沉著發暈不能樟身戰掉不堪便溺飲食俱不便

附子

右剉散每服三錢水一盞半生姜七片紅棗七枚煎至七分去滓攤冷就吞靈砂丹五十粒或百粒未效再以七棗湯吞黃芽丹二十粒仍服黑錫丹以墜痰亦可回元氣凡有此瘧但當守續真元沉虛熱為法

[illegible]散 治挾嵐嶂溪源蒸毒之氣自嶺以南地毒苦炎燥濕不常人多患此其狀血乘上焦病欲來時令人迷困甚則發躁狂忘亦有啞不能言者皆由敗血瘀心毒涎聚於脾所致於此藥中加大黃枳殼各五錢

[illegible]散 治瘴瘧[illegible]瘴大熱煩燥

生地龍(各去土焙研細末)
右入生姜汁薄荷汁生蜜各少許新汲水調下如熱熾
加腦子少許服效
[illegible]圓 取下暑毒瘧氣毒
圓白半夏(生) 烏梅肉 川巴豆(去殼不去油) 母丁香
巴上各十枚(焙乾)右為末姜汁麪糊丸如麻子大上下以
厚紙蓋貼有油又再易貼每服五丸臨卧冷水下
勞瘧 [illegible]散 治表裏俱虛真元未復疾雖暫止小勞
復來
當歸 川芎 白茯苓(去皮) 青皮(去白)
陳皮(去白) 半夏(湯泡七次) 鱉甲(去裙醋炙黃) 芍藥(各等分)

右剉散每服三錢薑五片棗二枚烏梅一箇水煎不以
時服熱多加柴胡寒多加草果少許
瘧母 消癖圓 治瘧年經吐汗下榮衛虧損邪氣伏藏脇間
結為癥癖腹脇堅痛
芫花(炒) 朱砂(研各等分)
右為末煉蜜丸如小豆每服十丸棗煎湯下去癖須
用芫花大戟破水之劑下後即與養胃湯(方見[illegible])
熱瘧 八正散 治瘧發則心煩腹赤溺吐煩燥極熱欲冷地
上卧及冷飲加牛黃灯心白竹青煎即效(方見淋類)
白虎湯 治熱瘧表裏俱熱時時惡寒大渴口舌乾燥加人
參(方見傷寒通治類)

虛瘧 分利順元散 治虛怯人患瘧未可進常山等藥者
川烏(壹兩) 附子(炮去皮臍貳兩) 南星(貳兩) 木香(別研五錢不入火)
右除木香不見火三味各一半去皮生用即三生飲一
半炮熟即順元散合和切片每服四錢生姜十片棗七
枚水一盞煎至七分當發前一日及當發之日早晨連進
二三服以化去痰蓋云无痰不成瘧又半生半熟乃能
分解陰陽也
四獸飲 治瘧作時仆倒搐搦不醒是中心抑鬱陰陽交
戰所致先依灸法(方見[illegible])仍服此藥
附子(壹兩) 訶子(四個) 陳皮(四個全者) 甘草(四寸)
右剉散每服四錢水二盞生姜七片棗七枚煎至七分
初服或不納再進則漸能嚥四服盡頸愈更不復作

七棗湯 治五臟氣虛陰陽相勝作為痎瘧不問寒熱先後
與夫獨作疊間日悉主之
附子(壹枚炮[illegible])
右剉散水一盞生姜七片棗七枚煎至八分當發日空
心溫服仍喫棗子三五枚
[illegible]散 治脾臟不和瘧疾瀉利腹痛下部無力身重足痿
腳下浮腫飲食中滿四肢不舉此方極驗
橘皮(生用) 甘草(炙) 厚朴(去粗皮姜汁炒各壹兩)
羌活 防風 肉豆蔻(煨) 白茯苓(各貳兩)
川芎(半兩) 吳茱萸(去梗各半兩)

右剉散每服二錢水一盞煎至八分空心食前服

果附湯治脾寒瘧疾不愈振寒少熱面青不食或大便溏泄小便反多

草果仁　附子炮去皮臍

右剉散每服半兩水二盞姜七片棗一枚煎至七分溫服不拘時候

冷附湯治冷痰作瘧方見痼冷類

參附湯治瘧疾無過是痰實痰結不通脾胃弱並熱在上焦于胸膈不得入于臟腑所以五更冷服乃使藥下達壯脾胃去痰實除虛熱降心氣及用發痰

附子炮去皮臍

右切作片分二服水二大盞生姜十片煎至一盞去滓露一夜煎下用薄綿覆蓋露一宿五更初冷服

久瘧丁香散患瘧經年不差黃瘦飲食減少雖有時歇三兩日或發或不發少食每物相犯寒熱立至多服效方見脾胃類

大全香圓治瘧久不愈每發即振寒極熱瘧退汗如雨生薑煎湯服一服不作方見泄瀉類

補脾湯治久瘧扶虛理脾服此後以消瘧飲子截

通治瘧疾陰陽交爭寒熱互作用藥須半生半熟一冷半熱乃收十全之功

草果平胃散治脾虛作瘧不問寒熱先宜飲食不進宜服

右以生料平胃散四兩加入草果大腹皮檳榔青皮各二兩剉碎相和勻每服五錢水一盞半姜三片棗二枚煎七分空心多服收效

人參養胃湯治寒多熱少或但寒不熱頭痛惡心胸滿嘔噦身體疼痛慄慄振寒面色青白不進飲食脈來弦數每服生姜七片棗二枚寒多加炮附子方見傷寒類

不換金正氣散與人參養胃湯合和名清脾湯治寒多熱少多用養胃湯熱多寒少多用小柴胡湯寒熱均則平用生薑桃柳枝煎多服取效

柴苓湯治瘧偏身體痛加草果縮砂一兩方見傷寒類

小柴胡湯與五苓散合和名柴苓湯治傷風傷暑瘧大效每服薑三片麥門冬二十粒去心地骨皮少許煎溫服

柴胡桂姜湯治瘧或有寒者但寒不熱者亦治久不愈者

北柴胡四分　桂心一分半　黃芩一分半　栝樓根二分

牡蠣煅　甘草　乾薑各一分

右剉散每服五錢水一盞半煎八分溫服

七棗湯每服四錢薑五大片加旋覆花四錢煎日四服不拘時候久瘧有效虛弱人棗附湯兼服方見痼冷

截瘧常山飲治一切瘧病發作有時蓋因外邪客於臟腑生冷之物內傷脾胃或先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或寒少熱多或但熱不寒或但寒不熱或一日一發或間日而發或發後二五日再發寒則肢體顫掉熱則舉身如

火頭痛與心煩渴引飲氣喘急口舌咽乾背疲痰腸鳴
腹痛或痰聚胸中煩滿欲嘔並皆治之
檳榔四兩　常山[illegible]
右為末水麪糊為丸梧桐子大每服三十丸於發前一日晚臨卧用冷酒吞下便睡不得吃熱物茶湯之類至四更尽再用冷酒吞十五丸忌食一切熱羹湯粥食半日間可食温粥至晚方可食熱忌一切生冷魚腥等物
又方　川常山二兩為末雞卵二个取清為圓（治証服法如上）
[illegible]　常山一味細剉每用五錢半酒半水煎去滓於當空以薄絹封蓋露至天微明時取湯温服此二小嘔泄無妨

辰砂圓　治瘧之為害異於諸疾世人治之不過用常山砒霜之類發吐取涎而已雖安所損和氣多矣有人病瘧半年前人方術用之畧盡皆不能効遂服此藥愈
辰砂（有墻壁者）　阿魏（真者）各壹兩
右研匀和粳米糊丸如皂角子大空心濃煎人參湯下一圓瘧之為病雖在忌醫之列但脉證得所因真的按方用藥無不切効（一方用[illegible]二服）
又方　生薑四兩連皮搗爛止用自然汁約明日當發隔夜安排將紗片遮蓋露一宿五更初攪動澄者一呷吞之或有痰吐任之即安或微利亦安
灸法　大椎在第一椎下陷中宛宛中灸二七壯至四十九

壯止或灸第三骨節亦可
大陵穴在掌後兩骨間灸三壯立效
譩譆二穴在肩膊內廉第六椎兩傍三寸其穴抱肘取之灸二七壯至一伯壯止
凡灸瘧必先問其病所發之處先灸之亦可
灸法　於十指近甲梢針出血及看兩舌下（有紫腫紅筋亦須針去血效）

○痰病

[illegible]　治暴患痰厥氣虛身微冷面淡白昏悶不知人事
方見[illegible]
[illegible]　治暴患痰厥氣盛身熱面赤（方見中風[illegible]）
又方　治暴患痰厥不省人事
右用生清油一盞灌入喉中須臾逐出風痰立愈

○眩冒

白薇湯　治平居無苦疾忽如死人身不動搖默默不知人目閉不能開口噤不能言或微知人惡聞人聲但如眩冒移時方寤此由已汗過多血少氣併於血陽獨上而不下氣壅塞而不行故身如死氣過血還陰陽復通故移時方寤名曰鬱冒亦名血厥婦人多有之
白薇　當歸各壹兩　人參半兩（去蘆）　甘草壹分
右剉每服五大錢水一盞半煎至一盞去滓溫服不拘時
[illegible]
瓜蒂　藜蘆　礬石（煅）　雄黃（各等分）

右為細末少許吹入鼻中得嚏為度此藥能起死人
○卒厥尸厥
追魂湯 治卒厥暴死及主客忤鬼擊飛尸奄忽絕氣不覺口噤
麻黃三兩去節 杏仁去皮尖貳伯五十箇 甘草炙一兩
右為剉散每服肆錢水壹盞半煎七分去滓灌之通治諸感忤或口噤拗口不開去齒下湯湯入口活不下分病人髮左右捉搦肩引之藥下漸甦令服盡取効千金有桂心貳兩金匱云寸脈沉大而滑沉則為實滑則為氣實氣相搏血氣入臟則死入胃則愈若卒厥脣口青身冷為入臟即死身和汗出則愈

[illegible] 治尸厥脈動而無氣氣閉不通靜而若死名卒厥
菖蒲去毛
為末每用貳字內兩鼻中吹之令入仍以桂末安於舌下
[illegible] 治尸厥奄然死去四肢逆冷不省人事腹中氣走如雷鳴
焰消半兩 硫黃壹兩
右二件細研如粉分作三服每服用好酒一大盞煎覺焰起傾於盞內蓋着溫灌與服如人行五里又進一服不過三服即甦
又方 附子七錢炮裂去皮臍為散分作貳服每服用酒三盞煎至一盞溫服

又方 生薑自然汁半盞酒壹盞煎令百沸灌貳服却用灸
灸法 頭上百會穴四十九壯兼臍下氣海丹田穴三百壯覺身體溫煖即止
○沙證
艾湯試沙證江南舊無今所在有之原其證古方不載所感如傷寒頭痛嘔惡渾身壯熱手足指末微厥或腹痛悶亂須臾能殺人先濃煎艾湯試之如吐即是
右用五月蠶退紙碎剪安椀中以碟蓋之以百沸湯泡艾椀許仍以別紙封裹縫良久乘熱飲之就卧以厚衣被蓋之汗出愈
又近時多看頭額上及胸前兩邊有小紅點在於皮膚者

却用紙撚成條或大燈草微蘸香油於香油燈上點燒於紅點上焠爆者是又令水傷寒却用樸硝煎湯服或葱豉湯汗出愈如腹痛不止又用針於兩手十指近甲梢針出血即愈
絞腸沙 治心腹絞痛冷汗出脹悶欲絕俗謂絞腸沙今攷之此證乃名乾霍亂此亦由山嵐瘴氣或因飢飽失時陰陽暴亂而致急用鹽湯吐法此法救人不一
右用鹽半鹼許以熱湯數椀泡鹽令患人盡服連致數椀不得住手方可却以鷄羽撩咽喉間即時吐所喫鹽湯盡出其証即愈
又方 治沙證但用苧麻蘸水於頸項兩肘臂兩膝腕等處

瘡疹見得血凝皮膚中紅點如粟粒狀然後宜灌表發瘡
少粥湯或蔥豉湯或清油生薑等浴得汗即愈此皆使皮膚
腠理開發毅利識不藥之良法也

又法 兩足脛痛亦名水沙 刺兩脚曲瞅出血兩膝兩脅間刺出血仍令香和加

○時疫

十神湯 治時令不正瘟疫妄行感冒發熱或欲出疹此藥不問陰陽兩感風寒並宜服之

川芎 甘草炙 麻黃去根 乾葛
升麻去芦 赤芍藥 白芷 陳皮
香附子炒去毛 紫蘇各四兩

右剉散每服三錢水一盞半姜五片煎七分去滓熱服不拘時候如發熱頭痛加連須蔥白中滿氣實加枳殼煎

不换金正氣散 治四時傷寒瘴疫時氣頭痛壯熱腰背拘急五勞七傷山嵐瘴氣寒熱往來五膈氣噎咳嗽痰涎行步喘乏或霍亂吐瀉臟腑虛寒下痢赤白並宜服之

厚朴去皮姜汁炒 藿香 甘草 半夏
蒼朮米泔浸 陳皮各等分

右剉散每服三錢水一盞半生姜三片棗二枚煎八分去滓食前稍熱服忌生冷油煎之物不伏水土宜服之常服進飲食調脾胃一方加白茯苓

桂枝黃芩湯 治風疫脉浮數而不弱頭項疼腰脊痛發熱惡風遞相傳染

桂枝 赤芍藥 黃芩去朽各半兩 甘草壹錢炙

右剉散每服五錢水一盞半生薑三片棗二枚煎七分熱服

敗毒散 治冬合寒反煖春發溫疫方見傷寒陽證類

大柴胡湯 治春合暖反涼夏發燥疫方同見上

五苓散 治秋合涼反淫雨冬發濕疫方見傷暑類

五積散 治夏合熱反寒秋發寒疫方見傷寒陰證類

柴胡石膏散 治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞咽喉乾燥心胸煩滿寒熱往來痰實咳嗽涕唾稠粘

赤芍藥四兩 桑白皮三兩七錢半 石膏煅
柴胡去芦 前胡去芦 乾葛各五兩 升麻弍兩五錢
黃芩去朽心三兩七錢 荊芥穗去土三兩五錢

右剉散每服三錢水弍盞半生薑三片淡豉拾餘粒煎七分去滓熱服小兒作三服

辟瘟丹圓 凡入瘟疫家先令開啓門户以大鍋盛水二斗於堂中心用貳十圓煎其香能散疫氣凡病者各飲一甌後醫者却入診視不致相染

又方 入疫家不相染

雄黃研細水調以筆濃蘸塗鼻竅中與病人同床亦不相染初洗面後及臨卧時點之凡瘟家自生惡氣聞之即上泥丸散入百脉轉相傳染若倉卒無藥以香油抹鼻端及以紙撚探鼻嚏之為佳

○戰汗四證

厥陰逆至第七日脉得微緩微浮為有脾胃脉也故知脾氣全不再受尅邪無所容否極泰來榮衛將復水升火降則寒熱作而大汗解矣

以諸服藥宜但與冷水盡足飲之須臾當寒覺汗出便瘥 方通治門見之

柴胡證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆得湯必蒸蒸而振發汗出而解

謂以承氣湯證云太陽病未解脉陰陽俱停必先振慄汗出而解

○急下兩證

少陰主腎繫舌本傷寒熱氣入於臟流於少陰之經腎汁乾咽路焦故口燥咽乾而渴宜急下之非若陽明證宜下而可緩也雖然陽明宜緩而有一證發熱汗出多者亦急下之蓋陽明屬胃汗多則胃汁乾亦須急下也少陰證口燥咽乾謂之腎汁乾宜急下之陽明證發熱汗多謂之胃汁乾亦急下之

○傷寒傷風誤下成痞

傷寒傷風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞕也甘草瀉心湯主之屬太陽

○三陰可汗

陰病不當發汗發汗即動經然太陰脉浮少陰病發熱亦須微微出汗但不可正汗耳太陰脉浮者宜桂枝湯少陰發熱脉沉宜麻黃細辛附子湯少陰二三日常見少陰證無陽證者宜麻黃甘草附子湯微發汗皆陰證表藥也

○差後昏沉

傷寒差後十數日或半月二十日終不惺惺常昏沉似失精神言語錯謬又無寒熱醫或作鬼祟或作風疾多般治之不差或朝夕潮熱頰赤或有寒熱似瘧皆緣發汗不盡餘毒在心胞絡間所致也知母麻黃湯主之

○飲酒復劇

傷寒時疾三日已汗解因飲酒復劇苦煩悶乾嘔口燥呻吟錯語不得臥黃連解毒湯主之

○循衣摸牀

傷寒若吐若下後不解不大便五六日以上至十餘日日晡即發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視若微者但發熱譫語大承氣湯主之若宜服利則止後服脉弦者生脉濇者死

○傷寒別名

清便自調自可謂大小便如常也 ●大便鞕而堅則曰鞕

●小便不利小便少下利清穀皆謂水穀不分 ●得大便

曰更衣 ●大便閉不便利曰脾約 ●下利曰殞泄又曰腸澼
謂痢也 ●寒而利曰鴨溏 熱而利曰腸垢 ●轉失氣謂氣
轉而響 時時失下即後分泄氣 腹中有積 ●大汗傷氣
大下傷血 或火邪逼迫發狂 或尺寸脉緊而反汗 或發
汗後汗不止曰漏風 或陰病本無汗而反有汗 或其脉浮
濇微弱不能作汗 皆曰亡陽 吐汗下温針以後其病不
解曰壞病 曰何逆 瘥後更發 曰遺熱 脉相兢賊曰
負 兩手無脉曰雙伏 一手無脉曰單伏 左關脉曰人
迎 右關脉曰氣口 足趺上動脉曰衝陽 足后跟上陷中動
脉曰太谿 婦人乳頭之下近腹處曰期門 臍下一寸
曰氣海 二寸曰丹田 三寸曰關元 玄府即汗空也 臍

間動氣曰臍腹 筋惕肉瞤曰瞤 中暑曰中暍 妄發
濕温汗曰重暍 渴欲飲水 水入即吐曰水逆 心下停
水 身無大熱頭額微汗曰水結胸 乾嘔曰噦 咳逆
曰噎 日中不了了謂不明了也 睛不和謂不和平如常
也 三月至夏方發病曰晚發

○傷寒戒忌

傷寒新瘥後但少喫糜粥 常令稍飢 不得飽食 反此則復
不得早起 不得梳頭洗面 不得多言 不得勞心費力 反
此則復 瘥後百日內氣脉未得平復 犯房室者死 忌食
羊雞狗肉肥魚油膩諸骨汁及醎藏鮓脯油餅麪 病再發

○臨治警省

傷寒證候有別傳 亦有傷寒治法雖只一證 非可以輕心視
之也 其間種類不一 條治法莫是有難矣 至於陰證發燥
熱極發厥 陰證似陽 陽證似陰 脚氣似乎傷寒 中暑似乎
熱病 與夫蓄血一證 上熱下冷 食閉似寒 甚至四證發厥
昏迷悶絕 凡此等類 尤當審思而明辨之 若疑似未別 脉
證未明 姑且試探 切不可妄投決病之劑 方匕雖微 死生
係之 謹之哉

○傷寒篤證

搖頭直視 形如煙熏 心絕 唇吻反青 四肢多汗 肝絕
反目直視 狂言遺尿 腎絕 汗出髮潤 喘而不休 肺絕
環口黧黑 柔汗發黃 脾絕 汗出如油 喘促無已 水漿不
下 形體不仁 命絕 ●大發濕家汗則成痓 熱而痓者不治
發濕温汗 身青面變 耳聾不語 曰重暍 不治 ●發風温汗
必發譫語 並不治 ●發風濕中濕汗 並逆 ●發動氣汗 不治
●發少陰汗 九竅出血 曰下厥上竭 不治 ●發少陽汗 則
發譫語 發汗只在頭而不至遍身 發黃不止者逆 ●發汗不
至足者逆 ●諸逆發汗 劇者言亂目眩 並不治 ●當汗無
汗 服麻黃數劑 七日汗不出者不治 ●汗出如珠不流 不
治 ●汗出如油 口噤肉戰 呻吟喘促 不治 ●汗後嘔吐 水
藥不入口者逆 ●熱病脉躁盛而不得汗 不治 ●汗後不
爲汗衰 復大熱 脉躁疾 狂言 不食 曰陰陽交 不治 ●汗冒
昧無脉 服藥後汗解則生 若無汗 脉不至者 不治 ●少陰

厥逆無脈服藥通脈其脈漸續則生暴出則不治。●下利厥逆無脈灸之脈不回身不溫微喘者不治。●少陰四逆下利惡寒而拳發躁無脈不治。●下利日十餘行其脈反實者逆。●少陽陽明合病下利脈長大而弦曰負不治。●陽病見陰脈不治。●發斑屬陽見陰脈不治。●代脈不治吐血衄血脈反浮大而牢不治。●陰易陽易脈離經者腫腹中絞痛手足拳亦未治。●欬逆上氣脈散者不治讝語譫妄反沉微四肢厥冷不治。●脈陰陽俱虛熱不止者不治。●七八日以上發大熱難治。●舌本爛熱不止者逆下利發熱或汗不止厥不止並不治。●下利發熱者逆燥不得臥不治。●譫語直視或喘滿或下利並不治。●譫語屬陽見陰証者逆。●傷寒脈浮發熱不治。●發斑先赤後黯面色黧晦不治。●發斑大便自利不治。●發黃而變黑不治。●口乾舌黑不治。●口張目陷不治。●張口出氣乾嘔骨骸熱痛者逆。咳逆不止者不治。●心下痞悶上喘而氣急者逆。●霍亂喘而脹煩燥不治。●誤下濕家額汗喘促或小便不利大便自利不治。●頭汗內外關格小便不利此爲陽脫不治。●腹滿欬逆不得小便不治。●腹大滿而下泄不治。●若脈洪緊而滑尤可慮。●臟結如結胸舌白胎陰筋引臍腹痛時時下利不治。●結胸證具加煩燥不治。●臟厥七八日發厥膚冷煩燥下利無時暫安不治少陰吐利厥逆煩燥不治。●厥而下利反能食者曰除中不治。●四肢厥逆臍下絞痛石硬眼定者逆。●厥陰唇青舌卷黑而耳聾囊縮不治。●頭重臍痛甚手足俱冷不治●陰毒陽毒過六七日不治。●兩感難治。●狐惑咽乾聲啞唇瘡不治。●赤斑五救其一。●黑斑十救其一。●黍米樣者逆

世醫得效方卷第三

大方脉雜醫科

○諸氣

小烏沉湯 調中快氣，治心腹刺痛，利三焦，順臟腑。

香附子炒去毛　烏藥去心　縮砂去殼貳兩　粉草炒

右為末，每服壹錢，紫蘇葉三皮，鹽少許，沸湯調下，不拘時候。大便氣秘，橘皮湯下。亦名寬氣湯。

沉香降氣湯 治陰陽壅滯，氣不升降，胸膈痞塞，心脇脹滿，喘促短氣，乾噦煩滿，咳嗽痰涎，口中無味，嗜臥減食。又治胃痺留飲，噫醋聞酸，脇下支結，常覺妨悶；及中寒欬逆，脾濕洞泄，兩脇虛鳴，臍下撮痛，皆能治之。患人毒氣上衝，心腹堅滿，肢體浮腫者，尤宜服之。常服開胃消痰，散壅思食。

香附子炒去毛　沉香四錢六分不見火　縮砂去殼　粉草炒三兩

右為末，每服一錢，入鹽少許，沸湯點服。凌旦霧露，空心服食，去邪惡氣，使無瘴疫。

木香檳榔圓 疏導三焦，寬利胸膈，破痰逐飲，快氣消食。

木香不見火　檳榔　枳殼去穰麩炒　杏仁去皮尖麩炒　青皮去白各一兩　半夏麴　皂角去皮酥炙　郁李仁去皮各二兩

右為末，別以皂角肆兩，用漿水一椀搓揉，熬膏，更入熟蜜少許，和圓如梧桐子大，每服伍拾圓，食後生薑湯下。

[illegible]氣湯 治氣不升降，胸膈痞滿，心腹刺痛，不進飲食。

沉香　木香　丁香不見火　白薑炮
川楝子肉炒　肉桂去皮不見火　陳皮去白　當歸
甘草炙　附子炮去皮臍　縮砂
益智去殼炒　胡蘆巴炒　白朮　舶上茴香炒
豆蔻煨各一兩

右剉散，每服三錢，水一盞，紫蘇三葉，木瓜肆片，鹽少許，煎服。

木香流氣飲 調順榮衛，通流血脈，快利三焦，安和五臟。治諸氣痞滯不通，胸膈膨脹，口苦咽乾，嘔吐少食，肩背腹脇走注刺痛，及喘急痰嗽，面目虛浮，四肢腫滿，大便秘結，水道赤澀。又治憂思太過，怔忪鬱積，腳氣風濕，聚結腫痛，喘滿脹急。

陳皮去白　青皮去白　紫蘇去梗　甘草炒
厚朴去粗皮薑汁製　香附炒去毛各半斤　木通去節　大腹皮
丁皮　檳榔　肉桂去粗皮不見火　藿香葉
蓬莪朮煨切　草果仁　木香不見火　麥門冬去心
人參去蘆　白朮去蘆　乾木瓜　石菖蒲
赤茯苓去黑皮　川白芷　半夏湯洗

右剉散，每服肆錢，水一盞半，生薑三片，紅棗貳枚，煎至

七分去滓熱服如傷寒頭痛發熱覺得疾入連根葱白三寸煎服升降陰陽汗出立愈如瀉痢白利入粳米煎婦人血氣癥瘕入艾醋煎不拘時候

秘傳降氣湯 治男子婦人上熱下虛飲食過度致傷脾胃酒色無節耗損腎元水火交攻陰陽關隔遂使氣不升降上熱則頭目昏眩痰實嘔逆胸膈不快咽喉乾燥飲食無味下弱則腰脚無力大便秘澁裏急後重臍腹冷疼若治以凉則脾氣怯弱腸鳴下利治以溫則上焦壅熱口舌生瘡及脚氣上攻與久痢不瘥宜先服此藥却以所主藥治之氣[illegible]升降之熱消疾亦効

五加皮 半兩酒浸半日炒黃色　枳殼 一兩湯浸去瓤麩炒

柴胡 去蘆　骨碎補 [illegible]　地骨皮 [illegible]

桔梗 [illegible]　桑白皮 [illegible]　陳皮 [illegible]　訶子 [illegible]

甘草 炒　半夏 [illegible]

草菓 [illegible]

右剉散和勻以[illegible]就飯甑上蒸一伏時傾出攤令冷收之每服貳錢紫蘇葉生薑各參片水壹盞同煎七分食後通口服痰嗽加半夏麯心肺虛每料加人參茯苓壹兩上膈熱加北黃芩伍錢下部大段虛加少許炮附子煎如使附子多加生薑婦人血虛加當歸壹兩煎

[illegible] 治[illegible]中脘不快心腹脹滿陰陽壅滯氣不升降胸膈[illegible]噫氣吞酸嘔逆短氣乾噦煩滿咳嗽痰涎口中無味嗜卧減食宿寒留飲停積不消脅下支結常覺妨悶專治脚氣上衝心腹堅滿肢體浮腫有妨飲食

蘇子 淨炒　半夏 [illegible]　甘草 炙

前胡 去蘆　厚朴 [illegible]　陳皮 去白

川當歸 [illegible]　肉桂 去麤皮

右剉散每服貳錢至參錢水壹大盞生薑參片煎至七分去滓溫服不拘時常服消痰飲散滯氣進飲食體虛痰喘加人參壹錢北五味子柒粒烏梅壹個杏仁柒粒去皮尖紅棗貳枚煎虛煩加知母人參烏梅各壹兩

分心氣飲 治男子婦人一切氣不和或因憂愁思慮或因酒色過傷或臨食憂慼或事不遂意以此不足留滯不散停於胸膈不能流暢致使心胷痞悶脇肋脹滿噎塞不通噫氣吞酸嘔噦惡心頭目昏眩四肢倦怠面色萎黃口苦舌乾飲食減少日漸羸瘦或大腸虛秘並皆療之常服升降陰陽調順三焦消化滯氣進美飲食此方獨清而疏快常服大效

紫蘇 [illegible]　半夏 [illegible]　肉桂 去皮

青皮 去白　陳皮 去白　大腹皮　桑白皮 炒

木通 去皮節　芍藥　甘草 炙　赤茯苓 [illegible]

右剉散每服參錢水壹盞半生薑參片棗貳枚燈心拾莖取七分去滓溫服氣秘每服加枳殼去穰麥麩炒蘿蔔子皂角子各半錢咳嗽不利加人參壹錢五味子七粒桔

檳榔壹錢氣滯腰疼加木瓜貳片杉木節壹錢半水氣面目浮腫加車前子麥門冬去心甜葶藶子木瓜澤瀉猪苓去皮每料各壹兩又名小流氣飲

推氣圓 治三焦痞塞氣不升降胸腹滿悶大便澁小便赤黃

檳榔　枳實　陳皮　黃芩

大黃　黑牽牛炒各等分

右為末生薑自然汁煮糊圓如梧子大每服三四十圓淡薑湯下

神保圓 治諸氣刺痛流入背膂及脇下諸藥不能治

木香　胡椒各壹錢　全蝎拾枚　巴豆拾箇去皮心研

右為末湯釋蒸餅圓麻子大朱砂為衣每服伍粒心膈痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨薑湯下血痛炒薑醋湯下肺氣甚者白礬蛤粉各叁分黃丹壹分同研為末煎桑白皮糯米飲調叁錢下小喘桑白皮糯米飲下腎氣脇痛下茴香酒下大便不通蜜湯調檳榔末壹錢下氣噎木香湯下宿食不消茶酒漿飲任隨意下諸氣為膀胱氣脇下痛最難治獨此藥能去之[illegible]皆以為[illegible]治之藥乃不愈乃流入背膂又注右脇下攣痛甚者方合治之三服而愈後常服[illegible]又服病除

又方用胡椒半兩　蝎尾半兩[illegible]為末麪糊圓如粟米大每服五七圓至十五圓陳米飲下名推氣圓又壹方於[illegible]

氣圓中加木香壹味和順臟氣消腹脇堅脹小便不利并治息積名胡椒圓

[illegible]圓 治氣結不散心胸痞痛逆氣上攻分氣逐風功不可述

枳殼麩炒　木通剉炒　青皮去白　陳皮去白

桑白皮炒　蘿蔔子微炒　白牽牛炒　莪茂煨

茴香炒　荊三稜煨各等分

右為末生薑汁打麪糊為圓如梧子大每服貳拾圓煎橘皮湯下不拘時候

三稜煎圓 順氣寬中消積滯化痰飲治中脘氣痞心腹堅脹脇下緊硬胸中痞塞喘滿短氣不通噁吐痰逆飲食不下大便不調或泄或秘

杏仁湯浸去皮尖麩炒黃壹兩　蘿蔔子微炒壹兩　神麴碎炒[illegible]分

京三稜[illegible]　麥蘖炒[illegible]

硇砂壹兩以水研如麪　青皮去白　乾漆炒各[illegible]兩

右件為末以三稜膏勻搜和圓如梧桐子大每服拾伍圓至貳拾圓溫米飲食后服[illegible]

三和散 治五臟不調三焦不和心腹痞悶脇肋䐜脹風氣壅滯肢節煩疼頭面虛浮手足微腫腸胃燥澁大便秘難雖年高氣弱並可服之又治背痛脇痛有妨飲食及脚氣上攻胸腹滿悶大便不通

羌活去蘆壹兩　紫蘇[illegible]　宣木瓜切焙[illegible]　沉香壹兩

白朮叁分　檳榔　木香各叁分　蓬莪朮叁兩
甘草炒叁分　陳皮去白叁兩　大腹皮炙焦壹兩
右剉散每服貳錢水壹盞煎至六分去滓溫服不計時
候四磨湯亦可兼服方見秘結類

【九香[illegible]湯】治壯盛人胸膈痞塞氣不升降百藥不效服
之奏功必矣方見痞壅雜證類

【神仙九氣湯】治九氣膈氣風氣寒氣熱氣憂氣喜氣驚氣
怒氣山嵐瘴氣積聚堅牢如杯心腹刺痛不能飲食時去
時來發則欲死
川薑黃　甘草　香附子
右為末每服壹大錢入鹽少許百沸湯點空心服立效

【[illegible]氣散】治心胸間兩脅腹脹虛脹飲食減少氣不宣通多億
寒兩脅刺痛攻心
荊三稜　蓬莪茂煨熟各伍兩　白朮叁兩
木香半兩　枳殼去白麩炒壹兩
右剉散每服貳錢水壹盞生薑三片煎至六分食前溫
服用砂糖少許壓下

【參附正氣散】治陰陽不和臟腑虛弱頭目昏眩腹脇刺痛
嘔逆惡心飲食不進氣虛盜汗咳嗽上喘四肢厥冷寒熱
酸疼腰痛泄瀉腰背俱拘精血傷竭氣短脈沉耳鳴寒熱
面黃體瘦全濟多困小便頻數小腸氣痛霍亂吐瀉及卒
中風氣昏亂不常大病瘥羸倦弱妊娠失調理產后虛損

並宜服之大能補虛正氣調理氣血固腎消痰
人參　木香　白豆蔻各[illegible]半　川芎
乾薑　甘草　藿香　茯苓
黃耆　當歸去尾　丁香　桂心
陳皮　白芷　縮砂仁　青皮去白各半兩
白朮　附子炮　半夏麴各叁分
右剉散每服半錢生薑五片棗二箇煎服此方屢用有奇效

【破痞圓】治憂瘠結成氣塊腹中不能消散服之立效
草撥壹兩　大黃壹兩各生用
右為末入生麝香少許煉蜜為圓如梧子大每服叁拾
圓空心冷酒下或溫冷湯下日叁服

【灸法】凡上氣冷發腹中雷鳴轉叫嘔逆不食灸太衝穴在
足大指本節後貳寸陷中不限壯數從痛至不痛不痛
至痛止心腹諸病堅滿煩痛憂思結氣心痛吐下食不
消灸太倉穴在心下肆寸胃脘下壹寸
臍下搊痛流入陰中發作無時此冷氣灸關元百壯穴
在臍下叁寸及灸膏肓二穴
短氣不語灸大椎隨年壯又灸肺俞百壯臍孔中貳七
壯上氣灸第伍椎下隨年壯

●中氣

【蘇合香圓】治氣中雖不見方書所載然只緣喜甚傷陽暴怒傷
陰憂愁不意氣多厥逆往往多得此疾便覺涎潮牙關緊

急若作中風用藥非惟不相當多能死人昔有一婦人因憂戚中忽然氣厥牙噤涎潮里醫作中風用藥以大通利藥下之尺汕數行一夕而卒可不戒之如遇此證急化蘇合香圓四五粒灌之便醒然後隨其調理無不痊愈

蘇合香油 [illegible]　薰陸香 壹兩研

青木香 [illegible]　白朮 去芦　丁香　白檀香

朱砂 研水飛　沉香　香附子 去毛　烏犀 [illegible]

蓽撥　安息香 [illegible]　麝香 研

訶梨勒 煨　龍腦 研已上各壹兩

右為末入研藥勻用安息香膏并煉白蜜和劑每服旋圓如梧子大取井花水溫冷任意下四圓老人小兒可服壹圓溫酒化服亦得并空心服之用蠟紙裹壹圓如彈子大緋絹袋盛當心帶之一切邪神不敢近

順氣湯 治中氣閉目不語四肢不收昏沉等證

南木香 不以多少

右為末冬瓜子煎湯調下痰盛加南星為散生薑煎

參附湯 治中寒中氣之候四肢厥逆口噤牙關緊急痰涎壅盛如中風狀者

白朮 [illegible]　綿附子 [illegible]切片　甘草 貳兩炙

右剉散每服叁錢水壹盞生薑拾片煎取八分去滓後調蘇合香圓貳粒併進貳服或氣短頭暈手足厥逆未退者可進養正丹叁拾粒至一百粒奇効不拘時候

附陽湯 治中氣脈弱大段虛証等證

川烏 生去皮臍　附子 生去皮臍各一兩　乾薑 [illegible]

青皮 [illegible]　益智仁 [illegible]

右剉散每服叁錢薑七片紅棗壹枚煎服或入少木香不拘時候

八味順氣散 中風亦當間服此藥中氣者尤得其宜

白朮 [illegible]　白茯苓 去皮　青皮 去白　白芷

陳皮 去白　天台烏藥　人參 [illegible]各壹兩　甘草 [illegible]

右剉散每服叁錢水壹盞煎至七分溫服不拘時候

○諸疝

烏頭桂枝湯 治風寒疝腹中痛逆冷手足不仁身疼痛灸刺諸藥不能治及賊風入腹攻刺五臟拘急不得轉側發作叫呼陰縮悉主之

大烏頭 [illegible]　肉桂 去粗皮

芍藥 各叁錢叁字　甘草 [illegible]

右剉散每服肆錢水壹盞半生薑伍片大棗叁箇入前煎烏頭蜜半合同煎至七分去滓食前服一法用附子壹个不使烏頭為蜜附湯

葱白散 治冷寒疝入腹心腹疼痛及小腸膀胱氣刺脾腎氣攻[illegible]急極痛不可忍屈伸不能腹中冷重如石白汗出

山梔子 [illegible]　附子 [illegible]

右剉散每服貳錢水壹盞酒半盞煎至七分入鹽一捻
溫服即愈暑證香薷散加瞿麥木通每服四錢(食鹽少許煎服)

丁[illegible]木香白[illegible]散 治寒疝作痛和氣
丁香　檀香　木香(各壹兩)　甘草(炙肆兩)
縮砂(去殼貳兩)　白豆蔻仁　沉香(各壹兩)　藿香(去土肆兩)
右剉散每服貳錢水壹盞半生薑叁片紫蘇葉五皮食
鹽少許煎熟服不拘時候或爲末炒茴香鹽酒調亦可

七情 沉香[illegible]子 治七情所傷遂成七疝心腹脹痛痛引腰
脇連背不可俛仰
檀香　木香　乳香　沉香
丁香(並不見火)　藿香葉(去土各一兩)　玄胡索(炒去皮)　片子薑黃(炒)

川烏(炮去皮尖)　桔梗(去蘆)　桂心(不見火)　甘草(炙各半兩)
右剉散每服半錢水壹盞半生薑三片紅棗壹枚煎至
七分去滓溫服不拘時候

熱證 [illegible]木通心飲 治腎與膀胱實熱小腸氣痛小腑不通
瞿麥穗　木通(去皮節)　梔子(去殼)　黃芩
連翹　甘草　枳殼(去穰)　川楝子(去核各)
右剉散每服伍錢水壹盞半燈心貳拾莖車前草五莖
同煎空心溫服

八正散 治腎氣實熱脉洪數小腹外腎肛門俱熱大小便
不利作痛每服肆錢燈心貳拾莖枳殼半片去穰煎食前
溫服熱盛加淡竹葉貳拾皮(方見後秘結類)

虛冷 五積散 治體虛膀胱小腸氣作痛不可忍每服五錢
生薑三片鹽炒茱萸伍粒茴香一撮葱白伍寸煎空心熱
服(方見前傷寒陰證類)

[illegible]散 治男子婦人脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛連
胸脇膀胱小腸腎氣及婦人血氣刺痛並皆治療
蓬莪朮(煨)　甘草(各肆兩)　延胡索　官桂(去粗皮)
乾薑(炮各壹兩)　縮砂(去殼)　丁皮　檳榔(各貳兩)
藁本　三稜(煨)　白茯苓(去皮)　青皮(去白各叁兩)
右剉散每服伍錢水壹盞半入連根葱白壹莖煎至七
分空心熱服

通[illegible]散 治風疝陰核腫大荊芥穗不以多少新瓦上

焙乾爲末每服貳錢熱酒調下效

硇砂圓 治諸疝作痛大效
木香　沉香　巴豆肉(全者各壹兩)
青皮(不去皮貳兩)　銅青(研半兩)　硇砂(別研)
右以二香青皮三味細剉同巴豆慢火炒令紫色爲度
去巴豆爲末入青砂二味研勻蒸餅和圓如梧子大每服
七圓至十圓鹽湯吞下空心日進二三服

奪命散 治小腸疝氣
玄胡索不以多少鹽炒過入全蝎半錢爲末每服壹錢
溫酒調下立效

[illegible]散 治偏墜疝氣連根葱白一寸燈心十莖鹽炒茴香

局方

上揺川練子參箇去核煎湯調下大効傷暑濕作痛亦效

就香[?]白术香圓亦可方見傷暑門

〔寶鑑〕□□圓治膀胱疝氣腫痛及胸膈噎塞氣滯不行腸中水聲嘔噦痰逆不思飲食常服寬中利膈

黑牽牛 二兩半生半熟 補骨脂 炒 香附 去毛 蓽澄茄

檳榔 酸粟米飯裹濕紙包火中煨紙焦去飯 各半兩 青木香 各一兩

右為末入牽牛末合勻以清水拌和為圓如梧子大每服五十圓溫熟水吞下

又法用大粒斑猫七箇去頭足翅為末同於文武火上慢炒益智子微香以磁碟蓋錶上頓在冷處少頃去斑猫末取圓子每服伍拾圓茴香酒下

□□圓治小腸氣外腎腫墜

山茱萸 去核 吳茱萸 去梗 石茱萸 去梗 各貳兩

川練子 破故紙 壹兩七錢半炒

青皮 去白 青鹽 各壹兩 黑牽牛 壹兩炒 茴香 炒各叁兩

右為末醋煮麵糊圓如梧子大每服伍拾圓用桃仁十五箇炒酒送下或茴香酒亦可

□□散治小腸氣痛婦人血痛欲死者

川五靈脂 蒲黃 隔紙炒

右剉散每服貳錢酒半盞水半盞煎至七分食前服並痛甚熱入真米醋少許煮加玄胡索各等分

□□圓治大人小兒小腸氣膀胱氣小腸氣疝氣偏墜

濟生

□腎小腹有形如卵上下來去痛不可忍者

巴豆 □□ 茴香 □□□ 吳茱萸 □□□

川練子 □□□ 大巴戟 去心炒 川烏 □□ 皮尖

右為末酒煮麵糊圓如梧子大每服十五圓空心溫酒□□下小兒□□圓茴香湯吞下文方加牽牛

□□湯治七疝心腹冷痛腸鳴氣走身寒自汗大腑滑泄

玄胡索 炒去皮 附子 炮去皮臍 各壹兩 木香 不見火

右剉散每服肆錢水壹盞姜七片煎七分不拘時溫服

□□散治疝氣

川芎 川練子 青皮 去白 茴香 炒

桃仁 黑牽牛 炒各壹兩

右剉散每服貳錢無灰酒壹盞煎至八分溫服

□□圓治膀胱腫痛及治小腸氣陰囊腫毛閒水出

金鈴子肉 伍兩 茴香 炒 馬藺花 炒

海蛤 破故紙 菟絲子 海帶

木香 丁香 各壹兩

右為末麵糊圓如梧子大每服叁拾圓溫酒鹽湯任下

□□圓治疝氣

杜茴香壹斤以老生薑貳斤取自然汁浸茴香一夜約薑汁盡入茴香內以好青鹽貳兩同炒赤取出焙燥碾為末無灰酒煮糊圓如梧子大每日空心食前服叁拾圓或伍拾圓溫酒米飲任下此藥專實脾胃以其有

塩引入下部遂大治小腸疝氣服之累有效尋常治疝一藥多是喙涼久而未有不為害者此藥用薑汁導一發散而無疏導之害所以為妙也、

三和治疝圓 治腎與膀胱俱虛為邪氣搏結遂成寒疝伏留不散臍腹撮痛陰核偏大膚囊壅腫重墜滋長有妨行步瘙痒不止時行黃水浸成瘡瘍或長怪肉累治不痊致令腎經閉結陰陽不通外腎腫脹冷硬如石漸漸醜大皆由觸服熱藥內攻或因兜取以至如此此藥溫導陽氣漸退寒邪補虛消疝煖養腎經能使復元應小腸氣寒疝之疾久新不過三料第一料、

茴香 [illegible] 川楝子 [illegible] 沙參 [illegible]

木香 各壹兩

右為末水煮米粉糊圓如梧子大每服貳拾圓溫酒塩湯空心食前日進三服小病此一料可安纔盡可服第二料、

第二料加下項藥、

蓽撥 壹兩 檳榔 半兩

右入前藥共六味重五兩半依前法糊圓湯使圓數服之若病久未愈便服第三料、

第三料又加下項藥、

白茯苓 [illegible] 黑附子 [illegible]

右通前藥共八味重拾兩止依前法糊圓數服之加至叁拾圓新久大病不過此三料可愈小腸氣頻發及三十年者寒疝漸至楞挫大者皆可消散神効

消堅圓

牡丹皮 去骨 桂心 各壹兩 川烏 炮去皮尖

桃仁 別研 [illegible] 去皮尖

右為末酒糊為圓如梧子大每服三十圓溫酒下

川楝子圓 治疝氣一切下部之疾悉皆治之腫痛縮小雖多年服此藥永去根本

川楝子 [illegible]

木香 壹兩 不見火 破故紙 壹兩 炒香為度

右為末酒糊圓如梧子大每服五十圓塩湯下甚者日進三兩服空心食前

[illegible]圓 治偏墜小腸氣效

海藻 海帶 各壹兩 班猫 式拾個 去足翅

巴豆 式拾個 去殼完全者

右班猫巴豆二味一處生絹袋盛用好醋壹碗以瓦銚盛四味同煮將乾去班猫巴豆不用只將海帶二味細研為末以淡豆豉壹伯粒以煮藥餘醋略浸蒸研為膏和前藥為圓如梧子大每服用麝香少許朱砂三錢乳鉢細研至無聲却入麝香再研勻為衣日乾以新瓦瓶

收之每粒服菜粒一服拾粒三服拾伍粒若未愈再進
至兩服皆用拾伍粒仍用鹽炒茴香細嚼酒吞下空心
服忌鴨子并鮓醬動氣等物久病三五服效此藥貴新
合切速若合下稍久多服為佳

〔敷法〕治腎囊偏墜
牡礪〔煅〕 良薑〔各等分〕
右為末津唾調傅大偏處須臾如火熱着痛即安

〔灸法〕治諸氣心腹痛小腸氣外腎吊痛疝氣小腹急痛不
可忍足大拇指次指下中節橫紋當中灸五壯男左女右
極效又治疝氣偏墜
量患人口角兩角為壹摺斷如此則叁摺成叁角如△
様以壹角臍心兩角在臍之下兩傍盡處是穴左偏灸
右右偏灸左二七壯若灸兩邊亦無害
治腎氣外腎癰小腸氣痛腹内虛鳴灸風市穴五七壯
灸氣海穴□壯灸臍左右各去一寸半兩穴各七壯灸
之立效復求不發名外陵穴〔□□□□□□□氣海穴在臍下壹寸半〕

腰痛

〔獨活寄生湯〕治風傷腎經腰痛如刺久不治流入腳膝為
偏枯冷痺緩弱之患及新産腰脚攣疼除風活血
獨活〔貳兩半〕 桑寄生〔□□□〕 杜仲〔切炒〕
北細辛 白芍藥 桂心 芎藭
防風〔去蘆〕 甘草 人參 熟地黄〔洗〕
大當歸〔各壹兩〕
□□每服肆錢水貳盞煎空心服或小續命湯加桃
仁貧氣虛不和不食除地黄

〔□□□〕治寒傷腎經腰痛不可俛仰每服可加桃仁杵粒
去皮尖煎殘甚者加黑牽牛少許熟炒研損效〔方見□□〕

〔□□□〕治人久處卑濕瀝服經腰重冷痛如帶伍千錢冷
如水洗以熱物着痛處分小覺不渴小便自利食飲如故
虛弱人加附子或用白术茯苓官桂附子各等分為末每
服貳錢溫酒調服〔方見□□〕

〔□□□〕治濕痺傷冷腰痛加官桂羌活杜仲〔各五分□□□□〕

〔□□□〕治風熱腰痛加續斷天麻薄荷木瓜〔□□□□□□〕

〔舒筋散〕治血滯腰痛亦治閃肭
玄胡索 當歸 官桂〔各壹分〕
右為末每服貳錢溫酒調下食前服或加牛膝桃仁川
續斷亦效

〔人參順氣散〕治氣滯腰痛加五加皮煎服〔方見風類〕或用
〔木香流氣飲〕亦效〔方見氣類〕

〔小七香圓〕治鬱怒憂思氣滯腰疼
甘松〔洗焙壹兩〕 甘草〔炒拾五兩〕 香附子〔炒去毛拾伍兩〕
丁香皮〔拾伍兩〕 蓬莪术〔煨乘熱碎貳兩半〕 縮砂仁〔貳兩半〕
益智仁〔炒柒兩半〕
右為圓每服五十圓橘子壹錢鹽少許煎湯空心服或

用沉香降氣湯打和，調氣散

治閃挫腰痛

神麯壹塊約如拳大，燒令通赤，好酒貳大盞淬酒，使飲令盡，仰卧少頃即安。或用枳殼散。方見婦人類

或以縮砂烏沉湯，木瓜鹽酒調，熱服亦效。方見諸氣類

安腎圓 治腎虛腰疼，橘皮煎湯吞下，加單[illegible]亦佳。

補髓圓 治腎虛勞力腰疼，添精助陽，壯氣健腳力，神效。

破故紙 杜仲 去皮切薑汁炒

右為末，用胡桃肉伍拾箇、大蒜貳拾箇研膏，圓如梧子大，每服叁拾伍圓，鹽湯服。虛極人十補湯吞服。方見虛損類

一方加川續斷、桃仁去皮尖、去胡索、黑牽牛炒，酌量入。

[illegible]圓 加鹿茸、當歸、木瓜、續斷，治腎虛腰痛，鹽湯下。

二至圓 治老人虛弱人腎氣虛損，腰痛不可屈伸。

鹿角 鎊二兩　麋角 鎊二兩　附子 炮去皮臍

桂心 不見火　補骨脂 炒　杜仲 去皮薑汁炒絲斷 壹兩

鹿茸 酒蒸焙　青鹽 別研 半兩

右為末，酒糊圓如梧子大，每服柒拾圓，空心用胡桃肉細嚼，以鹽酒鹽湯任下。惡熱藥，去附子，加肉蓯蓉一兩。

酒浸微炙焙用

[illegible]圓 治冷氣流注腰疼，不能俛仰。

延胡索　破故紙 炒　黑牽牛 炒 各等兩

右為末，研煨蒜為圓如梧子大，每服叁拾圓，葱酒鹽湯下。

[illegible]圓 治腰疼極效，亦治閃挫。

附子 炮　黑牽牛 炒 各兩

右為末，酒糊圓如梧子大，每服五十圓，鹽湯食前服。

熟大黃湯 治打撲腰痛，惡血蓄瘀，痛不可忍。

大黃　生薑 各半兩

右同炒令焦黃，以水一大盞浸一宿，五更去滓頓服，天明所下如雞肝，即惡物也。

二妙方 治坐立或熱睡濕地，氣入腎經，外腎腫，腰背彎，用茯苓用五苓散，每服貳錢，用[illegible]子少許，下青木香[illegible]，十粒，數服臟腑微動，腫消腰直，其痛立止。

[illegible]圓 治腰臂痛

五靈脂　赤芍藥 各半兩　川烏 [illegible]

沒藥 別研　麝香 少許

右為末，酒糊圓，空心溫酒送下。

導引法 理腰背痛，正東坐，收手抱心，一人於前據躡其兩膝，一人後捧其頭，徐牽令偃臥，頭到地，三起三臥，便瘥。

針灸法

腰脊痛，[illegible]委中[illegible]出血，便瘥。

腰痛不得俛仰者，令患人正立，以竹拄地，度至臍斷，乃度背，灸竹上頭處[illegible]，令人知[illegible]

腧穴亦可、

●眩暈

風證 川芎散 治眩暈惡風自汗或身體不仁氣上衝胸戰掉如在舟船之上、

川芎 壹兩　北細辛 叁分　白茯苓 壹兩　白朮 壹兩

粉草 半兩　桂枝 叁分

右剉散每服肆錢水壹盞半生薑三片煎不拘時服有痰兼服青州白圓子 方見風科通治類

感寒 三五七散 治陽虛眩暈頭痛惡寒耳鳴或耳聾

人參　附子　北細辛 各叁兩　甘草

乾薑　山茱萸　防風　山藥 各伍兩

右剉散每服肆錢生薑五片棗子壹枚煎食前服如寒眩甚者加剉附子薑附湯 方見中寒類

傷暑 消暑圓 治冒暑眩暈煩悶不甦用香薷散生薑[illegible]下每服七十圓 方見中暑類

中濕 芎朮湯 治冒雨中濕眩暈嘔逆涎沫頭重不食[illegible]不瘥者、

川芎　半夏　白朮 各壹兩　甘草 半兩

右剉散每服肆錢生薑五片水壹盞煎不拘時候溫服

七情 茯苓湯 治喜怒憂思悲恐驚傷臟氣不行鬱而生涎結為飲隨氣上厥伏留陽經心中忪悸四肢緩弱[illegible]面熱頭目眩冒如欲搖動、

人參　麥門冬 去心　山藥　前胡

熟地黃　枳殼 去瓤麩炒　茯神

遠志 甘草水煮去心　白茯苓

半夏　黃耆 各[illegible]　甘草 半兩

右剉散每服肆錢流水盞半薑伍片秫米一撮煎食前服

痰證 茯苓半夏湯 治痰眩暈或因冷食所傷

陳皮　半夏　白茯苓 各壹兩　甘草 伍分

丁香　胡椒 各叁分

右剉散每服肆錢薑三片烏梅一個同煎不拘時熱服體虛甚者順元散 方見[illegible]

失血 芎歸湯 治去血過多頭重目昏眩暈不省人事頭欲倒

大芎藭　大當歸 去蘆各叁兩

右剉散每服叁錢水壹盞半煎不拘時候、

下虛 黑錫丹 治陰陽不升降上熱下冷頭目眩暈病至危篤或煩躁上潛愈甚者

黑錫　丹頭 各貳兩　川楝子　陽起石

木香　沉香　青皮　肉豆蔻

茴香　官桂 去皮　[illegible]　胡蘆巴

破故紙 壹兩　烏藥　磁石 [illegible]

右為末酒糊圓如梧子大每服伍拾圓加至柒拾圓濃煎人參茯苓棗湯空心吞下

○身疼

風證烏藥順氣散又名通氣驅風湯方見大川芎丸方後附風科
寒證五積散發汗即效或用敗毒散方見傷寒和
濕證除濕湯五苓散方見濕證
血滯當歸拈痛湯方見脚氣類
或用舒筋散於内有延胡索活血除風理氣方見腰痛類
痰證[illegible]湯加辣桂生薑烏梅煎方見痰飲
勞傷人參養榮湯治男子婦人勞傷四肢倦怠脚膝酸疼瘦弱遍身疼痛頭昏顏赤肢體沉滯面色萎黃唇焦口乾心煩熱痰涎咳嗽腰背引痛不能起卧膝弱不下食神情恍惚心驚有盜汗口苦無味不美飲食及治山嵐瘴氣寒熱往來並能治之

荊芥去梗　貝母去心　白芷半兩　沒藥
天仙藤　前胡去蘆　羌活　肉桂各半兩
當歸去蘆洗　陳皮去白　秦艽去蘆洗　甘草炙各一兩
右剉散每服貳錢水壹盞生薑三片同煎至八分稍熱服不拘時酒調亦得常服養氣調血體倦怠
虛損證十全大補湯加半夏秦艽肉桂每服各半錢方見虛損類

● 臂痛

風證烏藥順氣散方見風科虛證類
五積散治臂腿痛
五靈脂　荊芥穗　防風　羌活
獨活　甘草節　川山甲　骨碎補

草烏參伍分　麝香少許
右爲末用溫酒調下臨睡服如渾身一頭痛加沒藥木香酒調空心服
寒證五積散加和氣飲加川牛膝木瓜葱白方見傷寒類
濕證[illegible]治風濕臂痛諸藥不效
白术　當歸　獨活
羌活　甘草　川芎各半兩
右剉散每服三大錢水壹盞半生薑五片慢火煎至一盞去滓溫服合滓不拘時候
氣證白[illegible]散治臂痛外連肌肉牽引背胛時發時止思慮[illegible]衛之氣循行失度留滯經絡與正氣相搏其痛發則

有似癱瘓
真白芥子　木鱉子去殼各　沒藥
桂心　木香各半兩
右爲末入研藥令勻每服壹錢溫酒調下
消風散子治同上
紫蘇葉　青皮　桔梗　當歸
芍藥　烏藥　茯苓　川芎
黃芩　枳殼去瓤　防風各半兩　甘草
橘皮　木香　連皮大腹子
右剉散每服水貳盞薑三片棗二枚煎至壹盞去滓服
痰證[illegible]方見痰飲類

芎活湯治水飲停蓄注於經絡發為臂痛皆因脾土有虧平日多飲水漿不能傳化所致

川芎　半夏湯洗　白茯苓　川獨活

陳皮　枳殼去穰炒各半兩　白朮　甘草各等分

右為散每服叁錢水壹盞半生薑五片同煎去滓食後傳少時溫服

控涎丹凡人忽患胸背手腳腰胯隱痛不可忍連筋骨牽引釣痛坐臥不寧時時走易不定俗醫不曉謂之走注便用風藥及針灸皆無益又是風毒結聚欲為癰疽亂以藥貼亦非也此乃是痰涎伏在心膈上下變為此疾或令人頭痛不可舉或神意昏倦多睡或飲食無味痰唾稠粘夜間喉中如鋸聲多流睡涎手腳重腿冷痺氣脈不通誤為癱瘓亦非也凡有此疾但以是藥不過數服其疾如失

甘遂去心　紫大戟去皮　白芥子真者各等分

右為末煮糊丸如梧子大曬乾食後臨臥淡薑湯或熟水下五七丸至十丸如疾猛氣實加丸數不妨其効如神

加味控涎丸一方見喘急類

氣滯痛附方同方見諸氣類

血氣滯痛舒經湯治血氣凝滯留經絡不行臂痛不可忍者

片子薑黃如無以蓬朮代　白朮炒貳兩

羌活　甘草炙各壹兩　當歸酒浸壹兩

海桐皮去外粗皮壹兩　赤芍藥壹兩

右為散每服叁錢水壹盞煎至七分空心服

熨貼方方見氣痛類諸勤

敷貼藥治臂膊忽一兩點痛着骨不可忍

芫花根壹味研為末米醋調隨大小傅之立止敷貼不住須以紙花濃其上用綿帛扎定

針法肩髃一穴隨時而愈

● 脇痛

[illegible]方見諸氣痛類

治脇痛方白牡蠣粉研碎枳殼去穰切片各半錢

氣疝脅痛治膀胱氣脇下痛或項筋痛久不愈流入背膂脊痛並宜治之每服七粒用茴香酒下方見諸氣類

七情枳殼煮散治悲哀煩惱傷肝氣至兩脇骨疼筋脈拘急腰腳重滯兩股筋急兩脇牽痛四肢不能舉漸至脊膂攣急大治脇痛、

防風去蘆　川芎　細辛　枳殼去穰麩炒

桔梗微炒各壹兩　甘草炙貳兩　乾葛壹兩半

右剉散每服肆錢水壹盞半生薑三片煎至七分去滓空心溫服、

通治推氣散治右脇疼痛脹滿不食、

枳殼去穰麩炒　桂心去皮不見火各半兩　甘草炒伍錢

片子薑黃各半兩

右為末每服貳錢薑棗湯調服酒亦可、

推氣散治右脇刺痛不可忍者
枳實 川芎各半兩 粉草二錢半炙
右為末每服貳錢薑棗湯調服酒亦可
枳殼散治脇間痛如有物以手按之氣疾也
枳殼[illegible] 甘草七錢半炙
右為末每服貳錢濃煎葱白湯調下不拘時候

● 腹痛

風證 胃風湯 治腸胃不足風冷乘之水穀不化泄瀉下注腹中虛滿腸鳴[illegible]痛或下瘀血或如豆羹汁服[illegible]藥無效者此風痛也加入濃煎木香水一合 方見泄瀉類
寒證 挾虛者 五積散 [illegible]生薑三片[illegible]葱白二根木瓜一片鹽少許煎 挾實者 藿香正氣散 加生薑三片[illegible]木香少許煎 方並見傷寒類
暑證 [illegible]加生薑陳皮大黃木瓜[illegible]煎 [illegible]以[illegible]蘇鹽湯調[illegible] [illegible]為末服亦效湯引五苓散同 方[illegible]
濕證 [illegible]加炒蒼朮煨枳殼煎 末故用 不換金正氣散 生薑木瓜紅棗草煎子煎效 [illegible]
熱證 四順清涼飲 治腹痛大便秘小便赤喜飲冷以手按之轉甚不可近病者或兩手熱痛處亦熱 方見積熱類
或用大柴胡湯 方見傷寒類
或用小三黃圓 八正散 方見積熱類
老人 大麻仁圓 方見秘結類

冷證 [illegible]圓 治臍下極冷痛甚異常手足亦冷不任冷水冷食面黃肌瘦按之痛稍止者
綿附[illegible] 胡椒壹百粒
右為末薑汁糊為圓如梧子大每服五十圓薑湯或鹽湯空心吞下
[illegible] 加茱萸木香煎亦效 方見霍亂類
氣證 虛者 [illegible] 治滿腹脹膨痛流走不定[illegible]及腹脹滿者 [illegible]木香圓
熱啖大便秘 [illegible]木香檳榔圓 加大黃 [illegible]
積證 [illegible] 用生薑烏梅[illegible] [illegible]圓 治食多噫醋吞酸口出清水惡心腹中緊痛每服三七粒空豆大服後得通仍佐以[illegible]圓及[illegible]圓等藥方得全安 [illegible]
[illegible]圓 治寒氣[illegible]積通白不愈使虛泄小便赤[illegible]用[illegible]加縮砂仁一拾粒捶碎水一盞生薑拾片煎服五粒未效再服七粒 [illegible]
蟲證 化蟲圓 治腹中有塊起以手按之不見作聚往來痛無休止亦治心痛五更心嘈牙關強硬嘔吐涎沫或吐清水叉夢中齧齒面色青黃飲食雖多不作肌膚或寒或熱沉沉嘿嘿不知病之去處其蟲不療則子母相生無有休止長一尺則害人
胡粉[illegible] 鶴蝨[illegible] 白礬[illegible] 檳榔[illegible]

苦楝根 五錢

右為末麪糊圓如麻子大每服十五圓濕紙裹入生麻油一兩點折匀下之溫米飲下亦得不拘時候其蟲細小者化為水大者自下

虛證當歸建中湯 治汗傷虛羸腹痛吸吸少氣小腹拘急連腰背時自汗出不思飲食

當歸 二兩　桂心 一兩半　楊芍藥 二兩　黄耆 一兩半

右剉散每服水盞半薑三片棗二枚同煎溫服

通治大概宜通塞則為痛亦痛邑須通利臟腑乃愈隨冷熱須用巴豆大黃牽牛此最要法

小理中圓 治三脘氣弱中焦積塞脾虛不善飲食遲化吞物頻傷胸膈痞悶脇肋疼刺嘔吐噦逆噫醋惡心腹脹腸鳴心腹疼痛噎塞膈氣翻胃吐食飲食減少

草豆蔻 煨　京三稜 煨　乾薑 炮　青皮

陳皮 去白　肉桂 去粗皮 各二兩　牽牛 炒香熟　良薑 炒 各

阿魏 三兩　縮砂仁　蓬莪朮 煨　紅豆 各

右為末用水煮麪糊圓如梧子大每服五十粒生薑橘皮湯下溫湯亦得不拘時此藥無利性不損脾胃氣偏虛寒者最宜服之與三稜煎圓和同服尤妙 方見氣類

腹痛作嘔欲利大便諸藥皆吐惟蘇感圓用生薑汁泡湯吞服最妙蘇合香圓 見中氣類　感應圓 見

氣滯腹痛神保圓柿蔕煎湯下一七圓最為捷效 方

見諸氣類鐵彈圓入腰作痛以磁石散方并為十補藥果腰其上再以磁石煎湯調小調氣散服效

○諸痺

風寒濕合痺附子湯 治合痺骨節疼痛皮膚不仁肌肉重著四肢緩縱腰脚酸疼

生附子 壹兩　白芍藥　官桂　甘草

白茯苓　人參 半兩　白朮 三錢

右剉散每服肆錢水一盞生姜七片煎至六分去滓食前服惡甜者減甘草一半兼治瘦極筋脈氣痺從急痛躰酸疼

行痺湯 治寒入少陰流於經絡攣縮不得轉側

大烏頭 一兩　細辛　川椒　甘草

秦艽　附子　官桂　白芍藥 各七錢半

川獨活 壹兩二錢半

右剉散每服三錢水一盞半棗二枚同煎至八分去滓空心食前服

附子湯 治寒濕痺加附子天麻四分之一 方見霍亂類

續斷丸 治風濕痺身躰頑麻皮膚瘙痒筋脈攣急言語澁手足不遂時或不仁

黄耆 去芦　防風 去芦　官桂 不見火　天麻

萆薢　白芍藥　當歸 去芦　雲母粉

白朮　茵芋葉　木香 不見火　仙靈皮

甘草　川續斷 各一兩

右剉散以生絹袋盛以酒一斗浸之春五日夏三日秋七日冬十日每服一盞溫煖服之不拘時候常令酒氣相續為佳

葶藶丸 治一切風濕痺四肢拘攣

葶藶子三兩為散水一升半煎去滓分作三服或細末水糊圓如梧桐子大每服五十圓溫酒吞下

薏苡仁粥 治風濕痺正氣益筋骨中邪氣利腸胃消水腫久服輕身益氣

薏苡仁一升為末以水作粥空心服

寒濕痺 獨活湯 方見傷寒門治方

痰飲 茯苓湯 治支飲手足麻痺多睡眩冒

半夏湯洗七次 赤茯苓去皮 橘皮各一兩 枳殼去穰麩炒 桔梗去蘆 甘草炙各半兩

右剉散每服四錢水一盞半薑七片煎至七分去滓溫服不拘時候

血氣凝滯 三痺湯 治血氣凝滯手足拘攣風痺氣痺等疾

川續斷 杜仲去皮切薑汁炒 防風 桂心 華陰細辛 人參 白茯苓 當歸 白芍藥 甘草各一兩 秦艽 生地黃 川芎 川獨活各半兩 黃耆 川牛膝各二兩

右剉散每服五錢水二盞薑三片棗一枚煎至一盞去滓熱服不拘時但腹稍空服

筋痺 羚羊角湯 治筋痺肢節束痛

羚羊角 薄桂 附子 獨活各一兩三錢半 白芍藥 防風 芎藭各壹兩

右剉散每服叁大錢水一盞半生薑三片同煎至八分取清汁服日可一二服

熱證 升麻湯 治熱痺肌肉熱極體上如鼠走唇口反縮皮色變兼諸風皆治

升麻三兩 茯神去木 人參 防風 犀角鎊 羚羊角鎊 羌活各壹兩 官桂半兩

右剉散每服四錢水貳盞生薑二片竹瀝少許同煎至一盞不拘時溫服

○諸證

風證 大黃丸 治中傷風邪熱不解發為風痙手身黃小便或黃或白寒熱好臥不欲動其脈陽浮陰弱

生姜取汁入藥壹處銀器煎如膏 大黃蒸 黃連 栝樓根 凝水石煅 苦參 葶藶紙隔炒各等分

右為末以文膏和得所丸如梧子大初服六七圓漸加至二十丸有熱加苦參渴加栝樓根小便澀加葶藶小便多加凝水石小便白加黃連大便難加大黃並倍加

[illegible] 麻黃湯 治傷寒不解發為黃疸其脈緊以汗瀉之

麻黃三兩

右用水酒五升煎至一升每服一盞溫服汗出愈春夏用水

暑證五苓散治伏暑鬱發黃小便不利煩渴茵陳煎湯
調下一方治疸通用方見傷暑類
瘀熱茵陳湯治濕熱發黃小便秘澁頭汗而渴
茵陳蒿六兩 大黃二兩 小紅梔子十枚
右剉散每服五錢水煎服五苓散亦治發黃一藥爽前
濕證滑石散治濕疸得之一身盡黃發熱面色黑黃
七八日後壯熱在裏有血下如豚肝狀小腹滿者急下之
其身盡黃小便不利其脉沉細
礬石燒 滑石各等分
右爲末每服二大錢麥粥飲調下日三服食前便利如
血者效或汗愈

時行茵陳丸治時行疫癘發黃及瘴瘧疫癘
茵陳 梔子 芒消 大黃各二兩
杏仁去皮尖各三兩 豆豉五合
恒山 鱉甲各半兩 巴豆去皮心
右爲末餳飴爲圓如梧子大每服三圓飲下吐利爲効
未知加一圓覺體氣有異急服之
黃汗芪芍桂酒湯治身體洪腫發熱汗出如蘗汁其脉沉
黃耆五兩 芍藥 桂各三兩
右剉散每服四錢苦酒三合水一盞半煎至七分去滓
不以時服初服當心煩以苦酒阻故也至六七日稍愈
桂枝加黃耆湯治黃汗身腫汗出出已輒輕久久必身瞤

瞤胸中痛腰以下無汗腰髖弛痛如有物在皮中劇者不能
食煩燥小便不利
桂枝去皮 芍藥各三兩 甘草二兩 黃耆五兩
右剉散每服四錢水一盞半姜五片棗三枚煎至七分
去滓溫服仍飲熱粥以助藥力覆取微汗未汗再服
黃疸茵陳湯治黃疸發已頭眩身體面目爪甲牙齒及小
便悉黃或身體多赤多青皆由酒食過度爲風濕所
搏熱氣鬱蒸而成
茵陳 木通 梔子仁各一兩 大黃炒
瓜蔞壹個 石膏二兩 甘草半兩
右剉散每服水一盞半生姜五片葱白一莖煎至八分
去滓溫服不拘時候大小便閉加枳實赤茯苓葶藶

小半夏湯治黃疸小便色不異欲自利腹滿而喘者不可
除熱熱去必噦
半夏
右剉散每服五錢水二盞姜十片煎至七分不以時服
又方治黃疸身眼黃如金色不可使婦人雞犬見
東引桃根切細如箸若釵股者取一握
右以水一大升煎取一小升適溫空腹頓服後三日其
黃離離如薄雨散最後瘥百日方平復身黃後可時時
飲一盞清酒則眼中易散不飲則散遲忌食熱麪豬魚等
穀疸茵陳丸治胃實發熱風寒食穀不消大小便不利腹

渴不下食及陽脉緊而數亦治此證發熱耗鑠及黃

苦參 參兩　龍膽草 壹兩　梔子 半兩去皮炒　人參 三分

右為末以猪膽汁入熟蜜少許搜和圓如梧子大以大

麥煮飲下五十圓日三服不知稍加之

脾疸[illegible]圓治胃中積熱肺熱喘嗽口臭喉腥或舌甜丈

夫吐血婦人熱血崩並皆治

龍腦薄荷 五兩淨葉　真蒲黃 壹兩　麥門冬 一兩去心

阿膠 壹兩　甘草 壹兩　人參 壹兩　川當歸

黃耆 壹兩半　木通 壹兩　生乾地黃 叁兩

柴胡 半兩

右為末煉蜜圓如梧子大每服二十圓上焦食後用熟

水呑下服嚼破更好病下焦空心服小兒加減與之此

藥入神奇効不可盡述

[illegible]治穀疸腹滿眩暈怫鬱怔忡酒疸通用二陳湯加

縮砂煎湯下 方見痰飲門

酒疸[illegible]治酒疸因下後久久為黑疸目青面黑心中

如啖韭蒜狀大便正黑小便赤或黃其脉微而數大抵五

疸惟酒疸變證最多蓋酒之為物擔人性量不同有盈石

而不醉者有濡唇而輒亂者以醞釀而成有大熱毒滲入

百脉為病則不待發黃溢于皮膚為黑為腫流於清氣道

中則眼黃鼻腫種種不同故方中論酒疸外有肉疸黑疸

癖疸勞役疸

葛根 壹兩　枳實 去瓤麩炒　梔子仁　豉 各壹兩

甘草 半兩炙

右剉散每服四錢水盞半煎至八分去滓溫服不拘時

酒蒸黃連圓 治酒疸

黃連去鬚淨四兩剉碎以酒浸一宿日乾為末粟米

糊為圓梧桐子大每服叁四拾圓以二陳湯加葛根煎

湯送下

[illegible]散 治酒疸肚脹

蓽撥　荊芥穗　不蛀川楝子 去皮核用

生薑母　秋烏梅　甘草

右件等分於石臼中擣細用瓷器盛以自己溺服小便

去其尾取中間小便浸藥勿重鋪露星宿下揩眼

[illegible]散 用車前子山茵陳竹園荽煎湯乘熱調五苓

散服自然黃水從小便出而肚不脹妙

人參散 治飲酒房勞酒入百脉令人恍惚失常

人參　白芍藥　栝樓根　枳殼 麩炒

茯神　酸棗仁　甘草 各壹兩　熟地黃 壹兩

右剉散每服四大錢水壹盞半煎至七分食後臨臥溫服

[illegible]散 治飲酒行房酒熱瘀於心經致成黃疸并加

為細末少許每服貳錢茵陳根煎湯調下日三服

王瓜方 治酒疸熱疸王瓜搗汁取服任意

附論 酒毒不散發黃久入浸漬流入清氣道中宜引

鼻中滴出黃水愈、
苦瓠子去殼 苦葫蘆子各二七个 黃黍米炒三百粒
丁香
右爲末以一字搐入鼻中滴盡黃水三升或過多則以
香穰燒灰麝香末各少許搐入鼻中立止、
女勞疸（石膏散）治女勞疸身黃額黑日晡發熱惡寒小腹
急足下熱其脈浮緊濇或滿者難治、
滑石 石膏煅各等分
右爲末大麥粥飲調下二錢匕日三四服小便利則瘥、
熱疸（[illegible]）治疸發熱諸熱通用、
柴胡一兩 赤茯苓 桑白皮炒 川芎
甘草炙半兩
右剉散每服三錢生薑棗子煎服
虛勞疸（秦艽散）治五疸口淡耳鳴脚弱發寒熱小便白濁
秦艽去蘆 當歸酒浸去蘆 芍藥 白术
官桂去皮不見火 赤茯苓去皮 熟地黃酒蒸 橘紅
小草 川芎各壹兩 半夏湯泡 甘草炙各半兩
右剉散每服肆錢水一盞半薑五片煎至七分去滓溫
服不拘時候、
（[illegible]）治濕同上、方見濕類、
女黃疸（[illegible]）治人無故忽然振寒皮膚曲塵出小便赤澀
大便時秘氣無異飲食不妨諸藥湯不除因爲少黃、

苦參 黃連 瓜蒂 黃蘗去皮
大黃蒸各壹分 葶藶炒半兩
右爲末每服一大錢米飲調服當吐下隨時消息加減
積黃（[illegible]圓）理脾胃退黃
針砂醋煅 紫金皮酒浸 香附子炒 三稜醋煮
蒼术米泔浸 陳皮 青皮去瓤 厚朴去皮薑製
縮砂各壹兩
右糊圓每服三十圓酒熟水下川椒湯服亦可立効
○五噎
五噎（[illegible]）治五種噎食飲不下胸背痛嘔噦不徹攻刺疼痛
淚與涎俱出、

人參 茯苓 厚朴去粗皮薑汁製 甘草炙
枳殼去瓤炒 訶子炮去核 桂心 白术
橘皮 白薑炮 三稜炮 神麴炒
麥芽炒各壹兩 木香 檳榔 蓬莪术各半兩
右剉散每服二錢水一盞生薑三片棗子一枚煎至七
分空心服爲末鹽湯亦得
（[illegible]）治五噎五膈胸中久寒諸氣結聚嘔逆噎塞飲
不化結氣不消常服寬氣通噎寬中進食
白术 茯苓各半兩 木通 當歸
橘皮 青皮 大腹子 檳榔
芍藥各壹兩 甘草炙壹兩半 白芷三兩 紫蘇葉四兩

枳殼 麩炒去穰各三兩

右剉散每服水一盞薑三片棗二枚煎至六分空腹温服

七氣湯 治同上

大七氣湯 治喜怒不節憂思兼并多生悲恐或時振驚致臟氣不平憎寒發熱心腹脹滿傍衝兩脇上塞咽喉有如炙臠吐嚥不下皆七氣所生

半夏 湯洗五兩 白茯苓 四兩 厚朴 薑製炒三兩 紫蘇 二兩

右剉散每服四錢水壹盞薑三片棗一枚煎空腹温服

○五膈

五膈寬中散 治因憂恚寒熱動氣成五種膈氣不進飲食

白豆蔻 去皮 縮砂 四兩 香附子 炒去毛十六兩 甘草 炙五兩

丁香 四兩 木香 三兩 青皮 去白四兩

厚朴 去皮薑汁炙一斤 陳皮 去白四兩

右為末每服二錢入生薑二片鹽少許沸湯點服不拘時候諸冷氣用之亦效

五膈散 治五膈胃脘痞悶諸氣結聚脇肋脹滿痰逆惡心不進飲食

枳殼 去穰麩炒 木香 不見火 青皮 去白 大腹子

白朮 半夏麴 製炒 丁香 不見火 天南星 湯泡去皮

乾薑 炮 麥牙 炒 草果仁 各一兩 甘草 半兩炙

右為末每服二錢水一中盞生薑五片煎至六分温服不拘時候

五膈圓 治憂恚思慮膈塞不通及食冷物即發其病苦心痛不得氣息引背痛如刺心下堅大如粉絮緊痛欲吐吐即差飲食不下甚者手足冷短氣或上氣喘急嘔逆者

麥門冬 去心 甘草 炙各五兩 人參 四兩 川椒 炒出汗

遠志 去心炒 細辛 去苗 桂心 各叁兩 乾薑 炮各二兩

附子 炮壹兩

右為末蜜圓彈子大含化日三服夜二服胷中當熱七日愈亦可圓如梧子大米湯下二三十圓空心加麥門冬甘草人參三兩一方以吳茱萸代遠志治遇寒冷則心痛咽中有物吐不出嚥不入飲食減少並可服不拘時

寬中圓 治氣不升降胸膈結痞

木香 京三稜 青皮 各半兩 半夏 湯洗七次

大腹子 壹分

右為末薑汁糊為圓如梧子大食後米湯下二三十圓

瓜蔞實圓 治胸中痛徹背喘急妨悶

瓜蔞實 別研 枳殼 去穰麩炒

桔梗 生各壹兩 半夏 湯洗七次

右為末薑汁打糊圓如梧子大每服五十圓食後淡薑湯送下

世醫得效方卷第三

世醫得效方卷第四

○大方脉雜醫科

○諸積

肉積（三稜煎圓）治脾虚爲肉食所傷，停久不散，作爲腹滿膨痛，或泄瀉。每服叁拾伍圓，用生薑湯，食後服。方見諸氣類。

阿魏圓 治脾胃怯弱，食肉食麪，或食生菓，停滯中焦，不能尅化，致脹滿腹疼，嘔惡不食，或利或秘。

阿魏 酒浸化　官桂 不見火　蓬朮 炮　麥糵 炒

神麯 炒　青皮 去白　蘿蔔子 炒　白朮 各一兩半

百草霜 三錢　巴豆 去殼油，三七粒　乾薑 炮，半兩

右爲末，和勻，用薄糊圓如菉豆大，每服貳拾圓，不拘時，薑湯送下。麪傷用麪湯送下，生菓傷用麝香湯下。

血積（桃仁煎）治瘀血凝滯，腹內刺痛，或膀胱痛，身面微黃。

水蛭 剉，炒　虻蟲 去翅足，炒　桃仁 去皮尖，炒，各壹拾伍

大黃 蒸，各叁錢叁字

右剉散，每服肆錢，水壹盞半，煎柒分，去滓溫服，血未利更服。

氣積（木香流氣飲）方見諸氣類。

水積者（芫花圓）治飲水過多，或成冷濕，胸腹脹滿，歷絡有聲，喘急氣促，面色痿黃。

芫花 醋炒　甘遂　大戟　黑牽牛 炒，取頭末

右各等分爲末，每服壹錢，先將紅棗拾枚煎湯壹盞，空心調湯，再單飲棗湯送下，平旦服。病不除，明日更服加半錢，利後糜粥自養，後但服加味控涎圓尤效。方見喘急類。

輕者（[illegible]圓）方見痰飲類。

涎積（[illegible]圓）治積聚痰涎結於心腹之間，致令心腹刺痛，日久不食，或乾嘔減食。

蚌粉 壹兩　巴豆 七粒，去殼

右貳味同炒，令赤，去巴豆不用，只以醋圓其粉，如梧桐子大，丈夫臍腹痛，炒茴香酒吞下貳拾圓；婦人血氣，炒薑酒下；敗血衝心，童子小便和當歸酒服；常服，薑酒下。

痃癖（[illegible]圓）空心茶清下，伍叁拾粒。方見脾胃類。

魚鮮積（香蘇散）多加生薑、陳皮煎。

果菜積（[illegible]）加丁香、麝香，為末，煎鹽湯調服，麝香湯下。

（[illegible]圓）叁拾粒立效。方見脾胃類。

酒積 冷者（[illegible]）加丁香、縮砂、麥芽、神麯，或香蘇散亦可。加入並用薑棗鹽煎，空腹服。

熱者（[illegible]）治酒癖不消，心腹脹滿，噫醋吞酸，嘔逆不食，脇肋疼痛。

神麯 剉，炒　麥糵 各壹兩　黃連 去鬚，拾兩，巴豆叁粒同炒，令轉色，去巴豆不用

右爲末，沸湯搜圓，如梧子大，每服五十圓，食後薑湯下。

茶積（[illegible]圓）治好茶積飲，人成癖，面黃腹痛。

陳倉米（半升用巴豆[illegible]同炒[illegible]去巴豆不用） 青皮（[illegible]）
陳橘紅（各壹兩）
右爲末好醋搜和爲圓如豌豆大每服貳拾圓食後用
淡薑湯下

[illegible]片[illegible]紫蘇濃煎汁加杏泥服即散
麥積[illegible]圓濃煎蘿蔔子湯下（方見前）
穀粒傷積[illegible]青木香圓治穀積傷脾噯酸不食心腹作
痛百藥不效且用青木香圓叁伯粒白丁香拾粒小酒麴
貳錢同爲末入巴豆叁粒更研和令勻蒸餅爲圓如菉豆
大每服貳拾圓漸加至叁拾圓生薑橘皮湯下宿滯既去
其疾自安只用小酒麴木香貳件爲末鹽湯調服[illegible]有酒
香是效

虛人沉積[illegible]圓治虛弱人久積不可直取宜此藥
多用蠟[illegible]又留腸胃久不傷氣能消磨[illegible]又有脾
氣偏虛飲食遲化[illegible]宜助脾養胃不須用尅化藥自然平
復又名[illegible]香圓
黃蠟（[illegible]） 巴豆（[illegible]）
杏仁（[illegible]） 丁香（[illegible]） 木香（[illegible]）
乾薑（炮） 肉豆蔻（[illegible]） 蓽澄茄（各[illegible]）
乳香（[illegible]） 百草霜 青皮（[illegible]）
片子薑黃（[illegible]）
右除巴豆粉百草霜杏仁乳香外並爲末却同前四味

拌和研勻先將上項黃蠟[illegible]兩於銀石器內溶化作汁
用重綿濾去滓以無灰酒壹升於銀石器內煮蠟鎔[illegible]
取起候冷其蠟自浮於酒上去酒不用春夏修合用清
油壹兩秋冬用壹兩半大銀器內熬令香熟次下酒煮
蠟同化作汁乘熱拌和前項藥末十分均勻了候稍
凝分作劑子用油單子盛之半月後方可服如服旋圓如
蘿蔔子大[illegible]服之貳叁拾圓加至伍拾圓無礙此藥
以蠟多雖難圓然圓子愈細其功愈博臨睡須常服之
若欲治病不拘時候治豆積[illegible]
遍治大抵治積以所惡者攻之以所喜者誘之則易愈

[illegible]圓治虛中積冷氣弱有傷不能傳化
心下堅滿[illegible]腸脇脹心腹疼痛噫宿腐氣及霍亂吐瀉或
後遲緩[illegible]積血相雜米穀不消久病形羸面黃口淡不
能飲食[illegible]服可效又能消化酒毒
肉豆蔻 川薑（炮） [illegible] 木香（[illegible]）
蓽澄茄 京三棱（[illegible]） 巴豆（[illegible]）
酒蠟（[illegible]） 杏仁（[illegible]） 清油
丁香（[illegible]）
右除巴豆杏仁外並爲末次下巴豆杏仁等和勻先將
油煎蠟令鎔化傾在藥末內[illegible]成劑入臼內杵千餘下
旋圓如菉豆大每服叁伍圓熟水吞下食後臨臥服小
兒如黍米大貳叁圓乾薑湯下[illegible]滯黃白有效

〔?〕圓 治冷積停滯腹痛，淡薑湯下二十圓。方見前瘧門

〔?〕香〔?〕湯 入和平胃散，治食積，食前鹽湯調服。方見脾胃類

五積散 合和，亦治冷積。生薑、葱白、烏梅煎，空心服。方見傷寒門。〔?〕和劑

〔?〕〔?〕〔?〕〔?〕

巴豆　乾薑　韮子　良薑

硫黃　甘遂　白檳榔 各等分

右為末，研飯為圓，如中指頭大。用時早朝用椒湯洗手了，麻油塗手掌中，握藥一圓，移時便瀉。欲得瀉止，即以冷水洗之。

利〔?〕湯

巴豆 〔?〕〔?〕〔?〕〔?〕　五靈脂　白薑

赤茯苓 各壹兩

右為末，醋糊圓如菉豆大，每服柒圓，冷茶清五更初服。或欲瀉止，冷水洗手面腳三處立住。

〔?〕金圓 治諸般食積、氣積、蟲痞、蠱脹之類

石菖蒲去根節，剉如米大，半斤重；斑猫半斤重，去足翅，同菖蒲慢火炒，不可燒了，如菖蒲黃色，揀去斑猫，用小布袋盛起菖蒲，兩人牽掣布袋，去盡斑猫屑，止將菖蒲研為末，用米醋煮糊為圓，如梧桐子大，每服貳參拾圓，隨意加減，溫酒、熟水不拘時候。治蠱脹，加香附子末湯

調下，治腫亦快。

○五積

肝積肥氣圓 治肝之積在左脇下，如覆杯，有頭足，如龜鱉狀，久久不愈，發咳嗽嘔逆，痎瘧連歲月不已，其脉弦而細。

青皮 一兩，炒　當歸鬚　蒼朮 一兩半　蓬朮

三稜 切　鐵孕粉 〔?〕〔?〕〔?〕〔?〕

蛇含石 〔?〕〔?〕

右為末，醋煮糊圓如菉豆大，每服肆拾圓，當歸浸酒下。

心積伏梁圓 治心之積起於臍上至心，大如臂，久久不已，病煩心，身體髀股皆腫，環臍而痛，其脉沉而芤。

茯苓　厚朴 〔?〕〔?〕　人參　枳殼 麩炒去瓤

白朮　半夏 湯洗七次　三稜 〔?〕〔?〕

右等分為末，煮糊圓梧子大，米飲下貳拾圓，食前日兩服。作末酒調服，純陰

脾積痞氣圓 治脾之積在胃脘，覆大如盤，久久不愈，病四肢不收，黃疸，飲食不為肌膚，心痛徹背，背痛徹心，脉浮大而長。

大烏頭 〔?〕〔?〕　附子 〔?〕〔?〕〔?〕　赤石脂 〔?〕〔?〕

川椒 炒出汗　乾薑 〔?〕〔?〕　桂心 半兩

右為末，蜜圓如梧子大，每服伍柒圓，米飲下。

〔?〕加〔?〕〔?〕

肺積息賁圓 治肺之積在右脇下，大如覆杯，久久不愈，病

酒寒熱氣逆喘欬發爲肺癰其脉浮而毛
半夏湯洗 吳茱萸湯洗 桂心各兩半 甘草
桑白皮炙 葶藶炒各兩半
右剉散每服肆錢水壹盞半薑三片紅棗貳枚煎七分
去滓食前服

賁豚湯 治腎之積發於小腹上至心如豚奔走上下無時久久不已病喘逆骨痿少氣其脉沉而滑
甘李根皮 乾葛 當歸
白芍藥 甘草炙 川芎
黃芩 半夏湯洗
右剉散每服肆錢水壹盞半煎七分去滓服

灸法
卒厥逆上氣氣攻兩脇心下痛滿奄奄欲絕此爲奔豚氣先急作湯以浸兩手足頻頻易之後灸氣海百壯穴在臍下壹寸半又灸關元百壯穴在臍下參寸又灸期門百壯穴直兩乳下第一肋間端傍壹寸伍分
奔豚腹腫灸章門百壯穴在大橫外直臍季肋端
奔豚搶心不得息灸中極伍拾壯穴在臍下肆寸

○六聚

散聚湯 治久氣積聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心腹㽲痛攻刺腰脇上氣窒塞喘咳滿悶小腹䐜脹大小便不利或復泄瀉淋瀝無度遺精白濁狀若虛勞
半夏湯洗七次 檳榔 當歸各三分 橘皮

杏仁湯浸去皮尖麩炒 桂心各貳兩 茯苓 甘草炙
附子炮去皮臍 川芎 枳殼麩炒去瓤 厚朴薑汁製炒
吳茱萸湯洗各壹兩
右剉散每服肆錢水壹盞半煎至七分去滓食前服大便不利加大黃煎服

○息積

[illegible] 治腸胃因虛氣癖於肓膜之外流於季脇氣逆息難積日頻年醫所不治久則榮衛停凝一旦敗濁潰爛爲膿多致不救
胡椒壹佰伍拾粒 木香壹分 全蝎去毒
右爲末粟米飲圓如菉豆大每服拾伍圓橘皮湯下

化氣湯 治息積癖於腹脇之下偏脹膨滿不妨飲食諸藥不能取轉及治心脾疼痛嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人脾血氣
縮砂仁 桂心 木香各壹分 甘草炙
茴香炒 丁香皮 青皮炒 陳皮
生乾薑 蓬朮各半兩 胡椒 沉香各壹分
右爲末每服貳錢薑蘇鹽湯調下婦人醋湯調服

灸法
以兩手拇指壓充名指本節作拳按髀跌坐扣齒叁拾六閉氣貳拾壹息燕氣叁口再閉息可燕如是三次

氣通爲效遇子午卯酉時則行然按摩導引之法甚多
隨意用之皆可不必拘此法餘見養生書

○癥瘕

大消石圓 治七癥八瘕聚結積塊及婦人帶下絶産并欲服丹藥腹中有癥瘕者當先下此藥但去癥瘕不令人困

消石 六兩 大黃 八兩 人參 甘草 各貳兩

右爲末以三年苦酒三升置銅石器中以竹作準每一升作一刻先納大黃常攪不息使微沸盡一刻乃內餘藥又盡一刻極微火熬使可圓則圓如梧桐子大每服三十圓米湯下四日一服婦人服之或下如鷄肝或如米泔正赤黑等三貳升後忌風冷如産婦

小三稜煎 治食癥酒癖血瘕氣塊時發刺痛全不思食及積滯不消心腹堅脹痰逆嘔噦噫醋吞酸脇肋刺痛胸膈痞悶并脾氣橫泄

京三稜 蓬莪朮 各肆兩 芫花 去梗葉 壹兩

右同入甆器中用米醋伍升浸滿封器口以灰火煨令乾取出稜朮將芫花以餘醋炒令微焦焙乾爲末醋糊圓如菉豆大每服拾伍圓生薑湯下婦人血分男子脾氣橫泄腫滿如水桑白皮煎湯下

三聖圓 治積年癥瘕癖塊諸藥療理不瘥至效

舶上硫黃 壹兩 水銀 半兩 硇砂 製

右三物乳鉢內同研如粉却以生鐵銚內用文武火熬

就取汁以火熬攪令勻候冷方劑下以帛裹當地坑內埋一宿取出再研細以

赤芍藥 當歸 京三稜 蓬莪朮

紅花 各壹兩

並細剉又法酒壹升煎及一半濾出砂瓮內研生布絞汁拌蒸後冷入飛羅麪爲糊搜圓如菉豆大治因産後傷於秋冷結伏在腹脇時發疼痛不可忍者當歸浸酒壹升送下柒圓至拾圓每服磨塊空心温酒下柒圓至伍圓所是藥渣焙乾爲末別入

乾地黃 蒲黃 芫花

右爲末以前一般糊圓如菉豆大治女人血臟冷氣攻心疼及一切血疾溫酒下十圓

□□圓 治臟腑宿積風冷氣血不和停滯宿飲結爲癥瘕積塊及婦人血瘕腸胃中寒飲食不下氣逆脹滿及下痢赤白霍亂轉筋及諸般拳攣脚膝疼痛行步不能常服建脾暖胃壯骨強陽

神麯 大附子 甘草

右爲末煉蜜圓每服左手一握分作十圓細嚼米飲下

□□圓 治諸臟氣虛積或食果菜子卵入腹而成蟲蛇魚鼈或宿食留飲婦人産後敗血不消女子月水不通結爲癥瘕時發寒熱唇口焦黑身體瘦削嗜臥多驚飲食少腹痛大便糟粕變成冷痢

附子（炮，去皮臍。生用者，去皮臍，切作片，入硇砂共壹兩，浸壹宿，取出焙乾；急用不用）
蓽撥　木香（炮）　青皮
破故紙（各叁兩半）
右爲末，麪糊搜圓如梧子大，每服叁拾圓，生薑橘皮湯下，淺嘗米湯下，加至五拾圓。
灸法：灸內踝後宛宛中，隨年壯；又灸氣海百壯，其穴在臍下壹寸伍分。
又灸婦人癥瘕、腸鳴泄利、遶臍絞痛，灸天樞百壯，其穴在挾臍傍貳寸。
積聚堅大如盤，冷脹，灸胃管二伯壯，其穴在上管下壹寸。

○心痛（脾疼附）
風冷重者，宜〔附子湯〕，治胃冷風邪入腹，拘急切痛，或吐或泄，如霍亂。
附子（去皮臍，切作厚片，以薑煎令附子黑色，焙乾，切半兩）　桂心
芍藥（各壹分）　甘草（炙，半錢）
右剉散，每服肆大錢，水壹盞半，薑伍片，棗二枚，煎七分，去渣，食前服。大便秘結，入白蜜半匙同煎一沸。
〔氣著〕〔分氣飲〕，厚朴、枳殼（炒）、蘿蔔子各半錢，南木香少許，食前服。方見諸氣類。
〔寒證〕〔附子理中湯〕治惡寒或發熱，外因心痛，內攻五臟，拘急不得轉側。

麻黃（去節，湯）　桂心　白芍藥　細辛
乾薑（炮）　甘草（炙，各叁兩）　半夏（湯洗柒次）
香附子（炒，去毛，各半兩）
右剉散，每服肆大錢，水壹盞半，生薑伍片，煎七分，去滓，食前服。大便秘，入大黃如棋子大兩枚煎。
〔桂枝四七湯〕治寒邪客搏心痛。
桂枝　白芍藥　半夏（湯洗）　白茯苓
厚朴（去粗皮，薑汁炒）　枳殼（麩炒）　甘草（炙，各半兩）　人參
紫蘇葉（各壹兩）一方加明乳香、玄胡索各半兩
右剉散，每服肆錢，薑七片，棗二枚，煎，食前服。
〔七情〕〔七氣湯〕治七情之氣，鬱結於中，心腹絞痛，不可忍。

半夏　人參　甘草　肉桂（各壹兩）
右剉散，每服叁錢，生薑三片，煎，不拘時服。
〔沉香降氣湯〕每服貳錢，枳殼半片，煨，切片，蘇葉三皮，鹽少許，煎湯，再入濃磨沉香水一合服。未效，再加乳香二粒。方見諸氣類。
〔分心氣飲〕加枳殼一枚，木香少許，煎。
〔食傷〕〔治中湯〕加生薑、石菖蒲、半夏，煨枳殼煎，不拘時候服。方見傷寒和解類。
〔感應圓〕每服二七粒，鹽梅湯下。方見諸積類。
〔熱證〕〔三黃枳朮圓〕治久積風熱，疏利滯氣，兒胸膈上刺痛。
木香　青皮（去白）　大黃（炒）　檳榔（各壹兩）

黑牽牛 半生半炒 貳兩

右為末煉蜜圓如梧子大溫水下三十圓

通心散 加枳殼燈心麥門冬車前子 各半分 方見小方 治同上

廣濟蒲黃散 治心氣冷痛不可忍者

五靈脂 去沙 蒲黃 炒 當歸 肉桂 去皮

石菖蒲 木香 胡椒 各壹兩 川烏 炮 壹兩半

右判散每服肆錢水壹盞入食鹽米醋少許煎服

大沉香圓 治冷心痛 方見心痛門

沉香圓 治虛寒積冷伏滯陰氣脹心腹疞痛兩脇刺

疼婦人服用之如神重者服

沉香 阿魏

沒藥 巴豆

硇砂 硫黃 檳榔 壹兩

木香 不見火 胡椒 壹兩 青橘皮 去白 壹兩 丁香 不見火

官桂 去粗皮 壹兩 人參 去蘆 乾薑

朱砂 良薑

右除硫黃朱砂外先用諸藥為末然入貳味研勻入煎

膏搜入臼杵叁貳千下圓如梧子大每服叁貳圓橘皮

湯下如暴卒心痛嚼破醋湯吞下立效

加味小建中湯 治心腹切痛不可忍按輕卻痛按重則愈

皆虛寒證所以熱藥并鍼灸不瘥此藥主之

桂心 三分 甘草 半兩炙 白茯苓 半兩 遠志 去心

右判散每服肆錢水壹盞半薑伍片棗一枚煎 又方

不用遠志只用當歸半兩亦效

丁香止痛散 治心腹卒痛安胃進食調冷熱定泄瀉老

少通用

丁香 一伯枚 甘草 半兩 高良姜 一兩 白茯苓 二兩

右為末每服二錢陳米飲調食前服

玄胡索散 治卒心痛或經年不愈者 玄胡索一兩 甘草二

錢為散水一盞煎至半盞頓服如吐逆分作三五次服

又方 安息香一味為末沸湯調服效

又方 栽[illegible]為末沸湯調立愈 蛤粉研細熱湯調亦效

神保圓 治冷心痛有效 方見

失笑散 治卒暴心痛 方見中惡門

仓卒散 治氣自腰腹間攣急疼痛不可屈伸腹中冷重如

石痛不可忍白汗如洗手足冰冷久不瘥垂死方

山梔子 附子 壹枚炮去皮臍

右判散每服貳錢酒壹小盞入鹽少許煎七分溫服又

治腰疼切痛

蛔蟲痛 化蟲散 治大人小兒蛔咬心痛經云蟲貫心則殺人

欲驗之大痛不可忍或吐青汁黃綠水出涎沫或吐蟲出

發有休止此即蛔心痛宜速治之

乾漆 雷丸 蕪荑 各半兩

右爲末每服叁錢溫水柒分盞調和服不拘時候甘草湯亦可
不過叁服小兒每服半錢重
眞心痛大抵心爲諸臟之主其正經不可傷傷之而痛者
則手足青至節朝發夕死夕發旦死不假履治其久心痛
者是心之支別絡爲風邪冷熱所乘痛故成疹不死發作
有時經久不得瘥也

通治 手拈散 主心脾疼
草果仁　玄胡索　五靈脂　沒藥
右等分爲末每服貳叁錢溫酒調下米飲亦可

香附湯 治心脾疼不可忍者
高良薑 去蘆剉炒　香附子 去毛剉炒
右爲末每服三錢入鹽米飲調下

訶子散 治心脾疼冷痛不可忍一服見效久者如霍亂吐
瀉其效如神
訶子 炮去核　甘草 炙　厚朴 姜汁炒　乾姜 炮
草果 去皮　陳皮　良姜 炒　茯苓
神麯 炒　麥蘗 炒 各等分
右爲末每服二錢候發刺不可忍時用水一盞煎七分
入鹽服

九痛圓 治九種心痛蟲痛疰痛風痛悸痛食痛飲痛冷痛
熱痛往來痛兼治卒中惡腹脹痛口不能言又治連年積
冷流在心胸并冷腫痛上氣落馬墜車等疾

三十作二

在金匱作注 當字在胸字下

附子 去皮 三兩炮　狼毒 炙香　巴豆 去皮心膜炒研　人參
乾姜 炮　吳茱萸 湯洗炒 壹兩
右爲末煉蜜圓如梧桐子大每服空腹溫下三圓卒中
惡心痛不能言服叁圓

寒氣

撞氣阿魏圓 治九種心痛五種噎疾痃癖氣塊冷氣攻刺
及脾胃停寒胸滿膨脹腹痛腸鳴嘔吐酸水丈夫小腸氣
婦人血氣血刺等
阿魏 酒浸一宿　胡椒 各貳兩　甘草
茴香 炒　川芎　青皮　陳皮
丁香皮 炒　莪朮 炒 各一兩　縮砂　桂心
白芷 炒 半兩　生姜 四兩 淹一宿作片炒黑色

十六

右爲末阿魏糊圓如雞頭大每藥一斤用朱砂柒錢爲
衣丈夫氣痛炒姜鹽湯下二粒至三粒婦人血氣醋湯
下常服茶酒任下一粒並嚼細嚥食前服
失笑散 治脾血冷氣心痛 方見血氣類
浮椒丸 治脾疼不可忍及療冷氣疼
陳茱萸 二兩　浮椒 即胡椒　蚌粉 各炒赤色
右爲末醋糊圓如梧子大每服二十圓用溫酒或醋湯
下過發時服甚者不過三服立效
附朮湯 治脾積氣痛婦人諸般氣痛
香附子 五兩炒去毛　莪朮 醋煮　甘草 各貳兩
右爲末每服貳錢入鹽少許百沸湯空心點服

〔九痛圓〕治心脾疼不可忍下九痛圓一服而止 [illegible]

湯同 九痛圓方見前

〔[illegible]氣散〕治腹脹脾疼中滿痞悶不食大小便或澀加生薑燈心縮砂仁煎服仍服理中湯半貼立效或加白茯苓厚朴各貳錢 方見諸氣及泄瀉類

〔[illegible]保圓〕治心氣痛刺痛甚者[illegible]燈心湯下 方見[illegible]氣類

〔[illegible]香抽刀散〕治男子婦人脾胃積冷中焦不和心下虛痞腹中痛胸脅逆滿噎塞不通嘔吐冷痰飲食不下噫醋吞酸口苦無味不思飲食及婦人久患冷氣刺痛男子或當空露臥感受風露之邪得心痛積年服之大效

乾薑 剉入巴豆[illegible]同炒[illegible]去巴豆不用 良薑 [illegible]

石菖蒲 [illegible]貳錢 糯米 炒貳兩半

右為末每服貳錢鹽少許沸湯點服不拘時或溫酒調尤佳 一方以去殼巴豆炒蚌粉去巴豆加蚌粉入抽刀散內煎服若尋常氣痛不用巴豆只加炒蚌粉亦得或甚而心腹痛大便秘者巴豆同粉研爛同抽刀散醋糊圓服貳叁粒大腑通為度

〔參[illegible]散〕治虛弱人脾疼

人參 白朮 [illegible] 乾薑 炮 白豆蔻仁

縮砂仁 丁香 橘皮 甘草 炙炒

右等分剉散每服叁錢薑三片煎取藥汁調炒過蚌粉壹大錢併服

〔[illegible]補[illegible]湯〕生氣補血[illegible]心脾虛積之人服此勝大建中湯

人參 當歸 去蘆 白朮 炒各壹兩 沉香 半兩

天台烏藥 白茯苓 去皮 附子 炮去皮臍各壹兩

肉桂 去粗皮

右剉散每服叁錢水壹盞薑五片棗一枚煎空心服

〔單方〕治若熱食冰雪過多又頻飲冷漿積冷于中脾疼年歲不愈

漢椒 [illegible]

〔大[illegible]中圓〕治因食水太過脾疼久不愈以水煎壹貳圓服立愈 又方治心脾氣痛加泡過茱萸叁拾粒入圓末皆可 方見泄瀉類

衛生易簡方 四 十八

〔[illegible]散〕治遠年近日一切脾疼遇食冷物或天氣寒作冷便作胸間一點痛起或引入背膂痛不可忍服之即絕根

南木香 青皮 陳皮 麥糵 炒

大枳殼 炮 京三稜 蓬莪朮 神麴 炒

甘草 炙各貳錢半 北白芍藥 川白芷 肉桂 去皮

玄胡索 破故紙 炒各貳錢半 蓽澄茄 丁香 各壹錢

右剉散每服叁錢水壹盞半生薑叁片棗子壹枚煎至七分空心服臨睡加鹽壹捻再煎兩沸忌熱食豆腐一切生冷

〔茴香湯〕治男子婦人一切心腹脹滿氣滯走痛神效

茴香 貳兩半 青皮 去白壹兩 良薑 壹兩酒浸炒

天台烏藥 炒以濃黃白色度

右剉散每服參錢水壹盞生薑五片棗一枚煎至柒分空心服

單方 治一切心痛無問久新服之良久當利即愈

生地黃一味隨人所食多少取汁搜麪作餺飥或作冷淘但忌用鹽

灸法 心痛有參蟲多涎不得反側上管穴主之

若心痛身寒難以俛仰心疝衝冒死不知人中管主之

陰都貳穴在通谷穴下壹寸灸三壯主心腹絞刺痛不可忍

○嘔吐

風證 藿香湯 治風邪入胃嘔吐自汗或身疼

人參伍分 厚朴 藿香 陳皮各壹兩

半夏 芍藥壹兩 官桂 粉草各伍分

右剉散每服肆錢生薑五片紅棗一枚煎食前服養胃湯藥用亦效

寒證 丁香湯 專治胃虛感寒嘔吐不止 方見霍亂類

熱證 竹茹湯 治寒熱嘔噦短氣煩悶飲食不下 方見傷寒類

暑證 香薷散 治傷暑飲冷當風取涼嘔吐不止者香薷散一兩半重二陳湯壹兩重二藥合和作六服生薑三片烏梅壹箇煎 方見傷暑及痰飲類或加鹽煎

五苓散 治同上藿香煎湯服未效生薑自然汁調下消暑圓熱薑湯下 方見傷暑中暑類

濕證 加減治中湯 治脾胃虛感冒雨濕嘔吐

人參 白朮 乾薑 青皮

陳皮各壹兩 藿香 半夏各伍分 甘草參分

右剉散每服參錢生薑三片紅棗一枚煎服

七情 大藿香散 治憂愁思慮七情傷感氣鬱於中變成嘔吐或作寒熱眩暈痞滿不進飲食

藿香葉 半夏麴 白朮 木香不見火各壹兩

白茯苓去皮 桔梗去蘆剉炒 人參 枇杷葉去毛

官桂不見火 甘草炙各半兩

右為末每服參錢水壹大盞生薑五片棗子一枚煎至七分去滓溫服不拘時候

痰證 大半夏湯 治心氣不行鬱生涎飲聚結不散心下痞鞕腸中漉漉有聲食入即吐或因酒食甜冷聚飲之為也

半夏貳兩湯洗七次 人參參分去蘆

右分四服每服水參盞蜜二錢重和水揚勻入藥煎至六分去滓溫服 一法有生薑七片 治經曰嘔家先渴今反不渴者以心下有支飲故也治屬支飲

半夏圓 治熱痰作嘔每服伍拾圓淡薑湯下不拘時候 方見痰飲類

養正丹 治冷痰作嘔每服二十圓薑湯空心下 方見痼冷類

二陳湯 治痰浮於上嘔吐不已加半夏一倍香附子每服肆錢水煎不拘時熱服再入生薑亦可 方見痰飲類

食證人參湯治胸腹脹滿因傷宿食或吐後噫臭卵氣加
丁香縮砂生薑七片烏梅壹箇煎若發服治中湯治嘔前
兼療中寒飲食不化吞酸嘔吐見食貝脹身腫滿噫逆
人參　白朮　乾薑炮　甘草炙
青皮　陳皮各等分
右剉散每服肆大錢水壹瓊半煎七分去滓大便秘入
大黃棊子大兩枚
血證[illegible]湯治虛勞氣攻血溢停留胃管嘔吐血腥噫
吐食飲及班嬌中脘宿冷冷血積腥惡聞食氣病者惡阻
半夏湯洗七次　茯苓　熟地黃各壹兩　橘皮
細辛　人參　芍藥　川芎各[illegible]
右剉散每服肆大錢水貳盞薑七片煎七分去滓空腹
服有客熱煩渴口瘡者去橘皮細辛加前胡知母腹冷
下利者去地黃入桂心炒胃中虛熱大便秘小便澁去
地黃加大黃壹兩捌錢黃芩陸錢
當歸湯治三焦虛損或上下發泄吐唾血皆從三焦起或
因熱損發或因酒發主之
當歸　乾薑炮　熟地黃　桑皮
小薊　羚羊角鎊　阿膠炒　芍藥
黃芩　甘草炙各等分
右剉散每服叁錢水貳盞竹茹壹塊如指大煎至八分
去滓入伏龍肝頭髮灰蒲黃各半錢匕再煎至七分不
以時服

氣嘔吳茱萸湯治氣嘔胸滿不納食嘔吐涎沫頭疼
吳茱萸[illegible]　人參各[illegible]
右剉散每服肆大錢水壹盞半薑伍片棗三枚煎七分
不以時服
[illegible]湯治氣嘔大效每服叁錢水壹盞半生薑三片
末入[illegible]斤炮熟服方見傷寒門諸證
[illegible]湯治氣攻嘔吐
半夏湯洗各壹兩半　人參　辣桂　厚朴
茯苓　甘草
右剉散每服叁錢半生薑七片棗壹枚煎服加木香亦得
熱嘔[illegible]湯治胃受邪熱心煩喜冷嘔吐不止
葛根　半夏　甘草
右剉散每服伍錢水貳盞入竹茹如棗許大薑伍片煎
至七分去滓取清汁微冷服不以時候二陳湯加白竹
青竹茹
[illegible]治心脾有熱作嘔每服二錢燈心藿香葉煎
[illegible]湯治胃中挾熱煩渴或吐涎沫水入即吐或因冒
熱伏暑及傷寒伏熱不解每服三錢加人參烏梅生薑伍
片紅棗一枚煎方見傷寒陽證類
[illegible]治嘔吐水漿不入或食已即吐大便秘或利

而不發映時覺腹滿者或下痢赤白而嘔吐食不下者或
大腸小腸膀胱結而不通上爲嘔吐膈食
大黃 厚朴薑製 枳殼 芒硝各半兩
甘草炙一兩
右㕮咀每服四錢水一盞半薑三片煎六分却入硝一沸
細呷服
【人參治中湯】治脾胃中虛四肢厥冷食即嘔吐或因冷
食傷胃或緊經汗下致虛胃氣但脈弱小便多復利身有
微熱兇厥者難治方見傷寒陰證類 未效服金液丹每服五十圓米
飲下 【丁香煮散】生薑十片煎呑下方見嘔吐類
【通治藿香正氣散】治胃口有虛熱作嘔生薑五片木瓜二
片煎方見傷寒陰證類
【香白圓】治氣不順痰涎壅盛嘔吐不止
青州白圓子方見痰飲類 青木香圓方見氣類
右各一千圓生薑湯呑下
【附子圓】治胃脘有熱胃中有寒嘔吐不止
附子炮去皮臍二兩
右爲末以糊圓如梧子大就濕以大黃末五錢爲衣每
服十圓加至二十圓用薑湯下
【快氣湯】治一切氣心腹脹痛胸膈噎塞噫氣吞酸胃中痰
逆嘔吐及宿酒不解可思飲食
香附炒去毛二十兩 甘草炙四兩 縮砂仁去皮八兩

右爲末每服壹錢鹽湯點下常服快氣美飲食養脾
【理中湯】治脾虛上氣寒在中脘痞塞嘔逆翻吐水飲不入
其證多變
木香勻氣散方見諸氣類 理中湯方見霍亂類
右二藥合和鹽湯調服立效
【人參散】治吐逆及瀉後除煩渴常服調中和氣
白茯苓 人參各半兩 白乾葛一兩 藿香
木香 甘草一兩半 嫩黃耆二兩半
右㕮咀每服二錢水一盞半煎七分去滓溫服瀉後渴
甚者每服加滑石末三錢同煎
【溫中丁香散】治脾臟伏冷胃脘受寒胸膈痞悶心腹刺痛嘔
逆惡心寒嗽中滿臟氣虛滑飲食減少翻胃吐逆四肢逆
冷但是沉寒痼冷無問久新功效不可具述
丁香不見火 紅豆去皮 青皮去白 甘草炙
川烏炮去皮臍 陳皮去白 乾薑炮各四兩 良薑四兩
益智去殼 胡椒一兩
右㕮咀每服二錢水一盞生薑三片鹽一捻煎至七分
空心食前稍熱服滓再煎病退即止極妙
【灸法】乾嘔灸尺澤穴在肘約上動脈灸三壯又灸乳下一
寸三十壯
乾嘔不止粥藥皆吐灸間使穴三十壯其穴在掌後三
寸兩筋間若四厥脈沉絕不至者亦灸之便通此起死

人法

吐嘔宿汁吞酸灸神光穴百壯其穴在二肋旁二寸上直兩乳

嘔逆噦噦灸石關百壯其穴在陰都穴下一寸

[理中湯]治中焦不和脾胃宿冷心下虛痞腹中疼痛霍亂吐下脹滿食不消化 腹痛腸鳴或寒或熱或渴或嘔

人參去芦 乾薑炮 白朮去芦 甘草炙各一兩

右剉散每服四錢水一盞煎七分去滓食前服

防風[illegible]為圓如梧子大每服三五十圓如[illegible]服方寸匕酒調下亦得若臍上築者腎氣動也去朮加桂心四兩腎惡燥故去朮恐作奔豚故加桂 吐多者去朮加生薑三兩下多者復用朮 悸者加茯苓二兩 渴欲得水者加朮合前成四兩半 腹滿加人參合前成四兩半 寒者加乾薑合前成四兩半 腹滿者去朮加附子 服藥後食頃食熱粥一盃 [illegible]温覆勿發揭衣被嘔則加丁香吐利止身體痛不休者當審其元因以和解之 [illegible]用桂枝之類所謂治有本也

[陽經病]治身熱無汗霍亂吐下脈亦浮[illegible]者[illegible]

七氣湯嘔噦生薑煎服其效如神[illegible]

[藿香正氣散]治傷寒頭痛憎寒壯熱[illegible]加丁香半夏藿香烏梅陳皮紫蘇木瓜各壹兩生薑伍片煎四肢冷加熟附子煩渴生薑自然汁調[illegible]

仍用[半夏圓][illegible]理中湯[illegible]

[除濕湯]治寒濕所傷身重著或多食生冷[illegible]之間[illegible]作

半夏[illegible] 厚朴[illegible] 藿香葉[illegible]

陳皮去白 甘草[illegible] 蒼朮[illegible]

右剉散每服肆錢水壹盞半生薑七片紅棗壹枚煎熱服不拘時候

[七情][七氣湯]治七情[illegible]

半夏[illegible] 厚朴[illegible] 桂心[illegible] 白茯苓[illegible]

白芍藥[illegible] 紫蘇 橘皮去白[illegible] 人參[illegible]

右剉散[illegible]服肆錢水壹盞半生薑[illegible]片棗壹枚煎七分去滓空心服

[冷香湯]治[illegible]氣[illegible]於陰陽[illegible]四肢[illegible]頭目[illegible]或復發熱[illegible]大便[illegible]不納食

硫黃[illegible] 半夏[illegible] 人參[illegible]

石膏（壹分同研……） 白茯苓（壹兩）
右為末，生薑自然汁釋炊餅糊為圓，如梧子大，每服伍
拾圓至伯圓，空心米湯入少生薑汁下。
食傷太圓 治脾胃虛弱，飲食過多，飲食留飲聚滯腸胃，
或因氣不調，衝冒暑濕，吐作霍亂，利併心腹疼痛，腸胃
纏刺，疲倦不勝。（方見[illegible]）
理中湯 加青皮、陳皮，治胃脘有寒亦效。方見前
[illegible]湯 治霍亂吐下不已，舉體轉筋，入腹則悶絕。
木瓜乾（壹兩） 吳茱萸（半兩） 茴香（[illegible]） 甘草（[illegible]）
右剉散，每服肆大錢，水壹盞半，生薑叁片，紫蘇拾葉，煎
至壹盞，七分，去滓，食前服。仍研生蒜貼心下、脚心上。

茯苓澤瀉湯 治霍亂吐利後，煩渴欲飲水。
赤茯苓（去皮） 澤瀉（貳兩） 甘草（炙，壹兩） 桂心（壹兩）
白朮（去蘆，壹兩半）
右剉散，每服肆大錢，水壹盞，薑三片，煎七分，去滓，食前
溫服。又方有小麥伍兩。
麥門冬湯 治霍亂已愈，煩熱不解，多渴飲水，小便不利。
麥門冬（去心） 橘皮（去白） 半夏（湯洗七次） 白茯苓（去皮）
白朮（去蘆，各壹兩） 人參 甘草（炙，各半兩） 小麥（半合）
右剉散，每服肆錢，水壹盞半，生薑伍片，烏梅壹箇，煎至
八分，去滓，溫服，不拘時服。
[illegible]圓 治伏暑傷冷，冷熱不調，霍亂吐利，口乾煩渴。

黃丹（壹兩，[illegible]） 巴豆（貳拾伍个，去皮心）
右同研勻，用黃蠟鎔作汁，和為圓，如梧子大，每服伍圓，
水浸少頃，別以新汲水吞下，不拘時候。
又用[illegible]湯，清滑沉冷服之，大效。然後用之法也。（方見[illegible]）
乾霍亂 [illegible]然心腹脹滿，攪刺疼痛，煩悶不可忍，欲吐
不吐，欲利不利，狀若神靈所附，頃刻之間，便至悶絕，亦
三因，或臟虛，或腸胃素實，故吐利不行。
急以鹽湯叁升，熱飲壹升，刺口，令吐宿食，使盡，不吐更
服，吐訖復飲，叁吐乃止。此法大勝諸治，俗人以為田舍
淺近，鄙而不用，守死而已。凡有此病，即先用之。續以理
中湯，倍加橘紅與之；或[illegible]正氣散，加官桂、茯苓、大棗

散，就吞蘇合香圓妙。
通[illegible] 治霍亂吐瀉，通用，腹痛者加桂，小便不
利加車前子，每料各壹兩。
[illegible]湯 治老幼霍亂吐利，壹服取效。（方見[illegible]）
[illegible]湯 治吐瀉過多，手足逆冷，氣少不語，脉沉伏。
附子（炮） 乾薑 人參（各去蘆，貳兩） 甘草（伍錢）
右剉散，每服肆錢，水貳盞，煎至一盞，空心服。腹痛加官
桂，小便不利加茯苓，每料各伍錢。
[illegible] 治霍亂轉筋，吐逆不定，病勢危篤，每服叁拾圓，[illegible]
湯下。（方見[illegible]）
[illegible]湯 治霍亂吐瀉，

金匱

胡椒 生薑

右為末，用木香湯溫和調下

奇方：薑壹兩，醋壹盞，同煎，勿溫服，[illegible]

皆可煮服

又方：南星末叁錢，薑汁[illegible]

逆冷不省人事，壹服可救，半夏為末，薑汁[illegible]

藿香為末，每服壹大錢，沸湯[illegible]服亦[illegible]

葱洗法：治霍亂轉筋

陳大蓼一把，水叁升，煮取二升，乘熱熏洗，仍飲[illegible]

用蓼須家園種者

[illegible]方：治霍亂吐瀉，心腹作痛

炒鹽貳錢，紙包，紗[illegible]，[illegible]其臍，并炒鹽[illegible]

火發氣透，明礬[illegible]，又以炒鹽熨其背，則[illegible]

灸法：治霍亂轉筋欲死，氣絕，惟腹中有暖氣者，可用灸法

炒鹽於臍中令實，就鹽上灸貳柒壯[illegible]

灸臍下壹寸半，名氣海，灸貳柒壯[illegible]

○痰飲

懸飲[illegible]：治飲水流在脅下，咳唾引痛，[illegible]不愈者

芫花(熬) 甘遂 大戟(炒)

右等分，剉散，水壹盞半，棗拾枚，煎八分，去棗，調藥，壯人

壹錢，羸人半錢，平旦溫服，不下者，明日更加半錢，下後

糜粥自養，若以下不可服

金匱

五苓散[illegible]流行水飲，每服貳錢，沸湯調，小便更不利，加防

己佐之

木防己湯：治膈間支飲，其人喘滿，心下痞堅，面色

黧黑，其脈沉緊，得之數十日，醫吐下之不愈

漢防己(叁兩) 桂心 人參 石膏

右剉散，每服肆大錢，水壹盞半，煎七分，去滓，溫服。虛者

即愈，實者三日復發，再服不愈，宜去石膏加茯苓四兩

芒硝壹兩半，微利則愈

茯苓[illegible]湯：治支飲，手足冷，多唾，口燥，氣從小腹上衝

胸咽，手足痺，面熱如醉，因復下流陰股，小便難，時復

冒咽腫

茯苓 桂心 甘草(炙) 五味子

右剉散，每服肆錢，水壹盞半，煎七分，去滓，空腹服之

衝氣即低，反更欬滿者，去桂加乾薑、細辛[illegible]

止而復渴，衝氣更發者，以細辛、乾薑為熱藥，此法不當

遂渴，反止者，為支飲也。支飲法當冒，冒者必嘔，嘔者復

內半夏貳兩半，以去其飲，飲去嘔則止，其人形腫[illegible]

加杏仁貳兩半，若面赤如醉，以胃中熱上熏，加大黃叁

兩，餘詳證加減

[illegible]：治[illegible]

麻黃 桂心 甘草

石膏 杏仁

右㕮咀，每服肆大錢，水壹盞半，薑伍片，棗貳枚，煎七分，
去滓，空腹溫覆一服，汗者勿再服，復服汗出多亡陽，虛
逆惡風煩躁不得眠也。

小青龍湯 治溢飲支飲，倚息不得臥，及喘滿者。

麻黃去節湯泡 芍藥 細辛 桂心
乾薑炮 甘草炙各參兩 五味子 半夏湯洗

右剉散，每服肆錢，水壹盞半，煎七分，去滓，空腹服。渴者
去半夏，加栝樓根參錢。微利，去麻黃，加芫花一雞
子大，炒。噎者，去麻黃，加附子壹枚，炮。小便不利者，去
麻黃，加茯苓肆兩。喘者，去麻黃，加杏仁參錢。參字疑兩。
上氣肺脹，其脈浮，心下有水氣者，脅中痛引缺盆，加石
膏貳錢半，研。

痰飲[illegible] 治痰飲停積，胸中中脘閉，嘔吐痰涎，咳嗽嘈
煩，心悸喘嗽，逆及痰氣中人，停留關節，手腳嚲曳，口眼喎邪，
半身不遂，食已即吐，頭疼發熱，狀如傷寒，以薑七片，棗子
壹枚煎，空腹服。嗽者加乾葛，腹痛加芍藥。

參苓圓 治胃氣虛弱，三焦痞塞，不能宣行水穀，為痰飲結
聚胸膈之間，令人頭目昏眩，胸膈脹滿，咳嗽氣急，嘔逆腹
痛，伏於中脘，亦令臂痛不舉，腰腿沉重，久而不散，流入於
脾，脾惡濕，得水則脹，脹則不能消化水穀，又令腹中虛滿
而不食也。或腸間漉漉有聲。

半夏壹兩 [illegible]

乾薑 良薑炒 白朮炒
茯苓各壹兩 木香 丁香不見火 青皮去瓤
陳皮各半兩

右為末，用神麴壹兩，大麥蘖貳兩，同碾取末，打糊和藥
為圓如梧子大，每服參拾圓至伍拾圓，溫熟水下，不拘
時候。常服溫脾胃，去宿冷，消積滯，化飲食，辟霧露風冷、
山嵐瘴癘不正非時之氣。或因酒癖停飲，痰水不去，或
心腹痰逆，時發嘔逆，皆是心痰，累藥不效，並皆治之。

四七湯 治七情氣鬱結，凝滯於咽中，如破絮，或如梅核，
在咽喉間，咯不出，嚥不下，并治中脘痞滿，痰涎壅盛，上氣
喘急。

半夏伍兩 茯苓肆兩 紫蘇葉貳兩 厚朴參兩

右剉散，每服肆錢，水壹盞半，薑七片，棗壹枚，煎八分，不拘
時服。若因思慮過度，心氣不足，小便白濁，用此藥下青
州白圓子，甚效。一方又用半夏伍兩，人參、官桂、甘草各
壹兩，生薑煎服，名七氣湯，大治七氣并心腹絞痛。

二陳湯 每料加木香、沉香各伍錢，縮砂仁貳兩，治氣不順，上
壅，化痰，每服參錢，生薑伍片，煎服。方見痰瘧類。

加味青州白圓子 治風痰壅盛。方見風類。

[illegible]芎辛散 治痰厥頭目眩，[illegible]語音不出，服
他藥亦不能去，乃是痰熱所致，用此藥數服而愈。

川芎　細辛　防風　桔梗
白芷　甘草　羌活各壹両　桑白皮半両
右剉散每服二錢水一盞半生姜二片薄荷三葉煎至七分不飢不飽時温服
枳殻半夏湯 除熱痰下氣寛中利膈消上焦痞滿
枳殻　半夏　黄芩　桔梗各二両
甘草五分
右剉散每服四錢生姜三片桑白皮七寸烏梅一个煎[illegible]未效加甜葶藶馬兜鈴防已薄荷立效熱痰黄色是也
虛證[illegible]治氣虛痰盛不得睡卧氣中痰厥尤宜服之方見傷寒陰證類
[illegible]丸 治下虛上壅頭眩痰盛服之立愈方見諸氣類
[illegible]湯 治上盛下虛痰涎壅盛此藥能鎮墜痰涎升降陰陽和五臟方見[illegible]類
[illegible]丸 治脾虛不得尅制腎水多吐痰唾而不咳者[illegible]服[illegible]
[illegible]丸 去痰[illegible]痰利冷飲
硫黄研　白礬[illegible]　半夏[illegible]　丁香
茴香炒　木香各壹両
右為末薑汁煮麵糊丸梧子大每服二十丸空心米飲下
[illegible]丸 治元氣虛弱痰氣上攻咽喉痰壅寒嘔吐不已
靈砂　青州白圓子[illegible]
右和勻生姜自然汁和米糊丸如梧桐子大每服三十丸生姜人參湯或棗湯下
[illegible]丸 治痰[illegible]後胸滿[illegible]痰飲服之愈
薄橘紅四両　甘草壹両
右為末沸湯調服其功在茯苓半夏枳實南星之上
茱萸丸 治頭疼背寒嘔吐酸汁不思飲食小便不利氣壅昏眩
白茯苓　呉茱萸各壹両
右為末煉蜜丸如梧子大每服三十丸不拘時候熟水吞下服後便漩中作茱萸氣是驗化痰藥不能及此一方只將茱萸酒浸三宿以茯苓末拌之候乾或湯或酒下百餘粒亦效
茯法丸 常服消食化痰養生之家不可缺
枳殻　桂　桔梗　半夏
右為末姜汁糊丸梧子大每服二十丸食後姜湯下
茯苓丸 治臂痛不能擧手或左右時復轉移由伏痰在内中脘停滯脾氣不流行上與氣搏四肢屬脾滯而氣不下故上行攻臂其脉沉細者是也後人謂此臂痛乃痰證也用以治痰無不效者
茯苓壹両　枳殻　半夏貳両　風化朴消
右為末姜汁煮糊丸如梧子大每服三十丸生姜湯下
累有人為痰所苦夜間兩臂常若有人抽牽兩手戰掉至於茶盞亦不能奉只以此藥治之皆隨服隨愈[illegible]

所謂痰之害者多矣……於立效未有如此藥之妙也

[術附湯]治酒癖五飲……動搖有聲皆由飲酒冒寒飲水過度

白朮（二兩）　附子（炮去皮臍）

右爲散分三服水一大盞姜十片煎至□空腹服臟腑微動即安……

[桂辛湯]下痰飲散風邪止咳嗽聰耳鼻宣關竅利咽膈清頭目解冒眩進飲食

桂（去粗皮）　細辛（去苗）　乾薑（炮）　人參（去蘆）

白茯苓（去皮）　甘草（炙各）　五倍子　陳皮（去白）

白朮　半夏（湯洗七次各等分）

右㕮咀散每服三錢水二盞煎至一盞去滓食前溫服

[丁香半夏圓]治脾胃宿冷嘔吐痰水噫聞酸

人參　丁香　木香　肉豆蔻

陳皮（各一分）　藿香葉（半兩）　半夏（……）

右爲末姜汁糊丸如小豆大每服四十九丸姜湯下

[□□圓]……送下青州白圓子治痰……或痰飲所作……

[□□湯]治同上……

[□□湯]專主治痰

附子（生去皮臍）　半夏（生用）

右等分㕮咀散每服四錢水一盞生姜十片煎七分去滓空腹溫服入少木香煎尤佳

[□□□□]治一切停痰留飲

青皮　陳皮（去白）　京三稜（炮）　川薑（炮）

草果　蓬朮　良薑

右爲末水煮糊丸如梧子大陰乾每服五十丸姜湯下

[□□圓]治五飲……胸膈……搶心疼痛飲食不下翻胃吐逆……心痛積年宿食不消久瘧久痢……頭痛……心氣不足……婦人腹中諸疾……能治療久服尤妙且不傷臟氣

蓽撥　丁香（不見火）　胡椒　縮砂仁

木香（不見火）　蝎梢　烏梅　青皮

巴豆（去殼……）

右以青皮同巴豆漿水浸一宿次日漉出同炒青皮焦去巴豆水淹烏梅肉蒸一炊久細研爲膏入藥末和勻丸如綠豆大每服五七丸臨臥姜湯吞下曾有婦人頭風服之亦效且不復發嘗頭風即痰飲耶

[□□湯]治一切痰頭目旋暈或痰飲留積不散胸膈痞塞脅肋脹滿頭痛吐逆喘急痰嗽涕唾稠粘坐臥不安不思飲食

半夏（湯洗……）　天南星　甘草　枳實

赤茯苓（去皮……）　橘紅

右㕮咀散每服四錢水二盞生姜十片煎八分食後溫服

[□□湯]治痰飲……嘔吐……或頭眩……或中脘不快……因食生冷飲酒過度脾胃不和並宜服之方加丁……

……方見霍亂類

【三稜煎圓】破痰癖，消癥塊，冷熱積聚，胸膈不關，通和三焦，升降陰陽，順氣消化宿食。

荊三稜（煨，切）　蓬莪朮（煨，切，各二兩）（以上二味用去殼巴豆二十一粒同炒，候巴豆黑色，去巴豆，文武火炒令乾黃色）

木香　枳殼（去瓤）　青皮（去白）　川茴香（微炒）

檳榔（各一兩）

右為末，醋糊丸如綠豆大，每服二十丸，食後生姜湯下。

【溫中湯】治停痰咳嗽，即治中湯加茯苓半夏等剉之。（方見霍亂類）

咳逆

【丁香柿蒂散】治吐利及病後胃中虛寒，咳逆至七八聲相連，收氣不回者，難治。

人參　茯苓　橘皮　半夏

良薑（炒）　丁香　柿蒂（各一兩）　生薑（一兩半）

甘草（五錢）

右剉散，每服三錢，水一盞，煎，乘熱頓服；或用此調蘇合香圓亦妙。

【[illegible]湯】治同上，用萊菔子湯泡研取汁，調熱服。

【[illegible]降氣湯】治同前，蘇葉三皮，鹽少許，煎湯熱服。（方見諸氣類）

【橘皮乾薑湯】治胃中有寒咳逆。

橘皮　通草　乾薑　桂心

人參　甘草

右各等分，剉散，每服四錢，水一盞半，煎六分，溫服，日三服。

【羌活附子湯】治吐利後胃寒咳逆。

羌活（去蘆）　附子（炮，去皮臍）　茴香（炒，各半兩）　乾薑（炮）

丁香（各一兩）

右剉散，每服二錢，水一盞，鹽少許，煎至七分，空心熱服。

【蓽澄茄散】治噫氣咳逆。

蓽澄茄　良薑（各二兩）

右剉散，每服二錢，水一盞，煎六分，沸投醋半盞，取出，時呷之甚妙。

熱證【小柴胡湯】治同上，每服三錢，水一盞，生薑三片，棗[illegible]三不拘時服。（方見傷寒類）

【橘皮竹茹湯】治胃虛膈熱者。

橘皮（去白，二兩）　人參　甘草（炙，各半兩）

右剉散，每服四錢，水一盞半，竹茹一小塊，生姜五片，棗二枚，煎至七分，去滓溫服，不以時。

【灸咳逆法】乳下一指許，正與乳相直骨間陷中，婦人即屈乳頭度之，乳頭齊處是穴，艾炷如小豆大，灸三壯，男左女右，只灸一處，火到肌即瘥，不瘥不可治也。其穴只當取乳下骨間動脈處是。

世醫得效方卷之四

世醫得效方卷第五

○大方脉雜醫科

○脾胃

虛證 沉香降氣湯 治氣滿不快，飲食不入，胸膈痞悶，或時喘脹，腹中刺痛等證。

丁香五分 沉香五分 木香五分不見火 人參去蘆半兩

青皮去白 神麴炒壹兩 茯苓去皮 甘草炙

陳皮去白 厚朴薑汁製 草果仁 藿香葉去土

半夏湯洗七次 縮砂仁去殼各貳兩 白豆蔻去殼

白朮去蘆炒 麥蘗炒 香附子炒去毛各壹兩

右剉散，每服叁錢，水壹盞半，入生薑三片，紅棗二枚，同煎七分，溫熱服。又方治氣滿不食，以棹味香蘇散同煎尤妙。人尤宜服。未效更服丁香煮散加蓽撥良薑。

實證 嘉禾散 治中滿下虛，五噎五膈，脾胃不和，胸滿短氣，脇肋脹滿，心腹刺痛，不進飲食，或多痰逆，口苦吞酸，胸滿短氣，肢體怠惰，面色萎黃。如中焦虛痞，不任攻擊，臟氣虛寒，不受峻補，或因病氣衰，食不復常，禀受怯弱，不能多食，尤宜服之。常服育神養氣，和補脾胃，進美飲食。

枇杷葉去毛薑汁炙 石斛細剉酒拌和微炒

沉香 薏苡仁炒 木香 縮砂去殼

杜仲去粗皮用薑汁與酒合和塗炙令香熟焦 藿香葉

隨風子 半夏 丁香 白朮

青皮 大腹子 檳榔 陳皮

桑白皮 白豆蔻 人參

五味子 白茯苓 神麴 甘草

右剉散，每服叁錢，水壹盞，入生薑三片，肥棗貳枚，同煎至七分，溫服，不拘時候。及療四時傷寒，能調理陰陽，使無變動，尅日得安。如療五噎，入乾柿壹枚同煎，十服見效。如膈氣吐逆羸困，入葱白三寸，棗五枚，同煎。婦人亦可服。

四君子湯 治脾胃不調，不思飲食。

人參去蘆 甘草炙 白茯苓去皮 白朮各等分

右剉散，每服叁錢，水壹盞，煎至七分，不拘時服。一方加橘紅，名異功散。又方加陳皮、半夏，名六君子湯。嘔吐加藿香、縮砂；泄瀉加木香、肉豆蔻。

溫中湯 治脾氣虛寒，腹脇脹滿，身體沉重，面色萎黃，嘔吐不食，水穀不化，大腑自利。

肉豆蔻煨 白豆蔻仁 附子炮去皮臍 厚朴去皮薑製

白朮去蘆 乾薑炮 紅豆 神麴炒各壹兩

丁香 胡椒 木香不見火 甘草炙各半兩

右剉散，每服叁錢，水一盞半，生薑五片，紅棗壹枚，煎至七分，去滓溫服。

參苓白朮散 理思脾氣弱神昏體倦飲食不進多困少力中滿痞噎心忪上喘嘔吐瀉利

人參　白茯苓去皮　白朮去蘆　山藥

甘草炙各壹兩　縮砂仁　桔梗去蘆　薏苡仁

蓮肉　扁豆薑汁浸去皮

右為末每服貳錢棗湯下小兒量歲數與之此藥中和不熱久服養氣育神醒脾悅色順正辟邪

參苓壯脾圓 治脾胃虛弱停寒留飲膈氣噎塞反胃吐食心胸痞滿脇肋虛脹背膊刺痛牽引背膂食少易傷噫醋氣短口苦舌澁惡心嘔噦咳嗽喘或久病泄利腸胃虛滑病後氣不復常飲食無味形容憔悴酒後痰多

人參　白朮　白茯苓去皮　甘草

山藥炒　木香　丁香　白扁豆炒

縮砂仁　薏苡仁　益智仁　藿香葉

紅豆　肉豆蔻　乾薑炮　高良薑

三稜炮　莪朮炮　神麴炒　麥糵炒

陳皮　枳殼炒　茴香炒　苦梗各壹兩

右為末煉蜜圓如彈子大每服一圓細嚼白湯下溫酒亦得空心食前常服溫養脾元進美飲食

治中湯 治脾胃不和嘔逆霍亂中滿虛痞或致泄瀉方見傷寒陰證類

平胃散 治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺痛口苦無味胸滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面色萎黃肌體瘦弱怠惰嗜卧體重節痛常多自利或發霍亂及五噎八痞膈氣反胃並宜服之

蒼朮去粗皮米泔浸貳[illegible]　厚朴去粗皮薑汁製炒香各[illegible]

陳皮去白[illegible]　甘草炒各[illegible]分

右為末每服貳錢以生薑三片紅棗貳枚煎湯調服或鹽湯點空心食前熱服常服調氣暖胃化宿食消痰飲辟風寒冷濕四時非節之氣為散煎亦可加人參尤妙

[illegible]丹平補不僭養益真陽變底[illegible]火性溫不燥壯脾土[illegible]和美[illegible]兩中州[illegible]飲食不[illegible]臍腹[illegible]甚或不食而脹滿[illegible]果消痰[illegible]暖胃[illegible]宿食不化腹紛痛泄瀉[illegible]不止應是一切脾胃諸疾不問男子婦人皆可服

[illegible]砂[illegible]大[illegible]不[illegible]者　羅參去蘆　縮砂去殼

肉豆蔻麪裹煨　蓽澄茄　白豆蔻去殼　紅豆

高良薑[illegible]　附子炮去皮　白朮去蘆　厚朴去粗皮薑汁製

丁香不見火　藿香葉去土　五味子去梗　乾薑炮去土

胡椒　益智仁　麥門冬去心　草果仁

橘紅去白各壹兩

右將人參等貳拾味各如法修製剉如豆大以銀鍋一口用白砂蜜二十兩將藥一半同蜜拌勻入銀鍋內以夾生絹袋盛貯朱砂懸於入銀鍋[illegible]以桑柴火重湯煮

三日三夜取沙淘淨焙乾入乳鉢用玉槌研五候十分
細水糯爲圓如菉豆大陰乾每服拾粒加至拾伍粒空
心食前用人參湯送下棗湯亦得如或嘔吐用淡薑湯
送右忌食豬羊血

補真圓 大抵不進飲食以脾胃之藥治之多不效者亦有
謂焉人之有生不善攝養房勞過度真陽衰虛坎火不溫
不能上蒸脾土沖和失布中州不運是致飲食不進胸膈
痞塞或不食而脹滿或已食而不消大腑溏泄此皆真火
衰虛不能蒸蘊脾土而然古云補腎不如補脾予謂補脾
不若補腎腎氣若壯丹田火經上蒸脾土脾土溫和中焦
自治膈開能食矣

葫蘆巴炒　附子炮去皮臍　陽起石煅　川烏炮去皮
兔絲子淘淨酒蒸　沉香別研不見火　肉豆蔻面裹煨　肉蓯蓉酒浸
五味子各半兩　鹿茸去毛酒蒸　川巴戟去心
鍾乳粉各壹兩

右爲末用羊腰子貳對治如食法葱椒酒煮爛入少酒
糊杵和爲圓如梧子大每服柒拾圓空心食前米飲鹽
湯任下

進食散 理脾元虛冷不思飲食久病脾虛全不食者宜
虛有風不食只三服便效

甘草炙半兩　肉桂去粗皮　良薑炒　陳皮去白
青皮去白各壹分　訶子煨去核五个　草豆蔻去皮八个　川烏炮去皮一个

右㕮咀每服貳錢水壹盞生薑三片煎七分空心服

瀉黃散 治脾胃壅實口內生瘡煩悶多渴頰痛心煩
唇口乾燥壅滯不食

藿香葉　石膏煅　縮砂去殼　山梔子去殼
甘草炙各半兩　防風去蘆半兩

右㕮咀同蜜酒炒香焙爲細末每服叄錢水壹大盞煎
至七分溫服不拘時候

枳殼圓 治脾實心腹壅滯四肢疼悶兩脇脹滿大小便不
利 方見秘結類

橘皮竹茹湯 治胃熱多渴嘔噦不食

赤茯苓去皮　陳皮去白　枇杷葉拭去毛　麥門冬去心
青竹茹　半夏湯泡七次　人參去蘆
甘草炙各半兩

右㕮咀每服肆錢水壹盞半生薑五片煎至八分去滓溫
服不拘時候

○翻胃

安脾散 治胃氣先逆飲食過傷或憂思蓄怒宿食痼癖積
聚冷痰動擾脾胃不能消磨穀食致成斯疾女人得之多
由血氣虛損男子得之多因下元冷憊有食罷即吐有朝
食暮吐暮食朝吐所吐酸臭可畏或吐黃水凡有斯疾乃
是脾敗惟當速疗遲則發煩渴大便秘水飲纖悉不得入
不旋踵斃矣

高良薑（壹兩以百年壁上土炒） 南木香
草果（去殼） 胡椒 白茯苓 白朮
丁香（不見火） 陳橘皮（湯浸去白） 人參（去蘆各半兩） 甘草（炙壹兩半）
右爲末，每服弍大錢，食前米飲入鹽點服，鹽酒亦得。

薤白粥 治翻胃無問久遠冷熱。
人參（壹兩以水[illegible]煎） 雞子（去黃） 薤白（弍莖）
熟稀粟米粥
右以雞子白及薤白粟等三味熟調攪，然後爆人參湯相和，更調攪，頓服之，不限早晚，服無忌，當時便定。往前服萬不失一。如思食，即與粟米粥飲，漸漸加粳米和之。

[illegible]草果飲法
烏梅肉（肆兩） 草果 乾薑（各叁兩） 赤茯苓（弍兩）
甘草（半兩）
右剉散，每服用半兩，水壹碗半，煎至壹碗，去滓，磁器盛，如熟水隨意服之。

茯苓湯 治翻胃發渴。
半夏（半錢） 桂心 甘草（各叁錢） 赤茯苓（肆兩）
澤瀉（肆兩）
右剉散，每服肆錢，生薑煎服。

三稜煎圓 治宿食積聚，翻吐酸臭。方見諸氣類

正胃散 治翻胃嘔逆，藥食俱不下，結腸三五日至七八日來大便不通，如此者必死之疾。

白水牛喉（[illegible]）
右用喉節，以好米醋壹大盞浸，頻翻令勻，緩火炙乾，再蘸再炙，醋盡爲度，存性，不得見太陽火，爲末，每服一錢，食前用陳米飲調下，輕者一服見效。

祕傳散 治脾疼翻胃
靈砂（壹兩） 蚌粉（同炒略變色） 丁香
胡椒（各肆拾玖粒）
右爲末，生薑自然汁煮半夏糊圓如梧子大，每服三十圓，翻胃，煨生薑湯吞下；虛人脾痛，炒鹽湯下。

青金丹 治一切吐逆。
水銀（捌錢） 生硫黃（一兩）
右二件入無油銚內，用慢火化開，以柳木篦子攪，或有焰起，以醋灑之，結成砂子，再研爲細末，用米粽尖杵和爲圓，如菉豆大，每服三十圓，用生薑橘皮煎湯送下，不拘時服。

太倉丸 治翻胃服水藥不得者。
大綿附壹箇，生薑自然汁壹碗，煮乾爲度，每丁香壹箇爲末，以少許安掌中心，舐喫，立效。

丁附散 治翻胃
大附子（壹箇，切去[illegible]，中作[illegible]，入丁香四十九粒，以[illegible]）
[illegible]

右爲末用一錢匕捺舌上嗽津下若煩渴徐徐食糜粥
忌油膩生冷

大倉圓治脾胃虛弱不進飲食翻胃不食亦宜服之
陳倉米壹升用黃土炒米熟去土不用　白豆蔻貳兩　丁香壹兩
縮砂仁貳兩
右爲末用生薑自然汁法圓如梧子大每服壹伯圓食後用淡薑湯送下

小半夏圓治翻胃及不快飲食
半夏湯洗　胡椒
右等分爲末薑汁圓如梧子大每服三五十圓薑湯下

六丁圓治翻胃如神
五靈脂伍兩　生辰砂壹兩　母丁香壹兩不見火
右爲末入黃狗膽糯米粽子尖爲圓如雞頭大每用薑湯化下

[illegible]治噎嗌翻胃吐食神效
先以犍牛用繩拑開牛口以淨布巾抹令口舌淨却抵牛舌出來候有涎出以椀盛之每服用八分盞爲一服研好麝香末一捻打勻却以銀盞盛令溫先以絹帛束縛中脘胃口令極緊候氣喘急熱解開隨氣喘一二口便服藥時先對病人說煮肉粥惱煩之昔煎丁香汁和粥服藥罷隨與粥喫

[illegible]圓治翻胃膈氣
丁香　木香　肉豆蔻　縮砂
青皮　陳皮　胡椒　蓽撥
沉香各半兩
右爲末以大蒜瓣子不拘多少每瓣作二片入去殼巴豆一粒用飿藥調麪裹蒜片慢火煨熟去巴豆及麪只將蒜研成膏將前項藥末一半搜和爲圓如梧子大每服卅圓於爐內灰過蘿蔔湯調前藥末二錢吞下神效

[illegible]治翻胃
真附子壹枚生去皮臍分作四片用生薑壹兩研水
右爲末每服壹錢空服鹽湯下

治翻胃嘔吐大秘結虛冷者用靈砂或養正丹溫而利之又蘇合香圓用四分感應圓用六分夾研作細圓薑汁泡沸湯下此亦溫利若大便熱結用蜜煮凝作指挺納後部導之或用豬膽一枚取汁入法醋少許以筆蘸滴灌於後部或燒皂角於桶內熏穀道或用連根葱白一握漢椒伍拾粒擣細作餅焙熱和輕粉掩臍續以葱椒煎湯熏洗身下

又方治翻胃
真蚌粉
右每服二錢薑汁米飲調下

治吐逆不止
真黃丹
粟米飯爲圓如梧子大醋湯吞七圓不以時候

灸法 兩乳下各一寸，以瘥為度。又灸臍上一寸二十壯。又灸內踝下三指稍斜向前三壯。中脘一穴，在臍上四寸。足三里二穴，在膝下三寸，各灸七壯或九壯，其效尤著。

導引方 除腹肚冷風宿疾積胃，口冷食欲進退吐逆不下。正坐，兩手向後捉腕，反拓席，盡勢，使腹弦弦，上下七，左右換手亦然。

乾食方 惟食乾飯餅餌，盡一年不食飲水漿，藥亦用圓，勿不反動。調理旬日奇效。有人三世死於胃反，至孫收效此方。

咳嗽

風證 神朮散 治四時瘟疫，頭痛項強，發熱增寒，身體疼痛，及傷寒鼻塞聲重，咳嗽頭昏，並皆治之。

蒼朮 五兩，米泔浸一宿，切，焙　香白芷　細辛 去葉

羌活 去蘆　川芎　甘草 炙，各壹兩

右剉散，每服叁錢，水壹盞，生薑三片，葱白三寸，煎七分，溫服，不拘時候。如覺傷風鼻塞，為末，葱茶調下。

三拗湯 治感冒風邪，鼻塞聲重，語音不出，或傷風傷冷，頭目痛眩，四肢拘倦，咳嗽多痰，胸滿短氣。方見傷寒陽證類。

杏子湯 治傷風身熱，有汗惡風，病證挾熱，服杏子湯不得者，此藥穩當也。

橘紅　紫蘇葉　杏仁 去皮尖　五味子

半夏 湯泡七次　桑白皮 炙　貝母 去皮　白朮 炒，各壹兩

甘草 炙，半兩

右剉散，每服四錢，水壹盞半，生薑五片，煎至八分，去滓溫服，不拘時候。

人參荊芥散 治肺感風邪，上壅咳嗽，頭目不清，言語不出，咽乾項強，鼻流清涕。

荊芥穗　麻黃 去根節　細辛 去土洗　桔梗 去蘆炒

陳皮 去白　半夏 湯洗　杏仁 去皮尖　人參

通草　甘草 各半兩

右剉散，每服肆錢，水一盞半，薑五片，煎八分，食后溫服。

寒證 金沸草散 治肺感寒邪，鼻塞聲重，咳嗽不已，增寒發熱，無汗惡寒，煩燥，或風熱壅在膈間，唾黏黃濁，甚者咯血。方見傷寒陽證類。

小青龍湯 治表有寒邪，喘水飲，咳嗽急，不得睡臥。方見傷寒通治類。

華蓋散 治肺感寒邪，咳嗽上氣，胸膈煩滿，項背拘急，聲重鼻塞，頭目眩，痰氣不利，呀呷有聲。

紫蘇子 炒　赤茯苓 去皮　陳皮 去白　桑白皮 炙

杏仁 去皮尖　麻黃 去根節　甘草 炙，半兩

右剉散，每服二錢，水壹盞，煎至七分，去滓，食後溫服。

暑證 六和湯 治傷暑，痰生咳嗽，喘滿，加麥門冬、烏梅煎，就吞消暑圓。方見伏暑中暑類。

濕證 白朮湯 治五臟傷濕，咳嗽痰涎，增寒發熱，上氣喘急。

白朮 二兩　五味子　茯苓 各壹兩　甘草 壹錢

半夏湯洗去滑破作十六片

右㕮咀分作十六服每服水一盞半薑五片紅棗一枚煎至七分空腹服

不換金正氣散 治傷濕四肢重著骨節疼痛洗淅咳嗽

厚朴去皮薑汁製 藿香去枝土 甘草炙 半夏煮

蒼朮米泔浸 陳皮去白 加木瓜每服壹兩只用五分

右等分㕮咀每服叁錢水一盞半生薑三片棗子二枚煎至八分去滓食前稍熱服忌生冷油膩

人參清肺散 治因抑鬱憂思喜怒飢飽病失節致臟氣不平咳嗽膿血漸成肺痿增寒壯熱羸瘦困弱將成癆瘵

人參 紫菀茸洗 阿膠蛤粉炒 百合蒸

細辛洗去葉土 款冬花 杏仁去皮尖炒 天門冬湯洗去心

半夏湯洗七次 經霜桑葉 五味子各壹 甘草炙各半兩

右㕮咀每服肆錢水壹盞半生薑五大片煎至七分去滓食後溫服因氣而嗽者宜加木香欬而唾血有熱加生地黃欬而唾血有寒者加鍾乳粉因疲極而欬嗽者加黃耆因損而唾血者加沒藥藕節欬而嘔逆腹滿不食者加白朮倍加生薑欬而小便多者加益智仁欬而大便溏者去杏仁加鍾乳粉欬而面浮氣逆者加沉香柑皮煎

人參款氣散 治久嗽痰喘[illegible]

熱痰積氣半夏湯 治上焦有熱咳嗽黃痰痞滿阻食妨[illegible]

巴豆去皮心膜出油 馬兜鈴 薄荷葉各半兩 每服[illegible]

貝母散 治熱嗽夜時咳不得安寢治痰喘

知母新方上焙 貝母[illegible]

右㕮咀錫糖一塊同煎服一方以二母為末入巴豆霜少許臨卧用生薑二片蘸藥夾定細嚼咽下

[illegible] 治同上

枇杷葉 木通 款冬花 紫菀

杏仁 桑白皮各等分 大黃減半

右如常製為末蜜圓櫻桃大食後夜卧噙化

玉芝圓 治風壅痰實頭目昏眩咳嗽聲重咽膈不利

人參去蘆 乾薄荷 白茯苓去皮 白礬枯過

天南星炮 各[illegible] 半夏湯洗七次薑汁炒八兩

右為末生薑汁煮麪糊圓如梧子大每服三十圓食後生薑湯下如痰盛燥熱薄荷湯下

黃連阿膠圓 治肺熱咯血亦治熱瀉

黃連淨三兩 赤茯苓貳兩 阿膠炒壹兩

右黃連茯苓為末水調阿膠和圓如梧子大每服三十圓食後米飲下黃連伏茯苓能抑心火肺得其清則嗽止

小柴胡湯 治嗽久瘥身有煩熱喉燥冷水而暫止者加桑白皮北五味子粟子煎不拘時服煩熱加麥門冬嗜臥減食加白朮煎方見傷寒門類

洗心散治心熱上炎肺經壅隔咽痛咽乾口燥咳嗽殊甚
方見積熱類

〔冷證〕寧肺散寧肺和胃化痰治嗽通暢三焦進美飲食生薑三片烏梅一箇杏仁七粒去皮尖北五味子七粒同煎就服青州白圓子方見傷寒陰證風科通治類

補肺湯治肺虛咳嗽痰唾清白飲食日減多嘔當溫養脾土則生肺金用五味子炒阿膠煎湯調服立效方見脾胃

杏子湯治一切咳嗽不問外感風寒內傷生冷痰飲停積

人參　半夏泡　茯苓　細辛

乾薑　官桂　杏仁　白芍藥

甘草　五味子

右各等分剉散每服四錢以水二盞薑四片煎至七分去渣溫服不以時此藥最宜冷嗽熱嗽非所宜若脉浮緊身熱無汗惡風脉浮身熱無汗惡寒而咳加少麻黃去節熬服

丁香半夏圓治肺胃虛寒咳嗽方見痰飲類

胡椒理中圓治寒嗽冷痰吐白涎沫綿續不止不能飲食

款冬花去梗　胡椒　蓽撥　陳皮

乾薑　甘草　良薑　細辛去葉各二兩

白朮二兩半

右為末蜜圓如梧子大每服十圓溫湯米飲任下不拘時候

加減理中湯治冷嗽加半夏麴乾薑五味子同煎空心服
方見傷濕類

溫肺湯治冷極嗽可加熟附子白豆蔻北五味子罌粟殼蚌粉炒阿膠一方見霍亂類以八味加減

款肺圓治久嗽

款冬花　人參　五味子　官桂去皮

紫菀　白石英微帶青色者　鍾乳粉

右等分為末用羯羊肺一具去皮尖杏仁半斤水煮肺爛為度去筋膜與杏仁同研極爛和衆藥圓如梧子大陰乾每服五七十圓至百圓糯米飲下食後臨卧服

時行人參飲子治寒熱上壅咳嗽痰涎

人參　苦梗去节　五味子　赤茯苓去皮

白朮炒各二兩　枳殼麩炒　甘草各半兩

右剉散每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去渣食前溫服嗽多者加桑白皮一兩痰多加半夏麴一兩寒暑之交氣盛人衣厚作壅忽痰盛微熱此藥最宜若作感冒發其汗攻其邪必成大病此方佳處在赤茯苓能導心熱枳殼能踈肺壅故易效一方有半夏一兩又云寒壅者加杏仁不去皮尖紫蘇各半兩

一服散治暴嗽

阿膠二片　生薑十片　大烏梅二個　甘草一錢炙

紫蘇十葉　杏仁七個去皮尖　大半夏三個泡　罌粟殼三個去瓤

右剉散水壹盞煎至六分去滓臨卧服

[illegible]各件每用四錢生薑[illegible]烏梅

桑白皮煎有效酌量用之 方此貝母湯[illegible]

勞嗽[illegible]治虛勞咳嗽咯血潮熱盜汗不思飲食

蛤蚧 蜜炙 人參 去蘆 百部 去心 款冬花 一兩

紫菀茸 兩 貝母 阿膠 蛤粉炒 當歸 [illegible]

柴胡 去蘆 肉桂 去粗皮 黃耆 蜜炙 甘草

杏仁 湯浸去皮尖 半夏 [illegible]

右為末每服叁錢水壹盞半生薑三片煎至一盞不拘

時溫服肉桂雖去風寒有熱人不肯服則當改用細辛

風痰嗽 白圓子 治一種咳嗽直至嗽頻吐飲食痰物俱

出盡方少安此乃肝木剋脾土風痰壅盛宜以青州白圓

子方作生料更加少木香丁香橘紅天麻全蝎去毒白僵

蚕炒去絲嘴只服有效

積嗽[illegible]治男子因打撲及車馬女子因勞苦用力而傷

肺經肺經既損遇風寒則為咳嗽或吐血或至紫黑宜用

此藥去心肺間瘀血仍灸肺俞穴 肺俞穴在三椎下各一寸半

蘇木 生地黃 當歸 大黃

赤芍藥 各等分

右為末酒調服得利去瘀血即止服養榮湯調理

通治諸嗽飲 治諸痰嗽服他藥不效者

南星 蚌粉 知母 貝母

半夏 白礬

右各等分剉散每服三錢水一大盞生薑[illegible]去滓澄

清候溫徐徐吸服食後臨卧服小兒亦用得效

[illegible]治肺感風寒咳嗽喘滿咯痰血

杏仁 湯浸去皮尖 牡蠣 火煆研為細末入杏仁同研 黃[illegible] 青黛 壹兩

右研勻入黃蠟壹兩鎔化和圓如彈子大壓扁如餅每

服用柿餅壹箇去核入藥在內濕紙裹煨約藥鎔方取出

去火毒細嚼糯米飲送下 一方名甲乙餅治咳出血片

兼涎內有血條不問年久月深但聲在一服効用青黛

一分牡蠣粉貳錢匕杏仁七粒去皮尖研蠟圓了湯送

並同前

[illegible]治肺胃虛寒咳嗽喘急胸膈噎悶腹肋脹滿

治寒痰氣久嗽咽喉引痛及勞嗽肺痿勞嗽唾血腥臭

乾嘔煩熱聲音不出肌肉消瘦倦怠減食

地骨皮 人參 甘草 阿膠 蛤粉炒

杏仁 去皮尖麩炒 桑白皮 知母 烏梅 去核

桔梗 去蘆 罌粟殼 去蒂蜜炙

右等分剉散每服三錢水壹盞半烏梅棗子各一枚同

煎至壹盞去滓食後臨卧加蜜半匙攪勻澄清吸服効

[illegible]治順肺氣利咽膈止咳嗽化痰涎

款冬花 紫菀 洗 甘草 各七錢 五味子 炒

桑白皮 炒 桔梗 杏仁 去皮尖 紫蘇葉 各壹兩

右剉散每服肆錢水壹盞並蜜少許煎食後臨卧溫服

［□□□］治一切喘嗽

用皂角一條作兩邊去子每孔入巴豆壹粒線紥定童子小便浸壹宿火上炙令焦黃去巴豆不用或入貳粒亦不妨卻以杏仁半兩各一合入麻油內煎令折裂為度同為末每服一字乾柿點藥細嚼或用白米粥點喫亦可臨卧時服服了不可喫湯水一應物妙不可言

［□□□］治上膈涎熱咳嗽聲重

［□□□］治大人小兒諸咳嗽

玄胡索壹兩　桔梗半

右為末每服貳錢用軟餳糖一塊和藥含化小兒一錢

用蜜亦可

［杏仁煎］治咳嗽失音不出

杏仁去皮尖研叁兩　生薑汁　蜜　砂糖各壹兩

桑白皮　木通　貝母各壹兩　紫菀

五味子各壹兩

右剉散用水叁升煎至半升入杏仁砂糖蜜薑汁再煎成稀膏每服挑壹匙頭含化更加知母款冬花各一兩尤妙

［□□□］治咳嗽嘔痰

［□□□］治寒壅相交肺氣不利咳嗽喘滿胸膈煩悶痰實涎盛喉中呀呷鼻塞流涕頭目昏眩肢體倦怠咽嗌

知母壹兩　麻黃去節　桑白皮　半夏

阿膠炒　貝母　杏仁去皮尖

甘草　款冬花

右剉散每服水壹盞薑三片煎至七分去滓食後溫服

［□□□］治肺壅咳嗽咽膈不利嗽不得睡卧

□□□

右為末每服貳錢水壹盞煎至六分不拘時溫服

［□□］治□□□壯人久嗽即效粟殼□□□□□□

右為末每服用蜜湯下

［□□］治虛弱久嗽□□□□□□□□□□□

［□□］治久嗽□□成勞瘵□□□□□□□□□□

［□□□］

薄荷　甘草　百藥煎　桔梗　防己

右剉散入口細嚼旋旋嚥下治熱嗽失聲有效

［□□□］治一切風痰利胃□壯脾胃及消痰積溫中順氣內傷生冷腹脇脹痛酒後痰實嘔吐服之神效

南星　良薑　縮砂仁各一兩　香附子

右為末生薑自然汁煮糊為圓如梧桐子大每服三十圓生薑湯下不計時候

［□□□］治久痢痰嗽咽啞藥未效

橘紅　甘草　

右用水五盞慢火煮煎焙乾為末白湯點服

滴油散 治痰嗽面浮
真蚌粉一味新瓦炒令通紅地上出火毒拌青黛少許
同淡虀水滴麻油數點服即愈
灸法 上氣欬逆短氣胸滿多唾惡冷痰灸肺腧五十壯
又法 灸兩乳下黑白際各百壯即瘥 咳嗽咽冷聲破喉
猜猜 灸天突伍拾壯 尤急 火炙 膏肓腧在四椎下五椎
上各去脊三寸近胛骨僅容一指許多灸之亦效

○喘急

風證 華蓋散 治傷風喘急坐卧不安痰涎壅塞咽喉[illegible]
手足冷痺
麻黄 去根節 肉桂 去皮 陳皮 兩 款冬花 [illegible]

訶子皮 五兩 甘草 五兩 杏仁 去皮尖
右剉散每服三錢水一盞半入烏梅一枚煎至八分食後夜臥通口服半夜不能煎但以藥末入茶和勻沸湯點或乾嚥亦得忌魚酒炙煿猪肉腥臊等物

溫肺湯 治肺虛久感風邪喘咳不能坐卧可思飲食
白芍藥 六兩 五味子 去梗 乾薑 炮 肉桂 去粗皮
半夏 湯洗 陳皮 去白 杏仁 甘草 炒 各三兩
細辛 去苗洗
右剉散每服三大錢水一盞半煎至八分以絹帛濾汁食後服兩服渣再煎一服 一方去芍藥細辛可加減用

參蘇溫肺湯 治肺熱傷風喘嗽痰實 方見咳嗽類

寒證 三拗湯 治肺感寒邪發喘
杏仁 不去皮尖 甘草 不炙 麻黄 不去節
北五味子 辣桂
右剉散每服四錢水一盞半生薑三片煎 喘甚加馬兜鈴桑白皮夏月減麻黄

[illegible] 素有熱者不服此方 [illegible]
[illegible] 渾身[illegible]增寒喘嗽頭目昏重加北五味子杏仁去皮尖[illegible]有泄不用杏仁 方見傷寒[illegible]

七情 四磨湯 治七情傷感上氣喘息妨悶不食
人參 檳榔 沉香 天台烏藥
右各濃磨水和作七分盞煎三五沸稍溫服或下養正丹

四七湯 治驚憂氣遏上喘
半夏 茯苓 厚朴 紫蘇葉
右剉散每服四錢水一盞半薑七片棗二枚煎服

分心氣飲 治憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹喘促煩悶腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利脈虛緊而滿
紫蘇子 大腹皮 草果仁 半夏
厚朴 木香 陳皮 木通
白朮 枳實 人參 甘草
右剉散每服四錢水一盞薑三片棗二枚煎至七分不拘時

[illegible] 治心肺伏熱致胸滿難[illegible]口乾作渴發喘嗽

口服氣每服貳錢薄荷茶清調下
人止散治同前用燈心二十莖淡竹葉一皮煎方見
葶藶散治過食煎煿或飲酒過度致肺壅喘不得臥及肺
癰咽燥
甜葶藶炒　桔梗去芦　瓜蔞子　川升麻
薏苡仁　桑白皮炙　葛根各壹　甘草炙半両
右剉散每服肆錢水一盞半生薑五片同煎食后溫服
小柴胡湯治服熱藥過多或身有煩熱作喘數服即安方
見傷寒門諸類
葶藶散加甜葶藶桑白皮煎方見腸癰類
杏蘇三拗湯加防己薄荷煎二方見咳嗽類
□□□圓治風熱上壅或中脘停留水飲喘急治及
浮腫脚氣入腹平常腹中痰氣諸氣結聚服之得利則效
大戟　芫花　甘遂　甜葶藶
巴豆去殼各乙両　黑牽牛取頭末炒　皂莢子炒両
右為末米糊圓粟米大每服三七粒茶清吞下或溫水
亦可服後未可服甘草藥及熱水
虛證□□湯治氣虛發喘不得安枕宜用枳殼杏
仁去皮尖炒五味各少許煎吞黑錫丹五十粒方見痼冷類
神□圓治喘嗽痰涎稠粘晝夜不止不能坐臥遠年日近
並皆治之
滑石半両　鍾乳粉煉成者両　南星炮切

右為末煮乾柿去蒂核搗細搜藥為圓如梧子大每服
四十圓薑棗煎湯下氣弱人更服養正丹方見痼冷類
潤肺□□圓治肺胃受冷氣短減食時吐痰水喘促煎
人參湯吞服甚妙方見咳嗽類
大腎□圓治腎寒多唾上喘人參鹽湯下八味圓亦可方見虛
損類補損類均有效
紅椒圓治虛勞喘嗽眩暈
靈砂研　人參　木香各錢　大香附子炒
大紅椒去合口者炒出汗各半両
右為末糯糊圓如麻子大每服二十圓空心橘皮湯下
通治人參定喘湯治肺氣喘咳中有聲坐臥不安胸膈緊
滿及治肺感寒邪咳嗽聲重
人參去芦　罌粟殼蜜炙　麻黃去節　半夏麴
甘草炙各壹両　桑白皮半両　阿膠炒　五味子各乙両半
右剉散每服三錢水壹盞薑三片煎至七分食後溫服
九寶湯治經年喘嗽通用常服屢效
麻黃去節　橘紅　薄荷各壹両　辣桂
紫蘇　桑白皮炒　杏仁去皮尖　大腹子連皮
甘草炙各半両
右剉散每服叁錢薑伍片烏梅壹箇水一盞半同煎食
後臨臥服或入童子小便半盞尤妙
人參散治因墜墮驚恐或渡水跌仆疲極筋力喘急不安

人參　桑白皮　橘紅　大腹皮
檳榔　白朮　訶子（麪裹煨取肉）　半夏（湯洗七次）
桂心（不見火）　杏仁（去皮尖炒）　紫菀（洗）　甘草（炙）
右等分剉散每服半錢水壹盞半生薑伍片紫蘇七葉
煎至七分去滓溫服不拘時候
分氣紫蘇飲治氣逆脈伏發熱而喘者（方見氣類）
蘇子降氣湯治氣不升降上熱下冷作喘生薑紫蘇葉同
煎就服□□□見效（□□方見□□類）
□□白朮散
陳皮　半夏　白茯苓
白朮　甘草（炙）　人參　山藥（各貳兩）　白扁豆（□□）
（[illegible]）
縮砂　桔梗（炒）　石蓮肉　薏苡仁（[illegible]）
右剉散治喘嗽每遇飲酒必發生薑棗白皮煎服效
□□□□湯治喘急泄瀉官桂生薑煎服（方見□□類）
□□□□□治久喘胸膈滿悶飲食不進每服七圓□□□湯
（八方見諸氣類）
□□□湯治久近喘嗽口乾作渴
茯苓根　知母　貝母（去心各壹兩）　甘草（炙半兩）
人參（半兩）
右未每服貳錢先鍊下黃蠟貳錢同入米飲調下食後服
□□□□治肺氣喘急晨久不得睡不問久新一服見效
砒石（壹兩）　菉豆（貳兩）

右二味同奓以豆爛為度取出砒石入黃丹壹兩同研
爛用紙做卷五七重如豆筒又入砒石黃丹以黃泥固
濟後燒紅為度又入黃丹壹兩麪四分為圓如粟米大
又以黃丹貳兩為衣每服二粒新井花水下得效即止
胡桃湯治痰喘
胡桃肉（去殼）　生薑（叁片）
右臨卧食畢飲湯三兩呷又再嚼如前飲湯就枕即安
□□□□□□大治肺氣咳嗽面浮目腫喘促睡卧
不得坐卧難小便亦澁等證
漢防己　貝母（□□□）　木通（各壹兩）
甜葶藶（隔紙炒）　杏仁（去皮尖麩炒黃）
（[illegible]）　（[illegible]）
右為末棗肉為圓如梧子大每服三十圓（[illegible]）
下不拘時候
□□□治喘并痰嗽兩服病不復作
白礬（飛過）　五倍子（為末）
右每服各一錢以生猪肝火上炙熟蘸藥食後臨卧服
□□□□治喘急喉塞加桔梗款冬花（方見咳嗽類）
□□□治喘嗽吐唾不利胸熱口中苦氣
南星（壹兩）　鈆白霜（少許）　桑白皮（清兩）　白附子（五錢）
右剉散生薑三片煎食後臨睡服
灸法肺俞各十一壯穴在第三椎下兩旁各去一寸五分
天突穴在頸結喉下五寸宛宛中灸七壯立效

○泄瀉

風證[illegible]治傷風自汗[illegible]泄每服肆錢[illegible]不入煎服 方見傷寒和[illegible]類

不換金正氣散 治體虛傷風冷濕加官桂烏梅 方見瘧疾類

胃風湯 治腸胃不足風冷乘之水穀不化泄瀉注下腹中虛滿大腸受濕下如豆羹汁或下瘀血日夜無度並宜服

人參　白茯苓 去皮　芎藭　桂心 不見火

當歸　白芍藥　白朮　甘草 炙

右等分㕮咀散每服肆錢水壹盞半入粟米百餘粒煎至七分去滓空腹稍熱服胃弱者不[illegible]服

八味圓 治風氣行於腸胃泄瀉

[illegible]為末醋糊圓每服三十圓空心服

寒證（治中湯）治腸胃虛弱腹內痛身體怯寒泄瀉青白兼治傷寒秋寒而利臍下冷 方見霍亂類

人參　白朮　乾薑 炒　甘草 炙各等分

加茯苓　厚朴 薑製各半兩

右㕮咀散每服叄錢水壹盞煎至柒分空心服

[illegible]治中湯 治腸胃虛弱腹內痛身體怯寒泄瀉

乾薑 炮　白朮 炒　青皮 去白　陳皮 去白

縮砂仁 各壹兩　人參　甘草 炙各半兩

右㕮咀散每服肆錢水壹盞半生薑伍片棗子二枚煎至七分去滓溫服不拘時或兼進感應圓

暑證（香薷散）治傷暑煩渴引飲所下如水 方見傷暑類

胃苓湯 治傷暑煩渴引飲所下如水

五苓散 方見傷暑類　平胃散 方見脾胃類

右二錢合和紫蘇烏梅煎湯下未效加木香縮砂白朮丁香煎服尋後服亦可 [illegible]

[illegible]散 分利水穀解煩熱止泄瀉

豬苓 去皮　白朮 去蘆　澤瀉 去毛　赤茯苓 去皮

車前子　木通　茵陳　瞿麥

右㕮咀每服肆錢水壹盞半燈心麥門冬煎服

六和湯 治暑瀉小便赤澀 方見傷暑類

[illegible] 治感暑口乾煩渴瀉 方見霍亂類

濕證（除濕湯）治傷濕泄瀉每服貳錢蘇棗三皮食鹽少許調熱服

[illegible]治腰腳冷痺小便自利肢體重著所下黃黑 方見傷濕類

白朮附子湯 治腸胃虛受濕腸鳴泄瀉自汗

白朮 貳兩　附子 炮　茯苓 去皮各壹兩

右㕮咀散每服肆錢水壹盞半生薑七片棗子壹枚煎至七分去滓溫服不拘時候

[illegible]圓 治臟腑受風濕泄瀉不止

芎藭　神麯　白朮　附子 炮各等分

右為末糊圓如梧子大每服五十圓米飲下

七情 加味[illegible]治飲食中夏[illegible]傷脾腹內膨滿泄

瀉痢後或作暴泄加丁香細剉各匙薑同粟米和各貳錢倒半盞
三斤紅棗一百枚煎如
木香散治臟寒冷極及久冷傷敗口瘡下泄米穀不化飲
食無味肌肉瘦瘁心多嗔恚婦人產後虛冷下泄及一切
水瀉冷痢
木香　破故紙各壹两　良薑　砂仁
厚朴各叁分薑製　赤芍藥　陳皮　肉桂
白朮各半两　胡椒　茱萸各壹分　肉豆蔻四箇
檳榔壹箇
右爲末每服叁大錢用不經水猪肝肆两批薄重重摻
藥末水一碗入醋茶腳少許入瓶蓋覆煮熟入鹽蔥白

胃　藥方五　十九

三莖生薑彈子大同煮欲盡空心作一服冷食之初微
瀉不妨此是逐下冷氣少時自住經年冷痢滑泄只是
一服渴則飲粥湯忌冷油膩如不能食冷則煮水煖令
之若只用猪肝爲圓如梧子大每服五十圓用
粥飲下亦效若暴瀉只一服
熱證香薷散治熱瀉利大便熱煩或小便赤澀飲
冷香薷散每壹兩加宣連伍錢剉碎令和炒心貳錢次甘草
前草貳根同煎方見傷暑類
冷證五苓散治泄瀉引飲七方見傷暑類
寒證小理中圓每服五十圓米飲下空心服方見咳嗽類
寒熱不調藥不換金正氣散治傷寒吐瀉煩渴泄瀉一藥

秘令用生薑陳米烏梅煎服五方並見傷寒陰證類
赤石脂湯治協熱泄瀉亦治血痢
蘗皮叁两　黃芩貳两　黃連壹两
右剉散每服肆錢水壹大盞煎至七分入阿膠末半錢
再煎少頃溫服
承氣湯治大實熱下利譫語此有燥屎也大泄瀉反
用大黃者乃因所利而利之此治熱瀉也非大實勿妄輕
用之方見傷寒陽證類
冷證和氣散治泄瀉過多和氣飲治脾胃宿冷腹內切
痛或外感風寒內傷生冷泄瀉黃白色不以歲月遠近受寒
而色青慘瘀而泄利生薑二片烏梅壹箇紅棗二枚同煎
大效方見傷寒陰證類

胃　藥方五　四十

固腸圓治丈夫婦人腸胃虛弱內受風冷水穀不化泄瀉
注下腹痛腸鳴手足逆冷服諸藥不效者此藥主之
肉豆蔻麵裹煨　木香貳两　白茯苓焙　乾薑炮
附子炮去皮臍　肉桂貳两　丁香壹两
右爲末薑汁糊爲圓如梧子大每服伍拾圓加至壹佰
圓薑湯吞下粥飲亦可空心食前服
漿水散治下泄如水或青或白臍腹痛手足冷脈細欲絕
滑泄知氣由陽氣暴絕爲陰所迫則注下不止陽復則生
不復則死又不止灸氣海可也方見傷寒中
奪命丹治沉寒痼冷臟腑虛憊心腹疞痛脇肋脹滿泄

洞腸鳴自利自汗久痢休息

蓽撥　肉桂各半兩　乾薑炮　高良薑各等分

右為末煮麪糊圓如梧子大每服五十圓空心米飲下

禦寒圓治臟腑虛怯冷氣衰弱脾胃不快不進飲食時加泄利晝夜不息

人參去蘆　白茯苓去皮　附子炮去皮臍各壹兩

木香濕紙包煨　訶子炮去核

右剉散每服貳錢薑三片棗一枚煎至六分服

□□湯治洞泄不止

大川烏　綿附　天雄炮去皮臍

木香　肉豆蔻麪裹煨　訶子去核各壹兩

右剉散每服叁錢生薑十片紅棗二枚烏梅一箇陳米一撮同煎空腹熟服未效仍服來復丹

□□□治同上

□□圓治臟寒腹痛泄瀉不止

艾葉炒　赤石脂　川薑各半兩　吳茱萸

縮砂仁　肉豆蔻　附子炮去皮臍各壹分

右為末麪糊圓如梧子大每服五十圓食前米飲下

猪臟圓治臟寒泄瀉不進飲食及氣積滯疾

吳茱萸滾湯泡洗不以多少用水浸

右用豮猪臟頭一截去脂膜淨洗將茱萸入臟內兩頭扎定慢火煮令極爛用甑蒸熟乃研取咊於臼內杵千下令極細圓如梧子大每服五十圓米飲下

猪肚圓治臟寒泄瀉先用熟艾成厚朴附子貳味生薑棗子煎服空心仍服此猪肚圓

川烏炮　附子炮各貳兩　乾薑炮　白朮

厚朴酥炙　良薑　肉豆蔻煨　蓽撥

吳茱萸去枝　縮砂仁　丁香　桂心各壹兩

右為末用豮猪肚壹隻淨洗以川椒壹兩去目茴香一兩大麪二兩入猪肚內用線縫定酒醋煮爛取出川椒茴香大麪焙乾為末搗和前藥以猪肚杵和得所為圓如梧子大每服五十圓空心米飲送下

□□圓治臟腑虛寒泄痢不止

烏梅去核　揉成無灰艾壹兩半

川椒炒去目　乾薑　赤石脂　黑附炮去皮各壹兩

右除烏梅外同為末將蒸過烏梅肉研勻更入熟棗肉蜜少許和圓如梧子大每服二十圓米飲下

□□□治脾泄多老人腎虛謂之水土同化

吳茱萸揀淨不以多少

右用白水煮去滓入鹽少許通口服蓋茱萸能暖膀胱水道既清大腸自固餘藥雖熱不能分解清濁也

大□中圓治大便虛滑不禁每一圓用平胃散壹貼煎服便止加肉荳蔻同煎尤妙

人參　白朮　乾薑　甘草各等分

右為末煉蜜圓如指頭大
六君子湯 治臟腑虛怯心腹脹滿嘔噦不食腸鳴泄瀉
人參　甘草　白茯苓　白朮
肉豆蔻 [illegible]　訶子 煨去核 各等分
右㕮咀散每服叁錢生薑三片紅棗二枚煎服或為末熱
鹽湯調服亦可
木香煮散 治久冷泄瀉及休息痢疾每服二十圓空心米飲
吞下多服收功 方見痼冷類
冷熱不調 [illegible]連圓 治腸胃虛弱冷熱不調泄痢腹鳴日夜
無度
艾葉 [illegible]　乾薑 [illegible]
宣連 [illegible]　訶子 煨去核
木香 [illegible]
人參 去蘆　白朮　烏梅 去核　百草霜 別研
白茯苓 去皮　酸石榴皮 [illegible]　當歸 [illegible]　地榆 [illegible]
赤石脂 [illegible]　龍骨 [illegible]　阿膠 [illegible]　罌粟殼 [illegible]
右為末將前項艾膏和為圓如梧子大每服五十圓陳
米飲下
戊己圓 治脾胃不足冷熱泄瀉不止米穀不化腸鳴腹痛
黃連　白芍藥　吳茱萸 泡七次焙乾
右等分為末用糊圓如梧子大每服三四十圓空心食
前濃米飲下

腎泄 [illegible]圓 治腎泄腹痛無定處似痢非痢骨痛面黧腰
腳時冷用[illegible]湯送下安腎圓 方見虛 七氣湯 [illegible]
震靈丹 治同前每服三十圓炒破故紙萊菔子煎湯調鍾乳
粉少許空心送下小兒腎泄付服褐汁面黧齒脫併入怯
參苓鹽[illegible]未入比二錘乳粉[illegible]以破故紙取熱汁調下
效方見痼冷類
金鎖正元丹 治腎虛泄瀉小便頻數盜汗遺精一切虛冷
之證悉皆治之 方見痼冷類
脾泄 [illegible] 治久患不愈
白朮　白豆蔻　白芍藥　桔梗
右等分為末炎鹽湯調服
[illegible] 即除麻黃五積散治久虛脾泄大效 方見傷寒
[illegible] 治脾元虛弱久患脾泄冷瀉不止反翻胃惡心臟
腑滑泄
厚朴 [illegible]　縮附子 [illegible]
神麴 炒五錢　乾薑 炮[illegible]
右為末酒煮麵糊圓如梧子大每服三十圓空心食前
米飲或鹽湯下
脾腎泄 木香散 治脾胃俱虛泄瀉
肉豆蔻 [illegible]　破故紙 炒　白朮
木香　甘草 炙 [illegible]　白茯苓 [illegible]
右㕮咀散每服三錢生薑三片紅棗二枚煎食前溫服

〔二神圓〕治脾胃虛弱泄瀉不止全不進食、
肉豆蔻弍兩 破故紙肆兩炒
右為末用肥棗肆拾玖箇生薑肆兩切片同煮棗爛去
薑取棗剝去皮核用肉研為膏入藥和杵圓如梧子大
每服二十圓鹽湯下如泄弱甚加茯苓貳兩木香壹兩
積證〔香稜散〕治食傷脾胃噫生熟氣及所泄穢氣殊甚或
腹堅塊痛水煎香稜散感應圓每服三七粒立效久患豆
積泄瀉不止經驗 方具傷寒門及諸積類
〔加味香附湯〕治傷食成積下泄〔巴豆散〕合和每服二錢
紫蘇葉煎湯調常服有效 方具諸氣及脾胃門
酒泄虛者〔葛根圓〕治飲酒多遂成酒泄骨立不能食但再
飲一二盞泄作幾年矣、
爆鹿茸 去毛酥炙黃 肉豆蔻 火煨 生麝香 另研
右為末白陳米飯為圓如梧子大每服五十圓空心服米
飲下 熱者酒蒸黃連圓 方見下痢類
〔四神散〕專治酒泄飲後獨甚加丁香縮砂麥芽神麯各五
錢為末空心服米飲調貳錢立愈、
飧泄又名濡泄〔[illegible]〕
生薑 肆兩切如豆大 黃連 貳兩剉
右一處淹一宿慢火炒薑紫色去薑不用將黃連末每
服二錢用臘茶清調一劑而愈又用米飲酒調治白痢
尤妙若欲速效一料只作二服、

〔五味子散〕治五更天明溏泄一次名腎虛泄感陰氣而然
五味子 陳去枝 貳兩 吳茱萸 半兩
右同炒香熟研為末每服二錢用陳米飲調下食前空
心服貳加破故紙炒香肉豆蔻煨裂為末蒜膏為圓如
梧子大每服三十圓米飲下大效
滑泄〔大斷下圓〕治下痢滑數肌肉消瘦飲食不入脈細皮
寒氣少不能言有時發虛熱由脾胃虛耗耗則穀氣奪穀
氣不入胃胃無主以養故形氣消索五臟之液不收謂之
五虛此為難治略能食者生
附子 炮 肉豆蔻 牡蠣 煅粹各壹兩 細辛
乾薑 炮 良薑 白龍骨 赤石脂
酸石榴皮 醋煮乾為度焙各壹兩半 白礬 枯 訶子 去核各壹兩
右為末糊圓如梧子大每服三十圓粟米湯下
〔豆蔻散〕治滑泄神效
陳米 壹兩 肉豆蔻 麵裹煨 五味子 赤石脂 研各半兩
右為末每服貳錢粟米湯飲調下日進三服
〔乳豆圓〕治滑泄不止諸藥無效、
肉豆蔻 生為末、
右以通明乳香用酒浸透研成膏和前藥末為圓如梧
子大每服五十圓空心服飯飲下
〔實腸圓〕治滑泄妙甚、
蓽撥 川薑 炮 丁香 不見火 附子 炮去皮臍

吳茱萸炒 良薑 胡椒已上各壹兩 山茱萸去核
草豆蔻去皮各半兩
右末棗肉圓梧子大每服伍十圓食前陳米飲下日三服
固腸圓 治臟腑滑泄晝夜無度
吳茱萸揀淨 黃連去須 罌粟殼去瓤蒂各二味各等分
右為末醋糊圓如梧子大每服三十圓空腹米飲下
暴瀉[illegible]散 治所下如破水
生硫黃 白滑石
右為末溫水調下立止
[illegible]散 治暴瀉不止小便不通
車前子右為末每服貳錢米飲調根葉亦可立效

針頭圓 治夏月水瀉不止
大巴豆壹粒去殼
右以針刺定燈上燒存性不可過研細用蠟如小豆大
蘸些油燈上炙令鎔圓巴豆灰作壹圓倒流水吞服食
前一服效
[illegible]圓 治暴瀉不止
神麴壹兩炒 茱萸半兩湯泡七次
右為末用醋糊圓如梧子大每服四十圓食前米飲下
肚蒜圓 治水瀉
豬肚壹枚淨洗去脂膜入大蒜在內以肚子滿為度
自晨至晚以肚蒜爛為度杵成膏子入平胃散同杵

圓如梧子大每服三十圓鹽湯或米飲空心服
[illegible]圓 治暴瀉
肉豆蔻炮 粟殼去蒂瓤醋炙
右為末醋糊圓如梧子大空腹米湯下三十圓
[illegible]方 鍾乳粉一味棗肉為圓治久瀉極甚棗湯下
小兒亦可服
灸法 泄利不止灸臍中名神闕穴五壯或七壯艾炷如小
筋頭大及關元穴三十壯其穴在臍下三寸
真人養臟湯 治大人小兒腸胃虛弱冷熱不調臟腑
受寒下痢泄瀉或便膿血有如魚腦裏急後重臍腹疞痛
日夜無度胸膈痞悶脅肋脹滿全不思食及治脫肛墜下
酒毒便血諸藥不效者並皆治之

罌粟殼去蒂蓋三兩六錢蜜炙 人參去蘆 當歸去蘆各六錢
肉桂去粗皮八錢 訶子去核壹兩 木香不見火壹兩肆錢
肉豆蔻麪裹煨半兩 白朮陸錢 白芍藥壹兩陸錢
甘草捌錢
右剉散每服貳大錢水壹盞半煎至八分去滓食前溫
服老人孕婦小兒暴瀉急宜服之立愈忌酒麪生冷魚
腥油膩 如臟腑滑泄夜起久不瘥者可加炮附子三片
煎服此的有神效或有積用細砂煎湯下感應圓二七
粒俟其積消然後服此
[illegible]圓 治丈夫婦人腸胃虛弱冷熱不調泄瀉煩渴米穀

不化腹脹腸鳴胸膈痞悶脇肋脹滿或下痢膿血裏急後重夜起頻併不思飲食或小便不利肢体怠惰漸即瘦弱並宜服之

黃連去芦鬚貳十兩用吳茱萸貳十兩同炒令赤去茱萸不用　木香四兩八錢不見火

右爲末醋糊圓如梧子大每服貳十圓飯飲吞下空腹食前日進三服

人參散 治瀉後煩渴 方見嘔吐類

世醫得效方卷第五終

世醫得效方卷第六

大方脉雜醫科

下痢

風證 神术散 治[illegible]傷風自汗小便難下痢 方見咳嗽類

[illegible]湯 治風痢純下清血

杏仁七个去皮尖　苦[illegible]　烏梅弍个　草果乙个

酸石榴皮半个　青皮弍个　甘草一寸

右剉散作壹劑水弍盞生薑叁片煎七分露星壹宿次早空腹服

胃風湯 治[illegible] 方見泄瀉類

寒證 人參敗毒散 治寒邪壯熱下痢及所下似痢非痢似血非血色如瀉酒者加陳米百粒同煎 方見傷寒類

不換金正氣散 治臟腑受寒下痢赤白加烏梅陳米煎 方見脾疾類

暑證 六和湯 治冒暑伏熱致成痢疾煩渴小便赤澁 方見傷暑類

香薷散 治同上能分陰陽利水道 方見傷暑類

[illegible]湯 治暑痢 方見泄瀉類

酒蒸黃連圓 治伏熱瀉痢不止用香薷散[illegible]車前草一根煎吞服立效 方見[illegible]傷暑類

濕證 加味除濕湯 治一身盡痛重著浮黃下痢如豆羹汁

半夏麴　厚朴去粗皮薑汁炒　蒼朮米泔浸炒各乙兩　藿香葉
陳皮炒　茯苓各五錢　粉草五錢　官桂
木香各五錢
右剉散每服四錢水壹盞半生薑三片紅棗貳枚煎服
空心仍以五苓散兼服利其小水
艾薑圓治濕冷下痢膿血腹痛婦人下血
乾艾葉四兩炒令焦黃存性　川白薑炮乙兩
右為末醋煮麵糊圓如梧子大每服三十圓溫米飲下
戊己圓治脾受濕氣泄痢不止米穀不化
黃連去鬚　吳茱萸去梗炒　白芍藥各五兩
右剉散每服三錢水壹盞煎至七分去滓溫服

熱證香連圓治冷熱下痢赤黃膿血飲冷不便不利得熱則極心煩燥渴先服一二服湯之須審是實熱方可投用
五苓散加車前子以利小便黃連阿膠圓佐治之因效方見傷暑及咳嗽類
小柴胡湯治下痢赤白心中煩燥渴熱加赤茯苓熟地榆麥門冬淡竹葉煎致方見傷寒陽證類
四君子湯治同上加陳米煎方見傷寒陽證類
烏梅圓治下痢純血臍腹絞痛脉急大數由腸胃久虛或先經下血痢未止服熱藥過毒伏熱淡成血痢
烏梅貳兩燒　黃連去鬚二兩　茱萸　當歸
酸石榴皮各乙兩

右為末醋糊圓如梧子大每服五十圓米飲湯下更以意加減服
香薷散治熱留腸胃下痢鮮血亦名潑火散方見傷暑類
黃連湯治熱證發熱下痢方見泄瀉類
芍藥黃芩圓治泄痢濕熱惡痢頻併腹痛無問膿血並宜服
芍藥　黃蘗各壹兩　當歸　黃連各半兩
右為末水圓小豆大溫水下三四十圓無時候及夜五六服忌油膩脂肥發熱等物熱痢大效
三黃熟艾湯治傷寒四五日大下熱痢諸藥不止宜服此除熱止痢亦作圓子熟水吞下四十圓治時行毒痢良驗
黃芩　黃連　黃蘗各貳分　熟艾半箇雞子大
右剉散每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時
酒蒸黃連圓治身熱下痢鮮血煩躁多渴或傷酒物過度
黃連去鬚四兩　好酒貳勝半
右用酒浸瓦器盛置甑上蒸至爛取出曬乾研為末用麪糊為圓如梧子大每服三十圓熟水吞下又療傷酒過多臟毒下血大便泄瀉用溫米飲下食前一日兩服
白頭翁湯治熱痢下血連月不瘥
白頭翁貳兩　黃連　黃蘗皮　秦皮各三兩
右剉散每服四錢水壹盞半煎至八分不拘時溫服
溫脾湯治冷痢裏急後重腸鳴所下純白腹痛不止手足冷者宜服之

當歸　白芍藥　附子炮　白朮
乾薑炮　厚朴薑製炒　阿膠蛤粉炒，各乙兩　烏梅去核，二兩
右為末，醋糊圓如梧子大，每服五十圓，米飲吞下，空心服。腹痛甚加桂半兩，小便不利加白茯苓壹兩。
大凡痢疾雖體寒，手足逆冷，冷汗自出，六脉沉伏，不宜輕用附子，多因伏暑而得此疾，亦有冷汗自出，四肢逆冷，六脉虛弱，但背寒面垢，或面如塗油，齒乾煩冤，燥渴引飲，此伏暑證也。小柴胡湯、五苓散、酒蒸黃連圓必能奏效。若宜審思耳。方見傷寒陽証傷暑類及食前

水煮木香圓 治純下白痢及淡紅重痢。
罌粟殼去蒂，去瓤，蜜炙，三兩　訶子肉大錢　乾薑炮，四兩

木香　青皮　陳皮　甘草炙，各參
當歸　白芍藥各半兩
右為末，煉蜜圓如彈子大，每服壹圓，新水空心服。

豆蔻散 治脾虛腸鳴，久痢不止。
大肉豆蔻壹枚，剜小孔子，入乳香三小塊在內，以麪裹煨，麪熟為度，去麪。
右為末，每服壹錢，米飲調下。

附子理中湯 正理中湯加炮附子，每料壹兩。

朮附湯、**[illegible]湯** 治同上。方見霍亂、中濕、中暑類。

[illegible]白圓 治臟腑久虛，下痢，空心米飲下，渴者人參湯下。亦治腸風下血。

[illegible]丹、**禹餘粮圓** 治同上。方並見痼冷及虛損類。

[illegible]建脾圓 治男子婦人虛損羸瘦，身體沉重，脾胃冷弱，飲食不消，腹脹雷鳴，泄瀉不止。又治腸虛積冷，下痢清穀，或下純白，腹中㽲痛，及久痢赤白，腸滑不禁，少氣羸弱，不思飲食，並宜服之。
肉桂去粗皮　人參去蘆　黃連去鬚　乾薑
龍骨各乙兩　蜀椒去目及閉口者，微炒出汗，乙兩半　當歸去蘆
大麥蘖炒　石斛去根，各乙兩　附子炮，去皮臍，乙兩　茯苓去皮
細辛去苗，七錢　神麴炒，乙錢　赤石脂乙兩　鍾乳粉乙兩
右為末，入鍾乳粉和勻，煉蜜為圓，如梧桐子大，每服三十圓，食前溫米飲下，日三服。未效，用三建湯吞金粟黃丹數粒。方見痼冷類。

木香散 治脾胃虛弱，內挾風冷，泄瀉注下，水穀不化，臍下㽲痛，腹中雷鳴，及積寒久痢，腸滑不禁。
藿香葉洗去土，四兩　赤石脂　附子去皮臍，炮，各乙兩
丁香　當歸去蘆　肉豆蔻仁　木香
甘草炙，各一兩　訶子皮乙兩半
右剉散，每服三錢，生薑三片，棗子一枚，煎，空心溫服。

五積散 治內傷生冷，下痢，加縮砂、木香、罌粟殼、蜜炙阿膠，大效。方見傷寒陰証類。

[illegible]圓 治虛寒下痢不止。方見泄瀉類。

四柱散 治下痢久，復渴瀉，耳鳴，手冷腹痛，加木香、生薑、棗子、粟米煎，就調服。方見泄瀉類。

赤石脂散 治腸胃虛弱，水穀不化，泄瀉注下，腹中雷鳴，及

陰陽不調下痢赤白腸滑腹痛遲數頻多脇肋虛滿胸膈
痞悶腹脹困倦飲食減少
赤石脂　甘草炙各乙兩
肉豆蔻煨各半兩　縮砂仁二兩　為末每服二錢粟米飲調
冷熱不調下痢〔以六合湯〕
〔香連圓〕治同上方並出温疫
〔駐車圓〕治同上方見後　巳上二方用皆立效
〔氣痢牛乳方〕治冷氣痢泄如鴨溏
蓽撥末二錢　牛乳半升
右同煎減半空腹服效
〔木香交氣飲〕治同上方見諸氣類

〔五膈寬中散〕治同上方見五膈類
〔異香散〕治腹脹氣滿不散腹中膨滿刺痛下痢不止
蓬莪术煨　益智仁　甘草炙　京三稜炮各六兩
青皮去白　陳皮各三兩　石蓮肉乙兩　厚朴薑汁炒二兩
右剉散每服一錢水一盞薑三片棗一枚鹽一捻煎七
分通口服不計時或鹽湯鹽酒亦可
〔木香勻氣散〕治氣痢腹痛綿綿方見諸氣類
積痢治食積下痢腹內脹痛不進飲食指梅湯或米飲吞
服〔感應圓〕或用〔蘇合香圓〕和圓仍用〔平胃散加丁香〕煎
二末鹽湯空心服調理亡安方見脾胃傷冷類
〔戊己圓〕又名〔震靈圓〕治痢止水瀉

硇砂研細各分　辰砂研乙分　巴豆三十粒去殼　黃蠟半兩
右以硇砂為末外將巴豆黃蠟銀石器內重湯煮一伏
時候巴豆紫色為度去十四粒將七粒與硇砂末同研
極勻再鎔蠟搜藥每旋圓如菉豆大每服三粒至五粒
水瀉生姜湯吞下白痢艾湯赤痢烏梅湯五更空心時
服服畢一時不須喫食臨臥服尤佳
〔噤口痢〕〔敗毒散〕治惡心煩手足熱頭痛此乃毒氣上衝心肺
所以嘔而不食每服四錢水一盞半陳倉米一百粒薑三
片棗一枚煎溫服方見傷寒陰證類
〔參苓白术散〕治禁口痢食飲不下棗湯調效方見脾胃類
〔又方〕用石蓮肉留心為末陳米飲下

〔又方〕治心腹虛脹手足厥冷或飲過苦寒藥晨朝未食
先嘔或聞食即吐不思飲食此乃脾胃虛弱山藥一味剉
如小豆大一半銀石器內炒熟一半生用為末米飲調下
自獲其功
〔鯽魚方〕治禁口痢
鯽魚去腸與腸肚入白礬如大豆許同煨熟入鹽醋
喫不過兩枚與痢俱效
〔休息痢〕〔加味養臟湯〕加炮附子青皮烏梅茯苓各五錢治
傷酒肉久痢後或為痢疾休作無時名曰休息痢生薑三片
紅棗貳枚煎方見泄瀉類
〔神效散〕治休息痢氣痢膿血不止疼痛困弱

當歸焙 烏梅肉 黃連

右等分為末，研大蒜成膏，為圓如梧子大，每服貳三十圓，厚朴湯下。一方加阿膠。

【必效五積散】治同上。生薑三片、紅棗一枚、烏梅一箇、木香半錢煎。方見傷寒陰證類。

【駐車圓】治冷熱不調，下痢赤白，日夜無度，腹痛不可忍者，及治休息痢疾，大效。痢方之冠。

黃連去鬚，六兩 阿膠蛤粉炒，三兩 當歸去蘆，洗，三兩 乾薑炮，二兩

右為末，醋煑米糊圓如梧子大，每服五十圓，加至七十圓，空心米飲下。

【秘方養臟湯】治同上。方見後。

【大已寒圓】治虛冷者，效。方見泄瀉類。

【曹參圓】止休息痢，大效。

乾薑炮 建茶各一兩

右以烏梅取肉，圓如梧子大，每服二三十圓，食前米飲下。

【蠱痢茜根圓】治蠱痢及蠱疰下血如豚肝，心煩腹痛，又脉或大或小，浮沉而起，下血如豚肝，五內切痛，此因服五石湯圓逼損陰氣，甚則其血白，白脉經絡而來注下，成蠱毒，此為難治。

茜根 川升麻去蘆 犀角 地榆 黃連 當歸去蘆 枳殼去穰，麩炒 白芍藥

右等分為末，醋糊圓如梧子大，每九十圓，米飲空心下。

【[illegible]】治痢下五色膿血，或如爛魚腸，並無大便，腸中攪痛不可忍，呻吟叫呼，聲聞于外。

粉霜研 輕粉 朱砂研 硇砂研，去砂石 白丁香 乳香半錢 巴豆去殼，七个，不去油

右為末，蒸棗肉為圓，嬰孩叁圓，如粟米大；貳叁歲、四伍歲如麻粒大，每用叁四圓，並旋圓，煎鮮湯吞下，仍間服調胃藥。此證緣久積而成，故小兒多有之。

【蠱疰痢羚羊角圓】治下血黑如鷄肝色，相似時發渴者。

羚羊角屑，一兩半 宣黃連去鬚，二兩 白茯苓去皮，四兩 黃柏去粗皮，蜜炙，一兩半

右為末，煉蜜圓如梧子大，每服五六十圓，蠟茶送下。病危者得生。若血鮮滑瀉不固，欲作厥狀，此藥不可服。當灸臍下氣海、關元貳穴，更服玉華白丹。方見痼冷類。

【參附湯】

人參 綿附子炮，去皮臍 肉豆蔻麵裹，煨裂

右剉散，每服二錢，水一盞半，生薑七片，棗二枚，煎，食前服。

腹痛不止。【薑茶方】治痢下腹痛，肚皮熱，手不可近。

右用生薑切碎如粟米大，草茶相等，煎服效。【又方】煑茶，白痢用蜜，赤痢用薑，當歸湯送下，不止，方見泄瀉類。

【香連圓】治冷熱下痢，腹痛，其肛門所泄皆熱。方見泄瀉類。

【木香勻氣散】治積冷不消，氣滿腹痛，用紫蘇湯調下，未效，用乳香沒藥湯調服。方見諸氣類。

【六和湯】治夏月冒暑，瘧痢俱作，瘧則間日而發，或者

煩燥難禁，齊發瘧之時，痢或暫止，痢則腹痛，晝夜頻數，又胸滿乾嘔，食藥莫下，以此藥治之。用生薑○斤，烏梅壹个，紅棗弍枚，麥門冬弍拾粒去心，煎乃間服。香連圓調茶飲下。未效，用五苓散、香薷飲，仍多服加減清脾湯，更用勝金圓斷之。方見傷暑泄瀉中暑瘧疾類

痢風。加味敗毒散治痢手足拘攣疼痛，加檳榔、木瓜同入，五積散合和，生薑、紅棗煎。方見傷寒陰證類

大防風湯 祛風順氣，活血脉，壯筋骨，逐寒濕，逐冷氣。又治患痢後脚痛瘓弱，不能行履，名曰痢風；或兩膝腫大痛，髀脛枯腊，但存皮骨，拘攣踡卧，不能屈伸，名曰鶴膝風。服之氣血流暢，肌肉漸生，自然行履如故。

熟乾地黃洗　白朮各弍兩　羌活去蘆　人參各乙兩去蘆

川芎洗　附子炮去皮臍乙兩半　防風弍兩去蘆

牛膝去蘆酒浸乙兩切　川當歸洗去蘆乙兩半

黃耆去蘆炒　杜仲去皮炒　白芍藥各弍兩　甘草乙兩炙

右剉散，每服五錢，水壹琖半，生薑七片，大棗壹枚，煎八分，空腹溫服。

獨活圓 治痢後風，手足不能屈伸，或麻豆瘡傳亦令手足筋脉急，亦能治之。

郁李仁　枳殼　川獨活　檳榔

右等分為末，木瓜湯調下，酒亦可。

又方 治脚手皆腫，不能行步。

川烏　赤芍藥　蒼朮泔浸　朱

右為末，糊圓如梧子大，引子同上。

通治木香散 治腹痛痢。

南木香五錢　地榆壹兩　黃連七錢　青皮去穰

赤芍藥　枳殼去穰　乳香　甘草各五錢

右為末，每服貳錢，熱湯調服。

黑豆散

小黑豆炒　川楝子　烏梅　甘草

乾薑　罌粟殼去蒂蓋炒

右剉散，煎至柒分，將紗濾過，控自然汁，空腹服。

當歸散 治瀉痢。

地榆　陳皮　罌粟殼去蒂蓋蜜炙　當歸去尾

赤芍藥　甘草　肉豆蔻煨　加黃連

右等分為末，每服貳錢，冷水調服。

[illegible]圓 治痢神效。

罌粟殼去蒂蓋及蒂中子，[illegible]　生用

右為末，用蜜圓如小指頭大，紅痢生地黃、春茶煎湯嚼下，白痢烏梅甘草節，但為末，貳錢，陳米飲、烏梅湯亦效。

神應散 治痢屢驗絕妙。

金櫻草梗　肉豆蔻　訶子　罌粟殼去蒂蓋

地榆　甘草　當歸去尾　茯苓

白朮　枳殼去穰　烏梅各乙兩　丁皮

木香各一兩 陳皮去白

右爲圓或末五色痢用春茶陳皮煎湯下如是末用蜜壹匙春茶烏梅煎湯調服

又方

金罌子葉及子 罌粟殼去蒂及瓤蜜炙

右爲末用蜜圓如手指大湯引同上

秘方茶梅湯 治五色痢神驗

陳皮去白 枳殼去穰 黃連去鬚 南木香

烏梅去核各五兩 罌粟殼去蒂膜蜜炙乙兩半 厚朴去皮薑汁炒

杏仁去皮尖 甘草各五錢重

右剉散五色黑豆粟子煎紅痢生地黃春茶甘草煎

服五色久不效加龍骨赤石脂人參楊芍藥各一兩爲末蜜圓烏梅甘草湯下粟米飲亦可立效

大阿膠圓 治發熱下痢腹痛至甚肛門痛欲絕者

當歸 阿膠炒 豆蔻煨 龍骨

赤石脂 大艾 黃連各半兩 木香

乳香別研 白礬枯各分

右爲末搗梅肉圓每服五十圓如梧子大陳米飲下

四物湯 治血痢方見婦人科通治類

駐車圓 治同上方見前

九聖圓 治下痢赤白日夜無度裏急外重臍腹痛服之特效

罌粟殼 烏梅 黃連去鬚

南木香 北赤石脂 枯礬 肉豆蔻火煨

乾薑 白茯苓去皮各五兩

右爲末醋煮陳米粉糊爲圓梧桐子大每服五十圓空心米飲下腹痛不止當歸乳香湯下又名緊皮圓

究原湯 治同上

罌粟殼六兩去蒂萼 當歸乙兩 芍藥

榴皮 地榆各二兩 甘草乙兩

右剉散每服五錢水壹盞同煎溫服

木香圓 治久痢不止方見泄瀉類

豆蔻圓 治臟氣虛弱大腸滑泄及數頻併下漸羸瘦不進飲食或久患亦白痢脾泄等疾並皆治之

白朮 白茯苓各三 白薑炮 訶子煨去核

赤石脂別研 丁香不見火 肉豆蔻麪裹煨 沒石子各二

右和勻用湯泡蒸餅爲圓小梧桐子大每服三四十圓米飲吞下粥食前一日三四服蜜肉圓亦可

荊芥湯 治白痢血痢或婦人血崩

荊芥 楮樹皮

右等分剉散治血崩每服二錢水一盞煎至七分去滓放溫服如血痢則爲末冷醋調徐徐呷服白痢熱醋調下神效不可具述

香茸圓 治下痢危困

麝香半錢別研 鹿茸

右鹿茸為末方入麝香以灯心煮棗肉圓如梧子大每
服五十圓空心服每料加滴乳香半两尤效有人苦痢
疾凡平時所用罌粟殼之類不可向口往往不救而死
唯服此等藥或没石子圓作效

益胃散 治血痢方見前

右拌壹两入川續斷㦸末二錢半拌匀每服二錢水一
盞煎七分服方見脾胃類

椿白皮散 治下痢諸藥不效

椿白皮壹握 粳米五十粒 葱白壹握 甘草壹寸或二寸
合水一升取半升頓服小兒量大小加減

百中散 治一切痢不問赤白或一日之間一二百行只一

服便疏再二三服即愈

罌粟殼去蒂穣 [illegible]
厚朴 [illegible]

右為末每服二錢米飲調下忌生冷油膩魚鮓毒物

[illegible] 治同上

石榴皮 陳皮 甘草 川當歸
罌粟殼去蒂穣醋炙各半两

右剉散用水十盞煎取[illegible]次用下藥

茯苓七分 粉草七分 北五味子七个

右為末將前藥汁入此叁味再煎五七沸去滓空心温
服甚者不過兩劑輕者一劑立效

[illegible]散 治痢疾甚者數服止

人參 白朮 當歸 地榆
阿膠各壹分 蚌粉炒黄 甘草各七分 乳香少許
肉豆蔲煨二个

右剉散每服三錢水一盞煎至七分去滓温服仍兼服
烏梅丹方見痼冷類

加減木香散 治一切痢神妙

木香 甘草 當歸 肉豆蔲
人參 官桂 楊芍藥 訶子
烏梅去核 阿膠蚌粉炒 白茯苓各五錢
罌粟殼[illegible]

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片紅棗一枚同煎
去滓空心服

加味四君子湯 治久患痢疾服藥已多而疾不愈且治痢
多是攻取臟腑之藥轉覺難安宜用輕清和氣之藥即愈

人參 白朮 白茯苓
黄耆 甘草 罌粟殼[illegible] 川芎

右各等分剉散每服三錢水一盞半生薑三片棗子二
枚烏梅一个煎温服

[illegible] 治婦人胎前産後赤白痢

生薑自然汁年小者十两年老者二十两 鴨子壹个打碎入薑汁内攪匀

右二味煎至八分入蒲黄三錢煎五七沸空心温服效

驚方　治痢無問赤白、

玄胡索不以多少新瓦上炒過為末每服弍錢米飲調下只一服取效

又方　治暑毒瀉痢

雄黃壹味乾蒸研為末甘草湯調服即效

灸法　泄利食不消不作肌膚灸脾俞隨年壯其穴在第十壹椎下兩傍各去壹寸半

泄利不禁小腹絞痛灸丹田百壯其穴在臍下壹寸又灸臍中一二十壯灸關元穴百壯

泄痢不嗜食雖食不消灸三報穴在俠臍相去五寸一名循際

秘澁

小便不通熱證　八正散　治心經邪熱小便赤澁不通加灯心枳殼車前草地膚子煎（方見積熱類加二味）

五苓散　治小便不通甚上心滿灯心一十莖車前草一握煎湯調（方見傷寒類）

通心飲　治心經有熱唇焦面赤發熱小便不通每服四錢水一盞半灯心十莖滑石末一匕麥門冬二十粒桑白皮七寸煎去滓再入生車前草汁一合攪勻服（方見小方脈科諸熱類）

木通散　治腹脹小便不通

苽蔞仁不以多少為末每服二錢溫酒調（不飲酒用米湯調服通為度）

虛證　八味圓　治腎虛小便秘澁不通或過服涼藥澁秘每服五十圓温酒鹽湯下立效（方見虛損類）

附子散　治小便不通兩尺脈俱沉微乃陰虛故也用淋澁通滑之劑不效者

綿附子（壹兩重炮去皮臍鹽水浸良久）　澤瀉（不蛀者壹兩重）

右剉散每服四錢水一盞半灯心七莖煎服隨通而愈

琥珀散　治老人虛人心氣閉塞小便不通

琥珀一味為末每服一錢濃煎人參湯下有驗

綿黃耆散　治老人氣虛小便閉塞不通

綿黃耆（去芦）　陳皮（去白）　甘草（各等分）

右剉散每服三錢水一盞煎服自然流通

參[illegible]湯　治心虛客熱乘之小便澁數而瀝

赤茯苓（七分半）　生乾地黃　綿黃耆（去芦）　桑螵蛸（炙）

地骨皮（去骨各半兩）　人參（去芦）　北五味子（去梗）

兔絲子（酒浸一宿焙）　甘草（炙各分半）

右剉散每服新水一盞煎臨熟入灯心弍十一莖溫服

轉脬　石韋散　治胞為熱所迫或忍小便俱令水氣迫於胞屈辟不得充張外水應入不得入內溲應出不得出小腹急痛不得小便小腹脹不治害人

寒水石（弍兩）　白滑石（壹兩）　葵子（壹合）　亂髮灰

車前子　木通（去皮節各壹兩）

右剉散水一斗煮取五升時時服一升即利、

八味圓　治虛人下元冷胞轉不得小便膨急切痛經四五

日困篤欲死每服五十圓鹽湯下（方見虛損類）

葵子湯 治小便卒暴不通小腹膨急氣上衝心悶絕欲死此由暴氣乘膀胱或從驚憂暴氣所使膀胱閉而不流氣衝胞系不正

陳皮（去白一兩） 葵子（壹兩） 葱白（弍莖）

右剉散水五升煮取二升分三服

洗方 治胞轉小便不能通先用

良薑 葱頭 紫蘇莖葉（各壹握）

右煎湯密室內熏洗小腹外腎肛門留湯再添蘸綿洗以手撫於臍下拭乾綿被中仰坐垂脚自舒其氣次用

蜀葵子（壹分半） 赤茯苓 赤芍藥 白芍藥（各半兩）

右剉散每服三錢煎取清汁打腰乘熱調蘇合香圓三圓并研細青鹽半錢食前溫服

鹽熨方 炒鹽半斤囊盛熨小腹

葱熨法 治小便難小腸脹不急治殺人用葱白三斤細剉炒令熟以帕子裹分作兩處更替熨臍下即通

大便不通 風秘脾約 麻仁圓 治風秘脾約證小便數大便秘

大黃 赤芍藥 枳殼（各壹兩） 厚朴（半兩）

麻仁（壹兩別研） 杏仁（去皮尖壹兩別研）

右為末煉蜜圓如梧子大每服二十五圓溫水吞服枳殼散溫水調送下尤妙（方見婦人科護胎類）

皂角圓 專治有風人臟腑秘澀大效

猪牙皂角 厚枳殼（去穰） 羌活 桑白皮

檳榔 杏仁（去皮尖別研） 麻仁（別研） 防風

川白芷 陳皮（去白）

右等分為末煉蜜圓如梧子大每服三十五圓溫水吞下蜜湯亦可

又方 皂角圓 治大腸有風大便秘結尊年之人宜服

皂角（炙去子） 枳殼（去穰麩炒）

右等分為末煉蜜圓如梧子大每服七十圓空心食前米飲送下

疎風散 治風毒秘結

枳殼（半兩麩炒） 防風 羌活 獨活

檳榔 白芷 威靈仙 蒺藜（炒去刺）

麻仁（炒另研） 杏仁（去皮尖麩炒另研） 甘草（炙各壹兩）

右剉散每服二錢半生蜜五匙水一盞半煎服

[illegible]圓 治腸胃氣壅風盛大便秘實

皂角（去皮弦子炙） 枳殼（炒） 大黃 羌活

木香 橘紅 桑白皮 香白芷（各等分）

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服七十圓空心米飲下

又方 只用枳實皂角等分為末飯飲為圓亦效（用羌活湯下）

[illegible]圓 治三十六種風七十二般氣上熱下冷腰脚疼痛四肢無力惡瘡下疰疏風順氣專治大腸秘澀真良方也

大黃（五兩半生半熟） 山藥 山茱萸肉

麻子仁（微炒退殼，弍兩，另研） 郁李仁（湯泡去皮，別研，六錢） 兎絲子（酒浸，炒）
川牛膝（酒浸一宿） 防風 枳殼（炒）
川獨活（各弍兩） 檳榔（弍兩） 車前子（弍兩半）
右為末，煉蜜為圓，如梧桐子大，每服二三十圓，用茶酒米飲任下，百無所忌，平旦臨卧各一服，久服自然精神強健，百病不生。
[illegible]圓 治大便秘結。
青皮（去白） 威靈仙（去蘆，洗） 大黃（壹兩）
大戟（壹兩） 牛蒡子（炒）
右為末，每服一錢，人壯實每服二錢，蜜酒調服，畢嗽口。
三仁圓 專治虛人老人風秘，不可服大黃藥者。

杏仁（去皮尖，麩炒黃） 麻子仁（另研） 柏子仁（去殼） 訶子（炮，去核）
右等分為末，煉蜜圓如梧子大，每服二十圓，溫水下。
氣秘 三和散 方見諸氣類
四磨湯 治氣滯腹急，大便秘澁。
大檳榔 沉香 木香 烏藥
右四味，於擂盆內各磨半盞，和勻溫服，有熱者加大黃、枳殼，名六磨湯。
蘇子降氣湯 治氣不下降，大便不通，加枳殼、杏仁。（方見諸氣類）
橘杏圓 治氣秘，老人虛弱人皆可服。
橘紅（取末） 杏仁（湯浸去皮尖，另研）
右各等分，煉蜜圓如梧子大，每服七十圓，空心米飲下。

蘇麻粥 此藥順氣滑大便。
紫蘇子 麻子仁
右二味不拘多少，研爛，水濾取汁，煮粥食之。
小通氣散 治虛人憂怒傷肺，肺與大腸為傳送，致令秘澁，服燥藥過，大便秘，亦可用。
陳皮（去白） 蘇嫩莖葉 枳殼（去穰） 木通（去皮節）
右等分，剉散，每服四錢，水一盞，煎，溫服立通。
積滯秘結 脾積圓 治飲食停滯，腹脹痛悶，嘔惡吞酸，大便秘結。
蓬莪朮（叁兩） 京三稜（弍兩） 良薑（半兩，以上用米醋一升於瓷器內煮乾，乘熱切焙）
青皮（去白，壹兩） 南木香（半兩）

不蛀皂角（大者，燒存性） 百草霜（村庄家鍋底者佳）
右末，用川巴豆半兩，只去殼，研如泥，漸入藥末研和，麪糊圓麻子大，每服五十圓，加至六十圓，橘皮煎湯送下。
[illegible]圓 治食積氣滯，通利大便，兼治腳氣、小腸氣、諸氣攻刺腹痛。
橘紅 青皮（去白） 檳榔（雞心者） 南木香（各半兩）
川巴豆肉（壹分，半研如泥，漸入藥夾研）
右為末，生薑自然汁調神麴末為糊，圓如麻子大，每服十圓，薑湯下，如氣攻腹痛，枳殼木瓜煎湯下。
感應圓 治飲食所傷，三焦氣滯，大便秘澁。
百草霜（用村莊家鍋底上者，刮下研細，秤弍兩） 新揀丁香（壹兩半）

杏仁（湯浸去皮尖雙仁者一百四十個去皮尖麩炒如黃）
南木香（去蘆一兩）　肉豆蔻（去皮用麵裹煨去油十個）
川乾薑（炮裂去皮一兩）　巴豆（七十個去皮心膜研細出油如粉）
右除巴豆粉百草霜杏仁三味外餘四味擣為末與三
味同拌研令細用好蠟匱和先將蠟六兩溶化作汁以
重綿濾去滓更以好酒壹升於銀石器內煮蠟溶數
沸傾出候酒冷其蠟自浮於上取蠟秤用凡春夏修合
用清油一兩於銚內熬令末散香熟次下酒煮蠟四兩
化作汁就鍋內乘熱拌和前項藥末秋冬修合用清油
一兩半同煎煮熱作汁和蠟匱藥末成劑分作小鋌子
以油單紙裹之旋圓服餌

【局方】【半硫圓】治年高冷秘及痃癖冷氣
生硫黃　半夏（湯洗七次等分）
右為末生薑自然汁煮麪糊為圓如梧子大每服三十
圓空心飲下酒亦可
【金液丹】治大便秘冷結滯用麻仁杏仁煎湯下傷寒陰結
亦用（方見痼冷類）
【威靈仙圓】治年高氣衰津液枯燥大便秘結
黃耆（蜜炙）　枳實　威靈仙
右等分為末用蜜圓如梧子大每服五七十圓薑湯熟
水下一方用防風無黃耆忌茶
【五仁圓】治津液枯竭大腸秘澀傳導艱難

桃仁　杏仁（炒去皮尖各一兩）　柏子仁（半兩）
松子仁（一錢二分半）　郁李仁（一錢炒）　陳皮（四兩另為末）
右將五仁別研為膏入陳皮末研勻煉蜜為圓如梧子
大每服五十圓空心米飲下
【潤腸圓】治發汗利小便亡津液大腑秘老人虛人皆可服
沉香（另研一兩）　肉蓯蓉（酒浸焙二兩）
右為末用麻子仁汁打糊為圓如梧子大每服七十圓
空心米飲送下
【又方】治大便秘澀連日不通
麻子仁（去殼半兩研如泥用水濾取汁）　脂麻（半兩微炒研用水濾取汁）
桃仁（湯泡去皮尖麩炒研如泥）　荊芥穗（搗末各壹兩）
右用前藥入鹽少許同煎可以當茶飲之以利為度

【蔥白散】治老人大便不通
蔥白（三大莖）　阿膠（壹片）
右以水煎蔥候熟不用却入阿膠溶開溫服
【胃爽圓】治老人胃寒氣秘大便艱秘每服五十丸米飲空
腹下未效生薑自然汁入熟水少許送下（方見霍亂類）
【黃耆湯】治年高老人大便秘澀
綿黃耆　陳皮（去白各半兩）
右為末每服三錢用大麻仁一合爛研以水投取漿水
一盞濾去滓於銀石器內煎候有乳起即入白蜜一大
匙再煎令沸調藥末空心食前服秘甚者不過兩服愈

常服即無秘澁之虞，此藥不冷不燥，其效如神。

秘澁【麻仁丸】治氣壅風盛，大便秘澁，後重疼痛煩悶。此藥當量虛實加減。

大黃（四兩，蒸）　人參（二兩）　訶子皮（四兩）　麻仁（六兩，別研）

右為末，煉蜜丸如梧子大，每服二十丸，溫湯、酒、米飲任意，食後臨卧服。

【檳榔丸】治大腸實熱，氣壅不通，心腹脹滿，大便秘結。

檳榔　大黃（蒸）　麻子仁（炒，去殼，別研）

枳實（麸炒）　羌活（去芦）　牽牛（炒）　杏仁（去皮尖，炒）

白芷　黃芩（各壹兩）　人參（半兩）

右為末，煉蜜丸如梧子大，每服四十丸，空心熟水下。

【四順清涼飲】治同上，每服二錢，水一盞，燈心十莖，枳殼十片，同煎，立效（方見諸熱類）。

【三黃圓】治熱証大便秘結，每服三十圓，溫水下（方見積熱類）。

【溫脾湯】治腸寒陽結，不能食而大便不下（方見脾胃類）。

【檳榔散】治腸胃有濕，大便秘澁。

檳榔（不拘多少）

右為末，每服二錢，用蜜湯點服，不以時候。

【香蘇散】多加枳殼、檳榔亦效（方見傷寒和解類）。

通治【甘遂散】治大小便不通。

右以甘遂二兩，赤皮者，為末，煉蜜二合和勻，每一兩重分作四服，日進一服，蜜水下，未知，日二服，漸加之。

又方　葵子末三合，青竹葉一把，水一升，煮五沸，頓服。

又方　葵子末二合，水一升，煮去滓，分作二服，猪脂一兩，空心。

又方　治大小便閉格不通，經三五日者，用不蛀皂角燒灰，米湯調下，即通。

又方　猪脂二兩，水壹升，煮三沸，飲汁立通。

【八正散】治同上（方見諸淋類）。

【推車散】治大小便秘，經月欲死者。

推車客七个　土狗七个

（如男子病，推車客用頭，土狗用身；如女子病，推車客用身，土狗用頭。）

右新瓦上焙乾，為末，用虎目樹皮向南者，濃煎汁調，只一服，經驗如神。

又【掩臍法】治大小便不通，用連根葱一莖，帶土不洗，以生薑一塊，淡豉貳十壹粒，鹽二匙，同研爛，捏餅，烘熱，掩臍中，以帛札定，良久氣透自通，不然，再換一劑。

通治大便不通【大潤腸圓】大便秘澁通用。

杏仁（去皮尖，麸炒）　枳殼（去穰，麸炒）　麻仁　陳皮（各半兩）

阿膠（炒）　防風（各二錢半）

右為末，煉蜜丸梧桐子大，每服五十丸，老者蘇子煎湯下，壯者荊芥泡湯下。

【獨棗湯】治大便積日不通。

大好棗（去核，擘開，入輕粉半錢）

右以棗相合，麻線扎縛，慢火煮熟，嚼細，以棗汁送下。

[illegible]治陰結至晷昏不知人生大螺一二枚以鹽一匕和殼生搗碎置病者臍下一寸三分用寬帛緊繫之即大通未效烏桕木根三寸研井水服亦效就多研爛敷臍下亦可

蜜兌法 蜜三合入猪膽汁兩枚在內煎如飴以井水出冷候凝撚如指大長三寸許納下部立通活人書單用蜜一法入皂角末在內尤效用法入薄荷末代皂角用尤妙又或偶無蜜只嚼薄荷以津液調作挺用之亦妙

提盆方 獨頭蒜煨熟去皮以綿裹納後部即通

熏方 不蛀皂角用碗燒置於桶內熏其後部自通

老人臟腑秘不可用大黃老人津液少所以臟腑秘澁更服大黃以瀉之津液皆去定須再秘甚於前只可服寬潤大腸之藥更用槐花煎湯淋洗亦效更有老人發熱而大腑秘澁或因多服丹藥脾胃虛弱表化不行遂為臟腑積熱須用神保圓得通瀉一行熱亦即退

○脹滿

風寒暑濕脹 大正氣散 治脾胃怯風寒濕氣傷動沖和心腹脹滿有妨飲食

厚朴(薑製) 藿香葉 半夏(湯洗七次) 橘紅
白术(各一兩) 甘草(炙) 檳榔 桂枝(不見火)
枳殼(去穰麩炒) 乾薑(炮各半兩)

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片棗子二枚煎至七分去滓不以時溫服

[illegible] 治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃心腹脹滿連兩脇妨悶頭暈嘔逆脈來浮弦

防風(去芦) 桂枝(不見火) 枳殼(去穰麩炒) 赤芍藥
桔梗(去芦炒) 木香(不見火) 人參 檳榔
當歸(酒浸去蘆) 川芎 橘紅 甘草(炙各半兩)

右剉散每服四錢水一盞薑五片煎七分不拘時溫服

[illegible] 治七氣流滯飲食不下氣滿臟脹(方見五臟門)

[illegible] 調榮衛利三焦行痞滯消脹滿(方見諸氣類)

[illegible] 治憂怒相乘神志不守思慮兼并擾亂臟氣不主傳導使諸陽不舒反順為逆中寒氣脹腸鳴切痛胸脇逆滿嘔吐不食

附子(炮去皮臍) 半夏(湯洗七次) 粳米(各三分)
甘草(炙半兩) 乾薑(炮各一分)

右剉每服二錢水二盞棗三個煎至七分去滓食前服

[illegible]湯 治憂思聚結脾肺氣凝陽不能正大腸與胃氣不平脹滿衝欬食不得下脈虛而緊澁

附子(炮去皮臍) 當歸 厚朴(去皮薑製炒) 人參
橘皮 白芍藥 甘草(炙各一兩) 乾薑(炮半兩)
川椒(炒出汗去合口者各三分)

右剉散每服四大錢水二盞煎七分去滓食前服

[illegible] 治中脘脹滿時復脇肋痛甚每噫則氣快

氣不噎則悶亂嘔噦面浮黃腫積聚，入紫蘇同煎下神保圓五柒圓 一方並見諸氣類

穀脹【大異香散】治失飢傷飽痞悶停酸早食暮不能食名穀脹

京三稜　蓬朮　青皮　陳皮

半夏麴　藿香　北梗　益智仁

枳殼 製　香附子 炒去毛各半兩　甘草 各炙三分

右剉散每服三錢水一盞半薑伍片棗二枚煎服

【[illegible]圓】治痞滿脹痛穀脹氣脹通用

蓽澄茄　白豆蔻仁　縮砂仁　青皮

蘿蔔子　木香 各二分　肉豆蔻 煨　茴香 炒

辣桂　丁香 各一分半　陳皮 各三分

右為末麪糊丸梧桐子大每服三十丸陳皮湯下

水脹【[illegible]湯】治脾土受濕不能制水水漬於腸胃溢於皮膚漉漉有聲怔忪喘息名水脹

半夏 湯洗　陳皮　茯苓　桔梗

檳榔　甘草 各等分

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片煎溫服

【[illegible]圓】治同上 一方見諸疝類

血脹【人參芎歸湯】治煩燥嗽水迷忘驚狂痛悶喘急虛汗厥逆小便多大便黑名血脹

當歸　半夏 製各三分　川芎 七兩　蓬朮 煨

木香　縮砂仁　烏藥　甘草 炙各半兩

人參　辣桂 去粗皮　五靈脂 炒各一分

右剉散每服三錢薑五片棗一枚紫蘇四葉煎食前服

熱脹【七物厚朴湯】治腹滿發熱以陽并陰則陽實陰虛陽盛生外熱陰虛生內熱脈必浮數浮則為虛數則為熱陰虛不能宣導飲食如故致脹滿者為熱脹

厚朴 薑製一兩　甘草 炙　大黃 各三分　枳實 麩炒半兩

桂心 一分

右剉散每服四錢水一盞半生薑七片棗二枚煎至七分食前服嘔加半夏利者去大黃寒多則加生薑十片煎

【[illegible]圓】治三焦痞塞氣不升降胸膈脹滿大便秘澀小便赤澀並宜服之

大黃　陳皮　檳榔　枳殼 去穰麩炒

黃芩　黑牽牛 半生半炒各等分

右為末蜜丸如梧桐子大每服五七十丸臨臥以溫熟水下更量虛實加減

寒脹【朴附湯】治老人虛人中寒下虛心腹膨脹不喜飲食脈來浮遲而弱此名寒脹

附子 炮去皮臍　厚朴 薑製

右等分剉散每服四錢水一盞半生薑七片紅棗一枚煎至八分去滓溫服不拘時候加少木香尤佳

【順氣木香散】治氣不升降嘔逆惡心胸膈痞悶脇肋脹滿

及酒食所傷噫氣吞酸心腹刺痛大便不調面色痿黃肌肉消瘦不思飲食兼婦人血氣刺痛及一切冷氣並治之

丁皮不見火 縮砂仁 良薑去蘆 肉桂去麄皮

乾薑炮 甘草炙 陳皮去白 厚朴去麄皮薑汁炙

蒼朮米泔浸 桔梗去蘆 茴香炒各三兩

右剉每服弍錢水一盞生薑三片棗弍枚煎至七分稍熱不拘時或入鹽少許沸湯點服寛中順氣和胃進食

食脹 溫中湯 治脾胃不和食啖生冷過飲寒漿多致腹脹心下痞滿有妨飲食甚則腹痛

乾薑炮去土 白朮各二兩 青皮去白 橘紅

人參 附子炮去皮臍 厚朴薑製 甘草炙各半兩

草果仁 丁香各三兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片大棗弍枚煎至七分去滓溫服不拘時嘔者加半夏半兩或食積致脹滿加蘿蔔子半兩

厚朴湯 治虛人老人喜啖生冷多致腹脹心下痞滿有妨飲食或刺痛滑利氣痞滯悶

厚朴去皮細剉 甘草細剉 生薑洗切 青州棗切各等分

右以厚朴甘草搗令得所方入生姜并杵令勻取出同棗焙令浥浥微燥却入鍋內慢火炒至紫色再焙乾爲末每服一大錢擦生薑少許沸湯點空腹以知爲度氣味甚美兼能愈疾又易修合

桂香圓 治大人小兒過食雜果腹脹氣急

肉桂不見火一兩 麝香一錢別研

右爲末飯丸如菉豆大大人十五圓小兒七圓不拘時候熟水送下未痊再服

獨聖散 治脾胃不定過食瓜果心腹堅脹痛悶不安

鹽炒令白

右用水壹升煎消頓服自吐下即定或因食菱令人腹脹暖酒和姜汁飲一兩盃即消

感應圓 治積食停滯脾胃作脹方見秘澁類

□□圓 治溫疫怯弱脾胃易傷因飢積聚中脘脹滿心腹堅硬疞痛攻衝牽引小腹如盤之狀方見虛損類

溫白圓 治心腹積聚久癥癖塊腹脹心下堅硬大如杯碗傍攻兩脇心痛積年食不消化

吳茱萸湯洗七次焙乾 桔梗 柴胡去蘆

菖蒲 紫菀去苗葉土 黃連去鬚 乾薑炮

肉桂去麄皮 茯苓去皮 蜀椒去目及閉口者炒出汗

人參去蘆 厚朴去麄皮薑汁炙 巴豆去皮心膜出油炒研各半兩

川烏炮去皮臍 皂莢去皮子炙各半兩

右爲末入巴豆令勻煉蜜圓如梧子大每服三十丸紫蘇湯下取下積滯如魚腦爛綿而安

鼓脹 木香散 四柱散 治脾胃虛憊腹脹如綳鼓氣急喘促全不進食甚方見脾胃類 四柱散方見泄瀉類

[illegible]治傷冷滯下腹肚膜脹其狀如鼓搭搖喘息
奔急冒悶張口吐氣上下不得分泄
厚朴去皮薑汁制 枳實麩炒 乾薑炮
良薑 青皮去白 陳皮去白 肉桂去粗皮
全蝎去尾足毒
右為末醋糊圓如梧子大每服三十丸生姜橘皮湯吞
下或紫蘇湯下
三稜煎圓 見木香圓 治心腹堅脹喘滿短氣緊促噎氣
不通飲食不消或嘔逆吐痰或腸中水聲大便或秘或泄
二藥合和每服三十圓食後米飲下 方見諸氣諸証類
四炒枳殼圓 主服脹鼓疾
枳殼去穰切作片子 分四分
右分作四分每分一兩一分用剉碎蒼术一兩同炒一
分用蘿蔔子一合同炒一分用乾漆一兩同炒一分用
茴香一兩同炒各以枳殼黃為度只取枳殼一味為末
却將蒼术等四味用水一椀煮至一椀半去滓取汁煮
麪糊為丸如梧桐子大每服五十丸食後米飲下
氣針圓 專治氣脹
全蝎去毒 木香 丁香不見火 胡椒
肉豆蔻 檳榔 片子薑黃 青皮
右為末用蘿蔔子炒淨退殼取仁四兩爛研和藥令勻
紅酒生姜汁各少許煮糊丸如梧子大每服四五十圓
紫蘇陳皮湯下不以時候
[illegible]湯 治氣滯實食腹中脹滿刺痛 方見脾胃類
[illegible]圓 治諸痞塞痞不通腹脹如鼓大便結秘等証又
腎氣小腸氣等功效尤速
青皮 莪术 胡椒
三稜 檳榔 吳茱萸 赤芍
石菖蒲 乾薑 附子
右各剉碎與所註藥炒熟去水蛭等不用秖以青皮等
十味為末酒糊丸如梧子大每服五十丸加至七十圓
空心紫蘇湯吞下
[illegible]散 治腹脹堅如鼓溢如木皮樣
杜烏藥 荊芥 蒼朮 甘草
山茵蔯 夏蠶沙 松毛 樟根葉
北蒜 螃蜞葉 橘葉 [illegible]
烏豆 赤豆 菖蒲各等分
右剉細分作二次炒熟以布袋盛熨腫處冷又炒熨三
四十度或後用煎水熏洗或服神保圓微溏泄去其氣
[illegible] 治腹緊硬如石或陰囊腫大先用熱水噴甘草後用
大戟 芫花 甘遂 海藻各等分
右為末醋調塗或用白麪和藥調一片覆肚上
[illegible]沉香飲 治腹脹氣喘坐臥不得
沉香 木香 枳殼各半兩 蘿蔔子炒一兩

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片煎七分溫服

〔木香枳殼丸〕治脾虛腹脹不進飲食快氣寬中

蘿葍子炒 檳榔 黑牽牛炒 木香各半兩

右爲末水糊圓梧桐子大每服三十圓薑湯食前下

〔灸法〕腹脹心滿不下食灸脾腧隨年壯穴在第拾壹椎下兩傍各去脊寸半

胷滿心腹積聚痞痛灸肝腧百壯穴在第玖椎下兩傍各去脊壹寸半

腹脹滿繞臍結痛堅不能食灸中守穴百壯在臍上一寸一名水分

脹滿瘕聚滯下冷疼灸氣海百壯穴在臍下一寸五分

腸中雷鳴不消灸大腸腧四十九壯穴在第十六椎下兩傍各去脊寸半

溏泄腸中雷鳴相逐痢下灸承滿五十壯穴在挾巨闕相去三寸巨闕在心下壹寸灸之者侠巨闕兩邊各二寸半

五臟六腑心腹滿腰背疼飲食吐逆寒熱往來小便不利羸瘦少氣灸三焦腧隨年壯穴在十三椎下兩傍各壹寸半

世醫得效方卷之六終

世醫得效方卷第七

○大方脈雜醫科

○消渴

〔猪肚圓〕治氣血虛熱在上焦心煩燥渴引飲無度小便數晝夜一二十行有麩片甜者此疾多得之飲啖炙煿日就羸瘦咽喉脣口焦燥吸吸少氣不能多語兩脚痠食倍於常不爲氣力

牡蠣粉 苦參 密陀僧 知母

水銀以白蠟結砂 栝樓根壹兩 黃丹壹兩半炒與水銀砂同研

右爲末男子用雌猪肚壹箇女人用雄猪肚壹箇入藥在內以線縫定用新甎襯在新甎上別用生栝樓半斤切碎同蒸早晨至午時取藥出不用栝樓根只搗研猪肚和藥爲圓如梧桐子大每服三十粒食前米湯下日三服十日可去病根

〔眞珠圓〕治心虛煩悶或外傷暑熱內積愁煩酣飲過多或致煩渴口乾舌燥引飲無度小便或利或不利

知母壹兩 川連去毛壹兩 苦參 玄參各壹兩

鐵胤粉壹兩研 牡蠣煅壹兩 朱砂另研貳兩

麥門冬去心 天花粉各半兩 金箔 銀箔各貳伯片

白扁豆薑汁炒壹兩

右爲末煉蜜入生栝樓根汁少許圓如梧子大用金銀

豬肚為衣每服二十圓至三十圓先用栝樓根汁下一服
次用麥門冬熟水下病退日二服忌炙煿酒色次投蓯
養圓補

蓯蓉圓

蓯蓉酒浸　磁石煆碎　熟地黃洗　山茱萸去核
黃耆去蘆鹽湯浸　澤瀉　鹿茸去毛切酥炙　遠志去心炒
石斛　覆盆子　五味子去梗　萆薢
破故紙炒　巴戟酒浸　兎絲子酒浸　龍骨
杜仲去皮剉姜汁拌炒斷絲各半兩　附子炮去皮臍各壹兩
右為末煉蜜圓梧桐子大每服伍拾圓空腹米飲下

生地黃膏治消渴[illegible]

生地黃[illegible]　冬蜜去白膜　人參半兩
白茯苓去皮壹兩
右將地黃洗切研細以新水壹椀調開同蜜煎至半次入參苓末拌和磁器盛收匙挑服

脾消之證飲食入腹如湯潑雪隨小便而出落於溷廁溝渠中皆旋結如白脂肌膚日益消瘦用熱藥則熱愈甚用涼藥則愈見虛羸不能起止精神恍惚口舌焦乾或陽強興盛不交而泄其證不久無治法姑錄一二方聊為備用

[illegible]治消中多因外傷瘴熱內積憂思喜啖鹹食及炙煿致脾胃乾燥飲食倍常不為肌膚大便反堅小便無度

生薑研汁　鯽粉

右搜勻每服貳錢匕長流水調下兩瀉是效次投附子
豬肚圓補

附子豬肚圓

附子炮去皮臍　檳榔各壹兩微炒　當歸
知母　木香　川楝子去核　秦艽去苗土
大黃酒蒸　龍膽草　白芍藥　破故紙酒浸炒
枳殼去穰麩炒各半兩
右為末分作叁分將貳分入豬肚內縫定用蚕酒三升童子小便五升同入砂銚內煮乾爛研細入一分末同搜擣為圓梧桐子大每服五十圓溫酒米湯任下

白术散治消中消穀善饑

人參去蘆　白术去蘆　白茯苓　甘草炙
藿香葉去土各壹兩　白乾葛壹兩　木香半兩
加北五味揀去梗　柴胡去毛　枳殼去穰各半兩
右剉散每服叁錢新水煎去滓不拘時候

[illegible]圓治消中煩熱消穀小便數

人參去蘆　茯神去木　生乾地黃去土　黃連淨
麥門冬去心　枳殼去穰　牡蠣粉各壹兩　遠志肉去心
黃耆炙去蘆　知母去毛　瓜根各半兩
右為末煉蜜和擣叁伯杵圓如梧桐子大每服伍拾圓清粥飲下

腎消[illegible]圓治腎水枯竭不能上潤心火上炎不能

既濟丸[illegible]而生心煩燥渴小便頻數白濁陰痿弱飲食不
美肌膚漸瘦削或腿腫腳先瘦小宜降心火生腎水其
煩渴頻止

熟地黃 [illegible] 真山藥 [illegible]
山茱萸 [illegible] 肉桂 去粗皮不見火
澤瀉 [illegible] 牡丹皮 去骨
白茯苓 [illegible] 真北五味 [illegible]

右爲末煉蜜圓梧桐子大五更初未言語時溫酒鹽湯
下三五十圓午前及晚間空腹再服此方用真北五味
子最爲得力服此不惟止渴亦免生癰疽久服永除消
疾氣血加[illegible]

天王補心丹 寧心保神益血固精壯力強志令人不忘清
三焦化痰涎祛煩熱除驚悸療咽乾口燥育養心氣

熟地黃 洗 人參 去芦 白茯苓 去皮 遠志 去心
石菖蒲 去毛 玄參 柏子仁 別研 桔梗 去芦
天門冬 去心 丹參 洗 酸棗仁 去殼 甘草 炙
麥門冬 去心 百部 洗 杜仲 薑汁炒 茯神 去木
當歸 去蘆 五味子 去梗

右爲末煉蜜圓每兩作拾圓金箔爲衣每服一圓燈
心棗湯化下食後臨卧服作梧子大圓吞服亦可

鹿茸圓 治失志傷腎腎虛消渴小便無度

鹿茸 去毛切酥炙 麥門冬 去心 熟地黃 [illegible]
黃芪 去芦 雞肶胵 麩炒 肉蓯蓉 酒浸 山茱萸 去核
破故紙 炒 川牛膝 酒浸 五味子 [illegible] 白茯苓 去皮
地骨皮 各半兩 人參 去芦 [illegible]

右爲末蜜圓如梧子大每服三十圓至五十圓米湯下

[illegible]圓 治腎虛[illegible]渴燥渴等候

鹿角膠 [illegible] 沉香 [illegible] 澤瀉 [illegible] 覆盆子
白茯苓 去皮 人參 去芦 宣木瓜 薏苡仁 炒
黃芪 [illegible] 熟地黃 [illegible] 肉蓯蓉 [illegible] 兔絲子 [illegible]
五味子 石斛 當歸 [illegible]
生鹿茸 [illegible]

右爲末煉蜜圓梧桐子大朱砂爲衣每服[illegible]圓空心
棗湯送下

[illegible]石圓 治[illegible]盛壯之時不自謹惜恣意[illegible]年高腎
氣虛弱惟不能房事多服丹石真氣既盡石氣孤立唇口乾
焦精液自泄小便赤黃大便乾實小便晝夜無度當
除熱補虛

白茯苓 去皮 天花粉 宣連 白扁豆
人參 去芦 石膏 甘草節 寒水石
白朮 去芦 豬苓 各等分

右爲末每服貳錢熱湯調服立效

[illegible]湯 治強中[illegible]因耽嗜色慾及快意飲食或服丹
石真氣既脫熱邪獨盛陰陽致煩渴引水飲食倍常陰氣常興

不交精出故中焦虛熱注於下焦三消之中最爲難治
薺苨　石膏各叁兩　人參去蘆　茯神去木
栝樓根　磁石煅碎　知母去毛　乾葛
黃芩去心　甘草各貳兩
右剉散每服用水叁盞猪腰子壹箇去脂膜黑豆壹合煎
至壹盞半去腰子黑豆入藥肆錢煎至七分去滓食後
服下焦熱則夜間服治此方服次投補藥

猪肚圓治強中消渴服薺苨散薺苨湯後便可服此
亦能補養
猪肚雄者壹枚治如食法　黃連去鬚　小麥炒各伍兩　天花粉
茯神去木各肆兩　麥門冬去心貳兩
右五味爲末內猪肚中縫塞安甑中蒸之極爛木臼中
杵可圓如梧桐子大每服七十圓米飲送下隨意服之
如不能圓入少煉蜜

罌粟湯治服消渴解五石毒
罌粟子　右煑稀粥入蜜飲之

三黃圓治丹石毒及熱渴以意測度須大實者方用
春　黃芩肆兩　大黃叁兩　黃連肆兩
夏　黃芩陸兩　大黃壹兩　黃連柒兩
秋　黃芩陸兩　大黃貳兩　黃連叁兩
冬　黃芩叁兩　大黃伍兩　黃連貳兩
右爲末煉蜜圓梧桐子大每服十圓服一月病愈

烏梅木瓜湯治飲酒多發積爲酷熱熏蒸五臟津液
枯燥血泣小便併多肌肉消鑠專嗜冷物寒漿
木瓜乾　烏梅打破不去仁　麥蘗炒　甘草
草果去皮各半兩
右剉散每服四錢水壹盞半生薑五片煎七分不拘時服

枳椇子圓治同上
枳椇子貳兩　麝香壹錢
右爲末麪糊圓梧桐子大每服三十圓空心鹽湯吞下

三[illegible]湯治同上
烏梅肉　遠志去心以甘草水煮焙各壹兩　枳實去瓤麩炒壹兩
夏加黃連伍錢春秋冬不用
右剉散每服肆錢水兩盞糯禾根壹握煎七分去滓不
拘時溫服若無糯禾根白茅根亦可如無白茅根禾稈
繩代之亦可

鹿茸圓治同上
鹿茸酥炙去毛壹兩　山藥　兔絲子酒浸一宿
右爲末煉蜜圓梧桐子大每服三十圓食前米飲下濃
煎人參湯亦可

黃連圓治消渴小便滑如油頭數者
黃連去鬚　瓜蔞連瓤各等分
右爲末生地黃自然汁圓如梧子大每服五十圓食後
牛乳汁下酪湯下一日二服忌冷水猪肉或研麥門冬

自然汁為圓熟水吞下

硃砂黃連圓 治心虛蘊熱或因飲酒過多發為消渴

朱砂別研一兩 宣連三兩 生地黃二兩

右為末煉蜜圓如梧子大每服五十圓燈心棗湯吞下

酒蒸黃連圓 治膈熱解酒毒止渴厚腸胃方見下痢類

通治

菟絲子圓 治三消渴利神藥常服禁精止白濁延年

菟絲子酒浸研爛焙乾拾兩 五味子去梗酒浸柒兩 白茯苓去皮 乾蓮肉各三兩

右為末別研山藥末陸兩將所浸酒餘者添酒煮糊為圓如梧子大每服五十圓天花粉北五味子煎湯下溫酒鹽湯亦可脚膝無力木瓜湯下

清心蓮子飲 治心中蓄熱時常煩燥因而思慮勞力憂愁抑鬱是致小便白濁或有沙膜夜夢走泄遺瀝澀痛便赤如血或因酒色過度上盛下虛心火炎上肺金受尅口舌乾燥漸成消渴睡臥不安四肢倦怠男子五淋婦人帶下赤白及病後氣不收斂陽浮於外五心煩熱藥性溫平不冷不熱常服清心養神秘精補虛滋潤腸胃調順血氣

黃芩去心半兩 黃耆蜜炙 石蓮肉去心 白茯苓去皮 人參各七錢半 麥門冬去心 甘草 地骨皮去骨 車前子半兩

右剉散每服五錢麥門冬十粒去心水一盞半煎取八分去滓水中沉冷空心服發熱加柴胡薄荷煎

六神湯 治三消渴疾

蓮房 乾葛 枇杷葉去毛 甘草炙 栝樓根 黃耆蜜炙各等分

右剉散每服四錢水一盞煎七分去滓溫服小便不利加赤茯苓

人參白皮湯 治三消渴病或飲多利少或不飲自利肌膚瘦削四肢倦怠常服補虛止渴利

桑根白皮新者刮去粗皮炒 白茯苓去皮 人參去蘆 麥門冬去心 乾葛 乾山藥 桂心去粗皮 甘草半兩生用

右剉散水一盞半煎至七分去滓溫服

□□湯 治三消渴利神效

糯穀旋炒作白花 桑根白皮厚者切細

右每用秤壹兩許水壹大碗煑取半碗渴則飲不拘時

文蛤散 治渴欲飲水不止

文蛤五兩

右為末以水飲任調方寸匕不拘時服

□□圓 治嶺南山瘴風熱毒氣入腎中變寒熱脚弱虛滿而渴者

宣連去鬚不拘多少為末 生地黃取汁 生栝樓根汁 羊乳無則以牛乳或人乳代之

右以三汁搜和為圓如梧子大每服三五十圓粥飲下

一法濃煎小麥飲下

〔[illegible]湯〕合〔[illegible]散〕治消渴方見中暑門 又方見暑類

〔生地黃飲子〕治消渴咽乾面赤煩燥

人參去蘆　生乾地黃洗　熟乾地黃洗　黃耆蜜炙

天門冬去心　麥門冬去心　枳殼去穰麩炒　石斛去根炒

枇杷葉去毛　澤瀉　甘草炙各等分

右剉散每服三錢水壹盞煎至六分去滓食後臨卧溫服此方乃全用二黃圓甘露飲料生精補血潤燥止渴佐以澤瀉枳殼疏導二腑使心火下行則小腑清利肺經潤澤則大腑流暢宿熱既消其渴自止造化精深妙無踰此

〔[illegible]湯〕治大渴

右深掘大栝樓根削去麁皮寸切以水浸一日夜一易水浸五日取出爛研細絹絞汁如作粉法乾之水服方寸匕日三四服入牛乳一合服尤好

〔[illegible]湯〕治心火上炎腎水不濟煩渴引飲氣血日消

人參去蘆　遠志去心甘草水煮　熟地黃洗去土酒蒸　白茯苓去皮　黃耆蜜炙去蘆　當歸去蘆　北五味子去梗

甘草炙半兩各　天花粉壹兩

右剉散每服三錢水壹盞半棗一枚煎食前服

〔[illegible]圓〕補虛治濁止渴潤腸婦人血海冷白帶白淫白濁

黃蠟　雪白茯苓各[illegible]兩

右茯苓為末溶蠟和圓彈子大每服壹圓不飢飽細嚼下棗湯亦可

〔[illegible]散〕治渴證小便滑數而濁兼有油濁用燈心茯苓煎湯下方見心恙類

〔[illegible]散〕治渴疾飲水不止

白浮石　蛤粉　蟬殼

右為末用鯽魚膽七箇調七錢服不拘時候神效

〔三消圓〕治消渴骨蒸

宣連去鬚為末不以多少剉冬瓜肉研裂自然汁和成餅子陰乾再為末再用汁浸和如是七次即用冬瓜汁為圓如梧桐子大每服三四十圓以冬瓜汁煎大麥仁湯送下尋常渴止一服

〔[illegible]散〕治消渴虛熱者尤佳

乾浮萍　栝樓根等分

右為末以人乳汁和圓每服二十圓空腹米飲下日二三服三年病者三日可又白芷末水調服止

〔又方〕

鉛丹貳兩　附子壹兩　乾葛　栝樓根各參兩

右為末煉蜜圓每服十圓米飲下日三服渴則服之治日飲水至一石者春夏去附子

〔[illegible]散〕治胃虛發渴

白朮壹兩　人參去蘆　白茯苓　甘草各半兩

右為末每服柒錢水一盞半煎至七分服凡渴之後多
有癰疾仍須服復元丹數服

人參湯 治消渴

人參去蘆 桔梗去蘆 天花粉 甘草各壹兩
綿黃耆鹽湯浸 白芍藥 白茯苓去皮 北五味各壹兩半

右剉散每服四大錢水一盞半煎八分日進四服合滓煎

雞蘇圓 治病後虛羸發渴

右雞蘇圓以北五味煎湯吞下 方見失血

蠶繭湯 治消渴

蠶繭 [illegible] 川黃連 [illegible]

右用蒸餅圓如梧子大每服五十圓煎蠶空茄根湯下臨

卧服次日加至伍拾圓以後每日伍圓至叁拾圓止服
藥後以見水惡心為度即住服不過五六服必效 [illegible]
惡心但每日食乾物壓之旬日後自定 [illegible]
[illegible] 蠶蛾了空 [illegible]

[illegible] 治渴疾愈須預防發癰疽

忍冬草 [illegible]

右以米麴酒於瓶內浸以糠火煨一宿取出曬乾入甘
草少許為末即以所浸酒為糊圓如梧子大每服五十
圓至百圓酒飲任下不拘時候此藥不特治癰亦能止
渴并五痔諸漏

[illegible] 治不渴而小便大利以牡蠣末取患人小便煎服

單方治渴

糯稻稈灰取中一尺燒淋汁飲或不燒便煎服亦妙
生牛乳細呷或生葛搗取汁時飲少許

繅絲湯 治渴神效

[illegible] 繅絲湯任意飲之頓效如非時以絲或綿煎湯服

效驗方 治消渴有蟲

苦楝根取新白皮壹握切焙入麝少許水貳碗煎至一
碗空心飲之雖困頓不妨自後下蟲三四條狀如蚘蟲
其色真紅而渴頓止乃知消渴一證有蟲耗其精液
凡消渴大忌飲酒房事食油麵煎炙糟藏鹹酸一切熱
物百日以上不可鍼灸 [illegible] 瘡中出膿水不止成漏 [illegible]

不止則死

○漩濁

心濁 治 [illegible] 傷心便下赤濁

白茯苓去皮 石蓮肉去心 龍骨生用 天門冬去心
遠志 [illegible] 柏子仁 [illegible] 紫石英 [illegible]
當歸 [illegible] 酸棗仁 [illegible] 龍齒 [illegible] 乳香 [illegible]

右為末煉蜜圓梧桐子大朱砂為衣每服七十圓空心
溫酒棗湯任下

[illegible]飲 治心中客熱煩躁不得眠 [illegible]

石蓮肉 白茯苓 [illegible] 益智仁 麥門冬
遠志 [illegible] 人參 [illegible] 石菖蒲

車前子　白朮　澤瀉　甘草各貳分

右剉散每服三錢燈心貳拾莖煎服有熱加薄荷少許

寧志膏 治心臟虧虛神志不守恐怖不常驚多恍惚喜忘睡臥不寧夢涉危險一切心疾並皆治之

人參去芦　酸棗仁各壹兩

辰砂研細水飛半兩　乳香壹分以乳缽坐水盆中研

右為末煉蜜圓如彈子大每服一圓溫酒化下棗湯亦可空心臨臥服

[illegible] 補諸虛不足益血收斂心氣治怔忪不寧精神恍惚睡臥不安赤白濁甚

柏子仁別研　遠志去心　酸棗仁去殼炒　紫石英火煅醋淬

熟乾地黃洗　川當歸洗浸去芦　白茯苓去皮

茯神去皮　人參去芦　黃耆去芦蜜炙　阿膠蛤粉炒

肉桂不見火各壹兩　龍齒壹兩半　辰砂別研

右為末煉蜜圓如梧子大每服三四十圓棗湯食後臨卧吞服

[illegible] 治男子婦人小便赤濁淋瀝諸藥不效者

五苓散　辰砂妙香散

右和勻用天門冬麥門冬去心煎湯空心調服一大錢一日三服當頃愈

[illegible] 治小便日數十次如稠米泔色心神恍惚憔悴食減以女勞得之服此不然[illegible]乃至[illegible]神魂定心志

菖蒲節炒　龍骨　人參去芦　茯神去木

當歸去芦　粉草節炙

右等分為末每服貳錢夜卧人參湯調服

[illegible] 治同上方見消渴類

[illegible] 治小便赤濁如神

遠志去心甘草煮半斤　茯神去木　益智仁各二兩

右為末酒糊圓每服伍拾圓臨卧棗湯下

心腎圓 治水火不既濟心下怔忪夜多盜汗便赤夢遺

牛膝去蘆酒浸　熟地黃酒蒸　蓯蓉酒浸　鹿茸去毛酥炙

附子炮去皮臍　五味子去梗　人參去芦　黃耆蜜炙

遠志甘草水煮去心　白茯神去木　山藥炒

當歸酒浸去芦　龍骨煅　菟絲子酒浸蒸焙

右為末浸藥酒煮糊圓如梧子大每服七十圓棗湯下

[illegible] 治元氣不固遺精夢泄

大附子炮去皮臍　龍骨煅　肉蓯蓉酒浸　牛膝酒浸焙

巴戟去心各壹兩

右末煉蜜圓如梧子大每服三十圓溫酒鹽湯空心下

[illegible] 治腎經虛損遺濁不止用二陳湯加白茯苓煎湯送下方見嘔吐類

[illegible] 治小便白濁

破故紙炒　青鹽各肆兩　白茯苓　五倍子各貳兩

右為末酒糊圓空心三十圓鹽湯溫酒任意下

茯菟丸治勞傷心腎水火不交漩面如油光彩不定漩腳
澄下凝如膏糊夢遺頻數無度又治遺泄不禁之疾方見消渴門
固陽丸治下虛胞寒小便白濁或如米泔或若凝脂腰重
少力 固精丸
牡蠣煅 菟絲子酒浸蒸 韭子炒 龍骨
五味子 白茯苓去皮 桑螵蛸酒炙 白石脂各等分
右為末酒糊圓如梧子大每服七十圓空心鹽湯送下
濟火丸治心腎水火不濟或因酒色遂至以甚謂之土濁
蓋脾有濕熱而腎不足故土邪干水先賢常言夏則土燥
而水濁冬則土堅而水清此其理也醫者往往峻補其疾
反甚此方中和補瀉兼之水火既濟而土自堅其流清矣

熟地黃洗焙 菟絲子酒浸 鹿角霜各伍兩 茯苓
柏子仁各叁兩 附子壹兩
右為末鹿角膠煮糊圓如梧子大每服百十圓鹽酒下
四精圓治濁渴
鹿茸 肉蓯蓉 山藥 茯苓各等分
右為米糊圓如梧子大每服三十圓棗湯下 [illegible]
[illegible]圓治濁
杜仲 川烏 破故紙 人參
巴戟各等分
右為末豬腎圓如梧子大每服三十圓鹽湯溫酒任下
[illegible]治諸虛白濁耳鳴之疾

當歸酒浸 鹿茸酒炙 黃耆[illegible] 沉香各錢
北五味炒 遠志肉 酸棗仁炒 吳茱萸[illegible]
茴香炒 破故紙炒 牡蠣煅 熟地黃[illegible]
人參去蘆 龍骨煅 附子炮 巴戟各壹兩
靈砂研細兩
右各煅製如法為末酒糊圓每服五十粒至七十粒空
心溫酒鹽湯任下
大菟絲子圓治腎氣虛損五勞七傷小腹拘急四肢酸疼
面色黧黑唇口乾燥目暗耳鳴心忪短氣夜夢驚恐精神
困倦喜怒無常悲憂不樂飲食無味舉動乏力心腹脹滿
腳膝痿緩小便滑數房室不舉股內濕癢水道澀痛小便

出血時有遺瀝並宜服之久服填骨髓續絕傷補五臟去
萬病明視聽益顏色輕身延年聰耳明目
石龍芮[illegible] 菟絲子酒浸[illegible] 白茯苓[illegible]
山藥[illegible]
右為末山藥糊搜和為圓如梧子大每服五十圓空心
溫酒或鹽湯下如腳膝無力木瓜湯下晚食前再服
四君子湯治小兒白濁
生料四君子湯 生料五積散
右和勻每服二錢燈心一握水一盞煎服 方見脾胃
[illegible]治虛勞[illegible]白濁二藥各
和每服[illegible]又和湯下 [illegible]

[illegible]丸治下元陽氣衰，脾精不禁，漏濁淋瀝，腰痛力疲。
蒼朮(泔浸一日夜，焙乾，各半斤) 舶上茴香(炒) 川練子(去皮核)
青鹽(半兩) 川烏(炮去皮) 破故紙(炒) 白茯苓
龍骨(各壹兩)
右為末，酒麵糊圓如梧桐子大，朱砂為衣，每服五十圓，空心，鹽砂煎湯下，糯米湯亦可。
[illegible]治小便淋濁，生薑煎吞[illegible]白圓子[illegible]
[illegible]治思慮傷心，小便赤濁，遺精白濁[illegible]
[illegible]圓治心腎俱虛，漏精白濁。
山藥(炒) 牛膝(酒浸) 白茯苓 山茱萸(去核)
舶上茴香(炒) 兔絲子(酒浸) 續斷(去蘆，各壹兩)
右為末，煉蜜圓如梧桐子大，每服三十圓，鹽湯下。
[illegible]治通心氣[illegible]精，治小便白濁並赤白濁。
益智 川萆薢 石菖蒲(鹽炒) 天台烏藥
右等分，剉散，入鹽少許，煎，空心服。
[illegible]圓治赤白濁[illegible]
[illegible]圓治心氣不足，思慮太過，腎經虛損，真陽不固，漩有遺瀝，小便經歲白濁，或淡赤，或如膏，夢寐精泄，甚則身體拘倦，骨節酸疼，飲食不進，面色黧黑，容枯肌瘦，唇口乾燥，虛煩盜汗，舉動力乏，多服取效。
白龍骨(半兩) 磁石(火煅醋淬) 朱砂(各壹兩) 牡蠣(火煅，壹兩)

紫梢花(青) 家韭子 兔絲子(酒蒸) [illegible]
白茯苓 川巴戟 官桂 肉蓯蓉(酒浸)
桑螵蛸(酒炙) 遠志(去心) 當歸(去尾)
蒼朮(炒) 茴香(炒) 吳茱萸(炒) 川練子(炒)
桑寄生 沉香(不見火) 木香(不見火) 黃耆(去蘆)
綿附子(炮) 已上各壹兩
右為末，煉蜜圓如梧桐子大，每服五十圓，溫酒鹽湯任下。
[illegible]治心虛泛熱，或觸冒暑熱，漩下或赤或白，或淋澁不行，時發煩躁自汗。
人參(去蘆) 石蓮肉(去心) 川巴戟(去心) 益智仁(去殼)
黃耆(去蘆) 萆薢 麥門冬(去心) 赤茯苓(去皮)
甘草(各等分)
右為散，每服三錢，水一盞半，燈心二十莖[illegible]煎，食前溫服，以後藥相兼。
[illegible]圓治心腎俱虛，夢寐驚悸，體常自汗，煩悶短氣，悲憂不樂，消渴引飲，漩下赤白，停凝濁甚，四肢無力，面黃容瘦悴，耳鳴頭暈，惡風怯冷。
梔子 蓮肉(去心) 枸杞子 白龍骨
川巴戟(去心) 破故紙(炒) 真琥珀(另研) 沉香
苦楝實(去殼) 赤茯苓(去皮) 白茯苓(去皮)
文蛤 蓮花蕊 白牡蠣(火煅)
右為末，酒煮肉蓯蓉壹斤二兩，爛研為圓，如梧桐子大。

砂壹兩半重細研爲圓濃煎萆薢湯空心吞下。治勞力
房事傷心腎渴止濁清自有奇效

○遺溺

[小方兎絲子圓] 治小便夜多脚弱老人虛人多有此證令人
卒死犬能耗人精液頭昏
兎絲子酒浸 家韭子各炒 益智子去皮 茴香子炒
蛇床子去皮微炒
右等分爲末酒糊圓如梧子大每服五七十圓糯米飲
鹽湯任下

[又方] 治夜多小便
右取純糯米糍壹片臨臥炙令軟熱喫之仍以溫酒下

不飲酒湯下多喫愈佳行坐良久待心間空便睡一夜
十餘行者當夜便止

[又方]
右用茴香不以多少淘淨入少鹽炒爲末如前炙糯米
糍蘸喫或用豶豬胞盛以糯米煮爛或入椒鹽少許同
煮去糯米只用胞切片蘸藥或更飲好酒半杯臨睡臨
臥各壹服尤妙

[兎絲子圓] 治小便多或不禁
兎絲子二兩酒浸 桑螵蛸半兩炙 牡蠣煆取粉 肉蓯蓉一兩酒浸
附子炮去皮臍 五味子一兩 雞膍胵半兩炙 鹿茸一兩酥炙
右爲末酒糊圓如梧子大每服七十圓食前鹽酒任下

一方加巴戟去心破故紙微炒赤石脂煆萆薢各壹兩

[[illegible]圓] 治小便利濁每服三十圓溫酒鹽湯下方見遺濁

[萆薢圓] 治小便頻數日夜無時
右用川萆薢洗不拘多少爲末酒糊圓如梧子大每服
七十圓空心食前鹽酒鹽湯任下

[縮泉圓] 治脬氣不足小便頻數
天台烏藥 益智仁各等分
右爲末酒煮山藥末糊圓如梧子大每服七十圓臨臥
鹽酒吞下

○遺溺

[家韭子圓] 治少長遺溺及男子虛劇陽氣衰敗小便白濁

夜夢泄精此藥補養元氣進美飲食
家韭子六兩炒 鹿茸四兩酥炙 蓯蓉酒浸 牛膝酒浸
熟地黃 當歸各二兩 兎絲子酒浸 巴戟去心各一兩半
杜仲炒 石斛去苗 桂心 乾薑炮各一兩
右爲末酒糊圓梧桐子大每服五十圓加至百圓空心
食前鹽湯溫酒任下小兒遺尿者多因胞寒亦稟受陽
氣不足故也別作一樣小圓服

[雞肶胵散] 治溺床失禁
右以雞肶胵壹具幷腸淨洗燒爲灰男用雌女用雄者
研細每服方寸匕溫酒調服

[又方] 用豬胞洗淨鐵鏟上炙香熟嚼細溫酒下

[illegible] 治內虛裏寒自汗時出小便不禁

白龍骨（三兩） 訶子（十個） 縮砂仁（一兩）

右為末糯米粥圓梧桐子大每服五十圓空心鹽酒下

桑螵蛸散 治小便日數十次如稠米泔色心神恍惚瘦悴食減以女勞得之

桑螵蛸（鹽水炒） 遠志（去心） 菖蒲（鹽炒） 龍骨

人參 茯神 當歸 鱉甲（醋炙）

右各等分為末每服貳錢夜卧人參湯調下

補脬飲 治婦人產後傷動脬破終日不能小便但淋瀝不乾

黃絲絹（生者一尺剪碎） 白牡丹根皮（末） 白及末（一錢）

右用水壹碗煎至絹爛如餳空心頓服服時不得作聲作聲不效

○ 遺精

桑螵蛸圓 治下焦虛冷精滑不固遺瀝不斷

附子（一只炮去皮） 五味子 龍骨（各半兩） 桑螵蛸（七個切炒）

右為末醋糯米糊圓每服三十圓空心鹽酒吞下

仙方固真丹 專治精泄不禁

禹餘糧 石中黃 赤石脂 紫石英

石燕子（五件各一兩[illegible]）

右以白茯苓肆兩人參貳兩[illegible]壹兩同為末入[illegible]酒糊量多少打糊拌和眾藥為圓以朱砂為衣如小指頭大每服貳圓至叁圓溫酒或鹽湯下空心臨卧服

[illegible] 治脬精泄不禁

桑螵蛸（去殼炒） 龍骨（別研） 白茯苓（各等分）

右末糊圓如梧子大每服七十圓煎茯苓鹽湯食前服

[illegible] 治夢中遺精每服一七虛者溫酒調熱者麥門冬去心濃煎湯調（方見心恙類）

[illegible] 治夢泄

益智仁（二兩用鹽二兩炒去鹽） 烏藥（一兩半）

右為末用山藥壹兩為糊圓如梧子大每服五十圓空心臨卧鹽湯下以朱砂為衣凡病精泄不禁自汗頭眩虛極或寒或熱用補澀之藥不效其脈浮軟而散蓋非虛也亦非房室過度此無他因有所覩心有所慕意有所樂慾想方萌不遂所欲而致斯疾既以藥補且固不效將何治之緣心有愛則神不歸意有想則志不寧當先和榮衛榮衛和則心安次調其脾脾氣和則志舍定心腎交媾精神內守其病自愈其法用人參三錢當歸壹錢洗焙為末作叁服糯米飲調下服畢自汗止而寒熱退頭眩未除川芎叁錢人參壹錢焙為末作三服沸湯調服頭眩遂差精不禁者用白芍藥半兩丁香三錢木香三錢剉散每服用生薑五片棗二枚煎空心服心安神定精固神悅

[illegible] 治經絡熱夢泄心怔忪恍惚

大柏皮（壹兩去粗皮）

右為末入腦子壹錢同研煉蜜圓如梧子大每服十五圓至十九圓濃煎去心麥門冬湯下

猪苓圓治年壯氣盛情慾動中所願不得意淫於外致夢遺白濁

半夏壹兩　猪苓貳兩

右用半夏剉如豆大用猪苓為末先將一半炒半夏黃色不令焦地上出火毒半日取半夏為末糊圓如梧子大候乾更用猪苓末炒微裂入不油沙瓶中養之每服四十圓空心溫酒鹽湯送下如常服於申未閒冷酒下

厚朴圓治遺瀝尋常只治宿冷緣脾虛亦有此疾

厚朴　羊脛炭

右為末水麪糊為圓如梧子大每服百圓米湯下

○失血

風證 **[illegible]湯**治傷風汗下不解鬱于經絡隨氣涌泄衂出清血或清道閉流入胃管出清血遇寒泣之色必瘀黑者

桂心　白芍藥　甘草　川芎　栝樓根

右等分剉散每服四大錢水壹盞半薑叁片棗一枚煎服頭痛加石膏

[illegible]湯治大人小兒臟冷氣虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下或腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度

寒證 **麻黃升麻湯**治傷寒發熱解利不行血隨氣壅世謂紅汗者

麻黃去節　升麻壹兩一分　黃芩　芍藥
甘草　石膏　茯苓各一兩

右剉散每服四錢水一盞半薑三片煎熱服微汗解

[illegible]湯治傷寒及溫病應發汗而不汗內蓄為瘀血及衂吐血不盡餘血停留致面黃大便黑

犀角一兩　生地黃八兩　芍藥三分　牡丹皮二兩

右剉散水煎狂者加大黃二兩黃芩三兩其人脉大來遲腹不滿自言滿為無熱不須加也

[illegible]湯治同上 方見傷寒

暑證 **[illegible]**治伏暑飲熱暑毒攻心[illegible]經絡[illegible]溢發衂或胃氣虛血滲入胃停留不散吐出一二升許治衂則以茅花煎湯調下屢用得效

[illegible]治同上 方見傷暑類

濕證 **[illegible]湯**治胃兩者濕鬱于經絡血溢作衂或脾不和濕著經絡血流入胃吐血

茯苓　乾薑各二兩　甘草炙　白朮各一兩

右剉散每服四大錢水煎服頭疼加川芎二錢最止浴室發衂

七情 **[illegible]**治氣逆嘔血衂血用側柏葉白茅花濃煎湯下

[illegible]治因氣作衂或吐嘔血濃煎白茅花湯化

黃芪散 治氣鬱發衂與此神效

黃芪 半兩 赤茯苓 白芍藥 各壹兩 當歸

生乾地黃 阿膠 炒各壹兩

右為末煎黃芪湯調下為剉散煎亦可

歸脾湯 治思慮傷脾心多健忘為脾不能統攝心以致妄行或吐血下血

白术 茯神 黃芪 酸棗仁 炒去殼各壹兩

龍眼肉 各壹兩 人參 木香 各半兩 甘草 弍分半

右剉散每服四錢水壹盞薑五片棗一枚煎不拘時候溫服

天門冬湯 治思慮傷心吐衂不止

遠志 去心甘草水煮 白芍藥 天門冬 去心 藕節

麥門冬 去心 黃芪 去蘆 阿膠 蛤粉炒 沒藥

當歸 去蘆 生地黃 各壹兩 人參 甘草 各半兩

右剉散每服四錢水壹盞半生薑五片煎不拘時服

加味理中湯 治飲食過度傷胃不化致嘔吐其色鮮紅或心腹絞痛自汗名曰傷胃嘔血

人參 乾薑 炮 白术 各壹兩 乾葛

甘草 各半兩

右剉散每服三錢水壹大盞煎不拘時候溫服或乾葛

加川芎治鼻衂理中脘分利陰陽安定血脈

天方 治暴吐血以柏木貳錢以[illegible]湯各半盞調猛喫其[illegible]只兩服效

[illegible]湯 治吐血自汗大效 方見痺證

[illegible] 治咯血用毛頭白紙燒灰入麝香煎調二錢服之如神 方見婦人崩漏類四君子湯加蒲黃[illegible]

大薊散 治飲啖辛熱熱邪傷肺嘔吐出血一合或半升名曰肺疽

大薊根 洗 犀角 鎊 升麻 桑白皮 炙

蒲黃 炒 杏仁 去皮尖 桔梗 去蘆炒各壹兩 甘草 半兩

右剉散每服四錢水壹盞半生薑伍片煎不拘時溫服

[illegible] 治同上 方見前

茜根散 治鼻衂終日不止心神煩悶

茜根 黃芩 阿膠 蛤粉炒 側柏葉

生地黃 各壹兩 甘草 半兩

右剉散每服四錢水壹盞半生薑三片煎不拘時溫服

[illegible] 治咯血

右用槐花不以多少為末每服貳錢食后熱酒調服

[illegible]雞蘇丸 治肺熱咳嗽鼻衂吐血血崩下血血淋熱淋勞淋氣淋止渴除煩涼上膈解酒毒口臭喉腥口甜口苦

柴胡 [illegible] 麥門冬 去心

黃芪 壹兩 阿膠 炒 生乾地黃末 後入膏

蒲黃 弍兩 雞蘇 淨葉 甘草 壹兩半 人參 弍兩

木通 [illegible]

右除別研藥後入外為末用好蜜二斤先煉一二沸然

後入生乾地黃末不住手攪時時入柴胡末湯汁慢慢熬成膏勿令焦同餘藥和爲圓如蠶豆大每服二十圓以去心麥門冬煎湯食後臨卧服如崩下血諸淋疾並空心食前服

三黃圓 治肛門腫痛或下鮮血 方見積熱門

黃連去鬚 黃芩 大黃各十兩

右爲末煉蜜圓如梧子大每服四十圓熟水吞下

白朮散 治積熱吐血咳血若因飲食過度負重傷胃而吐者最宜服之忌食熱麪煎煿一切發風之物

白朮二兩 人參 白茯苓 黃耆蜜炙各二兩

山藥 百合去心各三分 甘草半兩 前胡去蘆一分

柴胡去蘆各壹兩一分

右剉散每服叁錢水壹盞半生薑叁片棗一枚煎溫服

雞蘇散 治勞傷肺經唾内有血咽喉不利

雞蘇葉 黃耆去蘆 生地黃洗 阿膠炒

白茅根各壹兩 桔梗去蘆 麥門冬去心 蒲黃炒

貝母去心 甘草各半兩炙 桑白皮半兩

右剉散每服四錢生薑三片水一盞半棗一枚煎溫服

蓮心散 治勞心吐血

右以蓮子心五十箇糯米五十粒爲末酒調服效

天門冬圓 治肺虛客熱咳嗽咽乾痰唾涎沫或有鮮血并勞傷肺胃吐血嘔血並宜服之

麥門冬去心半兩 乾山藥 熟乾地黃 五味子各一兩

遠志去心甘草煮 丹參 貝母炒 防風去蘆各半兩

阿膠炒壹兩 茯神去木 柏子仁 百部根

杜仲各半兩炒 茯苓壹兩 人參壹分

右爲末煉蜜圓如彈子大水壹盞煎六分和滓服

奪命散 治金瘡打損及從高墜下木石所壓内損瘀血心腹疼痛大小便不通氣絕欲死

紅蛭用石灰慢火炒令焦黃色半兩 大黃 黑牽牛各二兩

右爲末每服三錢熱酒調下如人行四五里再用熱酒調牽牛末二錢催之須臾臟腑轉下惡血成塊或片血盡愈

花蕊石散 治一切金刃箭鏃傷及打撲傷損狗咬傷並於傷處摻藥傳或内損血入臟腑煎童子小便入酒少許調服及婦人產後敗血不盡

花蕊石一斤研細 上色硫黃四兩

右和勻入瓦瓶中以紙筋搗黃泥固濟候乾焙令熱透以磚磁用白炭一秤頂上發火燒炭盡候冷取出再研極細治諸臟傷及婦人產後瘀血不行並用童子小便溫酒一二錢匕服瘀血化

雞鳴散 治從高墜下及木石所壓凡是傷損血瘀凝積氣絕欲死并久積瘀血煩燥疼痛叫呼不得並以此藥利去瘀血即愈推陳致新折傷神效

大黃酒蒸壹兩 杏仁去皮尖三七粒

右研細用酒壹碗煎至六分去滓鷄鳴時服次日取

下焮血即愈若便覺氣絶取藥不及急擘開口以熱小便灌之

[illegible]湯 治打撲傷損敗血流入胃脘嘔吐黑血或如豆羹汁

川芎　當歸　白芍藥　百合水浸半日

荊芥穗各等分

右㕮咀每服四錢水一盞酒半盞同煎不拘時服

[illegible] 治忍氣虛耗不能藏血以致面色黃瘦五心煩熱咳嗽唾血及婦人懷姙惡阻嘔吐亦宜服之

白茯苓去皮　人參去蘆　前胡去蘆　半夏

川芎各三分　陳皮　枳殼去穰　紫蘇

桔梗去蘆　甘草　乾葛各半兩　當歸去蘆一兩

白芍藥貳兩　熟地黃壹兩半

右㕮咀散每服肆錢生薑五片棗一枚煎食前服

通治 [illegible] 治咯血

側柏葉焙乾如倉卒難乾新瓦焙爲末每服叁錢米飲調食後服。一方柏葉[illegible]拌勻煉蜜丸餅子服

[illegible] 治鼻衂不止或吐血

雞蘇擂汁入鹽服黃蓋方效或雞蘇汁藕汁滴入鼻中

[illegible] 治鼻衂不止

白礬枯別研　白龍骨煆各半兩　麝香別研半字

右和勻每用壹字先將冷水洗淨鼻內血滯然後吹藥於鼻中或以濕紙蘸藥於鼻內尤妙

[illegible] 治大吐血及傷酒食飽低頭掬損吐血至多并血妄行口鼻中俱出但聲未失無有不效

百草霜[illegible]

不拘多少羅細爲末每服一錢糯米飲調下鼻衂搐一字皮破血出灸瘡出血摻上止并治舌忽然腫破乾摻

川芎三黃湯 治實熱衂血

大黃濕紙裹煨　川芎　黃連　黃芩各等分

右爲末每服二錢食後井水調服

[illegible] 加桑白皮麥門冬前胡雞蘇 [illegible]治衂熱膈中鬱熱衂血兼治血淋吐血口臭方見[illegible]

[illegible]湯 治虛勞吐衂血方見諸氣類

[illegible]

川鬱金末井水調下亦治吐血。又茆花煎湯通口服。又方血餘散用頭髮燒存性研米湯調下仍以少許入鼻中。曾服燒煉藥致鼻衂者山梔子煎湯解之仍燒山梔子存性爲末入鼻。又方烏賊魚骨槐花等末入鼻。又方槐花半生半炒爲末入鼻。又方成片人中白燒去穢爲末入麝香少許入鼻或加亂髮灰。一方大蒜煨香取三瓣研傅脚心底鼻中有蒜氣即去之

天門冬丸 治吐血咯血大能潤肺止嗽

天門冬壹兩　甘草　杏仁炒　貝母

茯苓　阿膠各半兩

右為末煉蜜丸彈子大每一丸噙津嚥化日夜可十丸

龍骨散治鼻衄過多

右以龍骨不拘多少研為末用少許吹入鼻中凡九竅出血皆可用一方用梔子炒前法

白及散治鼻衄嘔血咯血肺損或食飽負重得者服之愈

白及不拘多少

右為末米飲調或用井水調一匕用紙花貼鼻竅中一方用阿膠末調貼

[illegible]治汗出污衣甚如坯染皆由大喜傷心喜則氣散血隨氣行兼服妙香散金銀麥門冬湯下病名紅汗方見虛損心恙類

葎草汁治產婦大喜汗出污衣赤色及膏淋尿血

葎草不拘多少

右擣取汁二升醋二合和空腹飲一盃或煮濃汁飲亦治淋瀝尿血

側柏散治內損吐血下血或因酒太過勞傷於內血氣妄行其出如湧泉口鼻皆流須臾不救則死服此即安

栢葉一兩半蒸乾　人參　荊芥穗各一兩燒灰

右為末每服三錢入飛羅麪二錢拌和新汲水調如稀糊相似啜服立效又方用百草霜川白芷研為末每服三錢濃米飲併服

蒲黃散治鼻衄不止

右以蒲黃血竭為末吹入鼻中

灸法療虛勞吐血灸胃脘三伯壯

吐血唾血上氣咳逆灸肺腧隨年壯

吐血嘔逆灸大陵穴在掌後兩骨間是

一方　衄血不止名腦衄灸上星穴五十壯入髮際一寸

又不止灸足大指節橫理三毛中十壯劇者伯壯并治陰卵腫

酒[illegible]圓治酒毒積熱便下鮮紅或肛門作熱方見積熱類　出下痢門

槐角圓治五種腸風瀉血糞前有血名外痔糞後有血名內痔大腸不收名脫肛穀道四面努肉如奶名舉痔頭上有孔名瘻并皆治之

槐角去枝梗炒一兩　地榆八兩　當歸去蘆八兩　黃芩半斤

防風八兩　枳殼去穰麩炒半斤

右為末酒糊圓如梧子大每服五十圓不拘時米飲下

人參敗毒散治同上每服三錢生薑三片薄荷葉七皮桑白皮七寸烏梅一个煎

防風散治因食熱物過度或飲酒熱毒結蘊大腸傳導以致熱毒之氣滲流而下此方独效

羌活　荊芥　防風　枳殼

茯苓去皮　芎藭各等分

右剉散，每服水煎至心温服，忌再喫熱物

【□□散】治同上，米飲下。方見咳嗽類

【加味四物湯】治腸風下血不止

側柏葉　生地黄　當歸酒浸　川芎各一兩

枳殼炒　荊芥穗　槐花炒　甘草各半兩

右剉散，每服三錢，生姜三片，烏梅一箇，煎，空心服。一方加防風、烏梅各半兩，效。

【□□散】大便鮮血，臍腹疼痛，裏急後重，脫肛滿□

荊芥二兩　亂髮燒　槐花炒　槐角炒，各一兩

枳殼二兩　甘草　蝟皮各一兩半

右將合燒藥同入甕瓶內，黄泥固濟，燒存三分性，出火

得効方七　二十四

氣，同甘草、枳殼一兩，搗為末，每服二錢，以水煎，空心服，温酒調亦可。

【□□丸】治丈夫婦人久新腸風痔瘻，臥床頭痛不可忍者，服此不過三四次見效。初得此疾，發痒或疼，穀道周圍多生硬核，其是痔；如破為瘻，只下血是腸風，皆因酒色氣風食五事過度，即成此疾。人多以外醫塗治，病在腸自有蟲，若不去根本，其病不除，此藥治之效。

刺蝟皮　豬懸蹄　牛角腮　雷丸一兩

槐角一兩半　敗棕

脂麻一兩　苦楝根皮一兩一錢半

右剉碎，入藥瓶內燒存性，藥為末，入麝香二錢，沉香五

錢，研令和勻，用酒打麪糊為丸，如梧子大，每服八粒，先細嚼胡桃一枚，空心晚食前温酒下，日二服，病甚日三服，切忌別藥，不過三兩日可除根本。

【□□□□】加側柏葉，每服二錢，加生薑三片，棗一枚，烏梅一个，煎，空心服。

【□□散】治臟毒下血神效

卷柏　黄耆

右等分為末，每服二錢，米飲調下。

【□□丸】治腸風下血，溺血

百藥煎

右為末，煉蜜丸如梧子大，每服五十丸，空心米飲下。

得効方七

【□□丸】治腸風痔漏

刺蝟皮　皂角刺　研黄

豬牙皂角　附子　白礬　枳殼炒

黄耆　白雞冠花子

右為末，酒糊丸如梧桐子大，每服七丸至十丸，空心食前温酒下，不飲米飲下。久年漏痔，服至三四十日內滿平安。諸痔服之即自消，外痔用藥十丸，以朱砂細研，醋調塗。常服永除根本。若服藥稍熱，加白雞冠花子一兩半或二兩，更加三五丸服之，臟腑自調。

【□□□□】

香附子　天台烏藥　甘草

右為末每服一錢空心鹽湯點服治同上

[illegible]治臟腑虛損大腸不收久作腸風下血一[illegible]藥夾用每服五十丸煎[illegible]加川芎空心嚥下（方見[illegible]）

[illegible]治同上加木香炒（方見[illegible]）

[illegible]治腸風臟毒下血
烏梅（[illegible]）　香白芷（[illegible]）　百藥煎（[illegible]）
右為末米糊丸梧桐子大每服七十丸空心米飲下

[illegible]治臟腑虛寒下血不止面色痿黃日漸羸瘦
側柏葉（[illegible]）　川續斷（[illegible]）　鹿茸（[illegible]）　附子（[illegible]）
黃耆　阿膠（[illegible]）　當歸（[illegible]）　白茯苓（[illegible]）
右為末醋煮米糊丸梧子大每服七十丸空心米飲下

[illegible]冷熱不調[illegible]
黃連（去鬚）　厚朴（薑製）　扁豆
右剉散用水煎服

[illegible]治冷熱不調下血（方見[illegible]）

[illegible]熱加茯苓槐花冷加白茯苓丁香（方見[illegible]）

[illegible]治大人小兒冷熱不調便下膿血[illegible]裏急後重（方見[illegible]）

[illegible]米飲調熱者吞酒蒸黃連丸冷者吞烏荊丸（方見[illegible]）
熱證通治及下痢證

[illegible]治腸風下血百藥不效

山棗葉俗名界洋團取乾者為末米飲調立效

又方柏子十四枚搥破紗囊貯以好酒三盞煎至八分服之初服反覺加多再服立止非飲酒而致斯疾以艾葉煎湯服之神效[illegible]

又方生猪臟一條切控乾以槐花炒乾為末填入臟內兩頭縛了以好米醋於磁石器內慢火煮爛切片沙鉢內研爛為丸梧桐子大每服二十丸煎當歸酒下

又方荊芥穗縮砂仁各等分為末糯米飲下

[illegible]灸第二十椎隨年壯

又法平立一杖子比臍平却向後脊骨當心灸七壯或年深於脊骨兩傍各一寸灸七壯余謂寸半[illegible]

白佳

[illegible]小便出血[illegible]白茅根濃煎湯放溫吞下[illegible]

[illegible]加辰砂一字燈心一握煎湯調下（方見[illegible]）

[illegible]治酒[illegible]過度房勞後小便出血
半夏麯（[illegible]）　川芎　赤茯苓（[illegible]）　赤芍藥
枳殼　青皮　柴胡　前胡
燈心　白茅根　桑白皮　北梗
甘草（各弍分半）
右剉散每服三錢生姜五片蜜一匙新水煎服

[illegible]治小便作痛不止
生薑七片　[illegible]　白茅根（[illegible]）

右用水同煎服神效

鹿角膠圓 治房室勞傷小便尿血

鹿角膠半兩 沒藥別研 油頭髮灰各三錢

右為末用白茅根汁打糊丸如梧桐子大每服五十丸

鹽湯送下

髮灰散 右用自己頭髮一握洗淨燒灰溫酒調下一服立效

鏡面散 治小便出血

鏡面草取清汁入蜜少許同水調服效

又方 療小遺出血條

淡豆豉一撮煎湯服效

又方 治小便出血

竹茹一大塊水煎服妙

又方 川牛膝壹兩去蘆水一椀煎至半椀頓服

又方 生地黃取自然汁半升生薑自然汁半合相和服未止再服

又方 當歸川白芷為末每服二錢溫米飲下

脫肛

文蛤散 治大腸寒肛門脫出不收用力過多及小兒叫呼久痢後肛便脫肛

五倍子

右為末水煎汁浸洗更入白礬蛇床子尤佳洗後用赤石脂為末以少許摻在芭蕉上頻用托入或長尺餘者以兩床相接中空一尺以磁瓶盛藥水滿架起与床平令病者仰卧以其所脫浸在瓶中換藥逐日如此浸縮盡為度

木賊散 簡易集要云治脫肛用木賊不以多少燒存性為末摻肛門上按入即愈

右用木賊一味為末摻肛上

槐花散 治脫肛

槐花 槐角

右等分炒香黃為末用羊血蘸藥炙熟食之以酒送下

或以豬膏去皮蘸藥炙服

蝟皮散 治同上 方見諸痔類

蝟皮散 治肛門或因洞泄或因用力太過脫出不收

蝟皮一個 磁石半兩煅碎 桂心各半兩

右為末每服二錢米飲空心調下治女人陰脫加鱉頭一枚燒灰研入

香荊散 治肛門脫出大人小兒悉皆治之

香附子一兩去毛 荊芥穗[illegible]

右為末每服三匙水一大椀煎熟淋洗

灸法 病寒冷脫肛出灸臍中隨年壯

脫肛歷年不愈灸橫骨百壯又灸龜尾窮骨上七壯

諸痔

[illegible]凡[illegible]者[illegible]肛邊[illegible]或生瘡痒時有膿血

栝樓二个燒存性 蝟皮兩个內燒存性碎銼 白礬煅
綠礬枯 胡桃仁十五个不油者內燒存性 白附子生用
半夏 天南星 雞冠花五兩炒 枳殼炒
附子去皮臍 訶子去核各弍兩
右為末醋趯糊丸如梧子大每服二十丸空心臨卧溫
酒下遠年不差者服十日見效久服除根
黑玉丹 治同上方見失血類
橘皮湯 治氣痔
橘皮 枳殼炒 川芎 槐花炒各半兩
檳榔 木香 桃仁炒浸去皮 紫蘇莖葉
香附子 甘草各弍分半
右剉散每服三錢水一盞半生姜三片紅棗二枚煎服
立效圓 百藥煎研為末每服三錢煮稀白粥攪匀服之立愈糊
丸米飲下亦可
黑圓子 專治久年痔漏下血用之累驗
乾薑 百草霜各壹兩 木饅頭弍兩 烏梅
敗棕 柏葉 亂髮各五分
右各燒灰存性再入桂心叁錢白芷五錢同為末醋糊
丸梧桐子大空心三十丸米飲下
熱證逐痰湯 通利大小便取下黑物
川芎 白芷 生乾地黃 赤芍藥

恭作丹

五靈脂 枳殼製 阿膠炒 蓬莪术煨
茯苓 茯神 大木通 生甘草各壹分
實大黃 桃仁各壹分去皮炒
右剉散每服三錢井水一椀生薑三片蜜三匙煎服以
利為度 痰血作痛通用
白玉丹 治久年腸痔下血服藥不效者
寒水石不以多少
右煅紅研細水飛再入銀窩中煅紅用糯米糊丸梧桐
子大每服五六十圓陳米飲下只一服愈
黃連阿膠圓 解熱調血枳殼散送下方見婦人氣治瀉類
槐角圓 治腸風痔瘻內生虫裏急下膿血止痒痛消腫聚
祛風毒 每服之除根方見前
乾葛湯 專治酒痢
白乾葛 枳殼炒 半夏 茯苓
生乾地黃 杏仁各半兩 黃芩 甘草各壹兩
右剉散每服三錢黑豆百粒姜五片白梅一个煎服
寬腸圓 五灰膏塗痔瘡之後或臟腑秘結不通者用此藥
寬腸五灰膏 方見后
黃連 枳殼各等分
右為末麵糊丸如梧子大每服五十丸空心米飲下
通治秘方 治諸痔捷效
右用白礬信石各少許於新瓦上煅過為末再入朱砂

本作藥 德作備

本少許以新汲井水調成膏，用舊金紙上藥，隨瘡大小貼之。先用鬱金固丹末以鵝翎刷於瘡四畔周圍護，恐損好肉。凡上藥賓宦人肉理嬌脆薄，少用之；惡俗人肉理麁厚，稍多少許用之。大抵上藥後多疼，不可太過為妙。仍用大青根、晚蠶沙煎水洗後再上藥，兼服槐角圓、宜角丸。臟腑結熱秘甚者，正散加灯心、枳殼、薄荷、童便再用。大黃、黃芩、荊芥穗、防風煎水洗效。熱癥正散方見積

又方 用川白芷煮白芋作線，快手緊繫痔上，微疼不妨，其痔自然乾痿而落，七日後安。

五灰膏 治臟腑一切蘊毒發為痔瘡，不問遠年近日，形似雞冠、蓮花、核桃、牛乳，或內或外，並皆治之。

東作束

蕎麥灰七升 荊柴 剪柴 山白竹

老杉枝

右以四件柴竹截作一尺許長，以斧劈破成片，各取一束燒乾，於火上燒過，置壇內為炭，防為風所化，候燒盡，却以水於鍋內煮出炭汁，又用酒漏，以布帛實其竅，向置蕎麥灰於酒漏內，以前煮炭汁淋之，然後取汁於瓷內慢火熬，汁約取一小碗，候冷入石灰、因丹調和成膏，以瓦瓶貯之。上用石灰傅面，不令走氣。臨用却去石灰，以冷水調開，令病者以水洗淨痔瘡，仰卧擡起一足，先以溫紙於瘡四圍貼護，却用收效必矣。

通方

蝟皮方三指大 雄黃 熟艾如雞子大

為末，用瓶一個，以灰實一半，如燒香法，安髙桶內，坐其上，薰，令煙透，煙從口中香出方好，三度熏永瘥，勿犯風冷。

洗方 用槐花、荊芥、枳殼、艾葉，以水煎，入白礬熏洗。

又方

黃連 黃芩 京芥 蛇床子各一兩

側柏葉四兩 槐條 鏡面草 蚵蚾草各一握

右用新汲水熬煎，傾入盆內熏，候通手却洗。

蓮子散

蓮子十四個 草茅茶十四個 乳香蠶上二葉豆炒入

右三味同搗，以節梁根透先以黃連湯洗患處，然後以藥生貼之。

木鱉散

木鱉子 百藥煎

右等分為麁末，每服一撮，布裹煎湯，以桶盛之，蓋上穴一竅，先以氣熏蒸，後通手洗之。

敷法 熊膽膏 傅痔極效。

熊膽研細 腦子研細

右各少許，用井花水調，以鵝羽掃痔上。

枯礬散 治五痔痛癢。

枯礬半分 腦子一字

右並研為末，先用魚腥草濃煎汁，放溫洗，次用少許傅

瘡上效

散 右用寒水石朴消爲末以津潤手指蘸藥敷瘡上立效

散 右用荔菁刮去涎對停入蜜調匀先以木鼈子煎湯熏洗然後傅藥其冷如冰

名方 耳環草一名碧蟬兒花手挪軟納患處即愈

川山甲自尾根盡處數除三鱗不用取第四第五第六鱗橫三行燒存性爲末用麝香少許臘茶一匙同調空心服以澄下濃者傅瘡上其冷如冰永不痛無不效

散 治痔瘡腫脹作熱如火

右用蝸牛螺一箇以冰片腦子麝香各少許同入瓦器內盛頓過半日自化成水以少許點瘡上立愈

灸法 平立量脊骨與臍平處椎上灸七壯或年深更於椎骨兩傍各一寸灸如上數無不除根

又法治痔疾大如胡瓜貫於腸頭發如燒炭火後則僵仆以柳枝濃煎湯洗後以艾炷灸其上三五壯若覺一道熱氣入腸中大瀉鮮紅血穢惡一時至甚痛楚瀉後其疾如失

久冷五痔便血灸脊中百壯

五痔便血失屎灸回氣百壯穴在脊窮骨上

世醫得效方卷第七終

世醫得效方卷第八

○大方脈雜醫科

○諸淋

證湯 治淋小便秘澁數起不通竅中疼痛憎寒凜凜多因飲水過度或爲寒泣心虛志耗皆有此證

附子去皮臍 滑石各半兩 瞿麥 木通各參分

半夏湯洗七次各參分

右剉散每服貳大錢水二盞生姜七片燈心貳莖煎至壹盞半去滓空心服

散 治同上方見脚氣類

散 治熱淋血淋加燈心車前草煎不拘時候服方見發熱類

湯 治下焦有熱及諸淋閉不通

地膚子壹兩 知母 黃芩 豬苓去皮

瞿麥 枳實麩炒 升麻 通草

葵子 海藻洗去鹹各壹兩

右剉散每服四錢水壹盞半煎空心服大小便俱閉者加大黃女人房勞小便難大腸滿痛脈沉細者用豬腎半隻水二盞煎一盞半去腎入藥煎七分服

散 治熱淋多因腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不宣出少起數臍腹急痛蓄作有時勞倦則發或尿如豆汁

沈氏便出砂石疼痛兼治大病後餘熱為淋

木通　石韋去毛 各壹兩　甘草　當歸

王不留行　滑石　白朮　瞿麥

赤芍藥　葵子 各壹兩半

右為末每服二錢煎小麥湯調食前日三服

清心蓮子飲 治上盛下虛心火炎上口苦咽乾煩渴微熱小便赤澀或欲成淋並宜服之 方見痼冷類

火府丹 治心經熱小便澀及治五淋

生乾地黃 貳兩　木通 壹兩　黃芩 壹兩

右為末煉蜜杵圓梧桐子大每服三十粒木通煎湯下

膏淋 鹿角霜圓 治膏淋多因憂思失志意舍不寧濁氣干清小便淋閉或復黃赤白黯如脂膏狀疲極筋力或傷寒濕多有此證

鹿角霜　白茯苓　秋石 各等分

右為末糊圓梧桐子大每服五十圓米湯下

海金砂散 治膏淋

海金砂　滑石末 各壹兩　甘草末 壹分

右研勻每服一匕用麥門冬湯下燈心湯亦可

氣淋 沉香散 治氣淋多因五內鬱結氣不舒行陰滯於陽而致壅滯小腹脹滿便溺不通大便分泄小便方利

沉香　石韋去毛　滑石　王不留行

當歸 各半兩　葵子　白芍藥 各三分　甘草

橘皮 各壹分

右為末每服貳錢煎大麥湯調下

血淋 亂髮灰散 治血淋若單小便出血如尿此為莖衄此主之

右以亂髮不以多少燒為灰入麝香少許每服用米醋泡湯調下治淋以葵子末等分用米飲調下最治婦人胞轉不尿

乾柿散 治血淋

右用乾柿燒灰存性為末米飲調服

[illegible]圓 犀角地黃湯治血淋或血瘀乃風熱傷腎宜煎木通湯下參拾圓不可專以血得熱則淖溢為說 方見失血類

乳石散 治血淋及五淋等

右據乳香中夾石者研細以米飲或麥門冬湯調下每服以飢飽適中時服空心亦可

小薊飲子 治下焦結熱尿血成淋

生地黃 洗四兩　小薊根　滑石　通草

蒲黃 炒　淡竹葉　藕節　當歸

山梔子仁　甘草 各半兩

右剉散每服四錢水煎空心服

導赤散 治心虛蘊熱小便赤澀或成淋痛

生乾地黃　木通　甘草 各等分

右剉散每服三錢竹葉少許煎不拘時服

白薇散治血淋熱淋、
白薇　芍藥各等分
右為末每服貳錢酒調下立效或加檳榔、
[illegible]散治血淋痛不可忍、
陳皮　香附子　赤茯苓各等分
右剉散每服三錢水煎空心服、
沙石淋石燕丸治小便淋痛不可忍出沙石而後小便通、
石燕燒紅水淬三次研細　石韋去毛　滑石
瞿麥穗
右等分為末糊圓梧桐子大每服五拾圓瞿麥穗燈心湯下日三服、

又方[illegible]治同上、方見前、
[illegible]治諸淋疼痛不可忍及沙石淋、
右以大蘿蔔切作一指厚四五片用好蜜淹少時安鐵鏟上慢火炙乾又蘸又炙取盡壹貳兩蜜翻覆炙令香熟不可焦候冷細嚼以塩湯送下、
[illegible]治沙石淋諸淋每溺時器中剝剝有聲痛楚不堪、
右以杜牛膝淨洗碎之凡一合用水五盞煎耗其四而留其一、去滓以麝香乳香少許研調服之、單酒濃煎亦妙、
通治[illegible]治諸淋、
消石壹兩研細
右勞淋勞倦虛損則發時葵花末煎湯調一錢服、

血淋熱淋井花水調、氣淋木通湯調、石淋將藥末入銚子內隔紙炒至紙焦再研細同溫水調、小便不通小麥湯下、諸淋並冷水調亦可空心、
[illegible]湯治五淋、方見前苦杖散同、
猪苓湯治五淋、
猪苓去皮　赤茯苓　阿膠炒過　澤瀉
白滑石各壹兩
右剉散每服五錢水一盞半煎溫服、
五淋散治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出或如豆汁或如砂石或冷淋如膏或熱淋便血並皆治之、
赤茯苓壹兩　赤芍藥　山梔子仁各二兩半
當歸　甘草各壹兩
右剉散每服叁錢水一盞半煎空心服、

[illegible]湯治同上、
通草　葵子　茅根　桃膠
瞿麥　當歸　蒲黃　滑石各壹兩
甘草半兩　王不留行壹兩
右剉散每服伍錢生薑五片煎不拘時服、
[illegible]治淋疾數年不愈者、
右以四君子湯去甘草每服二錢水壹盞煎服
[illegible]湯
淡竹葉　甘草　燈心　棗子

烏豆　車前子

右不拘多少以水濃煎湯代熟水服甚妙

□□湯 治小便澀痛淋瀝難欲出不出痛不可忍

赤茯苓去皮各一兩　葵子　石葦去毛　澤瀉各半兩

白朮貳錢半

右剉散每服三錢水一盞煎七分溫服

虛損

人參養榮湯 治積勞虛損四肢沉滯骨肉酸疼吸吸少氣行動喘啜小腹拘急腰背強痛心虛驚悸咽乾唇燥飲食無味陰陽衰弱悲憂慘戚多臥少起久者積年急者百日漸至瘦削五臟氣竭難可振復又治肺與大腸俱虛咳嗽下利喘乏少氣嘔吐痰涎

黃耆　當歸　桂心　甘草

橘皮　白朮　人參各一兩　白芍藥三兩

熟地黃　五味子　茯苓各七錢半　遠志去心炒半兩

右剉散每服四錢水一盞半薑三片棗二枚煎至七分去滓空腹服

遺精加龍骨一兩咳嗽加阿膠甚妙

□□□ 治心氣不寧諸虛百損肢體沉重情思不樂夜多異夢盜汗失精恐怖煩悸喜怒無時口乾咽燥渴欲飲水飲食減少肌肉瘦悴漸成勞瘵常服補精血調心氣進飲食安神守中功效不可具述

人參　黃耆　白茯苓　白朮

山藥　茴香　烏藥　縮砂仁

橘紅　乾薑炮　甘草炙各二兩　丁香

南木香　檀香各三錢　沉香各二錢

右剉散每服三錢薑三片棗一枚煎食前服一法有炮熟附子半兩或為末一匕鹽湯調亦可

□□湯 治男子婦人稟受不足諸虛不足榮衛俱弱五勞七傷骨蒸潮熱腰背拘急百節酸疼夜多盜汗心常驚惕咽燥唇焦嗜臥少力肌膚瘦瘁咳嗽多痰咯唾血絲寒熱往來頰赤神昏全不思食服熱藥則煩躁衝滿上焦進涼藥則腸滑而臟腑痛宜服此藥極有神效兼治大病後榮衛不調婦人產後血氣未復

人參去蘆　石斛去根　甘草　黃耆蜜炙

木香　白朮　當歸　正桂

茯苓　芍藥　半夏　川芎

熟地黃洗去土　山藥　五味子　牡丹皮去骨

麥門冬去心各等分

右剉散每服三錢水一盞半生薑五片棗二枚小麥五十粒烏梅一箇煎空心食前服

正元散 治下元氣虛臍腹脹滿臟腑刺痛泄利嘔吐自汗陽氣漸微手足厥冷及傷寒陰證霍亂轉筋久下冷利少氣羸困一切虛寒並宜服之常服助陽消陰正元氣溫脾胃進飲食

人參　白茯苓　白朮（各一兩）　黃耆（蜜炙兩半）
甘草　烏藥　山藥（鹽炒）　附子（炮去皮臍）
川芎　乾葛（各一兩）　桂心（各半兩）　烏頭（炮去皮臍各半兩）
紅豆（炒）　乾薑（炮）　橘皮（各三錢）
右㕮咀散每服三錢水一盞半生薑三片棗二枚鹽少許
煎食前冷服自汗加浮麥

□□圓 補下經起陰痿陽絶令陽氣入腦安魂定魄開三焦破積聚消五穀益精氣安臟腑除心中伏熱強筋骨輕身明目去冷除風無所不治補益多常服最妙七十老兒服之當有非常力

蓯蓉（酒浸兩）　乾薯蕷　五味子（各一兩半）　杜仲（炒去絲兩）
牛膝（酒浸）　兔絲子（酒浸）　赤石脂（煅）　白茯苓（各一兩）
澤瀉　山茱萸（去核）　巴戟（去心）　熟乾地黃（各一兩）
□（各二兩）　附子（炮去皮臍）　牡丹皮（去骨）　官桂（去皮各半兩）
右為末別用蓯蓉末半斤酒熬膏和圓梧桐子大每服五七十圓空心溫酒下不在特忌別無所忌只忌醋及陳臭之物七日後四體光潤口唇赤手足暖面有光潤消食體輕舌厚聲響是其驗也十日長肌肉其藥通中入腦鼻辛酸不可怪也又加減法若要肥加燉煌石膏二兩如失狂多忘加遠志一兩如少津潤加柏子仁一兩欲進房事加白馬莖若無用鹿茸代之二兩去毛酥炙陰下濕癢加蛇床子一兩（微炒）勿火色也

□□圓 滋養肝腎益血和氣腰膝無力虛損顏色黑男子衛生之良藥也此方專理肝心腎之血澤瀉引諸藥入腎

熟乾地黃（酒浸九蒸）　鹿茸（酥炙）　五味子（各一兩）
山藥（炒）　山茱萸（去核）　大附子（炮去皮臍）
川牛膝（酒浸）　白茯苓　牡丹皮（去骨）
澤瀉（各一兩）　大當歸（去蘆）　官桂（去皮）
右為末用鹿角膠半斤剉細入銀石器中煮酒圓梧桐子大每服五十圓空心溫酒鹽湯下

□□八□湯 治諸虛不足小腹急痛脇肋䐜脹臍下虛滿胸中煩悸面色痿黃唇口乾燥手足逆冷脉常自汗腰背□□骨肉酸疼吸吸少氣嗽喘之不欲飲食或因勞傷過度或病後不復

黃耆（去蘆）　人參（去蘆）　橘皮（去白）　當歸（去尾）
桂心　細辛　前胡（去芦）　甘草
茯苓　麥門冬（去心）　芍藥（各一兩）　附子（炮去皮臍）
熟地黃（酒炒）　半夏（湯洗）　遠志（去心炒）
右㕮咀每服三錢水一盞半生薑五片棗子二枚煎食前服腹滿食少去棗下住虛冷不甚渴小便數者倍人參當歸附子煩渴引飲加栝蔞根遺泄白濁加龍骨白歛小腹急引心痛名內乾黃

□□圓 治丈夫肝腎風虛上攻頭面虛浮耳內蟬聲頭目

脊腰項背拘急下注腰脚腫膝生瘡行步艱難脚下隱疼
不能踏地筋脉拘攣不得屈伸四肢少力百節酸疼腰腿
冷痹小便滑數及癱緩風痺偏身頑麻又療婦人血風攻
體疼痛脚膝緩弱起坐艱難並宜服之

黃耆 去蘆　杜蒺藜 炒　茴香 炒　川楝子 去核
川烏 炮去皮臍　赤小豆　地龍 去土炒　烏藥 各貳兩
防風 去蘆壹兩

右為末酒煮麵糊為圓梧桐子大每服十五圓溫酒鹽湯
吞下婦人醋湯下空心服

【□□圓】治丈夫元臟久虛冷氣攻衝臍腹疞痛腰背拘急
面色萎黃飲食減少及治脚小腸氣痛并手足膝風腫頭面
虛浮目暗耳鳴脚膝少力腿痛生瘡婦人血臟虛冷食減
少力肢體疼痛並宜服之久服補虛損除風冷壯筋骨明
耳目

威靈仙 洗去土　川練子 炒　川烏 去皮臍 各壹兩　杜烏藥 伍兩
川椒 去目及閉口者炒出汗 各壹兩　地龍 去土 各壹兩　赤小豆 貳兩
陳皮　萆薢 各壹兩　茴香 炒　防風 各壹兩

右為末煑麵糊圓如梧子大空心晚食前溫酒下二十
圓鹽湯亦可婦用酒煑 小腸氣痛炒茴香鹽酒下
脚轉筋木瓜湯下 婦人血臟虛冷溫醋湯下 臍腹
絞痛滑泄冷痢艾湯下

【□□圓】補心腎益精髓脾胃怯弱神志不寧耗腰脚沉重精神
昏亂氣血凝滯飲食無味四肢羸瘦小便白濁耳聾目暗
等疾

山藥　白茯苓 去皮
楮實子　川牛膝 酒浸　巴戟 酒浸去心
杜仲 薑汁炙去粗皮　舶上茴香　肉蓯蓉 酒浸
五味子　石菖蒲　枸杞子 各壹兩
遠志 去心　熟地黃
山茱萸 去核

右為末煉蜜入棗子蒸熟去皮核同為圓梧桐子大末
以末五錢為衣每服三十圓空心溫酒鹽湯下日進三
服心氣不寧加麥門冬少精神加五味子陽弱加續斷
久服百病不侵

【天真圓】治男子婦人亡血損血及脫血肌瘦絕不入食行
步不得手足瘦弱軟緩血氣枯槁形神不足如滑腸不食
者死無法可治者如咽喉窄下食不得只能五七粒漸漸
服之粒數多便可養起久服令人面色紅潤無血者便生
血并津液乾枯大便燥者服之自潤實中有虛虛中有實皆
可治之

羊肉 精者去筋膜　肉蓯蓉 拾兩　濕山藥 拾兩去皮
當歸 拾貳兩　天門冬 去心 拾兩

右四味安羊肉內裹定用麻縷扎縛取上色糯酒四
瓶煮令盡再入水貳升又煑直候肉如泥再入黃耆末

伍兩人參末叁兩白朮末貳兩熟糯米飯焙乾爲末令勻
拾兩前後藥末同劑爲丸梧桐子大一日約服之伍拾粒
初服伯粒加至前數服之覺有精神飲食增長添力
血脈便行輕健如久服不言老服之半月語言有聲血
下常咳行步不倦服之效恐難圖即入熟餅伍柒枚焙
乾爲末同糕和之酒送下空心食前鹽湯亦可

大聖藥 治男子五勞七傷腎氣虛衰行步艱辛婦人血海虛冷月經不調臍腹冷痛少子又治痔瘻腸風下血諸風諸氣並皆治之有人得風氣痰癖結痰痹服之頓除

川牛膝 酒浸 肉蓯蓉 酒浸 覆盆子 白附子
兔絲子 酒浸 赤小豆 天南星 川羌活
骨碎補 去毛 金毛狗脊 去毛 何首烏 萆薢
防風 去蘆 烏藥 各壹兩 川椒 去目 綿附 炮去皮臍
白朮 甘草 白茯苓 川烏 炮去皮
人參 黃耆 各壹兩半 木鱉子 去皮 地龍 去土各半兩

右爲末酒麪糊爲丸梧桐子大每服三十丸空心酒下

補損固真丹 治因感卑濕致痰疾久之陽氣衰絕乳石補益藥不效服此收功常服延年益壽悅心明目補益筋骨食

養真丹 補血

好破故紙 炒 胡桃肉 去皮

右煉蜜和二味均如飴盛瓷器中旦日以溫酒化藥一匙熟水亦可或爲丸服

固精丸 治遺泄定心消痰暖腎水止血去黑痣

蒼朮 去皮用青鹽
蓮肉
枸杞子 北五味子
破故紙 熟地黃

右爲末將此爲丸如梧桐子大每服四十丸空心鹽湯溫下

秘精丸 補元氣壯神鎖精固陽道男子服之有奇功

蒼朮 龍骨
赤石脂 各一兩 大川烏 破故紙
川楝子 去核 舶上茴香 蓮肉 去心
白茯苓 去皮 遠志 去心甘草水煮 各壹兩

右爲末酒煮麪糊爲丸如梧桐子大朱砂壹兩另研爲衣三十圓漸加至百圓食前溫酒米飲鹽湯皆可婦人無子服之效

大造中丸 治諸虛不足小腹急痛脇肋脹膜骨肉酸痛短氣喘嗽痰多咳嗽潮熱多汗心下驚悸腰背強痛多臥少起

黃耆 去蘆 附子 炮去皮臍 鹿茸 酒炙 地骨皮 去木
續斷 去蘆 石斛 去根 人參 去蘆 川芎
當歸 酒浸 白芍藥 小草 各壹兩 甘草 炙半兩

右剉散每服叁錢水壹盞半薑五片煎不以時服

欬嗽加款冬花。唾血加阿膠。便精遺泄加龍骨。
怔忪加茯神。

黃耆建中湯 治男子女人諸虛不足，小腹急痛，脇肋䐜脹，臍下虛滿，胸中煩悸，面色痿黃，脣口乾燥，少力身重，胸滿短氣，腰背強痛，骨肉酸疼，行動喘乏，不能飲食，或因勞傷過度，或因病後不復，並宜服之。

黃耆 去蘆 參兩　肉桂 去皮 參兩　甘草 炙 貳兩　白芍藥 陸兩

右剉散，每服三錢，水一盞半，生薑三片，棗一枚，煎去滓，入餳少許，再煎令溶，空心稍熱服。

人參黃耆散 治虛勞客熱，肌肉消瘦，四肢倦怠，五心煩熱，口燥咽乾，頰赤心忪，日晚潮熱，夜有盜汗，胸脇不利，減食多渴，咳唾稠粘，時有膿血。

天門冬 去心　半夏 湯洗七次　桑白皮

鱉甲 去裙 醋炙　知母　紫菀　秦艽

人參 去蘆 一兩　白茯苓 去皮 一兩　黃耆　赤芍藥

柴胡　地骨皮　甘草 炙　桔梗

右為散，每服三大錢，水一盞半，煎，食後溫服。

安腎圓 治腎經久積陰寒，膀胱虛冷，下元衰憊，耳重脣焦，腰腿腫疼，臍腹撮痛，兩脇刺脹，小腹堅疼，下部濕癢，夜夢遺精，恍惚多驚，皮膚乾燥，面無光澤，口淡無味，不思飲食，大便溏泄，小便滑數，精神不爽，事多健忘，常服補元陽，益腎氣，功效殊甚。

桃仁　肉桂 去粗皮　白蒺藜 炒去刺　巴戟 去心

肉蓯蓉 酒浸　山藥　破故紙　茯苓

石斛　萆薢　白朮

川烏 炮，去皮臍

右為末，煉蜜圓如梧桐子大，每服三十圓，溫酒鹽湯任下，空心食前，小腸氣，炒茴香鹽酒下。

雙和湯 治男子婦人五勞六極七傷，心腎俱虛，精血氣少，緣成虛勞，百骸枯瘁，四肢倦怠，寒熱往來，咳嗽咽乾，行動喘乏，面色痿黃，略有所觸，易成他疾，或傷於冷則宿食不消，脾疼腹痛，瀉痢吐逆，或傷於熱則頭旋眼暈，痰涎氣促，五心煩熱，或因飢飽動作，喜怒驚恐，病隨而至，或虛脹而不思食，或多食而不生肌肉，心煩則虛汗盜汗，一切虛勞不敢服燥藥者，並宜服之，常服調中養氣，益血育神，和胃進食，補虛損。

白芍藥　當歸 洗　熟地黃 洗　黃耆

肉桂　甘草　川芎

右剉散，每服三錢，生薑三片，棗二枚，煎，空心食前服，忌生冷果核等物。

十四味建中湯 治榮衛不足，腑臟俱傷，積勞虛損，形體羸瘠，短氣嗜臥，寒熱頭痛，咳嗽喘促，嘔吐痰沫，手足多冷，面白脇痛，小腹拘急，百節盡疼，夜臥汗多，夢寐驚悸，小便滑利，大便頻數，失血虛極，心忪面黑，脾腎久虛，飲食失味。

當歸（去蘆酒浸焙）　白芍藥　白朮（炒）　麥門冬（去心）
甘草　肉蓯蓉（酒浸焙）　人參（去蘆）
川芎　肉桂（去粗皮）　附子（炮去皮臍）　黃耆（蜜炙）
半夏（湯洗）　茯苓（去皮）　熟地黃（酒洗焙）
右等分剉散每服三錢水一盞半薑三片棗二枚煎至七分食前服

[illegible] 治腎氣虛弱風冷乘之或血氣相搏腰痛如折起坐艱難俛仰不利轉側不能或因勞役過度傷於腎經或處卑濕地氣傷腰或墜墮傷損或風寒客搏或氣滯不散皆令腰痛或腰間似有重物繫墜起坐艱辛悉能治之

方見腰痛類

十全大補湯 治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛夜夢遺精面色痿黃腳膝無力一切病後氣不如舊憂愁思慮傷動血氣喘嗽中滿脾腎氣弱五心煩悶並皆治之此藥性溫不熱平補有效養氣育神醒脾止渴順正辟邪溫煖脾腎其效不可具述 又名十全補湯

人參（去蘆）　肉桂（去粗皮）　川芎　熟地黃（酒洗）
茯苓（去皮）　白朮　甘草　黃耆（去蘆）
川當歸（去蘆）　白芍藥（各等分）
右剉散每服三錢水一盞半生薑三片棗一枚煎至七分空心服

[illegible]散 治男子婦人氣血勞傷四肢倦怠肌體羸瘦骨節煩疼頭昏頰赤肢體枯槁或時咳嗽咯血或時寒熱五心煩熱痰涎咳嗽腰背引痛乍起乍臥夢寐不寧神情恍惚時有盜汗口苦無味不美飲食及治山嵐瘴氣寒熱往來

荊芥（去梗）　貝母（去心）　白芷（半兩）　乾葛（貳兩）
天仙藤　前胡（各壹兩）　羌活　肉桂（各半兩）
青皮　柴胡（去蘆）　甘草　秦艽（去蘆）
鱉甲（去裙醋炙）
右剉散每服三錢水一盞半生薑三片煎不拘時候為末酒調亦得常服養氣血調榮衛解倦怠

[illegible] 治男子婦人五勞七傷氣血虛損腰背拘急手足沉重百節痠疼面色黑黃肢體倦怠行動喘乏胸膈不快咳嗽痰涎夜多異夢盜汗失精嗜臥少力肌肉瘦瘁不思飲食日漸羸弱一切勞傷諸虛百損並能治之

乾蝎（去毒炒）　沉香　人參　木香
巴戟（去心）　附子（去皮臍）　肉豆蔻（煨）　肉桂（壹兩）
川當歸（去尾）　熟乾地黃（酒洗焙）　白茯苓
牛膝（去苗）　黃耆（各半兩）　羌活　柴胡（去蘆）
荊芥（去梗）　半夏（湯洗七次）　秦艽（半兩）
右剉散每服三錢水一盞半生薑三片葱白二寸棗二枚擘破煎至七分食前服

[illegible] 治腎氣虛憊下元冷憊夜多漩溺肢體倦怠漸覺羸瘦腰膝沉重嗜臥少力精神昏憒耳作蟬鳴面無顏色泄瀉腸鳴眼目昏暗牙齒蛀痛並皆治之

香附子　川烏　川練子（各[illegible]）
剉焙　熟乾地黃（[illegible]）　茴香（[illegible]兩）
川椒（貳兩去目及閉口[illegible]）
右為末酒糊圓如梧子大每服二十圓至三十圓空心
鹽湯鹽酒任下常服補虛損下元冷憊

[illegible]煎圓 治久虛積冷心腹疼痛嘔吐痰水飲食少味腸
脇虛滿臍腹弦急大腸泄瀉小便利數肌膚瘦瘁面色萎
黃腰膝少力腰膝緩弱及冷痃癖積聚上氣咳嗽久瘧久
痢腸風痔瘻婦人血海虛冷赤白帶下久無子息並宜服
荊三稜（[illegible]）　陳橘（[illegible]）
當歸（[illegible]）　萆薢　厚朴（[illegible]）　肉蓯蓉（[illegible]）

肉桂　附子（[illegible]）　陽起石（[illegible]）
巴戟（去心）　石斛（去根）　鹿茸（[illegible]）
牛膝（去苗[illegible]）　兔絲子（酒浸[illegible]）　杜仲（[illegible]）
吳茱萸（[illegible]）　乾薑（[illegible]各叁兩）　甘草（[illegible]）
右為末用酒伍升於銀石器內將橘皮末熬如膏却入
諸藥末攪和搜勻仍以臼內搗五伯杵圓如梧子大每
服二十圓空心溫酒或鹽湯下

生犀散 治骨蒸肌瘦頰赤口乾日晚潮熱夜有盜汗五心
煩燥及大病瘥後餘毒不解
犀角（鎊）　地骨皮（去苗）　秦艽（去蘆）　麥門冬（去心）
枳殼（[illegible]）　大黃（[illegible]）　柴胡（去苗）　茯苓（去皮）

赤芍藥　桑白皮（[illegible]）　黃耆（[illegible]）　人參（去蘆）
鱉甲（醋炙）　知母（各等分）
右剉散每服三錢陳青蒿一根烏梅一枝亦可小兒疳病
熱似骨蒸者及久病後或虛後時復寒作潮熱者瘧疾
亦用有痰加半夏熱較去大黃加黃芩之

[illegible] 治脾元氣弱久積陰冷心腹脇肋脹滿刺痛面色
青黃肌體瘦弱怠惰嗜臥食少多痰噫氣吞酸噦逆惡心
腹中虛鳴大便泄利胃中痞塞飲食不下噎塞霍亂吐瀉
轉筋及五膈五噎痃癖瘕聚翻胃吐食久痛久痢並治之
縮砂仁　胡椒　肉桂　厚朴（[illegible]）
附子（炮去皮臍）　川芎　當歸　陳皮

乾薑　甘草（[illegible]）　阿膠（[illegible]）
白朮（叁兩）　青鹽（[illegible]）　北亭（[illegible]）
五味子（揀淨[illegible]）
右為末用銀石鍋內入好酒醋五升白沙蜜十兩先下
北亭阿膠青鹽三味并好頭麪一升同煎稠粘便下藥
末半兩以來更煎如稀麪糊漸漸入藥末煎得所離火
取出更以乾藥末和搜成劑臼內搗千杵圓如梧桐子大
每服拾伍圓微嚼破用生薑鹽湯下溫酒亦可空心服
忌羊血豆豉汁

[illegible]湯 治男子婦人諸虛不足榮衛俱弱氣耗傷一切
虛損

鹿茸（[illegible]）黃耆（[illegible]） 當歸（[illegible]） 白芍藥
人參 附子（[illegible]） 肉蓯蓉（[illegible]） 肉桂（[illegible]）
杜仲（[illegible]） 石斛（[illegible]） 五味子（[illegible]） 白茯苓（[illegible]） 半夏
熟地黃（[illegible]） 白朮（[illegible]） 甘草（[illegible]）

右㕮咀每服三錢水一盞半生薑三片棗二枚煎至七分空心熱服

[illegible]治腎氣虛損腰腳筋骨疼痛膝脛不能屈伸久病腳膝緩弱每服一字空心豆淋酒下服訖麻痺少時須臾[illegible]當中痛嚼胡桃肉酒調下甚者三五服或寒濕氣治之

草烏頭（[illegible]） 全蝎（[illegible]） 天麻（[illegible]）
附子（[illegible]） 蒼朮（[illegible]）

右為末空心溫酒調下

[illegible]圓補腎臟暖丹田興陽道減小便填精益髓駐顏潤肌治元氣虛損面目黧黑口乾舌澀夢寐驚恐眼中冷淚耳作蟬鳴腰膝沉重百節痠疼項筋緊急背胛勞倦陰汗盜汗四肢無力及治婦人子宮久冷月脈不調或多或少赤白帶下並宜服之

狗脊（[illegible]） 紫金藤（[illegible]） 巴戟（[illegible]） 肉桂（[illegible]）
青鹽（[illegible]） 吳茱萸（[illegible]）

右為末酒糊為圓梧桐子大每服二十圓煖鹽酒送下[illegible]

湯亦可日午夜臥各一服

[illegible]圓治真氣虛損下焦傷竭臍腹強急腰腳疼痛亡血盜汗遺泄白濁大便自利小便滑數或三消渴疾飲食倍常肌肉消瘦陽事不舉顏色枯槁久服補五臟行榮衛益精髓進飲食

附子（[illegible]） 乾薑 兔絲子（[illegible]）
桂心 厚朴（[illegible]） 巴戟（[illegible]） 遠志（[illegible]）
破故紙（炒） 赤石脂（[illegible]） 川椒（[illegible]）

右為末酒糊圓梧桐子大溫酒或鹽湯下三十圓空心

[illegible]圓治元陽虛寒[illegible]手足厥冷

陽起石（[illegible]） 鍾乳粉

右等分為末酒煮附子末為圓梧桐子大每服五十圓空心米飲下

[illegible]圓治精血耗竭面色黧黑耳聾目昏口乾多渴腰腳疼小便白濁上燥下寒不受峻補

鹿茸（[illegible]） 當歸（[illegible]）

右各為末煮烏梅膏子為圓梧桐子大每服五十圓空心溫酒下

[illegible]圓治思慮傷心疲勞傷腎心腎不交精元不固面少顏色驚悸健忘夢寐不安小便赤濁遺精白濁足脛痠疼耳聾目昏口乾腳弱

人參（[illegible]） 遠志（[illegible]） 茯神（[illegible]） 龍骨

山茱萸(去核) 五味子 枸杞子 熟地黄(酒蒸)
柏子(炒) 肉蓯蓉 川牛膝(酒浸)
紫石英(火煅醋淬七次)
右為末酒煮山藥糊為圓梧桐子大每服七十圓空心
鹽酒或鹽湯下

〔天門冬圓〕治心血燥少口乾咽燥心煩喜冷怔忡恍惚小便
黄赤或生瘡瘍
天門冬(去心) 熟地黄(九蒸曝)
右為末煉蜜圓如梧子大每服百圓熟水人參湯任下
不拘時候

〔固真丹圓〕治真氣虛憊腳膝緩弱目暗耳鳴筋骨痿
夜夢遺精小便頻數一切虛損久服壯元陽益腎氣健筋
骨生血駐顏扶老資壽
蒼朮 川烏 附子(同上) 川楝子
巴戟(去心) 白朮(炒) 陳皮 肉蓯蓉
破故紙 茯苓(各一兩) 肉豆蔻 木香(不見火)
當歸 杜仲 熟地黄
兔絲子(酒浸) 茴香 黑牽牛(半生半炒) 山藥
晚蠶蛾 葫蘆巴 肉桂(不見火)
石斛 川牛膝(酒浸)
右為末酒煮麪糊圓梧桐子大每服四十圓空心鹽湯下

〔　〕治腎虛明目治腰疼及治精滑淋多四肢困
乏久服有效
黑牽牛 山藥 杜仲
川烏 川楝子 茴香 紅椒皮
青鹽 破故紙 陳皮 蒼朮
附子
右等分為末入青鹽同酒煮麪糊圓梧桐子大每服三
十圓空心鹽湯下

〔　圓〕治丈夫諸虛百損五勞七傷頭痛目眩手足
逆冷或煩熱有時冷痺骨疼腰髋不生肌肉食少脚
陽氣衰絕陰氣不行補經脈起陰陽安魂魄開三焦
破積聚消脾胃強筋練骨輕身明目除風去冷無所不治
赤石脂 茯神(各一兩) 山藥(二兩) 茯苓
巴戟 杜仲 牛膝 五味子
澤瀉 兔絲子 熟乾地黄 山茱萸
右為末煉蜜圓梧桐子大每服二十圓至三十圓食前
溫酒或米飲下此藥通中入腦

〔　〕男子方當壯年而真氣猶怯此乃稟賦素弱非
因之藥尤宜速服手足厥逆便陰
治之不惟不能愈疾大病自此生矣
藥力細微難見功效但固天元一氣使水升火降則五臟
自和百病自去此方主之

□□□酒浸去　川當歸洗去　山茱萸去核各四兩

麝香別研

右三件為末入麝香拌勻酒煮麪糊為圓梧桐子大每服一百粒或五十粒溫酒鹽湯任下

鹿茸圓 治腎氣虛憊面色黧黑目暗耳鳴心忪氣短喘動乏力腳膝緩弱小便滑數房室不舉股內濕痒小便澀痛出血遺精久服補五臟去萬病益顏色聰耳明目

兔絲子淘淨酒浸　石斛去根各叁兩　熟地黃

白茯苓去皮　川牛膝去苗酒浸　五味子

澤瀉　山茱萸　鹿茸

川續斷　桑螵蛸　覆盆子

防風去叉　杜仲去皮　石龍芮

肉蓯蓉酒浸　補骨脂酒炒　蓽澄茄　黑角沉香

茴香炒　川巴戟去心　大川芎半兩

肉桂去粗皮　綿附子炮去皮

右為末酒煮麪糊為圓梧桐子大每服二十圓溫酒或鹽湯下空心腳膝無力木瓜湯下晚食前服

大固陽湯 治脫陽證或因大吐大瀉之後四肢逆冷元氣不接不醒人事或傷寒新瘥誤行房小腹緊痛外腎搐縮面黑氣喘冷汗自出亦是脫陽證須臾不救

附子　白朮　乾薑各半兩

木香壹分

右㕮咀用水貳盞煎至八分去滓放冷灌服須臾又進一服合滓併

又方 桂枝貳兩好酒貳升煎至壹升候溫分作貳服灌之

又方 葱白連鬚三七莖細剉砂盆內研細用酒伍升煮至貳升分作三服灌之陽氣即回　生薑二七寸切碎研酒煎服亦效仍炒葱白或鹽熨臍下氣海勿令氣冷

□□□□ 治房室虛憊嗜欲不常失飢勞力或飲食不調肌肉減耗榮衛虛弱外邪所襲入於經絡頭痛背拘攣增寒壯熱身疼腰痛腳弱轉筋自汗手足冷四體麻痺五臟諸虛百病並皆治之

人參　藿香葉　厚朴去粗皮薑汁炒　黃耆各貳兩

交趾桂壹兩　川白芷貳兩　大當歸貳兩　五味子

白朮各壹兩　半夏　綿附子　熟地黃

川芎　白茯神　丁香　南木香

乾薑　甘草各壹兩

右㕮咀散每服三錢水壹盞半生薑三片棗子一枚煎空心溫服

■ 痼冷

□□丹 又名太乙□□丹此丹養火不計歲年有起死回生之功□□換骨之妙昔鍾呂除三真人張柏子所煉皆此丹也粒至小功甚大治諸虛百損五勞七傷□風□□□□寒□冷水腫□□□痢久瘧一切男女老幼因

發之疾百藥不能療者悉皆主之初服覺腹中微撓或欲吐瀉則是驅逐諸病無病則不動丹服則不忌經云服丹之人能絕諸欲斷五腥不食雞魚大蒜陳臭等物當爲地仙矣若未免此服及一兩延壽二紀大率救濟扶危衛生伐病無出此丹之右服時以平旦取一粒在手內捷令暖置口中可加至十粒或用棗肉圓面東叩齒嚥念呪曰返我當歸我鄉服之千日朝虛皇一氣七遍以井花水或人參棗湯送下孕婦不可服

此丹無方惟有丹母不知是何藥修煉得成修煉時以大朱砂壹斤抽汞置丹母於鼎內以汞安於丹母上覆以真金箔伍拾片於靜室養火朝東北暮西南一月後開鼎如覺丹母傷火以清燒沉香水浴一載換丹成如穀芽樣或如花果樣用銀剪刀剪下入大羅甸內盛一伏時以羅篩深黑爲度取出用玉石杵臼研爲細末以木蜜爲圓圓如粟米大依前湯引服尤有功效所惜者此丹母自北而南多爲名宦巨室收藏不入醫家抽汞修煉家另有法

〔養氣丹〕治諸虛不足氣血怯弱頭目昏眩肢節倦怠心志昏憒夜夢失精小便滑數脾胃氣虛又治諸風癱瘓半身不遂語言蹇澁腰脚重痛寒濕氣痺或久寒宿冷泄瀉發瘧寒熱下痢赤白及腸風痔瘻下血不止婦人子臟久冷崩漏帶下五色月候不調腹脇刺痛血瘕血閉羸瘦之方並皆治之

代赭石　紫石英　赤石脂　禹餘粮（已上四味[illegible]）
陽起石（煅）　肉豆蔻（麵裹煨）　鹿茸（酒炙）　破故紙（酒炒）
鍾乳粉　五靈脂（酒研）　茴香（酒炒）　柏子仁
當歸（酒浸炙）　遠志（去心酒浸炒）　沒藥（別研）　白茯苓
附子（炮）　天雄（炮）　胡椒　沉香
丁香　木香　乳香　黃耆（蜜炙）
山藥　茯苓（去皮）　肉桂　巴戟（去心）
血竭　琥珀　朱砂　麝香（[illegible]）

右爲末糯米粥圓梧桐子大留朱砂麝香爲衣每服三十圓空心人參湯或棗湯下婦人醋湯

〔黑錫丹〕治丈夫元臟虛冷真陽不固三焦不和上熱下冷耳內虛鳴腰背疼痛心氣虛乏飲食無味膀胱久冷夜多小便婦人月事愆期血海久冷惡露不止赤白帶下及陰毒傷寒四肢厥冷不省人事急用棗湯吞一二百粒即便回陽此藥大能調治榮衛升降陰陽補損益虛回陽返陰

黑錫（去滓稱）　硫黃（透明者各二兩）　附子（炮去皮臍）　破故紙（酒浸炒）
肉豆蔻（麵裹煨）　茴香（炒）　金鈴子（[illegible]）　陽起石（[illegible]）
木香　沉香（各半兩）　肉桂（半兩）　胡蘆巴（[illegible]）

右用新鐵銚內如常法結黑錫硫黃砂子地上出火毒自朝至暮研令極細餘藥並杵羅爲細末一處和勻入

研酒糊圓梧桐子大陰乾入布袋內擦令光瑩每服五七十圓空心薑鹽湯或棗湯下婦人艾醋湯下如一切冷疾鹽酒鹽湯空心下叁肆拾圓年高將有者熱服之

【靈砂】性溫無毒主五臟百病益精養神補氣明目安魂魄通血脈止煩滿殺邪魅惡鬼祭衛小交養陰陽不升降上盛下虛頭旋氣促心腹冷痛翻胃吐逆霍亂轉筋臟腑滑泄赤白下痢久服通神輕身不老令人心靈此丹按仙經服餌之法會五行符合是妙體性輕清不隨煙焰飛走男女老幼皆可服

水銀 壹斤　硫黃 肆兩

右二味用新鐵銚炒成沙子或有煙焰即以醋酒傾研細入水火鼎醋調赤石脂封口鐵線扎縛鹽泥固濟用炭二十斤煅如鼎子裂筆蘸赤石脂頻抹其處火盡為度經宿取出研為細末糯米糊為圓如麻子大每服三粒空心棗湯米飲或井花水人參湯服量病輕重增至五七粒忌猪羊血菉豆粉冷滑之物

【[illegible]】以前靈砂養火十二月乃名成丹治諸虛用之其功十倍

【三建湯】治真氣不足元陽久虛寒邪攻衝肢節煩疼腰脊痠疼自汗厥冷大便滑泄小便白濁及中風涎潮不省人事傷寒陰證厥逆脈微皆可服之

天雄　附子　大川烏 各炮去皮臍各壹兩

右剉散每服肆錢水壹盞薑拾片煎不拘時服氣不順加木香沉香加丁香胡椒名丁切三建湯

【金液丹】固真氣暖丹田堅筋骨壯陽道除久寒痼冷補勞傷虛損男子腰腎久冷心腹積聚脇下冷癖腹中諸蟲失精遺溺形羸力劣腳膝疼弱冷風頑痺上氣衄血咳逆寒熱霍亂轉筋虛滑下痢又治痔瘻濕䘌生瘡下血不止及婦人血結寒熱陰蝕疽痔

硫黃 拾兩先飛煉去砂石秤研為細末用磁合子盛以水和赤石脂封口以鹽泥固濟曬乾地內先埋一小罐子盛水令滿安合子在上用泥固濟訖慢火養七日七夜候足加頂火壹斤煅候冷取出研為細末

右藥末壹兩用蒸餅壹兩湯浸握去水脈為圓梧桐子大每服三十圓多至百圓溫米飲下空心服之又治傷寒陰證身冷脈微手足厥逆或吐或利或自汗不止或小便不禁不拘圓數宜併服之得身熱脈出為度

【附子理中圓】治脾胃冷弱心腹疞痛嘔吐泄利霍亂轉筋體冷微汗手足厥寒心下逆滿腹中雷鳴嘔噦不止飲食不進及一切沉寒痼冷並皆治之 方見中卷類

附子 炮去皮臍　人參　乾薑 炮　甘草　白朮 各叁兩

右為末煉蜜圓每兩作拾圓每服一圓以水一盞化破煎七分空心稍熱服

【震靈丹】此丹不犯金石飛走有性之藥不僭不燥奪造化沖和之功大治男子真元衰憊五勞七傷臍腹冷疼肢體

橘白古本作 …　　　　　　　　　　　　　　　禹古　　　　　　　　　　　　　　　　　　涎潮古本作

痰痛上盛下虛頭目暈眩心神恍惚血氣衰微及中風涎潮
緩攣足不遂筋骨拘攣腰膝沉重容枯肌瘦目暗耳聾口
苦舌乾飲食無味心腎不足精滑夢遺膀胱疝墜小腸淋
瀝夜多盜汗久瀉久痢嘔吐不食八風五痺一切沉寒痼
冷服之如神及治婦人血氣不足崩漏虛損帶下久冷胎
臟無子服之無不愈者

禹餘粮（火煆醋淬不計遍以手捻得碎為度） 丁頭代赭石（如禹餘粮製）
紫石英 赤石脂（以上四味並作小塊入坩堝內……） 滴乳香（别研） 沒藥（去砂石研）
五靈脂（去砂石研） 朱砂（水飛過）

右為末以糯米為糊圓如小雞頭大曬乾出光每一粒

空心溫酒下冷水亦可常服鎮心神駐顏色溫脾腎理
腰膝除尸疰蠱毒辟鬼魅邪癘久服輕身漸入仙道忌
猪羊血恐減藥力婦人醋湯下孕婦不可服極有神效
不可盡述

【來復丹】此藥配類二氣均調陰陽奪天地沖和之氣乃水
火既濟之方可冷可熱可緩可急善治榮衛不交養心腎
不升降上實下虛氣閉痰厥心腹冷痛臟腑虛滑不問男
女老幼危急之證但有胃氣無不獲安補損扶虛救陰助
陽為效殊勝

硝石（一兩同硫黃並為末入磁碟內以微火漫炒用柳篦子不住手攪令陰陽氣相入不可火太過恐傷藥力再研極細名二氣末） 太陰玄精石（研飛） 青皮（去白）

陳皮（去白 貳兩）
納上硫黃（研） 硝石（明者 各壹兩） 五靈脂（須擇仙臺山產用水飛去沙石 曬乾 貳兩）

右用五靈脂青皮陳皮為末次入玄精石末及前硝石
硫黃末拌勻以好醋打糊圓豌豆大每服叁拾粒空
心粥飲吞下甚者五十粒小兒三五粒新生嬰兒一粒
小兒慢驚風或吐利不止變成慢風搐搦者非風也胃
氣欲絕故也用伍粒研碎米飲送下老人伏暑迷悶紫
蘇湯下婦人產後血逆上搶悶絕并惡露不止及赤白
帶下並用醋湯下常服和陰陽益精神散腰腎陰濕止
腹腸冷疼立見神效應諸疾不辨陰陽證者並宜服之
靈異不可具記

一 養正丹 却邪輔正助陽接真治元氣虛虧陰邪交蕩正氣
乖常上盛下虛氣不升降呼吸不足頭旋氣短心神怯弱
夢寐驚悸遍體盜汗腹痛腰疼或虛煩狂言口乾上喘翻
胃吐食霍亂轉筋咳逆不定又治中風涎潮不省人事陽
氣欲脫四肢厥冷如傷寒陰盛自汗唇青脈沉最宜服之
及婦人產後血氣身熱月候不均帶下腹痛悉能治療常
服濟心火強腎水進飲食

水銀 黑錫（去滓淨秤與水銀結沙子） 硫黃（研細）
朱砂（研細 各壹兩）

杖古作枝

右用黑盞壹隻火上鎔黑鉛成汁次下水銀以柳杖子
攪勻次下朱砂攪令不見星子放下少時方入硫黃末

急攪成汁和勻如有焰以醋灑之候冷取出研如粉極細用糯米粉煮糊圓菉豆大每服二十粒加至三十粒塩湯下此藥升降陰陽既濟心腎空心棗湯送下神效不可具述

局方

玉華白丹 清上實下助養根元扶衰救危補益臟腑治五勞七傷夜多盜汗肺痿虛損久嗽上喘霍亂轉筋六脉沉伏唇口青黑腹脇刺痛大腸不固小便滑數夢中遺泄肌肉瘦瘁目暗耳鳴胃虛食減久瘧久痢積冷痼冷諸藥不愈者服之如神

白石脂 淨瓦閣起火煅紅研細水飛半兩　鍾乳粉 煉成者壹兩

陽起石 用甘鍋於大火中煅令通紅取出酒淬放在地上令乾研細半兩

缺乞

左顧牡蠣 隨多少用韭葉擣汁鹽泥固濟火煅放冷取白者秤半兩

右各細研如粉拌和作一處令勻研一二日以糯米粉煮糊圓如雞頭大入地坑出火毒一宿每服一粒空心濃煎人參湯放冷送下熟水亦可常服溫平不僭不燥澤肌悅色祛除百病婦人久無妊者以當歸熟地黃浸酒下便有符合造化之妙或久冷崩帶虛損臍腹撮痛艾醋湯下服畢以少白粥壓之忌豬羊血菉豆粉恐解藥力尤治久患腸風藏毒

效局方作傚

局方

金鎖正元丹 治真氣不足元臟虛弱四肢倦怠百節痠疼頭昏眩痛目暗耳鳴面色黧黑鬢髮脫落頭皮腫痒精神昏困手足多冷心胸痞悶繞臍切痛膝脛痠疼不能久立或腳弱隱痛步履艱難腰背拘急不得俛仰腹痛氣刺兩脇虛脹水穀不消大便不調呃逆惡心飲食減少恍惚多忘氣促喘乏夜多異夢心忪盜汗小便滑數遺精白濁一切元臟虛冷皆治之

局方

五倍子 四兩　巴戟 去心十兩　茯苓 六兩　葫蘆巴 炒半斤

補骨脂 酒浸炒五兩　肉蓯蓉 洗焙十兩　龍骨　朱砂 一兩別研

右為末入研藥令勻酒糊圓梧桐子大每服十五圓至二十圓空心食前溫酒吞下鹽湯亦可

局方

四柱散 治丈夫元臟氣虛真陽耗散兩耳常鳴臍腹冷痛頭旋目暈四肢倦怠小便滑數泄瀉不止凡臟氣虛弱者悉宜服之

木香 濕紙裹煨　茯苓　附子 炮去皮臍　人參 各一兩

右剉散生薑二片棗子一枚鹽少許煎空心食前服

薑附湯 治同上 方見中寒類

欽陽丹 治諸虛不足心腎不安氣弱頭暈自汗力倦陽氣不斂安神益志順氣調榮甚妙

靈砂　鍾乳 煉成者研　金鈴子 蒸熟去皮核　葫蘆巴 酒浸炒

沉香　木香　附子 炮去皮臍　肉豆蔻 麵裹煨

陽起石 水飛研細　破故紙 酒浸炒　舶上茴香 炒　牛膝 酒浸去蘆

上各壹兩

鹿茸 酒炙　蓯蓉 酒浸　當歸頭 壹二兩

巴戟 去心壹兩　肉桂 半兩

右為末研如令勻酒煮糯米糊圓梧桐子大日乾每服

三十圓空心棗湯下塩湯或溫酒亦可

盛

沉附湯治上盛下虛氣不升降陰陽不和胷膈痞滿飲食不進肢節痛倦

附子炮去皮臍重一兩 沉香剉半兩

右剉散分作叁服水二盞姜十片煎至八分食前溫服

濟生

耆附湯治氣虛陽弱虛汗不止肢體倦怠

黃耆去蘆蜜炙 附子炮去皮臍

右等分剉散每服四錢水二盞薑十片煎不拘時服

參附湯治真陽不足上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈但是陽虛氣弱之證並宜服之

人參半兩 附子炮去皮臍重一兩

右剉散分作三服水二盞薑十片煎食前溫服

茸附湯治精血俱虛榮衛耗損潮熱自汗怔忡驚悸肢體倦乏但是一切虛弱之證並宜服之

鹿茸去毛酒炙一兩 附子炮去皮臍一兩

右剉散分作四服水二盞生姜十片煎至八分去滓食前溫服

桂附湯治虛汗不止及體虛失血大效

交趾桂去皮一兩 綿附子炮去皮臍一枚

右剉散每服三錢水二盞姜三片棗二枚煎食前溫服

元陽秋石丹治氣弱久嗽針灸不效頭眩腹脹喘滿積年腫滿耳少色慾過度未老眼昏腑疾遺泄白濁腰背時痛服之真還元衛生之寶如金器以竹器攪以金器竹器補之

真標本作之

陰煉法小便三五石夏月雖腐敗亦堪用分置大盆中以新水一半以上相和旋轉攪百匝放令澄清辟去清者只留濁腳又以新水同攪水多為妙又澄去清者直候無臭氣再研以乳男子乳和如膏烈日中暴乾如此九度仍須待好月色乃和盖假太陽氣也第九度即圓之如梧桐子大暴乾每服三十圓溫酒下

陽煉法小便不計多少大約兩桶為一擔先以清水挼好皂角濃汁以布絞去滓每小便一桶入皂角汁一盞用竹箆急攪令百餘遭乃止直候小便澄清白濁皆碇乃止徐辟去清水不用只取濁腳併作一桶又用竹箆子攪百餘匝更候澄清又辟去清者不用凡十數擔不過取得濃腳一二斗其小便須先以布濾去滓物取得濃汁入淨鍋內熬乾刮下擣碎再入鍋以清湯煑令化乃於筲箕內布筋紙兩重傾入紙筲箕內下淋過取淋下清汁再入鍋熬乾又用湯煑化再依前法下淋如熬乾色未潔白更准前下淋直候色如霜雪即止乃入固濟沙合內歆口火煅成汁傾出如藥生成濁更煅一兩遍候瑩白玉色即止細研入沙合內固濟頂火四兩養七晝夜久養火尤善再研每服二錢空心溫水下或酒棗肉為圓如梧桐子大每服三十圓並得空心服陽煉陰煉日午各一服 又名還元丹咳嗽癃瘵針灸不效

服此，主愈常病頻融腹數，久之漸加喘滿，經年妄因服
此有驗，皆只是火煉者，又傳陰煉法，云須得二法相兼，
其藥能洞入骨髓，無所不至，非惟治疾，可以常服，有功
無毒。火煉秋石，人皆能之，藥成時大作燥煩，煉數日
臭達四隣。此法極省力，只一小鍋便可煉，體如金石，永
不暴潤，與常法功力不侔，久病人只數服，極有神效，實
能再生人也。

灸法 腎與膀胱俱虛，灸腎腧百壯，穴在對臍兩邊，向後夾
脊相去各一寸五分，兼治便濁失精，五藏虛勞，痢冷，小
腹弦急。

夢泄精，三陰交，二七壯，夢斷神良，穴在內踝上大脉上。

肆指足

諸虛極，灸膏肓腧、氣海穴，壯數愈多愈妙。

五痿

加味四斤圓 治腎熱肝虛，熱淫於內，致筋骨痿弱，自不勝
持，起居須人，足不任地，驚恐戰掉，潮熱時作，飲食無味，不
生氣力，諸虛不足。

蓯蓉 酒浸　牛膝 酒浸　天麻　木瓜 乾
鹿茸 燎去毛，切，酥炙　熟地黃　五味子 酒浸　菟絲子 酒浸，別研

右為末，煉蜜圓如梧子大，每服五十圓，溫酒米飲食前
任下。一法不用五味子，有杜仲。

鹿角圓 治五痿，皮緩毛瘁，血脉枯槁，肌肉薄著，筋骨羸弱，
飲食不美，庶事不興，四肢無力，爪枯髮落，眼昏唇燥，疲憊
不能支持。

鹿角 鎊，一斤　大附子 一生，去皮臍，一兩半　熟地黃 四兩

右用大麥米二升，以一半藉底，以一半在上，以二布巾
隔覆，炊一日，取出藥，與麥別焙乾，為末，以浸藥酒添清
酒，煮麥粉為糊，搜和，得所，杵三千下，圓如梧子大，每服
五十圓，溫酒或米湯下，食前服。

芎桂散 治四肢疼痛，軟弱，行履不便。

川烏頭 二兩，切作片，以水浸一宿，切作算子條，更以米泔浸一宿，日乾，炒微赤為度
川芎 兩半　桂心 一兩　甘草 炙　乾薑 一兩半

右為末，每服二錢，溫鹽酒調下，日三服。

藿香養胃湯 治胃虛不食，四肢痿弱，行立不能，皆由陽明
虛，宗筋無所養，遂成痿躄。

藿香　白朮　白茯苓　神麴 炒
烏藥 去木　縮砂仁　薏苡仁 炒　半夏麴
人參 各半兩　蓽澄茄　甘草 炙，各三分半

右剉散，每服四錢，水一盞半，生薑五片，棗二枚，同煎七
分，去滓，不以時服。

積熱

三黃圓 治三焦積熱，頭目昏痛，肩背拘急，肢節煩疼，熱氣
上衝，口苦唇焦，咽喉腫痛，痰涎壅滯，眼赤睛疼，及大便秘
澀，或下鮮血。

大黃酒蒸 黃連去鬚 黃芩各等分
右爲末煉蜜圓梧桐子大每服五十圓不拘時熟水下、
臟腑壅實可加圓數以利爲度、
三 荊黃湯治風熱結滯或生瘡癤、
荊芥四兩 大黃一兩
右剉散每服三錢水一盞半煎空心服、
吉 三 涼膈散治大人小兒臟腑積熱口舌生瘡痰實不利煩躁
多渴腸胃秘澀便溺不利一切風熱並能治之、
連翹四兩 甘草 川大黃 朴硝各二兩
薄荷去梗 黃芩 山梔子仁各一兩
右剉散每服三錢竹葉七片蜜少許煎食後服爲末以
薄荷湯調亦可
吉 三 洗心散治風壅涎盛心經積熱口苦唇燥眼澀多淚大便
秘結小便赤澀、
白朮一兩半 麻黃和節 當歸洗去 荊芥穗
芍藥 甘草 大黃煨紙裹煨去皮各六兩
右剉散每服三錢水一盞半生姜三片薄荷葉七皮煎
服爲末茶清調亦可、
吉 八正散治大人小兒心經邪熱一切蘊毒咽乾口燥大渴
引飲心忪面熱煩躁不寧目赤睛疼唇焦鼻衄口舌生瘡
咽喉腫痛又治小便赤澀或癃閉不通及熱淋血淋、
車前子 瞿麥 萹蓄[illegible] 白滑石

甘草 梔子仁 木通去皮節 大黃各半斤
右剉散每服三錢水一盞半用燈心十莖煎食後臨臥
溫服小兒量力少少與之或加麥門冬去心尤妙、
四 甘露飲治丈夫婦人小兒胃中客熱牙宣口氣齒齦腫爛、
時出膿血目瞼垂重常欲合閉或即飢煩不欲飲食及赤
目腫痛不任涼藥口舌生瘡咽喉腫痛瘡疹已發未發皆
可服之又療脾胃受濕瘀熱在裏或醉飽房勞濕熱相搏
致生疸病身面皆黃肢體微腫胸滿氣短大便不調小便
黃澀或時身熱並皆治之
枇杷葉去毛 乾熟地黃 天門冬去心 山茵陳
枳殼去穰少 石斛去蘆 甘草 黃芩
生乾地黃 麥門冬去心
右等分剉散每服二錢水一盞煎食後臨臥溫服小兒
一服作兩服仍量歲數加減
消毒犀角飲治大人小兒內蘊邪熱咽膈不利痰涎壅盛
眼赤瞼腫腮項結核癰腫毒聚遍身風疹痒毒赤瘤及瘡
疹已出未出不能快透並皆治療小兒疹豆欲出及已出
熱未解急進此藥三四服快透消毒應手神效、
防風弍兩 鼠粘子[illegible]斤 荊芥穗八兩 甘草半斤
右剉散每服三錢水一盞煎食後溫服
青金丹清心解熱除潮治譫語舌生白胎痰盛氣壅煩渴
引飲及時行熱疫發熱如火連日不愈或熱極生風大人

小兒均可服
天門冬去心 麥門冬各一兩 天麻弍分 全蝎大者五箇
牙硝二錢 天竺黃二分 鵬砂一分 雄黃一分
紫粉四分 白附子二分 辰砂一分 水粉一兩
片腦子半分 生麝香半分 金銀箔各十片
右另研腦麝辰砂水粉金銀箔同前藥末入白甦二兩
水圓以貌花為衣如鷄頭大每圓用麥門冬生地黃煡
心薄荷煎湯磨化服合時加甘草人參亦尤妙
薄荷煎治口舌生瘡痰涎壅塞咽喉腫痛
薄荷一斤取頭末用二兩 腦子半錢 川芎半兩取末弍分
甘草半兩取末弍分 縮砂仁半兩取末弍錢

右和匀煉蜜成劑任意嗜食一方無腦子有桔梗
玄明粉治邪熱所乾膈上氣滯五藏秘澁
右以朴硝煎過澄濾五七遍至夜於星月下露至天明
自然結作青白塊子用甕罐子按實於炭火內從慢至
緊自然成汁煎沸直候不響再加頂火一煅便取出於
淨地上倒下用盆合蓋了以去火毒然後研為細末每
二斤入甘草生熟二兩為末一処攪勻臨卧酌量用之
或一錢二分以桃花煎湯或葱白湯下朴消性本寒燒
過性温無毒
天竺黃散治臟腑積熱煩燥多渴口舌頰生瘡咽喉腫痛
目赤鼻衄丹瘤結核癰瘡腫痛上壅痰喘伏暑燥熱瘡疹人

山梔子去殼 連翹各二分 甘草炙各弍分 蔵蒼根一兩陸分
雄黃飛研去毒 天竺黃五分 鬱金用皂角水煮乾切片焙乾三分
右為末每服一分食後臨卧改新水調下妙凡積熱病
服之胸次頓爽或瘡利瘡疹服之亦可痂成片自落
神芎圓治諸熱方見頭痛部
心煩清涼飲治血脉壅實臟腑生熱頰赤多渴五心煩燥
睡卧不寧四肢勅倦又因飲食不時寒温失度血氣不理
腸胃不調或温壯連滯欲成伏熱不歇欲發風癇又治風
熱結核頭面瘡癤目赤咽痛瘡疹餘毒一切壅滯並宜服
大黃炒下麸 赤芍藥 當歸去芦 甘草各等分
右剉散每服三分水一盞半煎食後臨卧温服小兒量

大小虛實加減微溏利為度加荊芥穗尤妙
大三黃圓大作黃治上焦壅熱咽喉腫閉心膈煩燥小便赤澁口
舌生瘡目赤睛疼燥渴心煩齒痛
大柏皮 黃連 山豆根 黃芩各四分
滑石二分 黃藥四分 鵬砂二分 腦子
麝香 甘草各一分 百草霜四分
右為末新汲井花水圓如小指頭大每服一圓入口含
化旋旋嚥下
解毒雄黃圓西百去毒令鮮可用取積下熱去風毒
雄黃研飛 川鬱金各一 巴豆十四个去油
右為末醋水麪糊圓或水圓如麻子大每服五圓加至

七圓挹茶清下重者每貫用此喉閉以熱茶清調灌下

牛黃涼膈圓治上焦壅熱口乾咽痛煩燥涎潮
馬牙硝　寒水石煅　硬石膏研各二　甘草炙壹兩
紫石英研飛　牛黃　腦子　麝香各一兩
牛膽南星三分
右為末煉蜜圓每兩作四十圓每服一圓溫薄荷人參湯調下

防風通聖散治一切風熱鬱結氣血壅滯筋脈拘攣手足麻痺頭痛昏眩腰脊強痛口苦舌乾咽嗌不利胸膈痞塞咳嗽喘滿腸胃燥澀大小便秘難中風暴瘖不語風熱瘡疥并酒熱毒小兒抽搐驚風並宜服之方見熱證類

灸法治胃中熱病灸三里三十壯穴在膝下三寸

○心恙

熱證朱砂圓鎮心神化痰涎退潮熱利咽膈止煩渴
鐵粉　天竺黃研各一　金銀箔　括仁　人參式分
腦子半分　生麝香一分　輕粉二分　真犀角二分
海金砂一兩　朱砂五分
右為末水圓朱砂為衣共圓作六百圓每一圓至五圓痰盛潮熱薄荷沙糖生葛自然汁井水下在言語涎壅膈上地龍三兩薄荷及沙糖水研心神不寧金銀箔薄荷湯化下

洗心散治心神煩燥涎壅咽乾口苦多渴方見積熱類

瀉心湯治心受積熱譫言發狂逾墻上屋
大黃　黃芩　黃連各五分
右剉散每服四分水一盞半煎服

甘遂散治癲癇及婦女心風血邪
右以甘遂壹錢為末用猪心取三管血三條和甘遂多少和之將心批作兩片入在內再合線縛定外用皮紙裹濕慢火煨熟不可焦過取藥細碾入辰砂末一錢和勻分作四圓每服一圓將所煨猪心煎湯化下再服別用猪心亦可過半日大便下惡物後調和胃氣凡此病乍作乍醒者難不食走癡者死

辰砂妙香散治男子婦人心氣不足志意不寧驚悸恐怖悲憂慘戚虛煩少睡喜怒不常夜多盜汗飲食無味頭目昏眩
麝香一分別研　山藥一兩薑汁炙　人參半兩　木香煨一兩
茯苓不焙　茯神去木　黃耆各一兩　桔梗半兩
甘草炙半兩　遠志去心一兩薑汁　辰砂三分別研
右為末每服二錢溫酒調不以時候

虛證引神歸舍丹治心氣亦治心風
大天南星生用去皮臍一兩　附子炮去皮臍上者七錢半
朱砂一兩水飛
右為末用猪心血圓梧子大如不稠粘入麪糊少許煎志萱草根湯下

茯神圓治心虛或癲或疼
附子大者一枚作罋入塊硃砂半兩依舊元物蓋之以茯神和麪作劑裹燒
右爲末豬心血爲圓人參湯下
驚氣圓治驚憂積氣心受風邪發則牙關緊急涎潮昏塞
醒則精神若癡
附子炮去皮臍 南木香
橘皮 白僵蚕炒 花蛇酒浸去皮骨
天南星洗浸薄切片薑汁浸一宿 麻黃去節各半兩 乾蝎去毒一分 紫蘇子炒一兩
朱砂一分留少許爲衣
右爲末入研腦子麝香少許同研勻煉蜜圓如龍眼大
用少朱砂爲衣每服一圓金銀薄荷湯化下溫酒亦可
鎮心圓治心氣不足老人虛人及用心過度者心脉虛弱
而心恙並宜服之
右用大附子一箇去皮臍切作片子踈絹袋盛用地黃
自然汁一大升銀石器中慢火熬候地黃汁將盡取出
附子曬乾爲末再入餘地黃汁研成劑圓如菉豆大每
服三十圓米飲下若病二三十年者只兩箇附子可較
二三年者一箇附子較矣
通治鐵粉散治癲狂譫語亂說神崇不避親踈登高履險
或歌或笑裸體不飲食數日昏不知人及風癇狂怒或如
醉如癡
顆塊大朱砂一兩另研 紅明琥珀一兩另研 真鐵粉
大南星二兩 圓白半夏二兩 白礬煅五錢

白附子炮二兩 大川烏一兩生去皮臍 羌活二兩
全蝎五十个 真金箔三十片 僵蚕一兩去絲嘴
右爲末每服四錢生薑四兩淨洗取自然汁溫煖調服
如不任辣味加湯水少許服之立效
十四友圓補諸虛不足益血收斂心氣治怔忡不寐精神
昏倦睡卧不安
柏子仁別研 遠志去心酒浸焙 酸棗仁炒香 紫石英明亮者
熟乾地黃洗 川當歸洗 白茯苓去皮 茯神去皮
人參去蘆 黃耆蜜炙 阿膠蛤粉炒 肉桂去粗皮各一兩
龍齒二兩 辰砂一兩另研
右爲末煉蜜圓如梧子大每服三四十圓棗湯食後臨
卧服嘗有患心疾怔忡健忘夢寐恍惚多不得睡是狀
無不有心藥無不服未能收效蓋此疾本憂愁思慮耗
心血而得之今欲安心當用當歸地黃等滋養心血若
更服發散藥如菖蒲之類心氣愈散難收斂之雖見功
效緩用心過而成此疾也服之大覺有神效
寧志圓好朱砂一兩將熟絹一小片包裹以線扎定獖豬
心一枚竹刀子切破不得犯鐵用紙拭去血入朱砂包子
於豬心內却用麻線縛合豬心又以甜筍殼再裹了麻皮
扎定無灰酒二升入砂罐子或銀器內煮酒盡爲度去線
并筍殼取朱砂別研將豬心竹刀細切砂盆內研令爛却
入後藥末并朱砂棗肉爲圓留少朱砂爲衣藥末須隔日

碾下棗肉於黃猪心目絕早煮熟剝去皮核取肉四兩用

患心風服此一料其病頓減

人參　白茯苓　當歸洗去土　石菖蒲

乳香別研　酸棗仁

右為末和圓如梧子大，以留下朱砂為衣，每服五十圓

人參湯下。

抱膽圓治男子婦人一切癲癇風狂或因驚恐怖畏所致

者及婦人產後血虛驚氣入心并室女經脉通行驚邪蘊

結纏服此累曾經效

水銀二兩　朱砂壹兩細研　黑鉛一兩半　乳香一兩研

右將黑鉛入銚子內下水銀結成砂子次下朱砂滴乳

乘熱用柳木槌研勻圓如雞頭大每服一圓空心井花

水吞下病者得睡切莫驚動覺來即安再一圓可除根

一醉散治心恙

無灰酒式椀　真麻油四兩

右和勻用楊柳枝式十條逐條攪一二百下換遍柳條

直候油酒相入如膏煎至七分椀狂者強灌之令熟睡

或吐或不吐覺來即醒。

又方蕊珠圓

大猪心一枚取血　大朱砂二兩為末　青靛花一匙

右先將青靛花同猪心血一處同研次以朱砂末共圓

如梧子大每服二十圓茶酒下不拘時甚者不過三服

鬱金散治顛狂可畏數年不愈多因驚憂得之痰涎留於

心竅。

蟬肚鬱金七兩真蜀川來者　明礬三兩

右為末薄糊為圓如梧子大每服五十圓湯水任服初

服覺心胸間有物脫去神氣洒然再服稍甦多服此藥

大能去痰安平必矣。

朱雀圓治心神不定恍惚不樂火不下降時復振跳常服

消陰養火全心氣。

茯神二兩去皮　沉香半兩

右為末煉蜜圓如小豆大每服三十圓食後人參湯下

陳艾湯治盜汗只自心頭出者名曰心汗。

茯苓二兩半

右為末每服二錢濃煎艾湯調下。

歸神丹治一切驚憂思慮恍惚作事多忘心氣不足癲癇

狂亂及大病後心虛神不守舍久服養神思益眼力

顆塊大朱砂二兩入猪心內燈心纏縛

金箔二十片　真銀箔二十片　深紅琥珀一兩

酸棗仁二兩去殼　大遠志　白茯神二兩去木

羅參二兩　大當歸二兩　龍齒一兩

右為末酒煮稀糊圓如梧子大每服二九圓至三九圓

去心麥門冬湯下癲癇甚至者乳香人參湯下夜寐不

寐或多亂夢炒酸棗仁湯下。

局方

●寧補寧心丹治丈夫婦人心氣不足志意不定神情恍惚夜多異夢忪悸煩鬱及腎氣傷敗血少氣多四肢倦怠足脛酸疼睡卧不穩夢寐遺精時有白濁漸至羸弱

酸棗仁 去皮隔紙炒　車前子 一兩去土　熟地黃 洗淨

白茯苓 去皮　五味子 去枝

天門冬 去心　遠志 去心甘草水煮　山藥 各一兩

茯神 去皮　麥門冬 去心　肉桂 不見火各一兩

人參 五分　龍齒 一兩　朱砂 細研水飛

右爲末煉蜜圓如梧子大每服三十圓空心飯飲下溫酒亦可加至五十圓常服益精髓養氣血悅顏色

本事引杜壬

獨效苦丁香散治忽患心疾癲狂不止得之驚憂之極痰氣上犯心包當伐其源

右以苦丁香即瓜蒂半兩爲末每服一錢重井花水調滿一盞投之得大吐之後熟睡勿令人驚起凡吐能令人目翻吐時令閉雙目或不省人事則令人以手密掩之信乎深痼之疾必投瞑眩之藥吐不止以生麝香少許溫湯調即解

灸法見千金方聖惠

●灸法　狂癇不識人癲病眩亂灸百會九壯　狂邪鬼語灸天窗九壯其穴在頸大筋前曲頰下扶突後動應手陷中是　狂言恍惚灸天樞百壯其穴去肓腧一寸半直臍傍二寸　狂癇哭泣灸手逆注三十壯穴在左右手腕後六寸　●癲狂風癇吐舌灸胃脘百壯不針　狂邪欲殺人不避水火及狂言妄語灸間使各十壯穴在腕後五寸臂上兩骨間　狂走喜怒悲泣灸巨覺穴隨年壯穴在背上夾內側反手所不及者骨芒穴上捻之痛者是也　鬼魅灸入髮一寸百壯　狐魅合手大指縛指灸合間粲七壯當狐鳴即差　卒狂言鬼語以帶急合縛兩手大指便灸左右脇下對屈肋頭兩處各七壯須臾鬼自道姓名乞去徐徐問之乃解其手　卒中邪魅恍惚振噤灸鼻下人中及兩手足大指爪甲本令艾圓半在爪上半在肉上各七壯不止十四壯艾炷如雀屎大　卒狂鬼語針其足大拇指爪甲下入少許即止

○怔忡

濟生

益榮湯治思慮過制耗傷心血心帝無輔怔忡恍惚善悲憂少顏色夜多不寐小便或濁

當歸 去蘆酒浸　黃耆 去蘆　小草　酸棗仁 炒去殼

柏子仁 炒　麥門冬 去心　茯神 去木　白芍藥

紫石英 一兩細研　木香 不見火　人參 各半兩

右剉散每服四錢生薑五片棗一枚煎不以時候服

同上

龍齒丹治心血虛寒怔忡不已痰多恍惚

龍齒　附子 炮去皮臍　遠志 去心甘草水煮

酸棗仁 炒去殼別研　當歸 去蘆酒浸　官桂 不見火

琥珀 別研　南星 剉如豆大薑汁浸一宿各一兩　木香 不見火

沉香另研　紫石英煅醋淬七次　熟地黃酒洗各半兩
右為末煉蜜圓如梧子大朱砂為衣每服五十圓不拘
時候棗湯吞下

同上
茯苓飲子治痰飲蓄于心胃怔忡不已
赤茯苓去皮　半夏湯泡　茯神去木　麥門冬去心
橘皮各一兩　沉香不見火　甘草炙　檳榔各半兩
右剉散每服三錢姜五片煎不拘時候溫服

同上
排風湯治風虛冷濕閉塞諸經怔忡方見風科通治類

加味壽星圓治驚憂思慮氣結成痰留蓄心胞怔忡驚惕
痰逆惡心睡卧不安方見風科通治類

棗肉灵砂圓治虛人夜不得睡夢中驚魘自汗怔忪
灵砂二錢研　人參半錢　酸棗仁肉一錢
右為末棗肉圓臨卧時棗湯吞下五七粒

姜术湯治虛證停飲怔忡
白姜生　白术　茯苓　半夏麯各半
辣桂　甘草炙各一分
右剉散每服三錢水一盞生姜三片紅棗一枚煎溫服
不拘時候

五苓散治水氣心下怔忡方見傷暑類

○驚悸

千味溫膽湯治心膽虛怯觸事易驚或夢寐不祥異象感
遂致心驚膽懾氣鬱生涎涎與氣搏變生諸證或短氣悸

乏或復自汗四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐卧不安
半夏七錢湯洗　枳實去瓤麩炒　陳皮去白各叁兩　白茯苓兩半去皮
酸棗仁炒　大遠志去心甘草水煮　北五味子
熟地黃酒洗　條參各五錢　粉草伍分
右剉散每服四錢水一盞半姜五片棗一枚煎不以時服

濟生
遠志圓治因事有所大驚夢寐不祥登高涉險神魂不安
驚悸恐怯
遠志去心姜汁炒　石菖蒲各二兩　茯神去皮木　茯苓
人參　龍齒各一兩
右為末煉蜜圓如梧子大辰砂為衣每服七十圓食後
臨卧熟水下

十四友圓治驚悸不寐
[illegible]圓治[illegible]　同上方並見心志類

加味四七湯治心氣鬱滯豁痰散驚
半夏湯洗五兩　茯苓　厚朴姜汁炒各三兩　茯神
紫蘇葉各二兩　遠志去心甘草水煮　甘草炙各半兩
右剉散每服四錢姜七片石菖蒲半寸棗二枚煎服

●疰忤

[illegible]治精神不全心志多恐遂為邪鬼所擊或復附著
奄忽氣絕無復覺知或譫言罵詈如醉如狂人有起心先
知其象其狀萬端不可緊執又卒心腹脹滿吐利不行如
乾霍亂狀世所謂衝惡者是也或已死口噤不開去齒下湯

或湯入口不下者，分病人髮左右，捉踏肩引之，藥下復增，取盡二升，須臾立甦。
杏仁（七十粒，去皮尖）　甘草（一兩，炙）　桂（去皮）　麻黃（去節）
右剉散，每服四大錢，水一盞半煎，不以時服。

雄朱圓 治心氣虛有熱，恍惚不常，言語錯亂，尸疰客忤，魘寐不祥，小兒驚癇，並宜服之。
桃奴　桃仁（去皮尖）　辰砂（別研）
生玳瑁　麝香（別研）　牛黃（別研）　龍腦（別研）
雄黃　黑犀
安息香
右為末，和入前膏，圓如雞頭大，陰乾，磁器封閉，淨室安置。煎人參湯研下一圓，食後臨臥服。

蘇合香圓 治卒中惡，忤疰。方見中氣類。

灸法 治飛尸、遁尸、寒尸、喪尸、尸疰，其狀腹痛脹急，不得氣息，上衝心胸，傍攻兩脇，或塊踊起，或攣引腰脊。灸乳後三寸，男左女右，可二七壯，不止者，多其壯數，取愈止。
又灸兩大拇指頭七壯。
一切疰，無新久，先仰臥，灸兩乳邊斜下三寸，第三肋間，隨年壯，可至三百壯。又治諸氣，神良，一名疰市。
五毒疰不能食，灸心下三寸胃管，十壯。
水疰口中涌水，乃肺來乘胃，食後吐水，灸肺俞。

世醫得效方卷第八

世醫得效方卷第九

大方脈雜醫科

健忘

小定志圓 治心氣不定，五臟不足，甚者憂愁悲傷不樂，忽忽喜忘，朝差暮劇，暮差朝發，及因事有所大驚，夢寐不祥，登高涉險，致神魂不安，驚悸恐怯。
菖蒲（炒）　遠志（去心，薑汁淹）各二兩　茯苓
茯神　人參各三兩　辰砂（為衣）
右為末，煉蜜圓如梧桐子大，每服五十圓，米湯下。一方去茯神，名開心散，每服二錢，不以時服。

菖蒲益智圓 治喜忘恍惚，破積聚，止痛，安神定志，聰耳明目。
菖蒲（炒）　遠志（去心，薑汁淹炒）　川牛膝（酒浸）　桔梗（炒）
人參各三兩三分　桂心三分　茯苓一兩三分　附子（一兩，炮，去皮臍）
右為末，煉蜜圓梧子大，每服三十圓，食前溫酒米湯下。

加味茯苓湯 治痰迷心胞，健忘失事，言語如癡。
人參（去蘆）　半夏（湯洗）　陳皮（去白）各一兩半　白茯苓（去皮）
粉草五錢　益智（去殼）　香附子（炒去毛）各壹兩
右剉散，每服四錢，水一盞半，薑三片，烏梅半箇同煎，不拘時溫服。

寧志圓 治心神恍惚，舉事多忘。方見心恙類。

竹茹湯 治產後心虛煩悶頭疼氣短內熱不解心中悶亂及婦人產後心虛驚悸煩悶欲絕

麥門冬去心 小麥各貳兩 甘草炙壹兩 人參

白茯苓各壹兩七錢 半夏湯泡七次貳兩

右剉散每服四錢水貳盞生姜七片棗子二枚淡竹茹一塊如指大同煎食前服虛勞煩悶尤宜服之

溫膽湯 治大病後虛煩不得眠此膽寒故也此藥主之又治驚悸自汗觸事易驚

半夏 竹茹 枳實麩炒去穰各貳兩

陳皮參兩 甘草炙壹兩 茯苓壹兩半 人參壹兩

右剉散每服三錢水一盞半生姜五片棗一枚煎食前服米湯加遠志去心薑汁炒北五味子各壹兩酸棗仁壹兩蚌粉炒入

酸棗仁湯 治霍亂吐下增劇虛勞煩擾奔氣在胸中不得眠或發寒熱頭疼暈悶

酸棗仁貳兩炒 人參 桂心各壹分

知母 茯苓各叁錢 石膏半兩 甘草炙

右剉散煎同上

小草湯 治虛勞憂思過度遺精白濁虛煩不安

小草 黃耆去蘆 當歸酒浸 麥門冬去心

石斛去根 酸棗仁炒 人參 甘草炙各半兩

右剉散每服三錢水一盞半生姜五片煎不以時服

地仙散 治傷寒後伏暑後煩熱不安及煩熱虛勞

地骨皮去木貳兩 防風去蘆壹兩 甘草炙半兩

右剉散煎同上

清心蓮子飲 治心中蘊積虛熱煩燥 方見消渴門

○自汗

風證桂枝湯 治傷風脈浮自汗惡風

桂枝不見火 白芍藥各壹兩 甘草炙半兩

右剉散每服四錢生薑五片大棗二箇煎不拘時服發汗汗不止者謂之漏風宜加炮熟附子壹兩

暑證五苓散 方見中暑門 [illegible] 治傷暑自汗 方見中暑門

濕證朮附湯 治傷濕自汗 方見傷濕門

防己黃耆湯 治同上 方見四氣兼證

牡蠣散 治諸虛不足及新病暴虛津液不固體常自汗夜臥即甚久而不止羸瘠枯瘦心忪驚惕短氣煩倦

牡蠣米泔浸煅取粉 麻黃根 黃耆 知母各壹兩

右為末每服用小麥百餘粒煎湯調服 一方為散每三錢水三盞葱白三寸煎一盞半分三服

黃耆湯 治喜怒驚恐房室虛勞致陰陽偏虛或發厥自汗或盜汗不止悉宜服之

黃耆蜜炙 白茯苓去皮 熟地黃酒蒸

肉桂不見火 天門冬去心 麻黃根 龍骨各壹兩

五味子 小麥 防風去蘆 當歸去蘆酒浸

甘草各半兩炙

右剉散每服四錢生薑五片煎不拘時候發厥自汗加熟附子發熱自汗加石斛末效或多喫麪食則安

〔[illegible]湯〕治自汗頭眩痰逆惡心

撫芎　白朮　橘紅各一兩　甘草炙半兩

右剉散每服四錢生薑七片煎温服

〔建中湯〕治表虛自汗

官桂叁分　芍藥壹兩半　甘草半兩炙

右剉散每服四錢薑五片棗二枚食前服本方加黃芪壹兩名黃耆建中湯治虛勞自汗加當歸壹兩名當歸建中湯治婦人血虛自汗其自汗漏不止者加桂半兩熟附子半兩當名桂枝附子湯每服四錢生薑七片棗一二枚空心煎服

〔防風散〕治盜汗

川芎壹分　人參半分　防風弍分

右為末每服一錢臨卧米飲調下

〔白朮散〕治盜汗極驗

白朮不拘多少剉成小塊如骰大

右用浮麥一升水一斗煮乾如白朮尚硬又加水一二升煮取出切作片焙乾去麥不用研為末別用浮麥湯每服二三錢不以時候

〔茯苓湯〕治虛汗盜汗

右用白茯苓為末煎烏梅陳艾湯調下二錢服之神效

〔[illegible]湯〕治虛熱盜汗百節酸疼腰痛肢體倦怠日漸羸弱口苦舌澁心忪短氣

綿黃耆炙　遠志去心　當歸　澤瀉各三兩　白芍藥　龍骨　人參各弍兩　甘草炙壹兩

右剉散每服四錢水二大盞生薑五片煎熱服氣弱加炮附子一二兩腰痛筋急加去皮官桂一兩

〔止汗温粉〕

右用川芎白芷藁本各一分為末入米粉三分綿裹撲於身上

〔止汗紅粉〕

麻黃根　牡蠣火煅各壹兩　赤石脂　龍骨各半兩

右為末以絹袋盛如撲粉用之

〔正元散〕治下虛手冷自汗

〔三建湯〕治真氣不足上盛下虛面赤自汗小便頻數

〔[illegible]附湯〕治附湯治氣虛陽弱虛汗不止四肢倦怠

〔虛勞[illegible]〕治榮衛不調夜多盜汗四肢煩疼飲食進退肌瘦面黃

秦艽　柴胡各弍兩　大鼈甲[illegible]　乾漆炒盡青　人參　茯苓　川烏炮去皮尖各壹兩　玄參　乾葛

右為末每服二錢小麥二七粒煎湯一盞去麥入[illegible]

食後服。如久患後亦宜服此，以退其勞倦，調理經絡。

[illegible]散 治虛勞盜汗，骨蒸咳嗽，胸脇滿，皮毛乾枯，四肢懈惰，骨節疼痛，心腹驚悸，咽燥唇焦，頰赤煩燥，涕唾腥臭，困倦少力，肌體潮熱，飲食減少，日漸瘦弱。

天仙藤　鱉甲醋炙　香附子炒　桔梗去芦

柴胡去苗　秦艽　青蒿　烏藥

甘草　川芎

右剉散，每服姜三片，煎，不拘時候溫服。小兒骨蒸勞熱，肌瘦減食者，每一錢水盞，半小麥三十粒煎服。

[illegible]大蒜圓 治陰汗濕痒。右用大蒜不以多少，煨，剝去皮，爛研，同淡豆豉末搜圓，如梧子大，朱砂為衣，每服三十圓，棗子、灯心煎湯送下。

[illegible]圓 治同上，每服五拾圓，酒服大效。

治陰汗濕痒方 爐甘石壹分　真蚌粉半分　為粉撲傅

治陰汗不止方 [illegible]

[illegible]洗方 蛇床子 [illegible] 炒白礬 [illegible] 煎水淋洗

○宿食

[illegible]散 治宿食留飲，聚積中脘，噫氣臭腐，心腹疼痛，或臟腑飱泄，每服四錢，生薑、葱白、烏梅煎。

[illegible]圓 建脾進食，消化宿滯，飽後宜服。

[illegible]湯 治心腹膨滿，噎宿冷氣，或時冷疼。

[illegible]圓 消食健脾，益氣進美飲食。

人參　縮砂　香附子炒去毛　三稜煨

蓬朮煨　青皮　陳皮　神麯炒

麥芽炒　枳殼各炒去穰，各等分

右為末，米糊圓梧子大，每服三十圓，空腹米飲吞下，鹽湯亦可。

[illegible]圓 磨化宿食，止腹痛。

[illegible]圓 治脹滿，消食積氣塊。

○癆瘵

總說 大骨蒸殗殜復連尸疰，[illegible]皆曰傳尸者，以疰者注也，病自上注下，與前人相似，故曰疰。其變有二十二種，或三十六種，或九十九種，大略令人寒熱盜汗，夢與鬼交，遺泄白濁，髮乾而聳，或腹中有塊，或腦後兩邊有小結核，連復數個，或聚或散，沉沉默默，咳嗽痰涎，或咯膿血，如肺痿肺癰狀，或復下痢，羸瘦困乏，不自勝持，積月累年，以至於死，死後乃疰易傍人，乃至滅門是也。凡疾[illegible]不爽，戒恢不調，[illegible]戒慎酒色，調節飲食，如或不然，妄信邪師，以言[illegible]殺不起，慎之慎之。又云男女傳尸之病，心胸滿悶，背膂疼痛，兩目不明，四肢無力，雖欲寢臥，臥不得穩，脊膂急痛，膝脛酸疼，多臥少起，狀如佯病，每至平旦，精神尚好，日午向後，四肢微熱，面無顏色，喜見人過，常懷忿怒，才不稱意，[illegible]

一本作七十三心

交或見先亡或多驚悸有時咳嗽雖思飲食不能多餐死在須臾精神尚好或時微利頭髮脹口燥鼻乾常多黏唾有時昏沉有時欲睡漸成沉羸猶未測息不覺死矣

○尸蟲遊食日夜及治法

大抵六蟲一旬遍遊四穴轉流周而復始其后六代法中白方卷一日後食起三日一食五日一醉醉則於所歸穴大醉五日故五日蟲醉可以下藥及灸其三日只養切不可妄有醫治蟲在人身也一蟲可占十二穴六蟲在人身中共遊七十二穴上旬十日從心至頭遊四穴中旬從心至臍遊四穴下旬從臍至足遊四穴上旬可先服藥後灸所遊穴其蟲頭向上若下火灸蟲知必奔走出在汗中更服藥取之以蟲毒爲度便服補藥未得安耳中旬其蟲所遊穴中頭向內可服藥取之下旬蟲在所遊穴中頭向下亦服藥取之不灸也恐其蟲奔走求難取盡此惡蟲性已通靈務在精詳勿令有悟可也

○觀尸蟲色知病淺深法

凡明醫者先須知毒氣與蟲並行攻人臟腑遇陽日長雄蟲陰日生雌蟲緣知食臟腑脂膏故其蟲色白次食血肉血肉盡故其蟲黃赤次食精髓故其蟲紫色精髓盡故其蟲黑色傳入腎中病人方死須求醫士曉達病源先取其蟲視其色理自知輕重其虫如白色可三十日服藥補之其虫如黃赤色可六十日服藥補之其虫如紫黑色此疾已極可百二十日服藥補之十中可保一二雖不能爲一身除害亦可爲子孫除害矣服藥仍須一截上之中刻意調攝方可痊平如此得命可謂再生矣世又云蟲頭赤者食患人肉其病可治頭口白者食患人髓其病難治只得斷絕不傳子孫矣

○六代傳病及諸蟲形狀

凡治病之道蓋須察病相應故同神聖仍在瀉實補虛調治臟腑方得痊愈故三尸九蟲種種靈異莫令知之或似蝦蟆或似結縷或似馬尾或似蜘蛛或似刺蝟或似鼠形或如爛麵或有足無頭或有頭無足或化精血歸於元陽之內種種形狀皆難辨其淺學之流難施方術醫甚多枉死不必或則取虫不盡或則淺學妄傳皆是徒費資財終無去病之理遂致夭折豈不悲哉

第一代謂初勞病受其病而不測病源酒食加餐淪瘦治療蹉跎乃至病重醫人不詳其故慎用湯藥枉而致死



此虫在人身中如嬰兒狀背上毛長二寸

此虫變動形如鬼在臟腑中



此虫形如蝦蟆變動在人臟腑中

上三虫在人身中藥者之後或大或小令人夢寐顛倒魂魄飛揚精神離散飲食不減形容漸羸四肢酸疼百節勞倦增寒壯熱背膊拘急腦與頭痛口苦舌乾面無顏色鼻流清涕虛汗常多行步艱難眼睛多痛其虫遇丙丁日食起醉歸心腧穴中四穴輪轉周而復始大醉可醫矣取虫出後補心當瘥

第二代爲覺勞病諸傳受此疾已覺得漸成病者異夢白知夜夢不祥與亡人爲伴醒後全無情思似醉神識不安所嗜食味轉成患害或則發氣動風所加四體不和心胸滿悶日漸羸瘦骨節乾枯或嘔酸水或則醋心唇口乾鼻塞腦痛背膊酸疼虛汗常出腰膝刺痛如此狀早須醫治少失時致傷命

此虫如亂髮可長三寸或似守宮

此虫形如蜈蚣在人臟腑中

此虫形如蝦在人臟腑中

上二虫在人身中令人氣喘唇口乾咳嗽增寒心煩壅滿夫[illegible]髮焦落氣脹吞酸津液漸衰次多虛汗鼻多清水四肢將虛臉赤面黃皮膚枯瘦腰膝無力背脊酸疼吐血喉腥語聲不利鼻塞腦痛胸膈多痰重者心悶吐血強倒在地不能自知其虫遇庚辛日食起歸肺腧中四穴輪轉周而復始大醉可醫矣取虫後補當瘥

第三代爲傳尸勞病傳受病人自得知之日漸羸瘦形容顏日日憂煩夜夜恐懼不遇良醫就死不遠

此虫形如蚊蟻在人身中俱遊臟腑

此虫形如蜣螂在人身中俱遊臟腑

此虫形如刺蝟在人三焦



上三虫在人身中令人三焦多昏日常思睡嘔吐苦汁或吐清水粘涎腹脹虛鳴肘後多熱口鼻生瘡唇黑面

青目漸消瘦精神恍惚魂夢飛揚飲食不消氣咽声急
汗出如油目昏多淚其虫遇庚辛日食起醉歸厥陰穴
中四穴輪轉周而復始大醉可醫矣取其虫出後服補
藥當瘥

論第四代病并尸虫形狀遊食日治法



此虫形如亂絲在人臟腑中



此虫形如猪肝在人臟腑中

此虫形如蛇在人臟腑中

上三虫在人身中令人臟腑虚吼噫逆腸中痃癖氣塊
增寒壯熱肚大筋生腰背疼痛或虚或瘦瀉痢無時行
履困重四肢無力時氣上喘口苦皮乾飲食過多要喫
酸鹹之物其虫遇戊己日食起醉歸脾腧穴中四穴輪
轉周而復始大醉可醫矣取虫出後服補藥當瘥

論第五代病并尸虫形狀遊食日治法

此虫形或有足無頭或有頭無足



此虫形如鼠在人身中俱游臟腑

此虫形如精血變動在人臟腑或在陽宮

上三虫在人身中令人多怒氣逆筋骨拳攣四肢解散
面黑面青增寒壯熱腰脊疼痛起坐無力頭如斧斫眼
睛時痛翳膜多淚背膊刺痛力倦身羸手足乾枯目著
床枕不能起立狀似中風四肢頑麻腹內多痛眼見黑
花忽然倒地不省人事夢寐不祥覺後遍身虛汗其虫
遇甲乙日食起醉歸肝腧穴中四穴輪轉周而復始大
醉可醫矣取虫出後補肝當瘥

論第六代病并尸虫遊食日治法



此虫形如馬尾有兩條一雌一雄



此虫形如鱉在人臟腑

此虫形如馬尾，或長或短

上三虫在人身中，居於脊髓，透連脊骨，令人思食是物，要食身體汪羸，瘦瘵無力，體寒骨熱，四肢枯乾，眼見火生，或服多黑暗，耳內虛鳴，陰汗燥痒，冷汗如油，夢與鬼交，小便赤黃，醒後昏沉，臍下結硬，或奔心胷，看物如蟹，心腹悶亂，骨節疼痛，其虫遇丑亥日食起，醉歸腎臟穴，四肢輪轉，而復始，大醉可醫矣，虫出後補腎填精，當痊

取虫方法

先令病人密用好紙糊一密室，不留些縫隙，尋一老成人過遍，以安息香水洒了過，遍人之身，又以雄黃雄黃塗其鼻孔耳眼唇上，安排鉄鉗一个，布巾一幅，用香油二斤，以鍋盛頃，微煎令滾，仍用高桶一个，以炭石灰在桶內，生布巾蓋桶口，却服取虫藥，五更初一服，五更三點肝一服，取藥後腹中疼痛，如刀斧劈，不妨，至巳牌必須下虫，或取下臭穢，如膠漆，或吐瀉膿血瘀塊，竝宜於桶中，其虫或從汗出，如蠶，或於耳鼻口中出，或小便中出，異般形狀不止一也，或青或黑或黃紅，大者急用鉄鉗取於油內煎，當日將油紙裹虫入瓦器內，石灰填实，埋棄於深山遠僻處，免致再染人，患人衣服床席並皆棄去，醫人分付藥後，亦須遠避。

神效取蟲藥方

青桑枝　柳枝　石榴皮　枝　桃枝

梅枝各七莖長四寸　鬼臼五錢　青蒿壹小握　赤箭五錢

右用童子小便壹升半，葱白七莖，去頭葉，煎及一半，去滓，別入安息香、阿魏各一分，再煎至一盞，去滓，調辰砂末半錢，檳榔末一分，麝香一字，分作二服，調下，五更初一服，五更三點時一服，至巳時必取下蟲，紅者可救，青黑不治，凡有所下，即進軟粥飯，温煖將息，不可用性及食生冷毒物，合時須擇良日，不得令猫犬孝服穢惡婦人等見，一方不用鬼臼赤箭

紫金丹

雄黃半兩　兎糞貳兩　天靈蓋壹兩酥炙黃

鱉甲　木香各半兩　輕粉

右為末，法酒壹升，大黃半兩，熬膏圓如彈子大，朱砂為衣，凡此疾，先燒安息香煙吸之，不嗽，非傳尸也，不可用此藥，若煙入口咳不止，乃尸也，宜用此藥，五更初服，勿令人知，用童子小便同酒一盞，化一圓服之，如人行二十里，正吐出蟲，或如燈心，或如爛瓜李，或如蝦蟆，未效再服，以應為度，蟲用紅火燒之，又用油煎

[illegible]治傳尸勞氣殺虫

川椒合口者炒出汗　貳斤揀去子

右為末，每服貳錢，空心米湯調下，須臾，葷肉少頃，如不

能禁即以酒糊圓如梧子大空心服三五十圓昔人曾與病勞婦人交婦人死遂得疾遇一異人云勞氣已入臓遂令急服煎六其病當去如其言服之幾盡大便出一物狀如蛇遂安續有人服之獲安濟者多矣

虛勞[illegible]治勞瘵增寒發熱口乾咽燥自汗煩躁咳嗽聲重唾中血絲漸瘦劇服之

人參去蘆 當歸去尾 白芍藥 白茯神去木

白茯苓 黃耆去蘆 白朮 半夏麴

五味子 熟地黃酒洗 甘草 蓮肉去心

大麥門冬去心 桔梗各等分

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑烏梅紅棗各一箇煎服治嗽加阿膠虛極胸滿者加木香濕紙裹煨沉香亦可不思食加扁豆

[illegible]治心腎俱虛勞嗽時復三兩聲遇夜發熱熱過即有盜汗四肢倦怠體瘦恍惚異夢喘中有血名曰肺痿

白芍藥伍兩 黃耆 甘草 人參

白茯苓 熟地黃 當歸去尾 五味子

半夏麴 阿膠各[illegible]

右㕮咀每服三錢水一盞半生薑三片紅棗二枚煎與凝神飲相類

[illegible]治諸虛百損氣血勞傷四肢倦怠骨節煩疼潮熱[illegible]自汗怔忪面色萎黃[illegible]不思飲食咳嗽痰多[illegible]

黃耆蜜炙壹兩半 當歸酒洗 紫菀去土 石斛去根

地骨皮 人參 桑白皮去赤 附子炮去皮臍

鹿茸酒蒸 款冬花各壹兩 半夏湯泡 甘草炙各半兩

右㕮咀每服三錢生薑七片棗子一枚煎不拘時服此藥溫補榮衛枯燥者不宜進此嗽血不止者加阿膠蒲黃各半兩

[illegible]治虛勞發熱加北柴胡地骨皮煎方見虛損類

[illegible]治同上方見虛損類

[illegible]治嗽甚咽痛失音方見聲嗽類

[illegible]治積勞咳嗽喘悶咯痰或有血

甘草 黃芩 桑白皮 防風去叉各壹兩

茯神半兩 麥門冬去心 杏仁去皮尖麩炒[illegible]

右㕮咀每服三錢水一盞入黃蠟一片如指頭大同煎食後熱服

[illegible]治勞手足煩心怔悸婦人血室有乾血身體羸瘦飲食不為肌肉

柴胡去蘆 當歸酒洗 麥門冬去心 鱉甲醋炙

石斛去根 白朮 熟地黃酒洗 茯苓去皮

秦艽各壹兩 人參 肉桂不見火 甘草炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片烏梅少許煎不拘時服此藥專治熱勞其性差寒脾胃快者方可服餌

虛甚而多汗者不宜服

阿膠圓 治勞嗽并嗽血唾血

阿膠(蛤粉炒) 生地黃(洗) 卷柏葉 山藥(剉炒)
大薊根 五味子 雞蘇(各壹兩) 柏子仁(別研)
人參 防風(去蘆) 麥門冬(去心各半兩)

右為末,煉蜜圓如彈子大,每服一圓,細嚼,濃煎小麥湯或麥門冬湯嚥下

地仙散 治骨蒸肌熱,一切虛勞煩燥,生津液

地骨皮(弍兩) 防風(壹兩去蘆) 甘草(半兩) 麥門冬(壹兩去心)

右剉散,每服三錢,水一盞,生薑五片,煎,不拘時候

[illegible]散 治骨節間熱,積漸黃瘦

黃連(剉壹兩)

右用童子小便五大升,浸經宿,微煎三四沸,去滓,食上分二服,如人行五里再服

四美圓 凡骨蒸莫非是勞,脊骨先痛,腎虛髓弱也,以蜀方

黃耆鱉甲散 沉香鱉甲散
秦艽鱉甲散 青蒿鱉甲散

四散和合為末,以豬牢脊骨一具,斫碎,煉汁調和為圓,溫酒吞下,治脊痛骨熱漸成瘵疾,一劑而效,其功全在脊骨,蓋醫者意也

通治 大造丹 河車者,天地之先,陰陽之祖,乾坤之橐籥,鉛汞之匡廓,胚腪將兆,九九數足,我則載而成之,故謂之河車。歷驗篇中名曰混沌皮,蓋亦生天地陰陽之始也,為七十二册之首,高士重之,謂開端繼太上之旨,若欲長生,當修所生,實資於此,所以成功,雖服草木金石,夜露曉霜之所比倫,假真之士服之不輟,誠足以返本還元,補益之道,真得其真

紫河車(壹具,用初生男子者良,帶子全者,以東流水洗斷血脈,入麝香壹錢在內,以線縫定,用生絹包裹,懸於砂罐內,入好酒,慢火熬成膏子)
人參 蓯蓉(酒浸) 沉香 朱砂(各壹兩)
安息香(去油酒熬) 乳香(各貳兩) 白茯苓(去皮)

右為末,入河車膏子和藥末,杵千百下,圓如梧子大,每服七十圓,空心溫酒送下,沉香湯尤佳。詳此丹以紫河車為主,但佐使之藥太耗,服之之人久服,可以輕身延年,補損扶虛,乃若病重之人,服之却宜增添之法也。一方有天靈蓋一片,酥炙黃

治男子真陽耗竭,腰背疼痛,自汗怔忪,夜多咳嗽,夢遺白濁,潮熱心煩,腳膝無力,宜於內加

鹿茸(酥炙去毛) 川巴戟(去心) 鍾乳粉 陽起石(煅另研)
附子(炮去皮臍) 黃耆 桑寄生 生鹿角
龍骨 紫菀 五味子(各壹兩)

右依法修製,和前藥末,用膏子為圓

治婦人血海虛損,榮衛不足,多致潮熱,心煩口乾,喜冷,腹脇刺痛,腰腿疼痛,痰多咳嗽,驚惕怔忡,經候不調,或閉斷不

通宜於内加

當歸去蘆　石斛去根　柏子仁

紫石英煅醋淬　鹿茸去毛酥炙　鱉甲醋炙各壹兩

巻栢葉壹兩　川牛膝酒浸去苗壹兩半

右依法修製和前藥末骨子圓虛寒者加炮附子貳兩

咳嗽者加紫菀茸貳兩、

治熱勞尤加

河車依前法　鱉甲醋炙半兩　桔梗　白芍藥

大黄煨　甘草　苦參　貝母

知母　秋石　敗心　草龍膽

黄藥子　莪术煨　犀角鎊　滑石各半兩

右為末以前骨子圓湯使如前

[illegible]圓　治傳尸骨蒸殗殜肺痿疰忤鬼氣心痛霍亂吐

氣瘴瘧等方見中氣類

青蒿散　治男子婦人骨蒸勞熱寒熱

青蒿[illegible]　大鱉甲醋炙　白术

地骨皮　白茯苓　粉草炙　揀參去蘆

瓜蔞根　北柴胡去蘆　桑白皮蜜炙各半兩

右為散每服三錢水一盞半煎溫服不拘時候、

[illegible]中湯　治男子婦人[illegible]骨蒸者毋用神效、

白术　白茯苓　桔梗　人參各鈒半

秦艽　北柴胡去蘆　防風　白芍藥

甘草　當歸去蘆　澤瀉　生乾地黄

熟地黄　地骨皮　肉豆蔻煨　檳榔

縮砂仁各四錢　猪苓去皮　黄耆壹兩

右為散每服叁錢水一盞半煎溫服不拘時候老人更

加黄耆一兩或為末蜜湯調服臨期斟酌

[illegible]散　治男子婦人童男童女初覺勞瘵五心煩熱去

熱如神

北柴胡　生地黄各貳兩　熟地黄　人參去蘆

防風去蘆　秦艽　赤茯苓各壹兩　胡黄連半兩

薄荷葉[illegible]錢半

右㕮咀每服三錢水一盞半煎溫服先服羌活圓一

服微汗臟腑後服此方見寒熱類

團魚散　治骨蒸潮熱咳嗽有效、

貝母　前胡　知母　杏仁

北柴胡各壹兩　團魚貳箇

右用藥同團魚煮魚熟提起去頭取肉連汁食之却將

前藥焙乾為末就用團魚裙甲及骨更煑汁一盞和藥

為圓如梧子大每服二十圓煎黄耆湯空心下病安仍

服黄耆益損湯補理方見虛勞類、

[illegible]圓　治積勞咳嗽日久不差白汗口中無味、

蛤蚧一對酥炙　款冬花　皂角不蛀者酥炙去皮子

木香不見火 熟地黃焙 杏仁去皮尖
五味子各壹兩
右爲末煉蜜圓梧桐子大每服五七十圓生薑湯送
下食後臨睡服
灸法 癸亥夜二更六神皆聚之時解去上體衣服於腰上
兩傍微陷處謂之腰眼直身平立用筆點定然後上牀
合面而臥每灼小艾炷七壯出或吐出或瀉下即安
又法 四花穴灸見蘇沈良方及資生經效
又法 灸膏肓腧穴每穴各灸卅壯仍依前出
䐐多灸爲妙灸後百日忌煎煿生冷熱物房
事避風寒喜怒安心靜處將息一月尤妙

得効方

初先上再灸

陰癩

治陰頹偏大上攻臍腹疼痛膚囊腫脹或生
瘡瘍時出黃水腰腿沈重足脛腫滿行步艱辛服之內消
不動臟腑
川練
玄胡索 大腹皮 五味子 海藻洗
茴香炒 桂心 川烏
吳茱萸 食茱萸 桃仁 山茱萸
木香 桔梗 青皮
右爲末酒糊圓梧子大每服三十圓溫酒下
治陰頹腫脹或小腸氣痛

大戟 葫蘆巴 木香
附子 舶上茴香 訶子 檳榔各壹兩
川練 麝香別研
右八味爲末外留川練以好酒二升葱白七莖長三寸
煮去皮核取肉和末藥圓如梧子大五七圓至十圓
空心溫酒下薑湯亦可潮發疼痛炒薑熱酒下十五圓
治陰器下墜腫脹卵核偏大堅如石痛不可忍
玄胡索 海藻洗 昆布洗 青皮去白
茴香炒 川練 馬藺花各壹兩 木香
大戟
右爲末別將硇砂阿魏安息香各壹分用酒醋各一升

得効方

洞去沙石熬成膏入麝香半分入前藥和圓
如菉豆大用綿灰酒下十圓至十五圓空心服
金圓 治熱入膀胱臍腹上下兼脇肋疼痛
挍之痛者
大黃 硝石 桂心 甘草
桃仁去皮尖
右爲末煉蜜圓如梧子大每服五七圓至十圓米飲下
婦人血閉疼痛亦宜服之
治敗精惡物不去結在陰囊成疝疼痛不可忍
服去病
阿魏

檳榔[illegible]

右同研為末入硇砂末一錢赤石脂末一兩同研麵糊搜和圓梧子大每服十圓至二十圓食前溫酒鹽湯下

三白散 治膀胱蘊熱風濕相乘陰囊腫脹大小便不利

白牽牛二兩 白朮 桑白皮 陳皮

木通各半兩

右為末每服空心薑湯調下初進一服未覺再進此藥不損臟氣只導利留滯此方大率多用熱藥此方惟壅熱證宜服之

念珠圓 治膀胱疝氣閉塞下元大小便不通疼痛不可忍者服之神效分心氣飲吞青木香圓亦效

金鈴子[illegible]

巴豆[illegible] 茴香一兩

右不用巴豆將二味為末每服二錢食前溫酒調下

金鈴圓 治膀胱腫硬牽引疼痛及小腸氣陰囊腫毛間水出並能治之

金鈴子肉五兩 茴香炒 馬蘭花炒

海蛤 菟絲子 破故紙 海帶各三兩

木香 丁香各一兩

右為末糊圓如梧子大每服二三十圓空心食前溫酒鹽湯任下

牽牛圓 治膀胱有熱服燥藥攻成腫滿作痛

黑牽牛三錢 大黃二錢 白□各一錢

右用巴豆去皮三十粒先入銚炒焦乾去巴豆入眾藥炒赤為末煉大麻研細為圓茴香湯送下

荔枝散 治疝大如斗不過二劑除根

舶上茴香 青皮全者 荔枝核

右等分剉散炒出火毒為末酒下二錢日三服

橘核圓 治諸種㿗疝

橘核炒 海藻 昆布 海帶

川楝肉炒 桃仁去皮尖炒 厚朴去皮 木通

枳實炒 玄胡索炒 桂心 木香各半兩

右為末酒糊圓如梧子大每服六十圓空心鹽湯酒任下虛寒者加川烏一兩堅脹久不消加硇砂二錢醋煮旋入有熱氣滯者加黑牽牛大黃各半兩

[illegible] 治小兒卵腫偏墜

防風 牡丹皮

右等分為末每服二錢溫酒調服鹽湯亦可

竹皮湯 治交接勞復陰囊腫脹痛入腹中

右刮竹青皮一升以水三升煮一半去滓分三服立愈

灸法 關元穴在臍下三寸灸三七壯

大敦穴在足大指甲後三毛上灸七壯

脚氣

蘭陵經驗[illegible]散 治男子婦人初患脚氣其病寒熱或頭

痛浮緊脈弱有筋一條自脚踝骨至腿及腰痛起作痛
因風寒暑濕之氣相感而成先須解散每服四錢加檳榔一
个切片木瓜二片生姜三片葱白一根水一盞煎熱服不
拘時候大便秘加大黄每服半錢（分量隨證加減）

加味羌活湯 治風寒暑濕流注足三陽經手足拘攣疼痛
行步艱難憎寒發熱背汗惡風頭眩腰重關節掣痛或學
中昏寒小便秘澁或腹痛嘔吐下利惡聞食氣兩腿頭
麻痺纘疼又隨熱悶臀膝心煩氣上喘下冷痺皆痛自然

麻黄（去節） 乾葛 細辛（去土） 蒼朮（米泔浸）
茯苓（去皮） 防己 枳殼（麩炒） 肉桂（去粗皮）
羌活 防風（去叉） 柴胡（去蘆） 黄芩
小草 白姜（炮） 半夏（湯洗） 甘草
麥門冬（去心各等分）

右㕮咀散每服姜三片棗一枚煎空心服自汗加牡蠣白
朮去麻黄腫滿加澤瀉木通熱甚無汗加桂加橘皮前
胡升麻腹痛吐利去黄芩加芍藥及炮附子大便秘加
大黄竹瀝喘滿加杏仁桑白皮紫蘇所加並等分凡有
此病詳認證狀逐一加減無不愈者常服下氣消痰散
風濕退腫滿諸師固秘此方雖父子兄弟不傳李者

加味敗毒散 治三陽經脚氣流注脚踝上焮熱赤腫寒熱
如瘧自汗惡風或無汗惡寒

羌活 獨活 前胡（去蘆） 柴胡（去蘆）
枳殼（麩炒） 桔梗（去蘆） 甘草 人參
茯苓（去皮） 川芎 大黄（蒸） 蒼朮（米泔浸）

右等分㕮咀散每服薑三片薄荷三皮煎熱服不拘時服
痢皮膚搔痒赤疹加蟬蛻煎
除經表散以香蘇散五積散合和治脹經同
湯便並同不效加金鈴子木香

加味獨活寄生湯 治脚氣虛弱坐卧當風暑濕所得腰痛
若不速治流入脚膝乃為偏枯冷痺緩弱疼重或腰攣痛
脚重痺正宜服之

獨活（去叉三兩） 桑寄生（如無真者以續斷代） 杜仲（炒去絲）
細辛（去苗） 牛膝（酒浸去苗） 秦艽（去土） 茯苓（去皮）
白芍藥 桂心（不見火） 芎藭 防風（去蘆）
甘草（炙） 人參 熟地黄 當歸（各等分）

右㕮咀散每服四大錢水二盞煎空心服氣虛下利除地
黄并治新産腹痛不得轉動及腰脚攣痺不得屈伸
此方最除風消血一方有附子無寄生人參甘草
當歸近人將治歷節風并脚氣流注甚效

四蒸木瓜圓 治肝腎脾三經氣虛為風寒暑濕相搏著流注
經絡竭日噎歲不痊及遇六化更變七情不平必至
發動或腫滿或頑痺增寒壯熱嘔吐自汗

威靈仙 黄耆（續斷同入） 蒼朮（橘皮同入）
烏藥（茴香同入）

右各半兩，以大木瓜四箇，切蓋去瓤，入前件藥，仍用蓋簪定，酒蒸熟，三蒸三晒，取藥出焙乾為末，研木瓜為膏，搜和搗千杵，圓如梧子大，每服五十圓，空心溫酒鹽湯任下。此傳木瓜圓最多，惟此方有效，當敬之。黃松節即茯苓中木。

□□圓 治肝腎虛為風寒濕毒所中，流注腿膝，歷節疼痛，如鋸刀鋸刺，不可名狀。

大烏頭 [illegible]　川牛膝 [illegible]

右二味，並不得見銅鐵氣，緣肝氣惡之。木臼搗碎，牛膝同入石磨中磨為末，酒糊圓如梧子大，每服四十圓，用無灰酒一瓶，中懸木瓜一箇，切作片子，入在瓶內浸，木瓜爛為度，用此酒下，不以時服。

□□圓 治腳氣上攻，心腎相擊，足心隱痛，小腹不仁，煩渴，小便或秘或利，關節攣痺疼痛，□□不可具述。

蓯蓉 酒浸　石斛 酒浸　狗脊 火去毛　萆薢

茯苓　牛膝 酒浸　地仙子　遠志 [illegible]

熟地黃 [illegible]　杜仲 [illegible]

右為末，煉蜜圓如梧子大，每服五十圓，溫酒鹽湯任下。

□□圓 治少陰腎經腳氣入腹，小腹不仁，上氣喘急，嘔吐自汗。此證最急，以腎乘心，水剋火，死不旋踵。

牡丹皮　澤瀉　茯苓 [illegible]　附子 炮去皮臍

桂心 各貳兩　山茱萸 [illegible]　熟地黃 [illegible]

右末，煉蜜圓如梧子大，每服五十圓，食前溫酒鹽湯任下。

□□□□ 治脾腎俱虛，肝經風邪，氣滯，肝臟虛寒，[illegible]風痺不仁，手足頑麻，語言蹇澀，頭旋目眩，牙關緊急，氣喘自汗，心神恍惚，肢體緩弱，上攻頭目，下注腳膝，榮氣凝滯，遍身疼痛，兼治婦人產後中風，角弓反張，墜車落馬，打撲傷損，瘀血在內。

當歸 酒浸　天麻　川芎　羌活

白芍藥　熟地黃 [illegible]

右為末，煉蜜圓如雞子黃大，每服一圓，用木瓜菟絲子浸酒下；腳痺，薏苡仁浸酒下；中風，溫酒米湯下。

□□□□圓 治腳氣風濕寒暑，四氣相搏，半身不遂，手足頑麻，骨節煩疼，足脛浮腫，惡寒發熱，[illegible]成腳氣，肝腎不足，四肢攣急，[illegible]攻注，或閃肭打撲，內傷筋骨，及[illegible]內損，男子疝氣，婦人經脈不調，活血止痛，補虛壯筋骨。

威靈仙 [illegible]　烏藥 [illegible]　茴香 炒　川楝子 [illegible]

橘皮　牽牛子　萆薢　防風 各貳兩

五靈脂　乳香 各半兩　草烏 [illegible]

右為末，酒糊圓如梧子大，每服五十圓，鹽酒或鹽湯下。婦人食前醋湯送下。

通治□□□□ 治[illegible]腳弱上氣，[illegible]錯[illegible]不分上重下

虛由濕滯嘔吐自汗無復絕徃

蘇子（炒）　半夏（炒）　前胡　厚朴（去皮）

甘草（炙）　當歸　桂心　桔梗

右剉散每服姜七片棗二枚煎食後服虛甚者加炮附子壹兩黃芪二兩

【木瓜圓】治脚氣入腹喘脹不仁喘悶欲死

吳茱萸　木瓜

右等分為末酒糊圓如梧子大每服五十圓至七八十圓酒或木瓜湯任下或以木瓜蒸爛研膏為圓尤妙

【虎骨散】治經年腰脚痿弱筋骨疼痛難於屈伸

全蝎（半兩）　天麻　蒼朮

草烏　黑附子

右為末每服一大錢匕用黑豆炒熟淋酒調服候所披麻痺少時其病隨安如骨髓中痛用胡桃去皮研爛入酒調服凡中風亦可服此疾經年累取不效服之如神非常脚氣藥比

【烏藥順氣圓】治寒濕風損手足疼痛

【三仙散】治脚下注者因久坐久立或冒濕之地當風浴後脫靴鞋成脚氣或發疼痛悶亂

蓬朮　京三稜　陳皮

右為末每服二錢炒黑豆五十粒以湯一盞生姜三片

煎至七分去滓調服用之經驗

【檳榔散】治遠年脚氣難治此方特效虛人減半服

檳榔　黑牽牛

甘遂　檳榔

右各為末不得相雜每服每件各一錢惟檳榔末二錢五更初濃煎葱白湯下至天明巳時取下惡物如魚涎隨喫淡粥將安更宜服後藥

大腹皮（三兩）　乾宣木瓜　紫蘇子

檳榔　荊芥穗　烏藥　橘紅

蘇葉（各一兩）　蘿蔔子（炒半兩）　沉香　桑白皮

枳殼

右剉散每服三錢姜五片煎不以時溫服

【舒筋保安圓】治腎經虛弱下注腰脚或當風取涼冷氣所乘沉重少力移步遲緩筋脈攣痛不能屈伸脚心隱痛有妨履地大治乾濕脚氣亦腫痛無發作無時呻吟難忍氣滿喘促舉動艱難面色黧黑大便秘澀

薏苡仁　石南葉　乾木瓜　肉桂

天麻（去苗）　當歸　附子（炮去皮臍）　羌活（各一兩）

檳榔（半兩）　防風　天南星

石斛（去根）　萆薢　川牛膝　黃耆

續斷（各一兩）　蒼朮

右為末麩糊丸梧桐子大每服三十丸至五十丸空心

溫酒或木瓜湯吞下，日二三服，常服舒筋輕足，永無脚
氣之患。昔人有此疾，服之一月，脚力頓愈，委有效驗。
茵芋圓 治風毒脚弱，少力，脚重疼痹，脚腫生瘡，脚下隱痛，
不能踏地，脚膝筋攣，不能屈伸，項背腰脊拘急不快，風毒
上攻頭面浮腫，或生細瘡，出黃赤汁，或手臂少力，或口舌
生瘡，牙齦宣爛，齒搖髮落，耳中蟬聲，頭眩氣促，心腹脹悶，
小便時澁，大便或難。
赤芍藥（各一兩） 五加皮（二兩） 萆薢（肆兩） 當歸（各一兩）
麻黃（去根節） 陳皮 赤小豆（各二兩） 獨活（去蘆，各肆兩）
薏苡仁 杏仁（去皮尖，麩炒赤） 牽牛子（一兩）
石南葉（各二兩） 木瓜（肆兩） 大腹皮 川芎

杜仲（剉炒） 牛膝（各二兩）
右爲末，以酒浸蒸餅丸梧桐子大，每服十九至十五丸，
木瓜湯下，早起、日中、臨卧各一服，若要宣通，隨意加之。
□□湯 治脚氣順氣防壅。
檳榔 香附子（去毛） 陳皮（去白） 紫蘇葉
木瓜 五加皮 甘草（各一兩）
右剉散，每服四錢，生姜五片，煎八分，溫服。婦人脚氣多
由血虛，加當歸半兩；室女脚氣多因血實，加赤芍藥一
兩；大便祕結，虛弱者加枳實，盛者加大黃。一方治脚
氣衝心，大便祕實，服二和散，加生姜、紫蘇、木瓜，常服妙。
茱萸湯 治脚氣入腹，困悶欲死，腹脹喘急。

木瓜（乾者，大片） 檳榔（各壹兩） 吳茱萸（洗七次，焙）
右爲散，每服四錢，水一盞半，煎服，食前用木瓜大者二
枚，吳茱萸五兩，湯洗七次，二味併用水四椀，煎至一椀，
分作兩服，如人行十里久再進一服，或汗或吐或瀉即
瘥，不拘時服。
三將軍圓 治脚氣入腹衝心，大便不通。
吳茱萸（湯泡） 檳榔 宣木瓜（去瓤） 川大黃（各等分，大黃或隨其病加減）
右爲末，米糊圓如菉豆大，每服五十圓，檳榔湯下，
未應，加圓數再服，以通爲度。
杉木湯 治脚氣入腹衝心，或心脇有塊，毒勝痰逆，痞滿
喘急，汗流搐搦，昏悶上視，咳噫，氣絕不知人，其此藥
以救急。

杉木節（一大升） 橘葉（一升） 大腹子（七枚，連皮）
右以童子小便三升，煎取一升半，分二服，若一服得快
利，停後服。
木瓜牛膝圓 治寒濕脚氣，冷濕下注，脚弱無力，及腎經虛
弱，腰膝沉重，腿脚腫急，筋脉拘攣，或時疼痛，步履艱難，二
便不利，皆可服之。
木瓜 肉蓯蓉（酒浸） 石楠藤 當歸（去尾）
烏藥 熟地黃 杏仁（去皮尖） 川牛膝（去苗）
黑牽牛（炒） 陳皮（去白） 續斷（去蘆） 赤芍藥（各等分）
右爲末，酒糊圓梧桐子大，每服三十圓，空心用木瓜煎湯

吞下鹽湯亦可未效用羌活木瓜浸酒或加川牛膝温服
一盞許吞下
[illegible]治脚氣服熱藥太過小便不通淋閉臍下脹
當歸 梔子仁炒 赤芍藥 赤茯苓
甘草各壹兩
右剉散每服三錢水一盞煎温服
[illegible]治一切風寒濕熱令足脛痛或赤腫脚骨間作熱
痛雖一點能令步履艱苦及腰膝臀髀大骨疼痛令人痿
躄一切風氣百用百效
蒼朮米泔浸壹宿焙 黄蘗去麄皮酒浸一日夜炙焦各四兩
右剉散每服四錢水壹盞煎至七分温服日進三四服

[illegible]治脚氣
木香兩半 川烏炮 羌活各一兩 白茯苓半兩
沉香 檳榔 木瓜 川芎
乳香各半兩研
右為末醋糊圓如梧子大每服六十圓薑湯下
[illegible]治脚氣發動鄉村無處問藥特效
上烏頭用乾麄布巾揩淨以瓦片刮下屑收於磁器內
以好酒壹升浸一宿次日空心去滓屑止將磁器內所
浸藥酒熱湯上坐温入生麝香少許尤妙一服即安禁
齋則多服服後瀉汁病去
[illegible]脚氣稍愈常服弱人更宜[illegible]壯盛人宜[illegible]服

[illegible]治脚氣用此藥熏蒸淋洗
[illegible]葉 石南葉 西江杉片 藿香
大蓼 獨活 白芷 紫蘇
紫金皮 秦艽 羌活各等分
右剉碎加大椒五六十粒葱一握用水二斗煎七分置
盆內令病者以足加其上用厚衣蓋覆熏蒸痛處候温
熱可下手時令他人淋洗
[illegible]
先以復元通氣散一方用黄芪圓倍加甘草酒糊圓每
服三十圓用淡淡酒吞下如人行五里又進一服連進

三服却用甘遂細末半兩用好醋調作以炭三四斤生
火於地上燒至十分通紅却去火以脫底桶子一枚或
二件圍往患人足沃其醋在地上急用被絮罩蓋其足
得脚上有汗為妙甚者經再取可去其病根一方以復
元通氣散并甘草先以酒服之却取猪腰子一隻分為
兩邊用甘遂末二錢頓在腰子上用托兩脚心以片帛
扎定仍濃煎甘草湯更服之又方治脚氣流注四肢結
成腫核不散赤熱焮痛及療一切腫毒以甘遂細末水
調傅腫處濃煎甘草湯一味服之其腫即散一服未安
再用二藥須兩人各買亦不可同處安頓及不許付手
修合耳聾亦可煎甘草湯服之以甘遂塞耳

腳氣敷藥法

猪牙皂角（擣不蛀者） 大皂角（不蛀者） 南木香

右各等分為末，黃子醋濃調，先於腫之上不腫處用藥圍塗之，闊三四寸，若圍然截斷毒氣，不使衝上，次塗下面腫處，只留脚尖不塗，仍將事脚甲出毒氣，時時用醋潤之。一方用不蛀皂角為末，入平胃散內，釅醋調傅。一方謂瓮中滋用皂角火上燒灰存性，薑汁調傅，雖皆可用，乃不及上方為妙。

脚氣淋洗法

每夜用鹽塗擦腿膝至足甲，淹少時，却用熱湯泡洗。昔有人得脚氣，諸方不效，後得此，春月常用淹洗，不再發。

熏洗方

凡脚氣初作，兩足伸屈之間或拘攣，或疼痛，或有赤腫，用香蘇散、香薷散，加蒼术、木瓜、大蓼、橘葉、川椒、葱白煎水，傾在盆內，衣被覆足熏一時，取汗，再淋洗，不可頻用。

灸法

風市穴，可令病人起正身平立，垂兩臂直下，舒十指掩著兩髀，便點當手中央指頭髀大筋上是。

三里穴在膝頭骨節下三寸，人長短大小當以病人手尖度取灸之。

絕骨穴在脚外踝上一寸，亦云四寸。以上三穴多灸取效，凡病一脚則灸一脚，病兩脚則皆灸，未效再灸攢竹穴，在膝頭下骨上夾解大筋中，以手按之，得窩解是穴，或上

灸肩髃穴在肩骨端兩骨間陷者宛宛中，舉臂取之。

曲池穴在肘外輔骨屈肘曲骨之中，以手拱胸取之。足十趾端名曰氣端，日灸三壯，並有神效。（愚屢痛深知之，後在有效）

〇腫滿

虛證復元丹治水腫。夫心腎真火能生脾胃真土，今真火氣虧，不能滋養真土，故土不制水，水液妄行，三焦不瀉，氣脈閉塞，樞機不通，喘息奔急，水氣盈溢，滲入經絡，皮膚溢滿，足脛尤甚，兩目下腫，腿股間冷，口苦舌乾，心腹堅脹，不得正偃，偃則咳嗽，小便不通，夢中虛驚，不能安臥。

附子（炮，二兩） 南木香（煨） 茴香（炒） 川椒（炒去汗）
獨活 厚朴（去皮剉，薑製炒） 白术（略炒） 陳橘皮
吳茱萸（炒） 桂心（各一兩） 澤瀉（一兩半） 肉豆蔻（煨）
檳榔（各半兩）

右為末，糊丸梧桐子大，每服五十丸，不以時，紫蘇湯下。此藥吾傳屢驗，未嘗示人。其間君臣佐使與造物同妙，服者自知，要當屏去諸藥，一日三服，先次漩利如傾，次乃腫消喘止，蓋藥能助真火以養真土，運動樞機，安平必矣。法當禁欲并絕鹹半年，乃不再作。

禹餘糧圓治十種水氣，凡脚膝腫，上氣喘滿，小便不利，但是水氣悉皆治之。

蛇黃（大者三兩，以新鐵銚盛，入一秤炭火中燒，蛇黃與銚子一般通紅，用鉗取出，候冷，研極細） 禹餘糧（二兩，醋中煆，則此即含石）

禹餘粮三兩，用真針砂伍兩，先以水淘淨，控乾，更入銚內，用醋二升，就銚內煮……以三物為主，其次量人虛實，入下項藥。治水多是取轉，惟此方三物既非大戟、甘遂、芫花之比，又有下項扶持，故虛老人皆可服。

羌活　木香　茯苓　川芎

牛膝酒浸　白豆蔻炮　土茴香炒　蓬朮炒

桂心　乾薑炮　青皮去穰　京三稜炮

白蒺藜　附子炮　當歸酒浸一宿　各半兩，虛人老人用，實壯人一兩

右為末，拌極勻，以湯浸蒸餅，扭去水，和藥再搗極勻，丸如梧子大，食前溫酒白湯任下三十丸至五十丸。唯忌鹽，雖毫末許不得入口。若無以節水病，去後且以醋少許調和食。不能忌鹽，勿服，果然去病，切須忌鹽。但試服藥，即於小便內旋去，不動臟腑，病去日日三服，兼以溫和調補氣血藥助之，真神方也。又名禹金丹。

○實脾散 治陰水，先實脾土。

厚朴去皮薑製炒　白朮　木瓜去穰　木香不見火

草果仁　大腹子　附子炮去皮臍　白茯苓去皮

乾薑炮各一兩　甘草炙半兩

右剉散，每服四錢，水一盞半，生薑五片，棗子一枚，煎至七分，去滓溫服，不以時服。

○加味腎氣圓 治腎虛腰重腳腫，小便不利。

附子炮二兩　白茯苓去皮　澤瀉　山茱萸取肉

山藥炒　車前子酒蒸　牡丹皮去木各一兩

官桂不見火　川牛膝去蘆酒浸　熟地黃各半兩

右為末，煉蜜圓梧桐子大，每服七十丸，空心米飲下。

○葶藶木香散 治面目虛浮，四肢腫滿，喘急，小便澀赤。

○[illegible] 又名葶藶散 治十種水氣，面目四肢遍身俱腫，以手按之，隨手而起，咳嗽喘急，不得安臥，腹大腫脹，口苦舌乾，小便赤澀，大便不利。

澤瀉一兩　椒目一兩　牽牛頭末

猪苓一兩　葶藶

右剉散，每服以蔥白三莖，漿水一盞，煎至半盞，入酒半盞，調藥三錢，絕早面向東服……十里久，以漿水蔥白煮稀粥，至蔥爛入酒五合，熱啜。量人啜多少，須啜一升許，不得吃鹽并麪。自早至午當利小便三四升，或大便利，喘定腫減七分，隔日再服。既平之後，必須大將息，及斷鹽房室等三年。

○[illegible] 治熱證消浮退腫，小水大效。

○疏鑿飲子 治水氣通身洪腫，喘呼氣急，煩躁多渴，大小便不利，服熱藥不得者。

澤瀉　赤小豆炒　商陸　羌活去蘆

大腹皮　椒目　木通　秦艽去蘆

檳榔　茯苓皮

右等分剉散每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去
滓温服不拘時候
○通苓散治腫滿口燥咽乾小便絶少（方見傷暑類）
○赤小豆湯治年少血氣俱熱遂生瘡疥變爲腫滿或煩或
渴小便不利
商陸　赤小豆（炒）　當歸（去蘆）　澤瀉
連翹仁　赤芍藥　漢防己　木猪苓（去皮）
桑白皮（炙）　澤漆（已上各半兩）
右剉散每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓温
服不計時候熱甚者加犀角二錢半
○三仁圓治水腫喘急大小便不利
郁李仁　杏仁（湯去皮尖）　薏苡仁（各一兩）
右爲末米糊丸如梧子大每服四十丸不拘時米飲下
○分心氣飲行滯氣去浮滿利旋大效（方見諸氣類）
○三和散和暢三焦治痞脹浮腫加赤茯苓一兩可以和氣
利水（方見諸氣類）
○塗臍膏治水腫小便絶少
地龍　猪苓（去皮）　針砂（各一兩）
右爲末擂葱涎調成膏敷臍中約一寸高闊絹帛束之
以小便多爲度日兩易
五皮散治脾水四肢頭面悉腫按之没指不惡風其腹如
故不喘不渴脉不浮
大腹皮（炙）　桑白皮（炙）　茯苓皮　生薑皮
陳橘皮（各等分）
右剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓熱服日二三
服效（一方用青木香丸每服三十五丸黑牽牛末少許新汲水調下二便得利效方見諸瘡類）
麻黄甘草湯治水腫從腰以上俱腫以此湯發汗
麻黄（四兩去根節）　甘草（二兩）
右剉散每服三錢水一盞半煮麻黄再沸内甘草煎至
八分取汗慎風冷有人患氣促積久不差遂成水腫服
之有效但此藥發表老人虚人不可輕用更宜審察
秘傳八方芫花圓消水腫
大巴豆（三十粒去殼）　葶藶　大黄
桂枝　芫花　杏仁（等分）
右爲末米糊丸每服五十丸空心温酒吞五更早喫下
水大效
牽牛湯催發
巴豆　甘遂（各參分）　檳榔　大戟
當歸（各五分）　青皮　黑牽牛（取頭末各壹兩）
右爲末用一大錢葶藶子煎湯調下五更初喫下水效
○從容散用補
木香（五分）　肉豆蔻（煨）　肉蓯蓉（酒洗炙各壹兩）
右爲末每服一大錢米飲調下忌生冷油麪
烏鯉魚湯治水腫消腫及四肢腫

烏鯉魚壹斤 赤豆 桑白皮 白朮
陳皮各壹兩 葱白五根
右用水三椀同煮不可入鹽先喫魚後服藥

○郁李仁散治腫滿小便不利
陳皮 郁李仁 檳榔 茯苓[illegible]
白朮各壹兩 甘遂兩錢
右為末每服二錢薑棗湯下

○川活散治水氣腫
羌活 蘿蔔子炒各壹兩
右為末用酒調下

○紅豆散 桑皮

丁香 木香各三錢 縮砂 紅豆
白薑 桂枝 陳皮 青皮
桔梗 胡椒各五錢
右為末每服二錢秋石湯調下

紫金圓
白薑 香附子炒去毛 紫金皮 石菖蒲
青木香 針砂炒紅
右各等分為末米糊圓用三十圓第一茶清下第二商陸根湯下第三赤小豆當歸湯下好酒吞下秘傳方止此

○防風散治風腫皮膚麻木不仁或時疼痛
麻黃去節 牽牛炒取頭末一廿 甘草炙各分半 杏仁去皮

防風 半夏炮 芍藥 辣桂
白芷 防己 當歸 川芎
羌活 獨活 檳榔各半分
右剉散每服三錢姜四片蘇葉三皮煎服

○茯苓散治水氣腫等疾
芫花醋炒 澤瀉 郁李仁 甜葶藶
漢防己 蒼朮米泔浸 陳皮 白茯苓
白檳榔 瞿麥各半兩 白滑石 大戟各七錢半
為末每服一錢桑白皮煎湯空心調下取下碧綠水如爛羊脂即差未盡隔日又服腫消如故不服忌鹽百日

○治脚腫方 小續命湯加羌活一倍煎服之遂愈方見風科

○消腫方 以煉石塗之立瘥

○烏梅方法 治手指甲頭腫 用烏梅核碎去核皮只取仁研米醋調入指頭浸之自愈

○[illegible]方 以赤小豆為末傳之立效

○[illegible]陰方 治男子陰腫大如升核痛人所不能治者 以馬鞭草搗爛塗之

○治人陰腫[illegible]方 雞翎羊斤碎炒令熟帛裹熨冷即易之

○灸法 足第二指上一寸半隨年壯又灸兩大手指縫頭七壯治水氣通身腫滿效太衝脐各百壯治虛腫發

出醫方得效方卷第九終

世醫得效方卷第十

○大方脉雜醫科

○頭痛

風證芎芷香蘇散治傷風鼻中清涕自汗頭疼或發熱 方見傷寒和解類

□□證□□□治傷風兼氣虛嘔惡頭痛風痰涎滿 方見風科諸熱類

寒證連鬚葱白湯治傷寒已發汗未發汗頭疼如破

生薑貳兩 連鬚葱白半斤切

右用水貳升煮令減半去滓分三服服不差者服後湯

□□證葛根葱白湯治頭痛不止

葛根 白芍藥 知母各半兩 川芎

生薑各壹兩 葱白壹握

右剉散水叁升煎取壹升半去滓每服一盞半熱服

暑證□□□治感暑自汗面垢脉微頭痛□□□加茵陳每服叁錢葱白伍寸生薑叁片同煎熱服 見香薷散方傷暑類

濕證芎朮湯治風寒在腦或感濕頭重頭痛眩暈欲嘔吐不定

川芎壹兩 細辛去苗 白朮去蘆 甘草炙各半分

右剉散每服四錢水壹盞半薑伍片茶芽少許煎至七分不拘時溫服 一方以川芎壹兩細辛半兩甘草貳錢防風半夏川白芷各半兩煎同上尋常風濕頭疼立效

熱證防風散治積熱上衝頭熱如火痛入項也

防風去蘆 羌活去蘆 薄荷去梗 當歸去尾

大黃 梔子去殼 川芎各壹兩 蟬退去足翅風科

甘草五分

右為散每服肆錢水壹盞半燈心貳拾莖苦竹葉拾皮煎食後服

太陽丹治腦寒之痛皆因邪攻於上焦令人頭疼晝夜引痛不能安要

腦子各貳錢研 川芎 甘草 白芷各壹兩

石膏各貳兩研 川烏壹兩半炮去皮臍

右為末蜜同麪糊圓每兩作拾捌圓朱紅為衣食後以生葱茶嚼下或用伍圓以水研灌鼻患處 方見得效

□□□治風熱上壅頭目痛甚 方見□□□□

□□□治丈夫婦人諸風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻塞聲重傷風壯熱肢體煩疼肌肉蠕動膈熱痰盛婦人血風攻疰太陽穴疼但是感風氣悉皆治之常服清爽頭目

薄荷去梗不見火捌兩 羌活壹兩 川芎貳兩

甘草壹兩 細辛去苗伍錢 防風去蘆伍錢 白芷壹兩

荊芥去梗貳兩

右為末每服貳錢葱白茶清調下用葱涎調貼兩太陽穴除痛甚者特效又用朴硝末少許吹入鼻中立愈左痛吹右右痛吹左

芎犀圓治偏頭疼一邊鼻塞不聞香臭常流清涕或作臭
氣一陣加芎蝎等偏服無效服此不十數服或作嚏突出
一錠稠膿即愈

石膏細研 生龍腦別研 朱砂研飛肆兩內壹兩為衣
生犀角壹兩 人參去蘆 茯苓去皮 川芎肆兩
阿膠碎炒 細辛去苗 麥門冬去心 甘草炙貳兩
山梔子去皮壹兩

右除別研藥後入羅為末煉蜜圓每服一圓至二圓細
嚼茶酒任下食後服

〔川芎圓〕治一切頭痛眩暈利咽膈能消風壯氣及結滯除
痰飲解煩熱

大黃 黃芩各貳兩 黑牽牛炒 白滑石各肆兩
黃連 大川芎 薄荷葉各半兩

右為末水圓小豆大溫水下拾圓至拾伍圓日三服或
煉蜜圓亦可

〔萊菔汁〕治偏頭疼用一蜆殼仰臥左痛注右右痛注左或
兩鼻皆注亦可數十年患皆一二注而愈

〔[illegible]〕治風熱上壅鼻流濁涕或腥臭或頭昏眉稜角
痛

右以茶調散加辛夷仁藁本蒼耳子木通各壹兩為末
淡茶清調立效方見前

〔香蘇〕〔芎辛湯〕治痰厥飲厥腎厥氣厥等證偏正頭疼不
可忍者只以此藥并如聖餅子服之不拘病退但多服自
能作效氣虛甚者人仍服養正丹黑錫丹芎辛發熱頭疼卻
不可服

生附子去皮 生烏頭去皮 天南星炮洗 乾薑炮
細辛去苗 川芎各壹兩 甘草炙

右剉散每服肆錢水貳盞薑伍片茶芽少許煎至六分
食前服中脘素寒者不用茶芽

〔[illegible]圓〕治男子婦人氣厥上盛下虛痰飲風寒伏留陽
經偏正頭疼痛連腦巔吐逆惡心目眩耳聾常服清頭目
消風痰暖胃氣

川烏炮去皮尖 天南星炮 乾薑炮各壹兩 甘草
川芎各壹兩 天麻 防風去蘆各半兩 半夏湯洗七次各半兩

一方加細辛

右為末湯浸蒸餅和圓如雞頭子大搗作餅子曬乾每
服貳拾餅薑湯或茶任意嚼下須臾合嚼少及藥

雖若傷寒得汗尚餘頭痛者濃煎葱白生薑湯下

〔[illegible]〕治風壅頭痛至甚用生抽并葱白研汁調貼頭上
兩太陽穴立驗

〔太陽圓〕一名蔥涎圓治元氣虛損下攻偏正頭疼不可忍

大附子壹枚炮去皮臍

右為末蔥涎圓如梧子大每服十五圓至二十圓臨卧
茶清送下一方以川烏頭炮去皮尖為末用蓮葉自然

汁和圓治風虛痰涎頭疼

[illegible]圓 治頭痛如破

大川烏 實大者去皮臍 川白芷 川細辛 去苗

大川芎 各壹兩

右爲末韭黃白米汁圓黃丹爲衣每服壹圓細嚼葱白

淡茶清下又名鶴頂丹

[illegible]圓 治頭痛如破每發則數日不食百藥不瘥

硫黃 弍兩 消石 壹兩

右用水爲圓指頭大空心臘茶嚼下一圓或圓如梧子

大每服十五圓暑暍慣冒者冷水服下咽即豁然清爽

傷冷即以沸艾湯下

葫蘆巴散 治氣攻頭痛

葫蘆巴 微炒 三稜 剉醋浸一宿焙乾各壹兩 乾薑 炮等分

右爲末每服貳錢溫生薑湯或酒調下凡氣攻頭痛一

服即差萬法不愈頭痛如破者服之即愈或瘴瘧差後

頭痛呼號百方不效用此一服如失去不可頭痛更擣

又方 [illegible]散

川芎 貳兩 香附子 炒去毛四兩 爲末淡茶清調常服除

根

[illegible]湯 治頭風至驗

大附子 壹個生用去皮臍 菉豆 壹合

右同入銚子內煮豆熟爲度去附子服豆即安每个可

煮五服後爲末服之

[illegible]散 治偏頭痛絕妙

右一味爲末令患者口中含水左邊疼令左鼻吸壹字右

邊疼右鼻吸壹字即效

[illegible]散 治偏正頭痛

細辛 雄黃 各等分

右爲末以少許搐鼻左痛搐左右痛搐右

[illegible]圓 治偏正頭風痰厥腦風眉稜骨痛牽引兩眼

抽掣疼痛迸出或生翳膜視物不明

藿香葉 荊芥穗 旋覆花 香白芷

石膏末 細研水飛 防風 各半兩 川烏 兩箇炮去皮尖生用弍錢毛

天南星 弍錢半 川芎 半兩 草烏頭 壹錢半

右各修事挂日中曬乾同搗爲末每服壹字食後淡茶

調下神效

[illegible]散 治腦瀉

防風 白附子 北細辛 白茯苓

川烏 菖蒲 乾薑 香白芷

川芎 甘草節 各等分

右爲末每服三錢嚼生葱白湯調下食後服

[illegible]散 治遠年日近頭風纔發則頭痺麻痒不勝爬搔或

狀寒傳痰嘔吐飯食莫入兩服可斷根

天南星 湯泡 半夏 製同上 川烏 生去皮臍 川香白芷

右等分為末每服七錢或十錢水壹椀半煎至一椀入生薑自然汁半盞再煎至八分熱服藥汁稍黑難服須要勉強喫二三服一說滿頭上有塊子者切宜麻油針逐箇針之此已效之方

白附子散 治胸逆頭痛風頭痛

麻黃不去節 天南星泡 烏頭炮去皮各半兩 白附子炮一兩

朱砂研 麝香研 乾薑各一分 全蝎五箇去毒炒

右為末酒調半錢服訖去枕臥少時

□□圓 治積聚頭疼

大黃 乾薑 巴豆去皮心出油

右等分為末煉蜜圓如豌豆大米飲下一圓羸人服半圓菉豆大以大便利為度

四神散 治大病後及諸虛頭痛

右用水煎將熟時入臘茶一錢服之方見痼冷類

□□湯 治眉心并眉梁骨疼者痰飲也宜用二陳湯調吞下青州白圓子最驗方見痰飲久風和劑治類

瓜蒂散 治胸中有伏痰吐之即愈

瓜蒂末 赤小豆末各等分

右研勻熱米飲調壹錢匕羸服半錢得吐為度痛即止

□□圓 大治諸風眩暈婦人産前産後傷風邪頭目昏重及血風頭痛服之令人目明凡沐浴後服一二圓甚佳若暴寒不暖神思不清頭目昏暈並宜服之

香白芷大塊者 湯泡洗

右為末煉蜜和圓如彈子大每服一圓多用荊芥點臘茶細嚼下食後常服諸無所忌只乾咽嚼亦可

灸法 頂心百會穴在前頂後一寸五分直上入髮際五寸可灸如豆許足六炙七壯

真頭痛者其痛上穿風府陷入于泥丸宮不可以藥愈夕發旦死旦發夕死盡頭中人之根根氣先絶也

○面病

□□散 治面上有熱毒惡瘡

胡粉炒 大柏炙 黃連

右等分為末面脂調傅豬脂亦可

治面上肺風瘡

右用無灰酒於沙碗鉢內濃磨鹿角尖傅之兼服治腎臟風黃耆圓即愈

□□散 治面部生瘡或鼻臉赤風刺粉刺百藥不效者惟此藥可治妙不可言每臨臥時洗面令淨以少許如面油用之近眼處勿塗數日間瘡腫處自平赤亦消風刺粉刺一夕見效

生硫黃 香白芷 瓜蔞根 膩粉各半分

芫青七個去翅足 全蝎一個 蟬退五個去足

右為末麻油黃蠟約度如合面油多少熬溶取下離火入諸藥在內如法塗之 一方加雄黃蛇床子各少許

又方

右用生薑自然汁調輕粉傅破處更無瘢瘕

治粉刺

右以白礬末少許酒調塗之

玉容澡豆法洗面藥

白及　白斂　白芷　甘松

白朮　藁本　芎藭　細辛

零陵香　白檀香各半　皂角去皮壹斤　乾楮實

黃明膠半斤[illegible]

糯米壹升[illegible]

右為末令勻相合成澡豆皂角末別入香澡豆緊慢添

減以洗面不燋為度藥末不可太細

烏鬚乾洗頭藥

右用香白芷零陵香甘松滑石四味並不見火等分為

末摻髮上梳疙

得法染鬚方

右用針砂以井水淘淨濾乾醋浸炒甲[illegible]為末入百藥煎

少許究一日將蕎麥粉各一半調和打為糊塗在鬚上

以蓮葉包裹更以絹巾兜定次早用肥皂洗淨後再用

呵子五錢好雄沒石子一箇醋炒為末百藥煎少許又

以蕎麥粉醋調作糊糊刷封裹其黑如漆一方加[illegible]

臍麝入或生麝香入

又方

針砂不以多少用水淘洗以水清為度用柳枝半寸長

數根於銅銚內炒幾打用好米醋浸壹宿次日再炒以

柳枝成炭為度於地上攤冷另放　八件打和為末

當歸　甘松　石膏　滑石各壹

橡斗子壹兩　酸榴皮貳分　母丁香　白檀香各壹

另收各包為末　生麝少許　沒石子弍箇　訶子[illegible]

百藥煎[illegible]　白及[illegible]

右用針砂壹兜白及貳兜八件末半兜餘者皆少許一

處合和好米醋調成膏子塗於髭鬚之上以荷葉緊包

定勿寬縵次日早洗去即黑却用此一核桃淨肉研爛成

滴擦於上則光軟在方中此方最勝

又方

漢防己　綠礬各壹　桑椹子壹斤[illegible]

[illegible]

右以磁罐盛用香油十二兩浸以紙數重緊扎定罐口

於飯甑上蒸飯熟為度取出埋地下窖一百日用大刮

又方

酸石榴壹箇　水銀半兩

右先將石榴去頂作一竅入水銀在內仍用頂子蓋定

再用黃蠟封固放留一月石榴內化作水為度然後以

雞內金蘸藥染於鬚上隨手黑

又方　用黑桑椹一升科斗子一升(即蝌蚪子)以瓶盛蜜封於東屋角百日盡化爲黑泥染鬚髮如漆又用桑椹二七枚和胡桃研如泥拔去白者點孔中則生黑者

洗面藥　治面上黑點風瘡

黑牽牛(半兩)　甘松　香附(炒去毛各肆兩)

右爲末作面藥逐日洗之

○耳病

秘傳降氣湯　加石菖蒲治氣壅耳聾大有神效(方見諸氣類)

清肺飲　治上膈有熱耳聾(方見咳嗽類)

排風湯　治風虛耳聾(方見風科通治類)

塞耳丹　治氣道壅塞兩耳聾聵(……治耳聾無不效)

石菖蒲(壹寸)　巴豆(壹粒)　全蝎(壹箇去毒)

右爲末葱涎圓如棗核大每用一圓綿裹塞耳內

治耳卒風腫痛起

右用柳木蛀虫糞水化取清汁調白礬末少許點入耳內効

蠟彈圓　治耳虛聾

白茯苓(貳兩)　山藥(炒叁兩)　杏仁(去皮尖炒兩半)　黃蠟(貳兩)

右爲末鎔蠟圓如彈子大鹽湯嚼下亦有以黃蠟細切嚼點好茶送下亦效

乾蝎散　治耳聾因腎虛所致十年內一服效

乾蝎(黃色小者并頭尾用肆拾玖箇)　生薑(如蝎大……切片銀石器內……至乾爲末)

右向晚勿食初夜以酒調作一服至二更以來徐徐盡量飲五更耳中聞百十攢笙簧便自此聞聲

[illegible]　治氣虛熱壅或失飢冒暑風熱上壅耳內聾閉徹痛膿血流出

赤芍藥　白芍藥(各半兩)　當歸　甘草(炙)

大黃(蒸)　木鼈子(去殼各壹兩)

右剉散每服四錢水煎食後臨卧服

[illegible]圓　治腎虛耳聾或勞傷或中風虛損腎氣升而不降或耳虛鳴

山茱萸　乾薑　川巴戟　芍藥

澤瀉　北細辛　菟絲子(酒浸)　遠志(去心)

桂心　黃耆　石斛　乾地黃

附子　當歸　牡丹皮　蛇床子

甘草　蓯蓉(酒浸)　人參(各貳兩)　菖蒲(壹兩)

防風(壹兩半)　茯苓(半兩)

右爲末以羊腎壹雙研細以酒煮麪糊圓梧桐子大食前鹽酒下三十圓至五十圓立效

[illegible]圓　治虛弱耳聾

大安腎圓(見腎)　磁石(煅醋淬)　石菖蒲　羌活(各半兩)

右三件爲末混合爲圓梧桐子大每服四五十圓鹽湯溫酒任下

〔黃耆圓〕治腎虛耳鳴夜間睡着如打戰鼓耳內風吹四肢抽掣痛。

黃耆壹兩　白蒺藜炒　羌活各半兩　附子壹枚

羯羊腎壹對焙乾

右為末酒糊圓如梧子大每服四十圓日午空心煨葱鹽湯下。

〔□□□〕治氣壅於上頭目不清耳常重聽。

乾荷花　白僵蚕炒去絲嘴各半兩　荊芥穗

羌活　木通　川芎　防風各一兩

木香壹錢　甘草　石菖蒲各一兩半

右為末每服三錢食後臨卧茶清調下。

〔蓯蓉圓〕治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴。

蓯蓉切片酒浸焙　山茱萸去核　石龍芮　石菖蒲

兔絲子洗淨酒浸蒸焙　川羌活去蘆　石斛去根

鹿茸去毛酒炙　磁石火煅醋淬七次水飛

附子炮去皮臍各一兩　全蝎去毒七個　麝香壹字另研入

右為末煉蜜為圓如梧桐子大每服七十圓加至一百圓空心鹽酒鹽湯任下。

〔犀角散〕治風熱上壅耳內聾閉腫熱掣痛膿血流出。

犀角鎊　菖蒲　木通　玄參

赤芍藥　赤小豆炒　甘菊花去梗各半兩

甘草炙二錢

右㕮咀每服肆錢生薑五片煎不拘時溫服。

〔□□圓〕治耳聵及虛鳴。

右用好全蝎肆拾玖枚炒微黃為末每服三錢以溫酒調仍下八味圓百粒空心只三兩服見效方見肝腎類

〔□□□〕治發熱耳暴聾頰腫脇痛胻不可以運此少陽之氣厥而熱留其經也方見傷寒湯證類

〔□□圓〕治壯實人積熱上攻耳出膿水不差服旋黃圓為三五行即效方見發熱類

〔地黃圓〕治勞損耳聾。

大熟地黃洗焙　當歸　川芎　辣桂

兔絲子酒浸蒸研　川椒出汗　故紙炒

白蒺藜炒去刺　葫蘆巴炒　杜仲薑製炒去絲　白芷

石菖蒲各等分　磁石火煅醋淬研細水飛各一分半

右為末煉蜜圓如梧子大每服五十圓葱白溫酒空心吞下晚食前又服。

〔芎芷散〕治風入耳虛鳴。

白芷　石菖蒲炒　蒼朮　陳皮

細辛　厚朴製　半夏製　辣桂

木通　紫蘇莖葉　甘草炙各壹分　川芎貳分

右剉散每服三錢薑五片葱白二根煎食後臨卧服。

〔犀角飲子〕治熱毒生風耳內痛與頭相連膿血流出。

赤芍藥　白蒺藜　川芎　當歸

甘草　大黃　木鼈子各半兩

右剉散每服肆錢煎食後臨卧服

治耳久膿以九節菖蒲末萆麻子分等綿包塞之

耳聾方

草烏頭(炮去皮臍生)　石菖蒲

右等分為末綿裹塞耳一日三度

治耳熱出汁方

滑石　龍骨　天花粉　防風各二錢

腦子少許

右為末摻耳立止

又聾方

萆麻子(去殼)　遠志(去心)　乳香

磁石(煅醋淬)　皂角(半錢炮取肉)　生地龍一條　全蝎(去毒)

右為末入蠟捻圓柱入耳

又方　甘遂半寸綿裹插放兩耳中却將甘草口中嚼自然通聰極效

耳痛方　右用白鹽炒熱重帛包熨

又方　右以杏仁炒焦研細用綿裹塞耳

附方　治積年耳聾

以驢生脂和生薑搗綿裹塞耳效不可言

有人耳癢一日一作可畏直挑剔出血稍愈此乃腎臟虛致浮毒上攻未易以常法治也宜服透冰丹勿飲酒啖濕麪蔬菜雞豬之屬能盡一月為佳不戒無效(方見風科熱證類)

附方　治聤耳底耳有膿不止

真陳皮(燈上燒黑)　麝香少許別研

右和勻每用少許以綿纏子絞耳內膿淨却上藥

附方　治聤耳底耳耳內膿出

桑螵蛸(一個燒存性)　麝香(一字研)

右為末研令勻每用半字摻耳內如有膿先用綿撚子以藥摻之一法用染坯枯礬等分為末以葦管吹入耳中即愈或入麝尤佳

治耳內痛方　以鰻魚血滴數點入耳內便愈

百蟲入耳　用麻油灌之即出

耳中出血　以龍骨末吹入即止

蚰蜒入耳　最為急速　皂角子用生鰻血調灌入耳中

附方　治耳聾無所聞

緊磁石　穿山甲

右用新綿裹了塞所患耳內口中銜一片生鐵以綫繫

治耳內如風雨聲即愈

附方　治耳聾

椒目　巴豆　菖蒲　松脂

右各半錢為末更以蠟熔令溶作筒子塞耳內

一日一易神效

【□□】槐葉接細塞耳自出 或以藍青研汁滴入耳

又蔥涕灌耳中 蟲即出 亦治耳聾 又香油以稻稈灰汁

又以川椒為末 法醋浸一宿 滴耳 椒葉為枕 蟲自出

【蜈蚣入耳】猪精肉壹指許 炙令香 置耳孔邊即出

【蚰蜒入耳】生薑取汁灌耳中自出 或以□汁灌耳中即自出

【治耳中有物不可出】

右以麻繩剪令頭散 傅好膠著耳中 使其物粘之 徐徐引出 或用弓弦尤好 水入耳 薄荷汁點 經驗

○鼻病

【芎藭散】治傷風鼻塞聲重 茶調 治肺熱涕濁 方見咳嗽類

【辛夷散】治肺虛風寒濕熱之氣加之 鼻內壅塞 涕出不已 或氣息不通 或不聞香臭

辛夷仁　細辛洗去土　藁本去蘆　升麻

川芎　木通去節　防風去蘆　羌活

甘草炙　白芷各等分　蒼耳子減半

右為末 每服貳錢 食後茶清調服 熱者茶調散合和服

【川椒散】治流涕

大紅開口川椒炒出汗　訶子煨取肉　川白薑生用

辣桂　川芎　細辛　淨白朮各等分

右為末 每服二錢 溫酒調下

【南星飲】治風邪入腦 宿冷不消 鼻內結硬物窒塞 腦氣不宣 遂流濁涕

上等大白南星切成片 用沸湯盪兩次 焙乾 每服二錢 用棗七枚 甘草少許 煎 食後服 三四服後 其硬物自出 腦氣流轉 濁涕自收 仍以大蒜 蓽撥末 杵作餅 用紗襯 炙熱貼顖前 熨斗火熨透 或以香附末及蓽撥末入鼻中

【細辛膏】治鼻塞腦冷 清涕出不已

細辛　川椒　乾薑　川芎

吳茱萸　附子各三分 去皮臍　皂角去皮半兩 炒　桂心壹兩

豬脂陸兩

右剉 以豬脂成油 先一宿以苦酒浸前八味 取入油煎 附子黃色止 以綿裹塞鼻孔

【治久患鼻膿極臭者】

右以百草霜末 冷水調服

【□□□】治鼻中流清涕出 腦冷所致

通草　辛夷仁各半兩　北細辛去苗　甘遂

桂心　芎藭　附子各半兩

右為末 蜜丸 綿裹納鼻中 密封塞 勿令氣泄 丸如大麻子大 稍加大 微覺小痛 搗薑為丸即愈 凡方治腦冷所致 然此疾亦有腦熱者 亦有肺寒者 素問云 膽移熱於腦 則辛頞鼻淵 又曰 腦滲為涕 肺之液為涕 當審詳之

[illegible]散 治鼻痛（方見風門瘡證類 又治腦漏細枝風湯）

[illegible]散 治同上

杏仁（去皮尖） 細辛 白芷（各壹分） 全蝎（兩個焙）

右為末麻油調傅

[illegible]圓 治酒齄鼻面上肺風瘡

每用白龍圓洗面如用澡豆法更須略略少時方以湯洗去食後用龍虎丹一服只作一服不半月盡退

[illegible] 治肺風面赤鼻赤

草烏尖（五個） 大風油（五文） 真麝香（五文）

右以草烏尖為末入麝研勻次用大風油磁合子盛於火上調勻先以生薑擦患處次用藥擦之日三二次

得效方 卷十 十

[illegible] 服之即除根本

何首烏（壹兩） 防風 黑豆（去皮） 荊芥穗

地骨皮（淨洗各壹兩） 桑白皮 天仙藤

苦參 赤土（各半兩）

右為末煉蜜圓如梧子大每服三四十圓食後茶清下

[illegible] 治酒齄鼻不三次可去根但藥差寒虛者慎用

凌霄花 山梔子

右等分為末每服二錢食後茶調下日進二服

又方

南番沒石子有竅者水研成膏手指蘸塗甚妙

[illegible] 治肺風酸鼻及婦人鼻上生黑粉刺

生硫黃（壹錢） 輕粉（壹錢） 杏仁（去皮尖）

右為末生餅藥調臨臥時塗早則洗去

[illegible] 治肺風酒齄等疾

生硫黃 乳香 生白礬

右同研如粉每用手微爪動患處以藥擦之月日必愈

[illegible]圓 治肺熱病發赤瘰即酒齄

右以老山梔子仁為末鎔黃蠟等分圓如彈子大空心茶清嚼下忌酒炙煿半月立效

[illegible] 治酒齄 白龍丸擦洗為妙

[illegible] 治鼻齆不聞香臭

瓜蒂 北細辛

得效方 卷十 十一

右等分為末綿裹如豆大塞鼻中

[illegible] 治鼻塞清涕腦冷所致

通草 辛夷（去毛） 細辛 甘遂

桂心 川芎 附子（各一兩炮去皮）

右等分為末煉蜜圓綿裹納鼻中密封閉勿令氣泄圓如麻子大稍加微覺擦薑汁為圓即愈

[illegible] 治鼻齆

雄黃（半錢） 瓜蒂（兩個） 綠礬（壹錢） 麝（少許）

右為末搐些子入鼻亦治息肉

[illegible] [illegible]

又方 鼻齆

右用杏仁研乳汁傅之。或以烏牛耳垢傅之。或黃柏苦參檳榔為末，以豬脂研傅之。或青黛攪杏仁研傅之。

〔□□散〕治鼻齆有息肉，不聞香臭，以藥傅之，即化黃水，點滴至盡，不三四日遂愈，不復作。

瓜丁（即瓜蒂也）　細辛

右等分為末，以綿裹如豆許，塞鼻中，須臾即通。鼻中息肉俗謂之鼻痔，無不效。

〔消鼻痔方〕

苽蒂　甘遂（各貳分）　白礬（枯）　螺青

草烏尖（各貳分半）

右為末，麻油搜令硬，不可爛，旋圓如鼻孔大，用藥入鼻內，令達痔肉上，其痔化為水，肉皆爛下，每日一次，甚妙。

〔灸法〕顖會在鼻心直上入髮際二寸再容豆是穴，灸七壯。又灸通天，在顖會上一寸兩傍各一寸，灸七壯。左鼻灸左，右鼻灸右，俱臭俱灸。曾用此法灸數人，皆於鼻中去臭積一塊，如朽骨，臭不可言，去此全愈。

凡鼻頭微白者亡血也，赤者血熱也，酒客多有之。若時行衄血不宜斷之，或出至一二升不已，即以龍骨為末吹入，凡九竅出血，皆用此法甚良。

○腋氣

〔□□散〕治胡臭，熏人不可向邇者。

大蜘蛛（一枚，以黃泥入少赤石脂搗細，入鹽少許，杵為一毬，火內燒通紅，放冷剖開）

右一味為末，臨臥入輕粉一字，用釅醋調成膏，傅腋下，明子登廁必瀉下黑汁，臭穢不可聞，於遠僻處弃埋之，免染人，神良。

〔□□□〕治漏腋，腋下、手掌、足心、陰下、股裏常如汗濕污衣。

乾枸杞根　乾薔薇根　甘草（各貳兩）　胡粉

商陸根　滑石（各壹兩）

右為末，以苦酒少許和塗，當微汗出，易衣更塗之，不過三著便愈。或一歲復發，又塗之。

○中毒

〔□□□〕治蠱毒，無論年代近遠，但煮一鴨卵，插銀釵於內，併噙之，約一食頃，取視釵卵俱黑，即中毒也。

五倍子（貳兩）　硫黃末（壹分）　甘草（壹寸，半生半炙）　丁香

木香　麝香　輕粉（各少許）　糯米（二十粒）

右用水十分，於瓶內煎取七分，候藥面生皺皮為熟，絹濾去滓，通口服。病人平正仰臥，令頭高，覺腹中有物衝心者三，即不得動，若出，以盆桶盛之，如鰍魚之類，乃是蠱物。吐罷飲茶一盞，瀉亦無妨，旋煮白粥補，忌生冷油膩鮓醬，十日後服解毒圓三五圓，經旬復。

〔□□圓〕治誤食毒草并百物毒，救人於必死。

板藍根（肆兩，淨洗，日乾）　貫眾（壹兩，剉，去土）　青黛（研）

甘草（生，各壹兩）

右為末，煉蜜圓如梧子大，以青黛別為衣，如稍覺精神

悦惕稱心即是誤中諸毒急取藥十五圓嚼爛用新汲水送下即解或用水浸炊餅爲圓尤妙如常服可三五圓大能解暑

[illegible]治金蚕蠱毒纔覺中毒先吃白礬味甘而不澁次嚼黑豆不腥者是也

右以石榴根皮煎汁飲之即吐出活虫無不愈者

[illegible]治中諸物毒

晋礬 建茶各等分

右爲末每服三錢新汲水調下得吐即效未吐再服

[illegible]治蠱毒諸毒一切藥毒神效

朱砂壹兩研 大山豆根[illegible] 雄黄 黄丹

麝香

川巴豆[illegible] 黄藥子[illegible] 續隨子[illegible]

糯米[illegible] 赤蜈蚣[illegible] 班猫[illegible]

右各修治入乳鉢研和於端午重陽臘日修合不令雞犬婦人見用糯米糊圓如龍眼核大陰乾磁合收每一圓好茶清吞下不得嚼破須臾病人自覺心頭如拽斷皮條聲將次毒物下或自口出或大便出嫩則是血老則成蠱或蜣螂諸蟲命之[illegible]血流下以水洗淨收可救三人如中毒口噤即挑開灌藥或[illegible]汗諸毒以好醋磨傳見效立解服藥已效如知毒害之家不必研究若誹之其毒再發不救瘥後更忌酒肉毒食一月[illegible]軟飯可也或急用但擇吉日精潔修合

[illegible]治[illegible]蠱毒挑生毒藥毒草毒畜獸毒

文蛤[illegible] 山茨菰[illegible] 全蝎五個

大山豆根 續隨子[illegible] 麝香[illegible]

朱砂 雄黄[illegible] 紅芽大戟[illegible]

右先以五味藥入木臼搗羅爲末次研麝續隨子朱砂雄黄次和糯米糊圓分作三十五圓端午七夕重陽臘日淨室修合每服一圓生薑蜜水磨下井水浸研傅所患此解毒收瘡救病神妙朱砂雄黄乃攻五毒第一用也

[illegible]凡始覺中毒及蛇虫咬癰疽纔作服此即令毒氣不聚

上好青黛 雄黄[illegible]

右爲末新汲水調下二錢

[illegible]治蠱毒從酒食中著者端午日合

辰砂另研 雄黄水飛 赤脚蜈蚣 續隨子[illegible]

麝香[illegible]分

右爲末糯米飲圓如雞頭大若覺中毒即以酒下一圓蛇[illegible]所螫醋磨塗之

[illegible]方

蚕退紙[illegible]

右爲末新水調壹錢頓服諸中毒面青脉絶昏迷如醉口噤吐血服之即蘇

解藥毒治蠱毒多因假毒藥以投之，知時宜煮大豆甘草
薺苨汁飲之，通治諸藥毒。
同前治蠱毒
白礬末　甘草末
右等分清水調下，或吐黑涎　兩捻或瀉亦驗
殺蟲殺腹內毒蟲
右用藍青葉多研水調服
又方解諸毒
右以黃連、甘草節濃煎服效
治蛇解藥毒蠱毒蟲蛇諸毒
大甘草節以真麻油浸年久愈妙

右取甘草節或以水煎服神效
挑生毒治肋下忽腫起如生癰癤狀，頃刻間大如
碗，此即中挑生毒也。候五更以菉豆細嚼試，若香甜則是。
川升麻為細末
右取冷熟水調二大錢連服之，若洞泄出如葱數莖，根
鬚皆具，腫即消縮，且煎平胃散調補，兼進白粥。
又方治魚肉瓜果湯茶皆可挑生，初中毒覺胸腹稍痛，明
日漸加攪刺，滿十日則物生能動，騰上則胸痛，沉下則腹痛，
積以瘦悴，此候也。
其法在上膈則取之，用熱茶一甌，投膽礬半錢於中，候
礬化盡，通口呷服，良久以雞翎探喉，即吐出毒物；在下
膈即瀉之，以米飲下鬱金末二錢，毒即瀉下，乃擇人參、
白朮各半兩，碾末，同無灰酒半升，納瓶內，慢火熬半日
許，度酒熟，取溫溫服之，日壹盞，五日乃止，任便飲食。
又方治一切毒
白扁豆曬為末新汲水下二三錢，頻服得利則安
解砒毒
右用菉豆半升細擂，去滓，以新汲水調通口服
或用真靛花貳錢，分作二服，以井花水濃調服　紫河
車研水調服　黑鉛井水磨之　濃研青藍汁磨甘草
節汁服　生麻油壹盞飲之，不能飲灌之，立見起死
此毒於肉飯中得之則易治，飲酒中得之則酒氣散歸

百脈難治，若在胸膈作楚，則用稀涎散吐之；若在腹中
作疼，急服雄黃圓瀉之，徐服參芩白朮散，無恙矣。仍忌
雞鴨肉數日
又方用早禾稈燒灰，新汲水淋汁，絹巾濾過，冷服，宜攪
從下利即安
又方用旋刺下羊血、雞鴨血熱服，兼解鼠莽毒及丹藥毒
又方藍靛子解砒毒及巴豆毒，用藍根、沙糖貳味相和擂
水服之，或更入薄荷汁尤妙
又方
白扁豆　青黛　甘草各一錢　巴豆一個去殼
右為末，以沙糖壹大塊水化開，新汲壹盞化之，毒隨利之

却服五苓散之類

解射罔毒 以生藍汁大小豆汁服效

解巴豆毒 寒水石磨水服效　黃連汁菖蒲根汁亦效

解天雄附子烏頭毒 防風粟米飲煎湯服

解用毒 地漿服之最妙

解一切菌毒 掘地深取黃土一升以冷水於內攪之令濁

澄少頃取飲之可解 小治楓木菌食之令人笑不止

又方 用芫花生爲末每壹錢以新汲水下以利爲[illegible]菌之毒

者蓋因蛇虫毒氣熏蒸所致

又解諸毒 用玉簪花根擂水服

中[illegible]毒 用甘草黑豆淡竹葉等分爲散水煎[illegible]服

解鼠莽毒 用金線虫草根擂水服之 或用烏桕根

擂水亦好

又方 用枯過明礬同[illegible]等分好茶末少許新汲冷水調服累

有效驗

又方 用大黑豆煮汁服之 如欲試其驗 先刈鼠莽苗葉以

豆汁澆其根 從此敗爛不復生矣

治猘犬傷 或經久復發 無藥可療者 用之極驗

雄黃　麝香

右各研和勻 用酒調貳錢服 如不肯服者 則撚其鼻而

灌之 服藥後必使得溺 切切勿輕視 任其自醒 候利下惡

物 再進前藥 即見效 犬終身忌食犬肉蠶蛹 此毒再發

則不可救

又方 用斑猫大者貳拾壹隻去頭足翅 以糯米壹勺 先將

斑猫七隻入米內 於微火上炒 不令米赤 去此斑猫 別

入七隻再於猫米內炒 令斑猫色變 復去之 又別入七

隻 如前法炒 米出青煙爲度 去斑猫不用 以米研爲末

用冷水入清油少許 空心調服 須臾又再進一服 以小便

利下惡毒爲度 如不利再進一服 利後或腹肚疼痛 急

用冷水調青靛服之 以解其毒 否則有傷 或煎黃連水

亦可 不宜便食熱物

解蜈蚣毒 用清油燈心點燈 以傷處於煙上熏之 其痛即止

或用雞糞塗之 嚼吳茱萸擦之立效

又方 蜘蛛咬 [illegible]於傷處[illegible]出毒氣 用冷水一碗[illegible]

如蜘蛛死 即投水中 救活 痛未止 再換蜘蛛 痛止爲度

蜂蠆毒 用野芋葉擦之 如不便 急以手就頭爬搔[illegible]傳之

或用塩擦

治猘毒 澤蘭葉搗汁飲之 乾者爲末白湯調下

解蚯蚓毒 生豉一大合 新汲水半碗 浸令豉水濃 頓服

之即瘥 此三物令人小便秘 臍下瘀痛 有至死者

河豚魚毒 一時困急 以清油多灌之 使毒物盡吐出爲

愈 白礬爲末湯調服 河豚能殺人 服此毒自消

蟹傷毒 貝母爲末 酒調 令患者[illegible]飲之 須臾酒自傷處

爲水流出 候水盡 封以藥[illegible]所傷至重垂死 但

有少氣服此即活

又方 惡蛇咬傷頓作不可療者 香白芷為末 麥門冬去心濃煎湯調下 須臾咬處出黃水 盡腫消皮合 仍用此藥滓塗傷處

又方 治毒蛇所傷 北細辛 川白芷各伍錢 雄黃貳錢別研 為末入另研麝香少許 每服二錢 溫酒調下

又方 五靈脂壹兩 雄黃半兩 為末 酒調貳錢服 仍塗傷處

又方 冷水洗後用茱萸二合 水壹盞研取汁飲 以滓塗傷處

虎傷 生葛汁服 并洗傷處 白礬為末納傷處 止痛立效

蜘蛛咬 以嚼麵白礬雄黃亦可 遍身腫脹若孕

狗咬 杏仁研細 先以葱湯洗 然後以此塗傷處

又方 蓖麻子伍拾粒 去殼 井水研成膏 先以鹽水洗咬處 次以此膏敷貼 或用虎骨及虎骨末傅

狗咬 涎入瘡 令人昏悶 浸 微以酒調甘草末塗之

又方 白礬為末 於瘡內裹之 亦效

馬咬 雞糞燒灰塗之 獨顆栗子燒灰貼 亦妙

蚯蚓咬 或於地上坐臥不覺 咬時陰莖腫 鹽湯浸洗數次

猫咬 薄荷汁塗之

蠶咬 苧汁塗之

鼠咬 猫毛燒灰 麝香少許 唾調傅

蠼螋咬 毒人必死 燕巢中土 用水煎三四沸 濾汁調白礬末塗瘡口 兼治蛇毒 醋磨雄黃塗之

蝎螫 痛不可忍 白礬 半夏等分 為末 醋調貼 痛止毒出

又方 射罔傷人 其虫隱於壁間 以氣射人 偏身生瘡 如湯火傷 用烏雞翎燒灰 雞子白調塗 效

灸法 凡猘犬所嚙 未盡其惡血毒者 灸上壹伯壯 已後灸每日一壯 若不血出 刺出其血 百日灸乃止 禁飲酒及猪犬肉 蛇傷 灸傷處

諸蟲

烏梅圓 治蛔厥 令病者靜而復時煩 此為藏寒 蛔上入膈 故煩 須臾復止 得食而嘔 又煩者 蛔聞食臭出 其人當自吐蛔

烏梅三百箇 當歸 川椒去目 細辛
附子炮 桂心 人參 黃蘗
乾薑 黃連

右為末 以苦酒漬烏梅一宿 去核 蒸之五斗米下 熟搗成泥 和藥相得 納臼中 與蜜杵一二百下 圓如梧子大 食前飲服十圓 稍加至二十圓

化蟲圓 治因臟腑虛弱 或多食甘肥 致蛔蟲動作 心腹痛 發則腫聚 往來上下 痛有休止 腹中煩熱 口吐涎沫 是蛔咬 宜服此藥 若積年不瘥 服之亦愈 又治下部有虫生痔癢痛

木香 鶴虱炒 檳榔 訶子煨去核
蕪荑炒 附子炮去皮臍 乾薑炮 各等分 大黃

右為末 蜜圓梧桐子大 每服三十圓 食前橘皮湯下

人醋湯下

〔[illegible]〕雷丸 貳兩　雞心檳榔 貳兩　鶴虱 壹錢　史君子 伍錢去殼

右為末入輕粉少許分作兩服當晚用豬精肉壹兩切成片以皂角漿浸一宿至五更微火炙熟又用些清油拭肉候溫取一服藥末摻於肉上略烘過空腹食之至巳刻蟲自下乃飲食

〔療蛔〕早可白諸蟲五更嚼肉一片莫吞候虫尋肉其頭向上都吐出即嚼前史君子三箇并輕粉一字少頃以苦吃前煎貫衆酒吞解毒雄黃圓七粒即瀉下皆虫也

〔下寸白蟲〕東邊石榴根煎湯調檳榔末服之即下 先好猪肉壹塊含在口中嚥津下勿食之須臾去肉却服

救急

救自縊法 凡自縊高懸者徐徐抱住解繩不得截斷上下安被臥又以一人脚踏其兩肩手挽其髮常令弦急勿使縱緩一人以手據按胸上數摩動之一人摩捋臂脛屈伸之若已殭直但漸屈之并按其腹如此一時頃雖得氣從口出呼吸眼開仍引按不住須臾以少桂湯及粥清灌令喉潤漸漸能嚥乃止更令兩人以管吹其兩耳此法最好無不活者自旦至暮雖冷亦可救暮至旦陰氣盛為難 又法緊用兩手掐其口勿令泄氣兩時[illegible]

救溺水急解去死人衣帶灸臍中即活令兩人以筆管吹其耳中

〔又法〕凡人溺水者救上岸即將牛一頭却令溺水之人將肚橫覆在牛背上兩邊用人扶策徐徐牽牛而行以出腹內之水如醒即以蘇合香圓之類或老薑擦牙

〔又方〕凡溺死一宿尚可救搗皂角以綿裹納下部須臾出水即活 又將醋半盞灌鼻中

〔又法〕以石灰死人兩腳著生人肩上以死人背貼生人背擔走吐水即活

〔又法〕炒熱灰或炒熱炭將溺者埋於其中從頭至足水出七孔即活

又以酒罈壹箇以紙錢一把燒放罈中急以罈口覆溺水人面上或臍上冷則再燒紙錢於罈內覆面上去水即活 數方皆效若人不諳此多以為氣絕而不與救溺可憐從其便而用之

救凍死 四肢強直口噤只有微氣者用大釜炒灰令暖以囊盛熨心上冷即換之候目開以溫酒及清粥稍稍與之若不先溫其心便將火炙冷氣與火爭必死

〔又方〕用氈或藁薦卷之以索繫定放平穩處令兩人對面輕輕衮轉往來如捍氈法四肢溫和即活

救魘死 不得着燈火照亦不得近前急喚多殺人但痛咬其足跟及母指甲際并多唾其面即活如不醒者移動處些子徐徐喚之若元有燈即存如無燈切不可用燈照

舟本作

又用筆管吹兩耳或以皂角末吹兩鼻內或以韭汁灌之或搗韭汁半盞灌鼻中冬月掘根研汁用

灸法 療壹切卒死及諸暴絕證精魄或不效急於人中穴及兩脚大母指內離甲一韭葉許各灸三五壯即活臍中灸百壯亦效

救療通治魘寐卒死及為墻壁竹木所壓水溺金瘡卒致悶絕産婦惡血衝心諸暴絕證

半夏 湯洗去滑不拘多少

右為末每壹大豆許吹入鼻中即活但心頭溫者一日可活皂角末亦效

又方 用葱黃心或韭黃男左女右鼻孔中刺入深五寸令目中出血即活

又方 視上唇裏有如黍米粒以針挑破

又方 治胸脇腹內絞急切痛如鬼擊之狀不可按摩或吐血口中出血或衄血用熟艾如鷄子大水伍盞煎至壹盞頓服

又用鹽壹盞水貳盞和服以冷水噀之吐即瘥

又用蓬莪朮酒研服一盞

備急丸 治卒中惡風氣忤迷絕不知人 用乾薑 大黃各一兩 巴豆仁拾伍粒 各研細以水叁合灌服

又方 治魘或到客舍及久無人居冷房安睡中鬼物所魘但聞其人吃吃作聲便令人叫喚如不醒不急救則死

牛黃 雄黃各壹錢 大朱砂半錢

右為末每挑一錢床下燒一錢用酒調灌之

又方 用柳枝取東邊者各三七寸煎湯一盞灌服

又方 竈心土 雄黃研為末每服二錢新汲井花水調灌更挑半指甲許吹入鼻中

某湯 治中惡中忤鬼氣其證暮夜或登厠或出郊野或遊空冷屋室或人所不至之地忽然眼見鬼物鼻口吸着惡氣驀然倒地四肢厥冷兩手握拳鼻口出清血性命逡巡須臾不救此證與尸厥同但腹不鳴心腹俱暖凡此切勿移動即令親眷衆人圍繞打鼓燒火或燒麝香安息香蘇合香之類直候記醒方可移歸

犀角 生麝香 大朱砂各壹分

右為末每服二錢新汲井水調灌之

又方 雄黃為末每服壹錢桃枝煎湯調灌下

又方 故汗衣須用內衣久遭汗者佳男用女衣女用男衣燒灰為末每服貳錢下沸湯調下

又方 治客忤中惡多於道路在外得之令人心腹絞痛脹滿氣衝心胸不急治即殺人

好京墨為末調二錢服或瓦器盛湯用衣襯貼熱湯於肚上轉移溫湯冷別換

○骨鯁

骨鯁入喉以縮砂甘草等分為末以綿裹少許含之旋旋嚥津久之隨痰出

又方 以野苧根淨洗擣爛如泥，毋用龍眼大，如被雞骨所傷，以雞羹化下；魚骨則以魚汁化下。

又方 用金鳳花子嚼爛嚥下，無子用根亦可。口中骨自下，便用溫水灌漱，免損齒。雞骨尤效。

玉屑無憂散 治誤吞骨鯁，硬塞不下。

玄參　貫衆　滑石　縮砂仁

黃連　甘草　茯苓　山豆根

荊芥穗 各半兩　寒水石 煆　鵬砂 各三錢

右為末，每服一錢，先抄入口，以新水嚥下。

[illegible] 通治諸骨鯁，用蘞白芨各半兩，以線繫定，手扡線少許，[illegible]白蘞之度，蘞至喉嚥下，引吐即出矣。[illegible]以綿一小塊

以蜜煮，用如前法。

又方 以朴消研細，封入雞蘇圓，別圓如彈子大，仰臥含化，不過三四圓，自然化之。

又方 以南鵬砂一新汲水滌洗，噙化，其骨脫然而失。

又方 以貫衆濃煎一盞半，分三服，連進。片時一咯而骨出。

[illegible] 收藏年深愈見神效。

青黛花 [illegible]　大黃　山豆根 各[illegible]　朴消 [illegible]

黃藥子 貳兩　白藥 貳兩　自然銅 [illegible]　貫衆

山梔子　宣連　楮實子　山茨菰 各貳

白滑石 壹斤半　鉛光石　芭蕉自然汁

右為末，糯米粥和為丸，一千作陰乾，不可見日，不然猶去

一料可作一千圓，却用鉛光石打光。諸般骨鯁，井水嚥下一圓，作勢一吞即下。[illegible]咽喉飛絲，清油調水磨化。酒毒，腸風下血，[illegible]湯。赤眼腫痛，井水。

金石藥毒，黃連水。蛇犬蜂蠆蜈蚣毒，用水磨塗傷處。

誤吞竹木棘刺，井水。諸般惡毒，用新汲井水。

治骨鯁，以[illegible]攙入食，即下；無則以[illegible]搗為末，用流水調下。

又方 [illegible]於咽喉下，外[illegible]自下。

[illegible] 或牙笏等，磨水嚥下，[illegible]米醋煎

消[illegible]自下

蘇合香圓 療心腹諸卒暴百病，中惡客忤，心腹脹滿，卒痛如刀所刺，氣急口禁。

乾薑 炮 [illegible]　巴豆 [illegible]　大黃 [illegible]

右為末，煉蜜圓梧桐子大，每服三十圓，不拘時，溫水下。

誤吞蜈蚣，以生猪血令病人喫，須臾生清油灌口中，惡其蜈蚣突在血中吐出，繼與雄黃細研水服愈。

誤吞銅物不能化者，濃煎縮砂湯服，其銅自下。又用生荸薺研爛服，其銅自化。細研堅炭為末，米飲下，於大便內瀉下，如烏梅狀。

怪疾 （得效四十六方）

項上生瘡如櫻桃大，有五色，瘡破則項皮斷，但逐日飲牛乳自消。

寒熱不止，經日後四肢堅如石，以物擊之一似鐘磬聲，日

漸瘦瘵，用茱萸、木香等分，煎湯飲即愈。

大腸頭出寸餘，痛苦，直候乾自退落，又出，名為截腸病。若腸盡乃不治。但初覺截時可治，用芝麻油器盛之，以臀坐之，飲大麻子汁數升愈。

口鼻中腥臭水流，以碗盛之，有鐵色蝦魚如粳米大，走躍不住，以手捉之，即化為水，此肉壞矣。任意饌食雞肉愈。

腹上麻痺不仁，多煮葱白喫之自愈。

婦人小便中出大糞，名交腸。服五苓散效，如未盡愈，可用舊幞頭燒灰，酒服之。

兩足心凸如腫，上面生黑色豆瘡，硬如釘子，釘了瘡出不得，脛骨生碎眼，髓流出，身發寒顫，唯思飲酒，此是肝腎氣冷熱相吞。用炮川烏頭末，傅之，煎韭子湯服效。

人腹脹經久，忽瀉數升，晝夜不止，服藥不驗，乃為氣脫。用益智子煎濃湯服，立愈。

四肢節脫，但有皮連，不能舉動，名曰筋解。用酒浸黃芦一兩，經一宿，取出焙乾為末，每服二錢，酒調下，服盡安。

玉莖硬不痿，精流無歇，時時如針狀，捏之則脆，乃為腎滿漏疾。韭子、破故紙各壹兩為末，每服三錢，水一盞煎，至六分，每日三次飲之，愈則住服。

咽喉間生肉，層層相疊，漸漸腫起，不痛，多日乃有竅子，臭氣自出，遂退飲食。用臭橘葉煎湯連服愈。

腹中如鐵石，臍中水出，旋變作虫行之狀，繞身匝啄，痒痛難忍，撥掃不盡。用濃煎鹽湯，浴之，以蒼术末入麝香少許，水調服瘥。

眼前常見諸般禽蟲飛走，以手捉之則無，乃肝膽經為疾。用酸棗仁、羌活、玄明粉、青葙子花各一兩為末，每服二錢，水壹大盞煎至七分，和滓飲，一日三服。

大腸虫出不斷，斷之復生，行坐不得。用鶴虱末，水調伍錢服之自愈。

眼睛垂出至鼻，如黑角色，痛不可忍，或時時大便血出，其名曰肝脹。用羌活煎汁，服數盞自愈。

腹中有物作聲，隨人語言。用板藍汁壹盞，分五服服之。又名應聲虫，當服雷丸自愈。

有飲油伍升以來，方始快意，長得喫則安，不爾則病。此是髮入胃，被氣血裹了，化為虫也。用雄黃半兩為末，水調服，虫自出，如虫活者，置於油中，逡巡間連油潑之長江。

治卧於床，四肢不能動，只進得食，好大言，說喫物，謂之失說物望病。治如說食豬肉時，便云你喫豬肉一頓，病者聞之即喜，遂置肉令病人見，臨要却不與喫，此乃失他物望也。當自睡中涎出便愈。

手十指節斷壞，唯有筋連，無節肉，虫出如燈心，長數尺餘，遍身綠毛卷，名曰血餘。以茯苓、胡黃連煎湯飲之愈。

遍身忽皮底混混如波浪聲，痒不可忍，抓之血出不能解，謂之氣奔。以人參、苦杖、青鹽、細辛各壹兩，作一服，水二

栲煎十數沸去滓飲盡復愈
眼白人渾黑見物依舊毛髮直如鐵條雖能飲食不語如
醉名曰血潰用五靈脂爲末貳錢酒調下
因灸火炙艾訖火痂便退落瘡內鮮肉片子飛如蝶形狀騰
空去了痛不可忍是血肉俱熱用大黃朴消各半兩爲
末水調下微利即愈
臨卧渾身虱出約至五升隨至血肉俱壞每宿漸多痒痛
不可言狀惟喫水卧床晝夜號哭舌尖出血不止身齒
俱黑唇動鼻開但飲鹽醋湯十數即安
眼赤鼻張大喘渾身出斑毛髮如銅鐵乃目中熱毒氣結
於下焦用白礬滑石各壹兩爲末作一服水叁椀煎至

半令不住飲候盡乃安
有虫如蟹走於皮下作聲如小兒啼爲筋肉之化雷丸雄
黃各一兩爲末摻在豬肉片上炙熟喫盡自安
手足甲忽然長倒生肉刺如錐痛不可忍喫葵菜自愈
鼻中毛出晝夜可長一二尺漸漸粗圓如繩痛不可忍雖
痛摘一莖即後更生此因食豬羊血過多遂生用乳香
硇砂各壹兩爲末以飯圓梧桐子大空心臨卧各一服
水下拾粒自然退落
面上及遍身生瘡似猫兒眼有光彩無膿血但痛痒不常
飲食減少久則透脛名曰寒瘡多喫魚雞韭葱自愈
脇破腸出臭穢急以香油摸腸用手送入煎人參枸杞淋

之皮自合矣喫羊腎粥十日即愈
口鼻中氣出盤旋不散凝如黑蓋色過十日漸漸至肩胸
與肉相連堅勝金石無由飲食此多因瘧後得之煎
澤瀉湯日飲三盞連服五日愈
遍身忽然肉出如錐既痒且痛不能飲食此名血壅若不
速治潰而膿出以赤皮葱燒灰淋洗喫豉湯數盞自安
眉毛搖動目不能視交睫喚之不應但能飲食有經日不
效者用蒜三兩取汁酒調下即愈
毛竅節次血出若血不出皮脹膨如鼓須臾眼鼻口被氣
脹合此名脈溢飲生薑水汁各一二盞即安
忽然氣上喘不能語言口中汁流吐逆齒皆搖動氣出轉

大則悶絕蘇復如是名曰傷寒併熱霍亂用大黃人參
末各半兩水三盞煎至一盞去滓熱服可安
口內生肉毬臭惡自己惡見有根線長伍寸餘如釵股吐
毬出以飲食了却吞其線以手輕捏痛徹於心困不可
言用水調生麝香壹錢服三日驗
渾身生燎炮如甘棠梨每箇破出水內有石壹片如指甲
大泡復生抽盡肌肉不可治急用荊三稜蓬莪朮各
伍兩爲末分三服酒調連進愈
頭面發熱有光色他人手近之如火燒人用蒜汁半兩酒
調下吐如蛇狀遂安
人自覺自形作兩人並卧不別真假不語問亦無對乃是

離魂用辰砂人參茯苓煎湯服之真者氣爽佳者化
男子自幼喜飲酒至成丁後日飲一二斗不醉片時無酒
叫呼不絕全不進食日就羸弱令其父用手巾縛住其
手足不令動搖但扶少立却取生辣酒一壜就於其子
口邊打開其酒氣衝入口中病者必欲取飲堅不可與
之須臾口中忽吐物一塊直下壜中即用紙封裹壜口
用猛火燒滚約酒乾一半却開視之其一塊如猪肝樣
約三兩重週回有小孔如針眼不可數計棄之於江飲
食復舊雖滴酒不能飲矣
夜間飲水誤吞水蛭入腹經停月餘日必生下小蛭能食
人肝血腹痛不可忍面目黃瘦全不進食若不早治能
令人死用田中乾泥一小塊小死魚三四箇將猪脂溶
攪勻用巴豆十粒去殼膜研爛入泥內為圓菉豆大用
田中冷水吞下十圓小兒只用三圓至五圓須臾大小
水蛭一時皆瀉出却以正方四物湯加黃芪煎服生血
補理方見婦人科通治類
婦人產後忽兩乳伸長細小如腸垂下直過小肚痛不可
忍危亡須臾名曰乳懸將川芎當歸各貳斤半斤剉散
於瓦石器內用水濃煎不拘時候多少溫服餘一斤半
剉作大塊用香爐慢火逐旋燒煙安在病人面前卓子
下要煙氣直上不絕令病人低頭伏卓子上將口鼻及
病乳常吸煙氣直候用此一料藥盡看病證如何或未
全安則縮減再用一料如前法煎服及燒煙熏吸必安
如用此二料已盡雖兩乳略縮上而不復舊用冷水磨
萆麻子一粒於頭頂心上塗片時即洗去則全安矣
婦人臨產服催生藥驚動太早未當離經而用力太過以
致育膜有傷產後水道中垂出肉線一條約三四尺長牽
引心腹痛不可忍以手微動之則痛苦欲絕先服失笑
散數服仍用老薑三斤淨洗不去皮於石鉢臼內研爛
用清油二斤拌勻入鍋內炒熟以油乾焦為度先用熟
絹一段約五尺長摺作結方令穩重婦人輕輕盛起肉
線使之屈曲作一團納在水道口却用絹袋兜裹茶薑
稍溫傅在肉線上熏覺薑漸冷又用熨斗火熨熱使之
常有薑氣如薑氣已過除去又用新者如此熏熨一日
一夜其肉線已縮大半再用前法越兩日其肉線盡入
腹中其病全安却再服失笑散芎歸湯補理切不可令
肉線斷作兩截則不可醫
有人患勞瘵兩年諸藥不效一日無肉味其腹痛不可忍
又恐傳染移在空房候其自然經停三日病者腹痛氣
息將絕思憶肉味之急忽有人惠雞子三枚其病人俯
仰取火低頭取瓦銚煎熟吹火厚熏屢藏鼻中如有所
礙將熟間忽嚏噴一聲有紅線一條自鼻中出牽抽約
二尺長趁入瓦銚中病人知是怪物急用瓶覆蓋銚中
盡力燒火不住其銚欲裂方住火開銚視之乃是小虫

一條頭目皆具已蝦死如鐵線縱橫以示其家人令投棄
之於江其病即安
若誤嚥水蛭在咽中或以煙火熏之欲死逆悶中援宜得
萊菔嚼汁下咽而甦又炭煙熏人往往致死蘿蔔搗汁
一片著口中煙氣不能毒人或預曝乾為末備用亦可
或新水擂爛乾者為末調飲之亦可
治行被擲穿斷舌忌血出不止以米醋用雞翎刷所斷處
其血即止仍用真蒲黃杏仁去皮尖鵬砂少許研為細
末蜜調稀得所噙化而安
身上及頭面肉上穿腫如蛇狀者用雨滴瓦上蒼苔一
錢水化開塗蛇頭立消

世醫得效方卷第十

世醫得效方卷第十一

建寧路官醫提舉司　刊行
南豐州醫學教授危　亦林　編集
江西等處官醫副提舉余　賜山　校正

小方科

活幼論

嘗謂木有根荄水則有源根荄盛則枝葉暢茂源深則其流必長小兒稟父母元氣而生成元氣盛則肌膚充實驚疳積熱無由而生風寒暑濕略病即愈元氣虛則體怯弱諸證易生所患輕則藥能調治所患重則可治者鮮矣或啼之後或不能言或不能行或手拳不展或[illegible]可治其則初生之時臍風撮口鎖肚等證鎖肚重舌無聲舌焦遍體青黑如此證狀非惡疾則百無一活若其餘諸病不一治之之道當觀形察色聽聲切脈觀形則先觀其眼若兩眼無精光黑睛無運轉目睫無鋒芒如魚眼猫眼者不治或神藏於內而外不得見神氣不脫則豈無可活之理察色若面目俱青眼睛竄視此為驚邪入肝面紅脈赤煩躁夜啼則驚邪入心面青黑咬牙乃驚邪入腎面色淡白喘息氣急則驚邪入肺面黃嘔吐不食汗多睡乃驚邪入脾皆隨其狀而治之若夫聽聲則睡中驚啼聲浮者易治聲沉不響者難痊或聲音如鴉中彈者不

子133 416

治宜於切脉虛則細而遲實則洪而數又當看紋假男左
女右手辨之從虎口內至第一節是風關第二節是氣關
第三節是命關第一節赤紋乃飛禽內外人驚亦為微驚
火驚黑則水驚乘打撲驚青色乃天雷四足驚以隱青紋
微紅則是急風假紋變為停食候第二節氣關紫色紋是
驚癎青色紋乃肝傳脾經白則肺傳脾經若黃色乃傳脾
經黑色難安第三節命關青黑紋現三關通度斜歸指甲
則不治至於驚癎積熱四證驚者虛陽往怯氣怯神散痰
涎疾去驚必青積滯生風其證有冷熱虛實冷則燥之
虛則溫之實則利之熱則涼之是為活法急驚之候通關
截風定搐去痰其熱尚作則當下之一泄已後又急須和
胃類心不可過用寒涼等劑其或口中出血兩足擺跳腹
肚搐動摸體尋衣神昏氣促噴藥不下通關不嚏心中痛
絕忽大叫者難愈慢驚之候宜於生胃氣藥和以截風定
搐不可太燥其或四肢厥冷吐瀉加嗽面黯神慘胃痛鵶
聲口生白瘡髮直搖頭[illegible]以手足一邊牽引者
難愈慢脾十救一二祗當生胃回陽如太衝脉在則取百
會穴多灸之若身冷粘汗直卧如尸[illegible]大小便不
禁虛痰上攻呼吸氣粗脉來浮數是謂陰盛強陽錯認陽
氣已復直與峻藥下痰痰隨涎下人以為痰去[illegible]此則實
證將絶之證雖不辛可無生意矣又有喉中痰涎聲如拽
鋸一兩日間閉目不開此為虛痰饒養其氣凌逼下痰亦必

未可保蘇合香白丸子單服與之[illegible]
[illegible]撮口痓病發癇大類乃風之種類舉身仰仆有十不[illegible]
手足冷口噤不開名柔痓無汗惡寒身反張咬牙為剛痓得之
未易治之[illegible]張口搖頭馬嘶反折[illegible]
吐舌大覇手足兩足拳攣[illegible]搖頭反折[illegible]
吐涎沫振目視人[illegible]眼目視腹脹頭覇唇口撮聚手足[illegible]
搐拂[illegible]身軟頭[illegible]視人[illegible]治法須辨其冷熱順
氣平[illegible]其或目睛不轉口噤無聲唇面青黑肚
脹不乳[illegible]下血厥冷吐利汗出壯熱不止[illegible]不睡眼
生白障不治之候大[illegible]者壯熱[illegible]脹手足搐掣如魚之上
鈎皆由乳母[illegible]撮風[illegible]
利風熱則[illegible]手冷食[illegible]風諸證有不可治者總而論之項
筋無力魚口氣急啼聲咬人瀉下如瘀血手足搐[illegible]
目似開不開身軟口噤不食[illegible]乾澀反張脊強頭陷不
動啼不作聲冷汗如雨[illegible]不[illegible]物不轉睛眼上赤
脉雖[illegible]復生亦無[illegible]之句若[illegible]二十歲已下為
癎二十歲以上為癲[illegible]
肝心脾肺腎五癎外有[illegible]
癎雖[illegible]各有[illegible]多因乳
哺失宜腸胃積滯或[illegible]
為候頭皮光急毛髮焦稀[illegible]兩眼[illegible]
搽鼻挦眉[illegible]可焦渴自汗[illegible]瀉酸肚脹

腸鳴瀉泄，溺熱，或身多瘡疥，踏濕地，食果鹹酸炙炒泥土等
飲水者，此其證也。惟此疳害人最速，若爲齒不發，亦邪熱所
乘，本出於胃，故以走馬爲喻。初作口氣，次第齒黑，甚則齦爛
熱血迸出，甚則齒脫，宜急治之，縱得全活，齒不復生。其證
潮熱如或飲水不已，滑泄不休，舌上瘡黑，目睛青，鼻眼角
黑氣，小便如乳，牙黑骨脫，脫肛，效逆氣促，身上粟生斑點
唇白腹高，中平滿，搖頭，手足垂軃無力，擲著腳心全不
知疼，身冷爲五疳。其有瘵乎？積者面目浮黃，肚緊脹
痛，覆睡多困，醒啼不食，或大腸秘澀，小便如油，或便利無
禁，糞白酸穢，此皆其證也。甚或面黑糞黑，肚脹泄下不止
氣促，手心有瘡，弱不食，亦能爲病，有實有虛。

實者兩腮紅，或口紅燥，煩渴焦煩，大小便難，常時熱躁。虛
時發熱，虛者面色青白，恍惚微渴，口中清冷，泄瀉虛汗
或作，或冷或溫，上壅下利，水穀不分，冷熱不調。外有十證
驚者潮熱如癇，風熱不滅，乳食積熟，多吐，傷寒頭疼，手冷耳
鼻腳都手指尖冷，乃麻疹之證，發汗如珠，乃麻疹候也。多
瀉多渴，有之爲熱，面青脈大，發熱不伸
毒驚然，目閉面如用胎中，全不受納，食化而黑
饑飽食隨吐，遍身冷則爲不治，諸瀉日久，不宜服澀之藥。凡
止先須調氣和中，瀉不止，乳食不進，無有愈期。汗多
舌出，唇紅，眼頭氣促，面腫血瀉，喉口得之否
四肢鼻於口，口五色，脫肛

脾毒冷積痢，無非便膿血，裏急外重，臍腹急痛，日
夜無度，治之當何如？須究其因，先以去積寬腸通氣之劑
續爲之斷下，解有不愈，其或所下如魚腸血水，壯熱煩渴
不食自汗，小便不利，未知有瘳。痧疹一證，一云總是表虛裏實，其
根於臟腑所患重，麻疹表實裏虛，其類於皮膚所患輕，不
治亦自愈。至若痘疹，多因時令不正，穢氣傳染，加之內有
風寒，內積邪熱，而得入抵與傷寒相類，發熱煩燥，或吐
紅，身痛頭疼，耳鼻腳指手中指俱冷，噴嚏呵欠，喘嗽痰涎
或乍寒乍熱，疑似之間，當視其耳後有紅脈赤縷，及見心
胸間細點如粟起爲疹，首尾不可汗下，宜溫涼之劑解毒
知守安表大要，人作能，得爲要，其或熱極往

風以清，急當清心散風，切不可投冷藥之藥及內服
甚多則火動熱燥，投冷藥則毒氣內伏，反爲大害。仍忌
諸般魚鱗煎炒油煙，父母行房，抗頭等觸犯，未發而觸則
毒氣入心，悶亂而死；已發而觸，則瘡痛如割，以至黑爛。切
宜禁戒。仍須常請解，要酒於避，以辟穢
濁之氣，邪不可以用含兒，不忌飲患爲常法。痢此者多不
服藥，豈知未發只發則合解散，已發則合活氣，向若依此
非惟出疹亦易，乾後患若不依此，則邪盛毒盛，後
亦貴乃毒爲患，或生癰疽疥癬，赤眼咽喉口瘡之疾。至
於其之證，猶當細認，如能乳食如常，大便或一日
一次，或兩日一次，通暢只須用和平不冷不熱之藥自保十

柱

平。金如惡證則春夏爲順秋冬爲逆冬月寒收水得
時反歸於腎或先如瘡後發泡其瘡色如點血此是證也
不治春膿疱爲金旺木衰黑陷爲水剋火秋斑子爲火剋
金冬疹子爲土剋水並逆并有黑氣或吉凶變色出而潰
語煩渴小便赤泄瀉不入食猪成餅抓搔癢不發其瘡焦
陷兩眼閉而黑陷腰脹而腫鼻臍目閉頭顱頭面腫大
覺囊抓破臭不可近或脚冷至膝或寒熱黑而焦風攻厥
頷瘡頂腫硬實高而突以上諸狀均不可治外此至於風
寒暑濕之感與大人無異治之法特將量差少耳雜證則
隨方備治吁爲醫之道大方脈爲難古幼方難以其臟腑
脆嫩皮骨軟弱血氣未盛經絡如絲脈息如毫易虛易實
易冷易熱兼之口不能言手不能指疾痛之莫知非觀形
察色聽聲切脈究其病源詳其陰陽表裏虛實而能療之
者蓋亦寡矣若妄投藥餌即生他證可不戒之

初生

拭口法 嬰兒在胎口中有惡物纔生下不候發聲急用軟帛
或綿裹手指拭去黃連甘草汁拭口惡汁稍定更以蜜少
許調朱砂末一字抹入口中鎮心安神解惡物之毒
生兒瘡豆之患須臾以乳與之

刺泡法 小兒纔生下即必用此法可救活急看兒口中懸
癰前腭上有泡以手指摘破以帛指拭血令淨若血入
喉即不可治

成

回氣法 初生氣欲絶不能啼者必是難產或冒寒所致急
以綿絮包裹抱懷中未可斷臍帶且將胞衣置炭火爐
中燒之仍作大紙撚蘸清油點著於臍帶上往來燎帶
燎之蓋臍帶連兒臍得火氣由臍入腹更以熱醋湯盪
洗臍帶須臾氣回啼泣如常方可浴洗了却斷臍帶

通便法 初生大小便不通腹脹欲絶者急令婦人以溫水
漱口了吸咂兒前後心并臍下手足心共七處每一處
凡三五次漱口吸咂取紅赤爲度須臾自通不爾無生
意有此證遇此法可謂再生

貼顖法 治出胎時被風吹鼻塞服藥不退
右用天南星爲末生薑自然汁調成膏貼顖上病去洗

奇方 治初生下遍身無皮但是紅肉宜速以白早米粉乾
撲候生皮方止
又治生下遍身如魚泡又如水晶碎則成水流滲
右用密陀僧研細羅過乾摻仍服蘇合香圓見中氣類
又治七日臍縮乃初生受寒所致
右用硫黄茱萸各半兩爲末研大蒜調塗其腹仍以蛇
床子微火燒熏之

噤風

撮口 治眼閉口噤啼聲漸小舌上聚肉如粟米狀吮乳
不得口吐白沫大小便皆通盖由胎中感受熱氣流毒於
心脾故形見於喉舌或爲風邪擊搏致之

辰砂叁錢　硼砂　馬牙硝各壹錢半　玄明粉貳錢
全蝎　真珠末各壹錢　牛黃　麝香各壹字

右為末，好油帋封裹，自然成膏。每服一豆粒許，用乳汁調，傅乳頭上，吮下。金銀薄荷湯下亦可，木通甘草湯服。

[illegible]散　和胃進乳消痰

白茯苓　人參　草果仁　蘇子微炒
木香[illegible]　甘草　陳皮
厚朴[illegible]薑汁炒

右剉散，每服一錢，生薑一片，紅棗一枚，末乳前服，令乳母服。

[illegible]方　治初生七日口噤

右用牛黃一錢，細研，以竹瀝調一字灌之，更以指乳點於口中。

臍風

天麻[illegible]圓　治因斷臍後為水濕風冷所乘，入於臍，流於心脾，令肚脹臍腫，身體重著，四肢柔直，日夜多啼，不能吮乳，甚則發為風搐。此藥利驚下痰，凡鈎腸鎖肚撮口皆可用。

天麻[illegible]　白附子[illegible]　南星[illegible]　全蝎[illegible]　巴霜[illegible]　輕粉　牙硝[illegible]

右為末，糊圓麻子大，每服一圓，薄荷[illegible]湯送下。若臍邊青黑及爪甲黑者不治。

[illegible]散　治同上

[illegible]散
蜈蚣壹條酒浸炙　瞿麥半錢　蝎梢[illegible]　直殭蚕[illegible]

右為末，每一字吹入鼻，啼則可醫，仍服薄荷調一字服。

[illegible]散　用
赤腳蜈蚣[illegible]　麝香少許　川烏尖[illegible]

右為末，每服半字，金銀器湯調下。

[illegible]法　先用荊芥水洗了，蔥葉一皮，火上炙過，地上出火毒，以手指甲刮薄，向臍[illegible]日便消，用[illegible]散。

小[illegible]天[illegible]圓　方見[illegible]

[illegible]散　治臍中汁出，或赤腫[illegible]，或因水與乳入臍所致

右當歸為末，傅蝦蟆燒灰，白石脂末，油髮灰，傅皆可。

撮口

[illegible]方　治面目黃赤，氣息喘急，啼聲不出，蓋由胎氣挾熱，流毒心脾，故令舌強唇青，聚口撮面，飲乳有妨。

右用直殭蚕二枚，去嘴，略炒為末，蜜調傅唇中效。

天麻圓　治鈎腸鎖肚撮口，內氣引痛，腸胃[illegible]，此藥特效。方見前。若口出白沫，四肢冰冷，最為惡候，一臘之內尤急。又法：驗其兒齒齦上有小泡子如粟米狀，以溫湯蘸熟帛裹手指，輕輕擦破，即開口便瘥。

[illegible]散　治胎風及百日內撮口臍風

右用蝎梢四十九箇，每一箇用薄荷葉[illegible]卷定，以綿扎[illegible]，[illegible]中炙轉焙，令薄荷[illegible]為度，再用白殭蚕四十九[illegible]，[illegible]為末，以[illegible]麝香少許

研勻紫雄雞肝二片煎湯調下

不乳

【葱白方】治初生不飲乳及不小便

右用葱白一寸四破之以乳汁銀石器煎灌之立效

又治初生口噤不開不收乳

右用赤足蜈蚣一條去足炙令焦細研如粉每用半錢以猪乳汁二合和勻分三四次灌之

【茯苓圓】治初生兒撮口不飲乳腹脹滿短氣不能飲乳

赤茯苓去皮　川黄連去鬚　枳殼麩炒　各等分

右為末煉蜜圓梧桐子大每一圓乳汁調灌下

【川芎散】治産婦取冷太過胎中受寒令兒腹痛不飲乳

木香　陳皮　檳榔各等分　官桂

川白薑　甘草炙各半分

右剉每取一捻水一合煎以綿蘸與之嘔加木瓜丁香

變蒸

【保生論】治變蒸變者上氣蒸者體熱輕則發熱微汗其狀似驚重則壯熱脉亂而數或吐或汗或煩啼燥渴輕者五日解重者七八日解其候與傷寒相似亦有變蒸兼邪者但變蒸則耳冷骫冷上唇頭白泡如魚目珠若兼邪挾之則寒熱交爭腹痛啼叫不已每服一錢麥湯調下熱甚者門冬薄荷葉湯下

【紫霜圓】治變蒸發熱不解幷挾傷寒溫壯汗後熱不歇及腹中有痰癖哺乳不進乳則吐哯先寒後熱者

代赭石煆醋淬　赤石脂各一兩　巴豆三十粒去皮心膜出油　杏仁五十粒去皮尖

右以二石為末別研巴豆杏仁為膏相和更搗一二千杵當自相得若硬入少蜜同杵之圓如粟米大用瓷器收每服二圓與少乳汁令下食頃後與少乳勿令多至日中當小利熱除若未全除明日更與二粒百日兒服五粒以此准定增减此藥兼治驚積痰癖食癇溫壯諸病無所不治雖下亦不虛人

【麥門冬散】治變蒸骨熱心煩啼叫

人參　甘草　麥門冬去心　北柴胡各二

龍膽草　防風各一錢

右剉散每服三字水一盞煎服

【當歸散】治變蒸有寒無熱

當歸一錢　木香　官桂辣者　甘草

人參各壹錢

右剉散每一錢水一盞薑三片紅棗一枚煎食前服

【錢氏】治變蒸吐瀉不乳多啼

木香　香附去毛炒　厚朴去粗皮薑汁炒　人參

橘皮　藿香去土　甘草各一分

右剉散每服三字水一盞生薑二片紅棗一枚煎溫服

以上證狀治之但當以平和之劑微表熱實者微利之或不治亦當自愈

通治

乳哺法 凡初乳先須捏去宿乳後與之母欲寐即奪其乳恐睡困不知飽足兒啼未定氣息未調乳母匆遽以乳飲之故不得下停滯胸膈而成嘔吐乳後不與食哺後不與乳脾胃怯弱乳食相併難以消化幼則成嘔而結於腹中作疼大則成癖成積成疳皆自此始

衛養法 小兒肌膚未實若厚衣過煖傷皮膚損血脈發瘡瘍汗出腠理不閉風邪易入若天氣和暖抱之使見風日則血氣堅剛肌肉硬可耐風寒不致疾病今人懷抱小兒不著地氣致令筋骨緩弱疾病易生非愛護之法

相兒命短長法

凡兒三歲已上十歲以下視其性氣高下即可知其夭壽兒小時識悟通敏過人者多夭小兒骨法成就威儀廻轉遲舒稍費人精神雕琢者壽預知人意迴旋敏速者亦夭初生叫聲連延相屬者壽聲絕而復揚急者不壽啼聲散啼聲深汗不流頭四破小便凝如脂膏常搖手足頭毛不周匝者並不成人臍中無血者好臍小者備身輭弱如無骨者汗血者多厄不壽鮮白長大卵縫通達黑者壽目視不正數動者大非佳早坐早行早齒早語皆惡性非佳人髮稀少者強不聽人額上有旋毛妨父母或早貴初生枕骨不成能言而死尻骨不成能倨而死掌骨不成能匍匐而死踵骨不成能行而死臏骨不成能立而死身不收者死股間無生肉者死顧下納者死陰不起者死陰囊下白者死赤者亦死

四君子湯 隨證加味量兒大小用

人參 白朮 茯苓 甘草各等分

右為末每服二錢 傷寒麻黃豆豉北柴胡 吐瀉南木香藿香乾葛 潮熱牛黃黃芩朴硝全蝎薄荷 麻豆牛蒡子紫草蟬退荊芥 腹脹枳殼木通蘇子薑錢 冷瀉扁豆肉豆蔻黃錢棗子 咳逆肉豆蔻木通 大熱苦竹瀝 積熱上攻茅根淡竹葉甘草 乳食不下訶子木香 肺行咳嗽藿香枳殼薑錢 暴風撮口蘇芥牛蒡子枳殼高良薑蟬退 鼻流清涕羌活麻黃防風 泄瀉肉豆蔻木香 滑腸訶子橘皮 腹中有疼如白利或有血根如魚腦髓豆蔻地榆罌粟殼 赤痢罌粟殼烏梅 白痢罌粟殼白黃 大便不利大黃朴消 小便不利木通車前子 霍亂木瓜藿香夏月加香薷 腹痛茴香附子或用澤瀉郁李仁葫蘆巴或只用木瓜豆蔻 腹緊積役三稜蓬朮檳榔薑湯下 有淋燈心麻子仁生薑皆可車前子海金沙葶藶子下 瀉血生地黃瞿麥 瀉枇杷葉炙去毛爪根 喘嗽杏仁炒去皮尖貝母知母這鎮蘇子 夜啼蟬退茯苓酸棗仁 發驚羌活薄荷朱砂犀角人參 顛癇甘草朱砂茯苓牛黃乳香犀角人參鉛白霜 喉痹杏仁當歸豆豉百合大黃 白虛

雞內金腦子黄芩朴消苦竹葉　唾血生地黄當歸稿
節側柏人參蒲黄　血衄蒲黄山梔子淡竹葉　白赤
秦皮菊花苦竹葉甘草　肚虫檳榔史君子枳殼苦朴
皮　頭痛石膏川芎　癥瘕及脇下氣塊肚痛此氣疾
也用天雄參稜朴消大黄　五心熱犀角腦子磨刀水
下　氣不升降沉香蘇子　養氣肥兒檳榔才香紫蘇
葉紅棗

驚癎　附天弔

太乙保生圓又名太乙驚圓治心熱夜啼煩燥常用安神定志去驚
人參去蘆　茯苓各半兩　甘草壹兩炙　僵蠶去絲嘴炒
白朮半兩　桔梗尾各半　辰砂半兩研　全蝎
金銀箔各廿片　麥門冬去心　木香各半兩　酸棗仁去皮炒
皮殼蝉炒　大赭石
右為末水調或蜜圓　急驚潮熱竹青薄荷葉　夜啼
寵心丸　傷風荆芥湯　疹豆蝉退去足翼　搐搦防
風　常服金銀薄荷　慢驚冬瓜子仁　凡驚風已退
神志未安加琥珀三錢別研遠志半兩去心薑汁炒焦
為度加入

天麻防風散治急慢驚風搐搦竄視涎潮
南星　木香　橘紅各壹錢　全蝎
右剉散水一盞半薑四片慢煎熱頻灌大便去涎即愈

鈞　改　按

鎮肝散治驚風搐塞以二三圓薄荷泡湯研灌下得泄即
愈凡驚風對證用藥已效若覺未甚蘇省可與服
又方安神圓定驚
麥門冬去心　馬牙硝　白茯苓　乾山藥
寒水石各半兩　朱砂　甘草半兩　龍腦
右為末煉蜜圓雞頭大每服半圓沙糖水化下不拘時

奪命丹治急慢驚風
蛇含石醋淬七次　大赭石醋淬同上各壹兩　全蝎伍箇　鐵孕粉半兩
右為末每服一錢薄荷煎湯入雄雞冠血少許潮熱入
朱砂病安常用安神圓

治急慢驚抱龍圓
鬱金皂角水浸　黄連　牙硝
木香不見火　藿香　龍腦　全蝎
右為末糊圓用雄黄朱砂麝香金銀箔為衣
風痰足驚熱重麻仁蝉退防風　白殭蠶罌粟殼
赤痢甘草烏梅　潮熱桃柳枝　鎮驚薄荷燈心　吐
藿香　瀉木瓜陳米　夜啼燈心薄荷蜜雞心丸　精神
不爽冬瓜子仁　大便不通枳殼大黄朴消　盤腸瀉
氣天麻亦用　嗽烏梅桑白皮　吐不止丁香末
改煎荆芥　常服金銀薄荷量用

通心飲治心氣不通小便退潮熱分水穀及治旋螺風
木通　連翹　瞿麥　梔子仁

一本加荷 宜入門作月

黃芩　甘草各等分

右剉散每服二錢水一盞燈心麥門冬去心煎。春加蟬退防風夏加茯苓車前子秋加牛蒡升麻冬加山梔子連翹。痸氣用釣藤川楝子或加白芍藥根竹葉。口瘡地黃野苧根湯。旋螺風，赤腫而痛者先用土牛膝澤蘭煎水洗。

[illegible] 一歲可用甘露散同服此藥治急驚初作傷寒不解後日溫熱轉傳風候。驚風形證不明並宜其陰證灌塗又溫若作陽證又不大搐乃陰陽不和宜用[illegible]同下[illegible]均可用[illegible]

[illegible] 治驚風天瘹心熱夜啼驚癇

蟬退[illegible]　荊芥穗[illegible]　甘草[illegible]
大黃[illegible]　黃芩[illegible]　蝎梢[illegible]

右剉散每服二錢水一盞白茅根煎溫服夜啼蟬退疹瘡紫草得利止。

[illegible] 治急驚身熱面赤引飲口中氣熱大小便黃赤搐掣

青黛　輕粉[illegible]　天竺黃[illegible]　黑牽牛[illegible]

右同研蜜圓如小豆大二歲一圓食後薄荷水下

[illegible] 加枳殼防風最能利驚即小柴胡湯[illegible]

[illegible] 治同上方見[illegible]

[illegible] 治兒在胎中受驚故生未滿月而發驚

右用朱砂研細同牛黃少許取猪乳汁調稀抹入口中 入麝香當門子尤妙。

急驚

急驚之證卒然得之初發潮熱直視牙關緊急手足搐掣面紅氣盛頭額遍身汗出口中熱氣大小便黃赤其脈浮數宜用通關散涼心散入此驚風乃心受驚肝主風致筋脈搐搦肝又主筋宜瀉青圓大青膏

[illegible] 同。治驚肝主風宜先涼肝而風自退面色青乃肝風作宜用凡是肝疾者便用眼疾藥肝亦宜用又可加減用如眼疾加山梔子龍膽無妨

龍膽草[illegible]　大黃　當歸[illegible]　川芎
山梔子仁　羌活　防風[illegible]

右為末蜜圓沙糖竹葉湯下

大青膏

天麻[illegible]　白附子[illegible]　蝎梢[illegible]　朱砂[illegible]
青黛[illegible]　天竺黃[illegible]　烏蛇肉[illegible]

右為末蜜圓雞頭大每服一錢薄荷竹葉湯下

[illegible] 治急驚痰壅目上視手足抽掣昏沉不省人事

[illegible] 治急驚風[illegible]

人參　茯苓　杏仁　[illegible]
麻黃　川芎　桂心　[illegible]

乾葛　升麻　當歸去蘆　獨活各叁錢

右剉散每服二錢水一盞生薑二片煎溫服

[illegible]治一切驚風潮搐眼視昏迷但是驚風變易皆可服之

麻黃去節　粉草各叁錢　蟬退去頭足　升麻各二錢

龍膽草貳錢　川芎　天竺黃　鈎藤

羌活　獨活　防風各叁錢

右剉散每服二錢竹葉三皮薄荷三皮煎不拘時溫服

[illegible]不但初生但有風證即用

右以麝香蝎梢薄荷葉蜈蚣牛黃青黛共為末研勻用棗肉膏調新綿上塗勻貼顖上炙手頻熨之百日外兒

更可用浴體法

[illegible]治胎驚風及傷風不睡潮搐傷風發搐從小皆可用

右用天麻蝎尾朱砂烏蛇肉酒浸白礬麝香青黛為末每三錢水三碗桃枝一握并葉煎十沸溫熱浴勿浴背

慢驚

慢驚風證得於大病之餘吐瀉之後及過服寒涼之藥其證眼慢騰騰或露睛手足瘈瘲面色青白通身四肢冷默默不聲其脈沉遲用白朮散[illegible]防風冬瓜仁煎服

[illegible]冬瓜仁湯磨化方見後

[illegible]宣利過多脾困眼慢涎盛四肢不舉不思飲食

大南星炮去皮臍　冬瓜子仁　白附子[illegible]

右為末每服一錢生薑二片防風少許煎湯調服

[illegible]治慢驚不省手足微動眼上視昏睡

天麻　防風　人參去蘆　全蝎去毒

僵蠶炒去絲　粉草各錢半　朱砂　雄黃各錢半

麝香半錢

右末蜜圓小指頭大人參湯化一圓不以時候冬瓜仁湯尤妙

[illegible]治胃氣不和脾困下瀉過多不思飲食乳食不化精神昏慢四肢困冷

人參　白朮　白茯苓

冬瓜子仁　酸棗仁去皮　甘草炙

藿香　枳殼　紫蘇葉少許　丁香不見火

石蓮肉去心　嫩黃耆各半兩

右為末每服一錢烏梅湯冬瓜子仁陳米湯調皆可

[illegible]止吐瀉每服壹錢紫蘇粳陳米湯調下

[illegible]治吐利脾胃虛風慢驚

鈎藤　蟬退　防風　人參各貳錢

麻黃　僵蠶　天麻　全蝎去毒

甘草　川芎　麝香

右剉散每服二錢水一盞煎寒加附子少許乳食前服

[illegible]治吐瀉脾虛生風成慢驚風及因服冷藥多者

南星　生附子　全蝎

右剉散，每服二錢，水一盞，薑三片，煎五分，量大小旋服。

丁附湯 治吐瀉，屢服成慢驚風。

大附子（生，去皮臍）

右剉散，每服一錢，水一大盞，生薑五片，丁香五粒，煎至五分，量大小與之。急無丁香亦可，屢收奇功。

蘇合香圓 治風搐搦，必須理氣，氣行則痰下，關竅自通。方見大方科也。

灸法 治急慢驚風危極不可救者。

先灸當兩乳頭上，男左女右灸三壯。次灸髮際眉心顖會三壯。手足大指當甲角，以物縛兩手作一處，以艾尉從甲半肉之間灸三壯。先灸男近左邊，女近右邊。手亦可治陰陽諸癇病，丈娃如麥子大。

慢脾

黑附湯 治慢脾風，面青額汗，舌短頭低，眼合不開，睡中搖頭吐舌，頻嘔腥臭，噤口咬牙，手足微搐不收，或身冷，或身溫而四肢冷，其脈沉微，陰氣極盛，胃氣極虛，十救一二。蓋由慢驚之後，吐瀉損脾，病傳已極，總歸虛處，惟脾所受，故曰脾風。若逐風則無風可逐，若療驚則無驚可療，但脾間痰涎，虛熱往來，其眼合者，脾困氣乏，神志沉迷，痰涎凝滯而然爾。世所謂慢風難療者，慢脾風是也。

附子（炮，去皮，三錢）　木香（一錢半）　白附子（一錢）　甘草（炙，半錢）

右剉散，每服三錢，水一盞，生薑五片，煎取一半，以匙送下。若手足煖而蘇省即止。

[illegible] 回陽。

真川烏（生，青分）　全蝎（去毒）　木香（各半分）

右為末，每服三字，生薑四片，煎取其半，旋滴入口中。啼者加丁香。

金液丹、青州白圓子 扶風回陽，理痰。二藥等分為末，每服半錢，陳米飲調下。金液丹方見大方科痼冷類，青州白圓子方見小兒科痰涎類。

生附四君子湯 助胃回陽。

右以四君子湯加生附子末四分之一，厥逆者對加。每服半錢，薑五片，慢火熟煎，以匙送下。

蝎附散 回陽氣，豁風痰。

全蝎（七個，去毒）　附子（一錢，炮）　南星（炮）　白附子（炮）　木香（各一錢）

右剉散，每服半錢，水一盞，生薑四片，慢火熟煎，以匙送服。

[illegible]散 正胃回陽，能止嘔吐，溫利痰涎。偏瀉者勿用。研為末，以少許米飲調下，或糕糊圓如粟米大，兒兩三圓，米飲灌下。方見小方科吐瀉類。

醒脾散 治慢脾風吐瀉不止。每服一圓，研人參南木香煎湯，浸熟調下。方見小方科吐瀉類。

灸法同前。

截風

[illegible]圓 若見搐搦不已，驚狂迷悶，角弓反張，或昏沉喘齒

雙目直視頻嗅不省後為癇證亦宜服此藥以除之却不可多進更須以疎風藥相間調理凡服此藥亦須先以木香烏藥枳殼檳榔磨少許進之却服藥使關竅通透藥力無不到

花蛇頭（酒浸炙） 全蝎（[illegible]） 紫粉（伍錢）
生麝香（半錢） 五靈脂（[illegible]） 朱砂（[illegible]） 真珠（[illegible]）
沉香 白附子（[illegible]） 金箔（[illegible]）
蛇含石（[illegible]）
一方加防風
天麻（各伍錢） 片腦子（[illegible]） 白蠶 南星

右為末煉蜜圓小指頭大每服大者一圓小者半圓[illegible]

證依後大風膏湯引下

定諸般風搐

花蛇（[illegible]） 蜈蚣（[illegible]） 全蝎（[illegible]）
蛇含石（[illegible]） 大赭石（[illegible]）
天竺黃（[illegible]） 天麻（三錢） 防風（一兩） 青黛
紫粉（[illegible]） 僵蠶（[illegible]） 白附子 辰砂（[illegible]）
麝香（半錢） 天南星（[illegible]）

右為末煉蜜圓又留用麪糊圓如小指頭大每服大者一圓小者半圓 慢驚[illegible]下 搐搦[illegible]
血瀉荷 [illegible]驚斑[illegible] 化涎[illegible] 退潮
熱瀉荷[illegible]水 止嗽[illegible]五味子杏仁 夜啼燈心[illegible]
心主蟬退 [illegible]下

奪命散 天於風痰不問慢驚急驚風痰[illegible]其聲如大潮百藥不能進咽命在須臾服此良久藥[illegible]隨大便過如稠涕膠黏乃藥之神效無此證不可服

真青礞石 焰硝（各[illegible]兩）

右同入[illegible]炭火[illegible]通紅須待[illegible]如金色取出研細[illegible]急驚痰壅身熱如[illegible]薄荷湯入蜜少許調[illegible]服之 [illegible]慢脾加青州白圓子三粒研為末[illegible]自然汁調若[illegible]入熟蜜少許調勻溫服

[illegible]消痰順氣疎風

半夏 枳殼（[illegible]） 茯苓（[illegible]） 陳皮
防風（[illegible]） 甘草（[illegible]） 人參（[illegible]）

右剉散每服[illegible]煎服效

人參羌活散 治壯熱涎潮牙關緊急

柴胡（[illegible]） 地骨皮（去土） 前胡（[illegible]） 天麻（[illegible]）
人參（[illegible]） 芎藭 獨活（[illegible]） 羌活（[illegible]）
枳殼（[illegible]） 茯苓（[illegible]） 甘草（[illegible]） 桔梗（[illegible]）

右剉散每服二錢水一盞[illegible]薄荷[illegible]服[illegible]

銀白散 治或吐或瀉[illegible]

石蓮肉 白扁豆（[illegible]） [illegible] 人參
天麻 白附子（[illegible]） 全蝎（[illegible]） 木香

甘草炒　藿香各半分　陳米炒黃

右為末每服一錢薑一片冬瓜子仁柒粒同煎或用陳米飲調下 此藥助胃扶風治驚通用

擦牙散

赤蜈蚣一條酒炙　直殭蠶　南星炮各一錢　麝香一字

豬牙皂角三錢略燒存性

右為末以手點薑汁蘸藥少許擦牙或用物引滴入藥兩三點涎出自開

嚏驚散

半夏生一錢　皂角半錢

右為末以豆許用管子吹入鼻立醒

諸癇

人參羌活散治陽證風癇身熱啼叫手足抽掣上竄口噤痰壅腹肚緊脹皆由血脈不斂氣骨不聚為風邪所傷驚怪所觸 方見前

牛黃凉心圓治躁悶項背強直腰脊反張時發時醒 方見風搐通治類

定癇圓治陰證風癇面色黯晦目睛不直視四肢軟緩身體無熱手足清冷不甚抽掣不啼哭 兼治諸癇陰證則除片腦子加綿附子炮切片為末入前圓 方見前

小紫圓治陽證驚癇心熱煩燥驚悸口噤抽掣手溯壯熱昏迷乍熱乍醒或為驚怪所觸而致 方見前

[illegible]湯治陰癇發搐痰壅口噤強直手足微動昏睡不醒小便澀滯或聲啞嘿 方見前

[illegible]圓治食癇肚脹身軟發搐脊強直目睛斜縮皆由乳哺失節結癖所致 方見前

甘遂分治小兒顛癇及婦人心風諸疾

右用甘遂末一錢豬心一個取三管頭血三條和甘遂末將豬心批作兩片以藥入在內用線縛定外以皮紙包裹水濕入文武火內煨熟不可過度除紙以藥細研辰砂末一錢和勻分作四圓每服一圓豬心煎湯化下再服別取豬心煎湯神效

參朱[illegible]治顛癇連年不效煎人參湯下 方見大方癇癇人參類

[illegible]菖蒲圓治癇後瘖不能言

右以大天南星濕紙裹煨為末每服一字豬膽汁調下

[illegible]圓治小兒心啟有血瘖不能言每服伍圓木香陳皮甘草煎湯吞下蓋方內有黃連能去心中惡血 方見右

[illegible]見驚癇類

外感

傷寒傷風發熱頭痛或鼻流清涕咳嗽面赤氣喘凡傷寒宜解表者麥湯散一一發頭上有粘汗妙滿口生瘡頰出汗只在頭上兆如[illegible]

麥湯散治夾驚夾食傷寒氣急嗽声

滑石　石膏　知母　貝母

麻黃　杏仁(炒)　甘草　甜葶藶(隔紙炒)
人參　北地骨皮(去骨)各等分
右爲末每服一錢小麥二十粒煎湯下泄瀉氣促桑白
皮湯下
【惺惺散】治風熱瘡疹傷寒時氣頭痛壯熱目澀多睡咳嗽
氣粗喘急痰涎兼治發痰
白朮　桔梗　細辛　人參
甘草　茯苓　瓜蔞根各等分
右剉散每服貳錢水一盞薄荷三葉煎至半盞時時與
服古方謂小兒壯熱昏睡傷風風熱瘡疹傷食皆相似
未能辨認間但服

【□□□】治同上(方見大方)
【柴胡散】治傷風傷寒熱氣壅滯小便不利或時行瘡疹
未分或痢疾潮熱但是一切積熱溫壯皆宜
柴胡(貳兩)　人參　甘草　黃芩(各壹兩)
半夏(湯泡七次)　麻黃(去節)各伍錢
右剉散每服二錢生薑二片薄荷三葉白竹青少許煎
溫服鼻衄加生地黃瘧疾姜錢桃柳枝地骨皮荊
芥作熱用涎嗽桑白皮
【人參羌活散】治傷風傷寒發熱頭痛(方見前)
【傷暑香薷散】治身熱惡寒頭痛或往來寒熱如瘧煩燥渴
甚嘔吐背寒面垢泄瀉昏悶爲細末每服貳錢水一盞燈心陳

車前草各二莖煎熱服嘔吐加藿香木瓜泄瀉白朮烏梅陳米
熱瀉黃連每服並各加少許(方見大方)
【□□□】治泄瀉引同前泄瀉不止【胃苓湯】合和紫蘇葉烏
梅煎湯下(方見大方)
【□□□】治身重脈緩腹疼發熱惡寒小便澁大便
泄自汗或浮腫因久在卑濕或為雨露所傷每服二錢水
一盞炒蒼朮車前子木瓜少許生薑二片煎熱服小便
多是泄(方見大方傷濕類)
【不換金正氣散】治同上
蒼朮(鹽炒)　藿香葉　陳皮各伍錢
半夏(去滑)　白茯苓　粉草各伍錢

右剉散每服一錢生薑二片紅棗一枚煎食前溫服
【平胃散】治傷濕腹痛泄瀉不食每服一錢空心蘇
鹽湯下(方見大方)
諸熱
潮熱【涼心散】治午來午去潮熱心煩面赤口乾如瘧狀(方見前)
【甘露飲】治同上
寒水石　石膏　鬱金　甘草
薄荷各等分
右為末每服一錢食後薄荷湯調下
【□□□】退潮熱骨蒸痰嗽唇紅面赤煩燥焦啼
瓜根　甘草　鬱金　天竺黃

連翹　防風　牙硝另研 各等分

右為末每一錢潮熱煎燈心茅根湯下驚搐竹葉湯下

惺惺散治伏暑潮熱及小腑不利作渴煩熱頭疼煩燥方見大方科並瀉類

驚風熱面青多乳食脈粗大天青膏疏風小驚丸牛黃膏

食積熱解熱消食丸脈偏方並見上

傷積熱肚緊其糞必臭消積丸白术散方並見前

疳熱肥兒丸治諸積疳丸如粟米大每服一二十丸米飲下

導赤湯亦可方見本方並瀉類

疹豆熱耳鼻尖冷中指冷脈赤唇紅肌膚繃急宜服

參蘇飲升麻葛根湯方見前

變蒸熱治法并方見前

疳熱渴而多瀉白术散肥兒丸方並見後

癖熱毒熱及瘡痛啼哭人參羌活散入生薑薄荷紫草麥門冬去心煎方見前

胎熱釀乳方解胎中受熱生下面赤眼閉不開大小便不通不能進乳食

澤瀉各兩半　猪苓　赤茯苓　天花粉各錢半

生地黃壹兩　茵陳　甘草各伍錢

右剉散每服二錢水一盞煎食後令乳母捏去宿乳却服

生地黃湯治生下遍身皆黃狀如金色身上壯熱大小便不通乳食不進啼叫不止此胎黃之候皆因母受熱而傳

苓

於胎也凡有此證乳母宜服病者與兒服之

生乾地黃　赤芍藥　川芎　當歸

天花粉各等分

右剉散每服二錢水一盞煎食後服

骨蒸熱清骨散治骨蒸肌瘦煩赤口乾日晡潮熱夜有盜汗五心煩燥大病瘥後餘毒不解

羌活　地骨皮　秦艽　麥門冬去心

枳殼炒　大黃煨　柴胡　茯苓

赤芍藥　桑白皮　黃芩　人參

鱉甲醋炙　知母各等分　有痰加半夏

右剉散每服二錢水一盞陳青蒿少許煎溫服亦加桃枝三寸亦可

病熱似骨蒸者交久病后或虛熱時復來作者用瘧疾亦用

又方

羌活　地骨皮　赤芍藥　柴胡

乾葛　甘草各等分

右剉散每服二錢水一盞薄荷五葉煎服瘧疾生姜二片薄荷五葉煎

心熱導赤散赤者心也心氣熱以此宜導赤熱甚但用導赤散此藥但可治心熱或虛熱或人性不宜服涼藥者用

生乾地黃兩　木通去皮　黃芩　甘草各五錢

右剉散每服二錢水一盞入燈心拾莖白茅根二莖青竹

韮五皮煎溫服不拘時候

瀉白散 治肺氣盛致令鼻塞乳食不下或氣逆喘嗽發熱嗽而渴

地骨皮　桑白皮　甘草各等分

右為末每服壹錢粳米百餘粒煎湯下

[illegible] 治肺經有熱口瘡生瘡衄衂等疾

藿香葉　梔子仁　石膏　甘草

防風各等分

右用蜜酒微炒香為末每服一錢溫熱水調不拘時服

[illegible] 解熱疏風方見前

[illegible] 治凡病多因驚則心氣不行鬱而生涎遂成大疾宜常服利小腸去心熱自少驚涎亦不成疾

寒水石　白滑石各貳兩　甘草半兩

右為末量大小暑月冷水調寒月溫湯調後驚及心熱坐臥不安者服之即安

[illegible] 治慢驚風後多服熱藥以致別生熱證唇裂口瘡咽乾煩躁以此解之兼治口瘡

大豆黃卷水浸出芽曬乾　貫眾　板藍根

甘草各壹兩

右剉散每服壹錢水壹盞煎甚者參錢水一盞煎

八正散 治諸熱一切熱毒明目清水利二便方見大小便秘

數沸不拘時服

[illegible] 治遍身壯熱頭目疼痛口舌生瘡拘急大熱衝上夜臥不寧乾嘔往來喉咽澀滯涕唾稠粘痰壅嗽食有阻心神煩躁目赤睛疼口舌生瘡語音不出百節疼痛二便不利鼻衄痰時行溫疫狂語多渴及天弔驚風夜驚並宜服之

方見大方科積熱門

[illegible] 治脾胃氣實有經有熱陰囊赤腫痛大腑秘結

大黃伍錢　黑牽牛半生半炒　猪牙皂角各一兩

右為末煉蜜為丸如菉豆大每服七粒溫水空心下

[illegible] 治初生肺經鼻塞乳食不下

右用牙皂草烏末蔥涎搽成膏貼顖上

[illegible] 治虛熱潮作亦治傷寒壯熱

知母　柴胡　甘草　人參

地骨皮　赤茯苓　半夏湯泡各等分

右剉散每服二錢水一盞薑三片煎溫服

甘露飲子 治胃中客熱口臭不思飲食或飢煩不欲食齒齦腫疼膿血滿口咽中有瘡赤眼目瞼重不欲開瘡疹已發未發並宜服之

天門冬去心　麥門冬去心　熟乾地黃　枇杷葉去毛

枳殼去穰麩炒　生乾地黃　黃芩　石斛去苗

山茵蔯　甘草炙各等分

右剉散每服二錢水一盞煎食後臨臥溫服

[illegible] 治脾發熱自汗虛煩

人參　黃耆　桔梗（焙）　粉草（各一錢）

右剉散每服二錢水一盞生姜二片紅棗一枚麥子三十粒空心溫服

痰嗽

[illegible]圓　治風壅痰飲咽膈不利

半夏（五兩）　白礬（[illegible]）　人參（壹兩）

右爲末生姜自然汁糊爲圓粟米大每服二十圓食后臨卧牡姜湯下

[illegible]湯　治肺壅咳嗽痰多（[illegible]）嗽不宜卒止先須調氣用[illegible]（[illegible]）並加人參五味子烏梅桑白皮紅棗若煎汁（[illegible]）

[illegible]散　治熱嗽　[illegible]散　治肺感寒邪咳嗽聲重

[illegible]湯　治肺胃俱寒咳嗽喘息（方見[illegible]）

[illegible]飲　治痰壅咳嗽不止

白礬（二錢半）　南星　半夏　蚌粉

知母　貝母　甘草（各四錢）　人參（三錢）

右剉散每服二錢生姜二片烏梅半箇煎澄清徐徐吸服　或亦治因飲乳逆氣觸於肺經作嗽久不止壽星圓（方見[illegible]）　非服[illegible]

[illegible]圓　治風痰上壅

右以蛤砂青州白圓子各一十粒姜蘇湯化開服

[illegible]散　治咳逆上氣因乳哺與食或挾風冷傷於肺氣或啼哭未定與乳飲之乳與氣相逆氣不得下

真蘇子　訶子（去核）　蘿蔔子　杏仁（去皮尖）

木香　人參（去蘆）　青皮　甘草（炙各等分）

右剉散每服一錢水一盞姜二片煎量大小減益溫服

疹痘

[illegible]散　治疹痘已發未發潮熱痰嗽臉赤手足微冷每服二錢水一盞姜二片葱白一根山梔子根叁寸同煎熱服合乳母服（[illegible]）

[illegible]散　治發熱頭痛欲作疹痘每服一錢水一盞桑白皮三寸去赤煎湯調不拘時服（[illegible]）

[illegible]湯　治身熱如火頭痛煩赤面紅呵欠[illegible]疹已未出時宜服

白芍藥　川升麻（各壹）　甘草　紫草（[illegible]）

乾葛（壹兩）　木通（去皮[illegible]）

右剉散每服二錢水一中盞入生姜二片葱白二根山梔子根叁寸同煎熱服壯熱心煩加人參赤茯苓石膏麥門冬（去心）

[illegible]散　治疹痘因多服熱藥發而不透身體頭面兩目皆腫連日風搐[illegible]（[illegible]）

[illegible]湯　治時令不正發爲疹痘解腸胃中一切熱毒皆可服之（[illegible]）

三豆飲　治天行痘瘡活血解毒或覺鄉里有此證預防之

則不逆

赤小豆　黑豆　菉豆各壹升　甘草半兩

右用淨水煑熟，逐日空心任意服，已染則輕，未染服之七日不發。

紫草飲子 治豆瘡欲發未發或未透者

紫草　白芍藥　麻黃去節　當歸

甘草各等分

右㕮咀，每服二三錢，水一盞煎，不拘時服。

[illegible] 治瘡豆出不快，及發陷倒靨，或小便赤澁，餘熱不除，一切惡候，或被風吹復不見，入皮膚內者。

紫草茸　木通去皮節　南木香　黃耆炒

川芎　甘草　人參各等分　蟬退去足翼

右㕮咀，每服二錢，水一盞煎，不拘時候溫服。大便秘加枳殼少許，大便如常加糯米百粒，性解毒，能釀而發之。

紫草木香湯 治瘡出不快，大便泄利。

紫草　木香　茯苓　白朮

甘草各等分

右㕮咀，每服二錢，水一盞，糯米三十粒煎，溫服。蓋紫草能利大便，木香白朮所以佐之也。

[illegible] 治瘡疹出不快

紫草　人參去蘆　木通去皮節　茯苓

糯米各等分　甘草減半

右㕮咀，每服二錢，水一盞煎，溫服。大便利者可入南木香，去紫草。

[illegible] 治豆瘡出不快

紫草　蟬退去足翼　人參　白芍藥各一分

木通去節　甘草半錢

右㕮咀，每服二錢，水一盞煎，溫服。

[illegible] 治同上，方見前。

[illegible] 治豆瘡已出未出，煩燥，大人同。

白芍藥不以多少

右為末，白湯調下。大能治皇豆瘡腹痛，屢用屢效。

[illegible] 治四肢發搐，疹瘡黑色不發，或泄瀉不止，身溫者不宜服，方見大方中寒類。

[illegible] 治瘡熱作疹瘡不出，煩燥不得眠。

黃芩　赤芍藥　甘草各伍錢

右㕮咀，每服三錢，水一盞煎，溫服。若胃中虛冷，其人能食，飲水即嘔，脈浮發熱，口鼻中燥，或衄，加大棗一枚；嘔者加半夏少許、生薑三片煎；食少者加人參、紅棗煎，量大小加減服。

[illegible] 治瘡疹已出未能勻遍，色不紅潤。

防風叁錢　人參　蟬退各貳錢

右為末，蘇葛湯調下，服了急用芥子末白湯調如膏，塗兒腳心，乾即再傅，其毒漸漸隨出，瘡疹依前紅活。

散方 治瘡疹出不透腹痛甚或黑陷者
右以蟬退二十五箇去足翼洗淨爲末每服一錢熟水調下腹痛立止而出透神效乳母亦可服一錢
又方 用乾山楂子爲細末湯點服立見出透紅活荔枝殼煎湯調服亦效
發隱□散 治瘡痘已發或爲風冷所折榮衛不和或爲宿食所傷內氣壅遏以致冰硬並主之
青皮去白 陳皮去白 桔梗去蘆 枳殼去穰
當歸去尾 半夏湯洗 川芎 木通去皮節
乾葛 甘草 紫蘇 紫草各等分
人參減半
右㕮咀每二錢姜三片棗一枚煎服未效加楂根三寸
發痘正□散 治瘡疹根脚白色水漿頂淡紅色而不發加川芎白芷紫蘇其加官桂方見大□□□
猪心龍腦子 治時疾豌豆瘡及赤瘡子未透心煩狂躁氣喘妄語或見鬼神或已發而陷伏宜速治不爾毒入臟必死
生龍腦壹錢
右研細旋滴猪心血和圓如小指頭大每服一圓心煩狂躁者用紫草湯化下未發于陷伏者溫酒化下少時心神便定得睡瘡疹發透依常將息取安或只用猪尾血亦可
救陷□□□ 治□□虛弱瘡疹發黑
雞心檳榔一箇 陳皮去白 青皮去穰
甘草炙各二錢 黑牽牛貳兩半生半炒熟
右爲末蜜湯調下氣怯者加南木香一錢先下黑糞次下褐糞後以四君子湯加厚朴木香陳米湯服和胃良久糞黃瘡自微出又以葫荽煎酒傳其身即發起
獨聖散 治瘡疹陷入不發黑色而氣欲絕服此漸蘇紅潤
穿山甲湯洗淨炒令焦黃
右爲末每服半錢入麝香少許南木香煎湯調下或紫草煎湯入紅酒少許服
五福化毒丹 方見前
人齒散 治瘡痘初出光壯忽然黑陷心煩性燥氣喘妄語或見鬼神並宜速治不然毒氣入臟必死
人齒脫落者
右爲末每服作一服酒調下
□□散 治瘡疹黑陷不起以好酒磨化三五粒服效
□□方 治瘡疹瀉黑面陷大便不固乳母同服亦可
人參 白朮 肉豆蔻麵裹煨 白茯苓
黃芪各半兩 甘草炙減半
右㕮咀每服二錢水一盞姜二片棗一枚煎五分乳母倍之若大渴手足厥冷譯病加炮附子
犀角地黃湯 瘡疹出太盛者以此解之
芍藥 生地黃 牡丹 犀角屑鎊或汁之

右剉散每服二錢水一盞煎湯服欲乾犀角散方見上

小篋圓方見前

甘桔湯治疹瘡毒攻咽喉腫痛

桔梗　甘草　牛蒡子炒各　麥門冬去心各

右為末每服一錢沸湯點服入竹葉煎尤妙

護眼膏治疹瘡正發時可用以防豆花入眼生翳

黃蘗壹兩　真菉豆粉壹兩　甘草四兩　紅花貳兩

右為末生清油調塗兩眼四畔用之瘡豆而上亦必或

但用乾胭脂塗抹亦可

加味四物湯治斑瘡入目或瘡豆收後

當歸尾　芍藥　川芎　蒼朮

白菊花　乾葛　羌活各等分

右剉散每服二錢水一盞入生地黃少許捶碎同煎半

盞量兒大小服之乳食後服忌一切動風毒物然食后

忌三二月日方可

蟬菊散治斑瘡入目或病後生翳障

蟬退洗淨去土　白菊花各等分

右剉散每服二錢水一盞入蜜少許煎乳食後量兒大

小與之屢驗

決明散治疹豆入眼

決明子　赤芍藥　瓜根　甘草各一兩

右為末每服一錢蜜水調下

羌菊散治疹瘡後毒氣不散生翳障兼治暴赤眼疼翳障

羞明

羌活　蟬退去足　防風　蛇退

菊花　穀精草　木賊　甘草

梔子　白蒺藜　大黃　黃連

沙苑蒺藜各半兩

右為末每服一錢清米泔溫煖調下

謝方治瘡疹入眼用兔屎焙乾為末茶清調下瘡疹安後

方可服多服即愈仍治疳眼

又治眼目瘡入目痛楚恐傷眼睛浮翳膜乾為末每服二

錢隨兒大小以羊子肝半箇入盞內以杖刺碎爛投水

半合攪取汁調下食後服不甚者一錢去已傷目者亦

服差

密蒙花散治疹痘瘡并諸毒氣入眼皆暗生翳障

密蒙花　青葙子　決明子　車前子各等分

右為末白羊肝一片破開作三片摻藥令勻却合作一

片以濕紙裹火煨於地上出火毒米泔嚼下空心服

決明圓治豆瘡入眼雖赤白障翳遮漫黑睛但得瞳子

不陷者可治之

石決明煅　川芎　黃蘗各壹兩　蒼朮米泔浸

右為末用兔肝或無以羊肝代之研爛搜和圓如

菉豆大每服二三十圓食後臨卧米泔下

又方用穀精草煮白柹喫，仍用菉豆根燒灰淋水，以上面清者洗，下面濃者服之。

通聖散　治豆瘡入眼生翳

菉豆皮　穀精草去根　白菊花各一兩

右剉散，每服一大錢，乾柹一枚，生粟米泔一盞同煎，候米泔盡，只將乾柹去核食之，不拘時候，日三枚，淺者五七日可效，遠者半月。

決明散　浮萍散　治斑瘡入眼，方見眼科　通治散

熏藥　真穀精草、蛤粉各等分，每服二錢，水一盞，入豬肝二片，青竹葉十片，煎熟，先熏後服。

洗方　右以黃連去鬚、白滑石、銅青，用絹帛包，泡湯，候溫洗。

塞耳丹　治疹瘡入眼

右以水銀一錢、國丹五分，同圓作六圓，入鎔銀窩中，用瓦上蓋，濕紙糊護定，用香爐盛炭火燒一日，後取出，以薄綿裹之。疹瘡在右則塞右耳，在左塞左耳，立見癥下。

消毒加味犀角飲　治毒氣壅遏，壯熱心煩，瘡疹雖出未能勻透，口舌生瘡，不能吮乳。

牛蒡子三兩　荊芥穗五錢　甘草炙　防風　川升麻各七錢半　犀角三錢　麥門冬去心　桔梗　錢

右剉散，每服二錢，水一盞，煎去滓，令溫，時時令呷，或頻灌之，大便利不宜服。

射干湯　治瘡疹後身壯熱，大便堅，口舌生瘡，咽喉腫痛，餘毒未盡。

鼠粘子炒，一兩　升麻　甘草　射干各叁錢

右剉散，每服三錢，水一盞，煎溫服，不以時候。

連翹飲　治瘡疹壯熱，小便不通，餘毒未解。

連翹　瞿麥　荊芥　木通　車前子　赤芍藥　當歸去尾　防風　柴胡去蘆　滑石　蟬退　甘草炒，各一分　山梔仁去殼　黃芩各一錢

右剉散，每服二錢，加紫草煎，溫服。

五福化毒丹　治瘡疹餘毒上攻口齒，又治經積毒熱，驚惕狂躁，頰赤咽乾，口舌生瘡，夜臥不寧，譫語煩渴，頭面身體多生瘡癤，未服等疹，亦名青黛圓。

人參半兩　玄參兩半　茯苓一兩　青黛　甘草各五錢　桔梗一兩　牙消各半兩　麝香　腦子一分，另研，加金銀箔

右為末，蜜圓，每兩作十二圓，一歲兒一圓，分四服，用薄荷湯下。瘡疹上攻，口齒涎血臭氣，生地黃自然汁化一圓，用雞翎刷在口內。熱疳肌肉黃瘦，有目疾不見物，陳粟米泔水化下，食後臨臥服。

甘露飲　解胃熱，方見前

瘡爛成片方

右用黃牛糞乾，傳臊多痛，甚者乾淨黃土為末傳之，瘡

逾口中痛不能食者五福化毒丹或生寒浸漬黃柏取
汁咲之為愈凡瘡疹成痂頻以面油乳酥清蜜潤之可
揭即揭血出無害若乾硬已久必成瘢痕如茶醋如豬
肝猪血之屬毋与食之則已脫之迹必為黯慘然而
瘡痂已脫肌肉稍嫩不可盥洗太早亦不可以手加之
蒴藋酒能辟惡氣左右所不可無或蒼术降真香之亦
可曰聖瘡七日熱而發七日泡而乾又七日則平復如
瘡瘍矣大抵調順血氣溫和脾胃均平冷熱則瘡出為
甚易若稟賦虛庶損不足而蓋有餘則瘡出為其難調
解
解之法無以逾此

活血散治疹子出多疼痛及肢痛時時叫喚 方見前

陳明中方 陳同
敗草散治瘡疹抓搔成瘡膿血淋漓
右用多年蓋屋爛草或蓋牆草不以多少曬乾為末乾
貼無時若渾身瘡破膿水不絕粘沾衣服難以坐臥可
用三二升攤於席上令兒坐臥即乾貼以其受經霜
雪雨露感天地陰陽之氣多善解瘡毒或用蕎麥粉荔
枝核燒灰搽瘡上亦好

麩方治水泡瘡
苦參 滑石 蚌粉 輕粉
川白芷各等分
右為末乾摻之立效

通治木香散治痘瘡疹身熱作渴
木香 大腹皮 人參去蘆 桂心
赤茯苓去皮 青皮去穰 前胡去蘆 訶梨勒去核
半夏薑製 丁香 甘草炙三分
右剉散每服二錢水一盞薑二片煎至空心溫服

朱章
異功散治痘出欲發未發之間頭溫手冷腹脹渴瀉急服
此切不可與蜜水
木香 當歸各三錢半 官桂去皮 白术
茯苓各三錢 陳皮 厚朴薑汁炒 人參去蘆
肉豆蔻 丁香各二錢半 附子炮去皮 半夏各一兩半
右剉散每服二錢水一盞薑二片棗二枚煎服

錢氏
白术散治痘已靨身熱不退清神生津除煩止渴
人參 白术 藿香葉 木香
甘草 白茯苓各一兩 乾葛二兩
右剉散每服二錢水一盞煎不以時溫服

人參麥門冬散治食熱煩渴
麥門冬一兩去心 人參去蘆 甘草炙 陳皮
白术 厚朴薑汁炒各半兩
右剉散每服二錢水一盞煎不拘時候溫服

消風散治疹豆或發透或未透然面青黑私是為風邪所
傷此藥主之疹豆證以耳冷尻冷足下冷及耳後有紅縷
驗之然須見心胃間細點如粟起則為真是加蟬退末 方見本科熱證類

四順清涼飲　大黃　芍藥　當歸　甘草炒各等分　便利者度加減　芥炒

五苓散治小便赤澁加燈心十莖麥門冬去心車前子各半錢煎湯調○人參湯加枳殼去穰切少許治大便秘結內煩外熱未效更加四順清涼飲少許方見傷寒附諸熱傷暑及人參湯即小柴胡湯

四順清涼飲治同下熱實者用方見大方

大如聖湯治瘡疹毒攻咽喉腫痛

桔梗　甘草生　牛蒡子炒各一兩　麥門冬去心半兩

右爲末每服二錢沸湯點細細呷服入竹葉五度煎湯尤妙

枳殼桔梗湯治胸腹脹滿

桔梗　枳殼麩炒去穰各一兩

右剉散每服二錢水一盞煎至一盞分二服

二陳湯治痰壅吐食每服二錢生薑二片烏梅半箇煎服方見大方升吐噦類

理中湯治下利嘔逆加木香熟附子每服各半錢方見大方升泄瀉

豆蔻圓治疹豆滑泄不止水穀不化

木香　縮砂仁各三　白龍骨　訶子肉各半兩

赤石脂　枯白礬各七　肉豆蔻各半兩

右爲末麵糊圓如黍米大每服三十圓至五十圓煎異功散下或瀉水穀白色淡黃色木香散下二方見前

蘇合香圓治疹痘爲穢邪穢氣所傷亦令變壞可用醋炭熏後以和穢湯化服解之方見大方升中氣類

旋

化毒散治豆瘡欲發未發便服之此藥以毒攻毒縱瘡出亦少快無惡證

右於冬月先取人猫猪犬糞各等分於高處黃土窖五日取出却用沙鍋盛鹽泥固濟日乾於臘月八日煅令通紅取出去火毒爲末入麝香少許每用一字蜜調白湯化下或挑少許於舌上用乳汁嚥之此方多效

二參飲治豆瘡後餘熱不足不須令病家知之

柴胡　甘草炙　黑參　人參

龍膽草各二錢半　麥門冬去心三錢半

右剉散每服三錢水一盞半煎稍熱服不拘時量大小加減

木筆花散治豆瘡出後有餘瘡生塞鼻中不能睡臥

右用木筆花研爲細末加生麝香少許葱白蘸藥入鼻中數次即通

滅瘢散治豆瘡愈後瘡痂雖落其瘢尤黯或凹或凸用此

韶粉一兩水飛　輕粉一兩

右同研勻猪脂油調塗

又方

白蜜不以多少塗於瘡上其痂易落且無瘢痕亦不臭穢或拌升麻同蜜塗摩痕上并數食之

綿繭散治豆瘡後身體及肢節上生疳蝕瘡膿水不絕

右以出蛾綿繭不拘多少用白礬搥碎塞入繭內令滿

以炭火燒候白巻汁搵取出研細每用乾貼瘡內若
不早治則潰筋骨以致難治

瘧疾

養解香蘇香薷散治暑傷風夏伏暑作瘧其證自汗惡風
先熱後寒或但熱不寒每服三錢生薑三片葱白二根水
一大盞煎服（方見大方科傷寒類）
千金神湯治夏傷濕秋傷風作瘧其證寒熱自汗嘔吐身疼
每服三錢水一大盞生姜三片木瓜二片煎服秋末感風冷
冬又傷寒或感濕暖之氣先寒後熱者服（方見大方科瘧疾類）
五苓散分陰陽和榮衛用人參少許前陳車前草各一根
煎湯服弱者木瓜紫蘇湯或服通靈散亦可（方見大方科傷暑類）

用作用

人參柴胡湯治熱多寒少每服二錢生姜二片麥門冬十粒去
心正地骨皮少許煎多服取效（方見小柴胡湯方見大方科傷寒陰陽證類）
草果平胃散治寒多熱少（方見大方科瘧疾類）
爭功散治熱瘧多效

知母　貝母　柴胡（去蘆）　常山
甘草　山梔子　檳榔（各五錢）　蟬退（十个）
地骨皮（去骨五錢）

右剉散每服三錢用桃柳枝各五寸煎末效用過路葛
藤五寸一處服
截瘧膠金圓（方見大方科瘧疾類）
湯脾圓化痰消積進食駐顏及治氣喘痃積

舞一本作府

杏仁（一兩去皮尖用炒令黃色）　半夏（一兩生姜自然汁浸一宿次日焙）
巴豆（五十粒去皮心膜炒黑出油）

右為末用大好北棗七枚入罐心水煮去皮核取肉為
圓每服五圓常服罐心棗子煎湯下注頭痛桃柳煎湯消
痛食陳米湯空心臨睡服化痰烏梅湯治瘧蒜煎湯或薤
水下消痞癖此方大效

通神餅截瘧有功

甘草末（三錢）　薄荷葉（各三錢）　砒霜（生一錢）
朱砂（一錢半）　定粉（一錢）　膩子　麝香（各少許）
金銀箔（十片）

右煉蜜圓梧桐子大作餅子貝盛每圓或一圓大者二
圓而止二日只一服不可過多服時用井花水或桃柳
枝煎水磨化向北服了忌燒熱飲食亦可繫於候脉處
參苓白术散愈後調理脾胃（方見大方科脾胃類）
紅圓子治血瘕包水癖側於脇傍時時作痛發寒熱瘧家
中脘多蓄痰水日久結癖亦效（止辟氣）

三稜（煨）　莪朮（煨）　芫花　桃仁（去皮尖別研）
杏仁（去皮尖別研）　朱砂　烏梅（炒）　巴豆

右為末醋糊圓小豆大朱砂為衣米湯空腹下

又方

三稜　莪朮　川練（去核）　陳皮（去白）

醋

青皮去白　芫花

右以芫花醋浸一夕炒漸乾入三稜莪朮同炒又入川楝陳皮青皮同炒焦黄為末等分如各半兩杏仁亦用半兩去皮尖別研巴豆二十粒去油膜和勻醋糊圓黍米大一歲二圓臨臥米飲下此二方稍相似不若於方中和桃仁與烏梅則尤妙又用薑湯下湯劑圓化痰涎一日一服或兩服日用如此服嚥水亦可

木鱉膏貼痞餅

木鱉去殼　獨蒜半兩　雄黄半兩

右杵為膏入醋少許蠟紙貼患處

灸法兩乳下一寸各三壯

痞結

枳實理中圓治虛氣痞塞胸膈留飲聚水腹脇或加脹滿手不可近以君子湯加枳實去穰麩炒乾薑炮為末煉蜜圓菉豆大熱湯化下渴加瓜蔞根下利加牡蠣粉各等分已用經驗

桔梗枳殼湯治熱氣痞滿胸膈兩脇按之則痛

枳殼去穰　桔梗去蘆各半兩　半夏湯洗　黄芩

瓜蔞仁　黄連去鬚各三錢

右剉散生薑麥門冬去心煎服利黄涎沫即安

客忤

蘇合香圓治神氣嫩弱外邪客氣獸畜異物暴觸忤口吐

青黄白沫水穀鮮雜面色變易喘息腹痛反側瘈瘲狀似驚癇但眼不上竄視其口中懸癰左右若有小小腫核即以竹針刺潰之或以指爪摘破急作醋炭降真香皂角熏之卻服此方見驚癇

右每服一圓薑湯調開頻頻與服次用豉三合水濕搗為圓如雞子大摩兒顖上及足心各五六遍次摩臍心及上下良久擘開自有毛即擲之大法宜辟邪正氣散鎮安心延久非為力也

雄麝散治客忤腹痛危急

雄黄一錢　明乳香半錢　生麝香一字

右為末每一字剌雞冠血調灌之

[illegible]圓治客忤驚啼壯熱

天麻　犀角　麥門冬去心　鈎藤

朱砂各壹分　鐵粉　雄黄半錢　生麝少許

右為末每服半錢金銀煎湯調但服安神圓亦可方見驚

黄土散治小兒卒客忤

竈中黄土　蚯蚓糞各等分

右研細水調塗兒頭上及五心良

世醫得効方卷第十二

○小方科

痘瘡

〔四順飲〕治風熱積毒聚成瘡發於頭面手足熱若如胭脂色其熱如火捫著手痛不可忍加紫草煎與犀角消毒飲相間服亦療火瘡紫黑焦症治壯熱煩渴甚加黃芩麥門冬去心朴消各半錢

〔内托散〕

紅内消　當歸　黃耆　甘草節

羌活　黃芩各半兩　麝香少許

右為末每服二錢茅蕉湯調成或生地黃亦可

〔解毒湯〕治瘡毒初發如桃李

每服貳錢水一盞姜三片紫草少許煎溫服

〔調解散〕與服毒散合和生薑薄荷煎　防風

細切煎湯加天花粉少許

〔敷方〕用海游走不定焮熱赤腫疼痛用當歸手足

妙後服藥

寒水石　石膏　黃連　黃柏各半兩

右為末水調傅

〔又方〕青黛為末井水調入蜜敷用亦可

〔又方〕黃丹不拘多少磨刀水調傅

〔又方〕癰腫如火用大黃朴消為末調塗腫處乾即水

若生地黃

〔洗方〕用防風酸草赤芍煎水洗

〔又方〕

〔蝦蟆法〕取活用水

即消未消再用毒滿身入腹入陰難治

○諸用

〔犀角地黃湯〕治心

〔瀉黃散〕治脾

方見

〔瀉肝湯〕治肝目白膜遮睛

肉色青黃

生乾地黃　熟地黃

半夏麴　天麻　地骨皮　甘草

當歸

〔瀉肺湯〕治肺喘嗽氣逆多痰寒熱

桑白皮　紫蘇　黃芩

當歸　天門冬　前胡　防風

赤茯苓　枳殼　生乾地黃　甘草

右剉散每服二錢水一盞煎溫服不拘時候

地黃圓治腎疳遍身瘦瘠有瘡疥寒熱作時頭極熱腳冷如冰

生乾地黃（焙） 乾山藥 山茱萸（去核，各四錢）

澤瀉 牡丹皮 白茯苓（各二錢）

右為末，煉蜜圓梧桐子大，每用一二圓，化開服。

胡黃連圓治熱疳潮熱如火大便澀

胡黃連 川黃連（各半兩） 朱砂（壹錢半，別研）

右二連為末，和朱砂入猪膽內，緊定，虛懸於銚中，煮一炊久，取出研，蘆薈、青黛（各二錢半），去足蝦蟆灰（二錢），麝少許，粳米飯圓麻子大，每服十圓，食後米飲下。

五疳保童圓治熱疳肌肉黃瘦雀目夜不見物，陳粟米飲化下（方見前）

至聖圓治冷疳時時泄瀉虛汗不止

丁香 丁皮（各壹錢） 木香 紫厚朴（制，各見）

史君子肉（焙） 橘紅 肉豆蔻（濕紙裹煨，各弍錢）

右為末，神麴糊圓麻子大，每七圓，食前米飲下。

銅青散治走馬疳，口內生瘡，牙齦潰爛，齒黑欲脫，或出血，臭氣，丈夫婦人同

川白芷（半兩） 馬牙硝（壹錢） 銅青（壹分） 麝香（壹字）

右為末，乾傅口角及擦齒上，仍服蟾酥圓（方見後）

下蟲圓治蛔疳，因食肉太早，或腸胃停蓄肥膩而蛔蟲，其證多啼，嘔吐清沫，腹痛脹滿，唇口紫黑，腸頭及齒癢

新白苦楝根皮（酒浸，焙） 綠色貫眾 木香

桃仁（浸，去皮） 蕪荑（各弍錢） 雞心檳榔（弍錢） 鶴虱（炒，壹錢）

輕粉（半錢） 乾蝦蟆（炙焦，一錢） 史君子（取肉，五十個）

右為末，飛羅麵糊圓麻子大，每二十圓，天明清肉汁下，內加當歸、川黃連各二錢半，治脊疳兼疳勞，可擇用。

大蘆薈圓治諸疳，蟲蝕脊膂，身熱羸黃，煩熱下痢，脊骨如鋸齒，十指皆瘡，頻嚙指甲

蘆薈 蕪荑 木香 青黛（乾）

檳榔 川黃連（各半分） 蟬退（弍十枚） 麝（少許）

胡黃連（半兩）

右為末，猪膽二箇取汁浸糕圓麻子大，每服二十圓，米飲下。

龍膽圓治腦疳，頭皮光急，滿頭餅瘡，腦熱如火，髮結如穗，遍身多汗，顖腫顖高

龍膽草 川升麻 苦楝根皮（焙） 防風

赤茯神 蘆薈 油髮灰 青黛（焙）

黃連（各二錢）

右為末，猪膽汁浸糕糊圓麻子大，每二十圓，薄荷紫蘇湯下，食後，仍以蘆薈末入鼻。

黃連圓治乾疳瘦悴，少血，舌乾，目睛不轉，乾啼，身熱，手足清冷，皮燥，大便乾結，搐口，夜臥乾渴

黃連（去鬚） 白蕪荑 草龍膽（去蘆） 青橘皮（去瓤）

五倍子　蝦蟆頭　夜明砂炒　苦楝根
雄黃　麝香　青黛　天漿子炒
熊膽　蘆薈　胡黃連已上各壹分
右為末，研令勻，糯米糊和圓麻子大。一歲兒每服一圓，不計時候，米飲下，日進三服尤佳。一方有乾蝸牛微炒壹分。

白朮散 治疳渴，煩燥引水，乳食不進，夜則渴甚。加烏梅、陳米，治積宿滯，水穀不聚，頻泄不效，加肉豆蔻、訶子，方見前。錢氏白朮散也。

香連圓 治疳痢，冷熱不調，五色雜下，裏急外重。
黃連　木香　紫厚朴去麤皮，薑汁炒
縮砂仁　夜明砂　訶子肉
右為末，粳米飯圓麻子大，每服十五圓，乾艾葉生薑煎湯，食前溫下。

褐圓子 治疳腫脹，因虛中有積，腹肚緊脹，頭面虛浮。
蘿蔔子微炒，壹兩　陳皮　青皮　好檳榔
黑牽牛半生半炒，取仁　北五靈脂　赤茯苓
蓬莪朮各半兩　木香貳錢半
右為末，飛羅麪糊圓菉豆大，每服十五圓，紫蘇桑白皮煎湯下。

黃耆湯 治疳瘦虛喘不定，虛汗骨蒸，渴而復瀉，乳食遲進。
黃耆蜜炙　當歸　川芎　白芍藥
生乾地黃　鱉甲去裙，醋炙　柴胡各二錢　人參

白茯苓　橘皮　半夏麴　北柴胡
史君子　甘草炙，各貳錢
右剉散，每服貳錢，水一盞，薑二片，棗一枚，煎，食前服。

蘆薈圓 治頭瘡。
人參半兩　川芎　蕪荑　北柴胡各壹兩
史君子　胡黃連　川黃連各二兩
右用豬膽一盞，吳茱萸一兩，拌和二連，淹一宿，次早炒乾，去茱萸，只用二連，夾餘藥杵末，粟米粉糊圓麻子大，每服二十圓，食前熟水下。

□□圓 治腦後項邊有核如瘰癧狀，按之轉動而不疼，名無辜疳毒，兼治諸疳。一服瀉，二服瀉止，三服瀉。

住
蟾蜍夏月溝渠中取不鳴者，腹大者佳。
右取糞中蛆，投置桶中，以尿浸之，桶上要乾，不與虫走。却將蟾蜍打殺，頓在虫中，任與虫食一日夜，次以新布袋包繫，置之急水中浸一宿，取出瓦上焙為末，入麝一字，粳飯揉圓麻子大，每服二三十圓，米飲下。
一方用蕪荑、黃連、胡黃連、青黛各半兩，蝦蟆一箇，只用酒浸炙，去骨為末，麪糊圓粟米大，每服三十圓，食後臨卧米飲下，日三服，立效。

又方 治無辜疳。
右以夜明砂炒為末，入豬飲食中與之。

[?]圓 治諸疳發熱腹痛泄瀉大渴或因病後通泄太過成疳
蟾酥 胡黃連 宣連去鬚
龍膽草 陳皮 川練子去核 木香
史君子去殼 蕪荑各壹兩 麝香半錢 巴豆去油
茴香壹兩炒
右為末猪膽汁圓或糊圓青黛為衣常服麻湯下
[?]圓 治諸疳多因飢飽乳哺食太早或因久患臟腑皆虛虫動口瀉羸瘦腹大不能行髮豎發熱無精神
黃連 神麴各壹兩 大麥蘖半兩炒 木香一錢
檳榔一个不見火 史君子肉 肉豆蔻麵裹煨各半兩

右為末麪糊圓如黍米大每服三四十圓量兒大小加減熟水吞下
[?]圓 挺疳止瀉
丁香 木香 肉豆蔻去殼各半兩用麪裹同入慢火煨
人參各半兩熟為度 訶子 史君子 蘆薈各壹錢細研入
右為末蒸棗肉圓麻子大每服五圓至七圓溫米飲下空食前服
五[?]圓 治疳傷肚大
青皮去白 巴豆 北五靈脂 蓬莪朮各壹
右為末提和拌京墨一兩用那巴豆肉去油拌一錢研細拌和粳米飯圓麻子大每三五圓米湯下不飢飽時下

[?]圓 治諸疳作熱煩渴每服二十圓米飲下方
大方科並載
[?]不能發者方
右以[?]研或每服十五圓用蘇合香圓一粒入朱砂五麝香末各少許石菖蒲煎湯調開下方見大方科中氣門蘇合香圓
[?]圓 治疳發自後挺至弱冠潮熱發瘡乃疳氣滓然疳蟲食其肌至成疳熱流注遍身熱瘡發歇無已
[?]圓 猪肚圓服之如
雄猪肚一具 黃連去鬚七兩
右剉作小截少水和納猪肚內用線縫定頓在五升粳米上蒸十分爛取放臼中入些蒸飯搗千餘杵粘實得所乘手捏圓如小菉豆大每服二十圓米飲下童子倍之飛者又倍之仍以川芎生地黃茯苓茯神與之調理清心熱多者間服生犀散方見前二十歲以上潮熱發瘦是為虛勞此一種病也用藥同前凡兒童諸疳不出於疳則出於熱熱則生痰常須識此矣
洗方 右用大腹皮苦參川白芷為剉散煎湯淋洗妙
敷方 甘草黃柏焙[?]蔥荊芥煎水洗後却用訶子連肉核燒灰入麝香輕粉少許和勻傅瘡上效
[?]法 治疳後虛熱小便脹
右以韭菜地龍糞為末水火煎清油調傅
[?]法 治[?]疳脫後項有核如彈轉動軟而不疼

其間有虫如米粒，不速破之，則虫隨熱氣流散，淫蝕筋脈，以致肢體作癱瘓，使稍長，血壯熱，羸瘦，頭露骨高。昔因氣血虛積所致，用針剌破，以膏藥貼，則愈。或因浴濯兒衣，露於簷下，為雌鳥落羽所污，兒著此衣，虫入皮毛，亦致斯疾。凡曬兒衣，須微火烘之。

丁奚哺露

大全方 治小兒手足極細，項小骨高，尻削體痿，腹大臍突，號哭胸陷，或生穀癥，是名丁奚。虛熱往來，頭骨分開，翻食吐虫，煩渴嘔噦，是為哺露。二者皆因脾胃久虛，不能消化水穀，以榮血氣，致肌肉銷鑠，腎氣不足，復為風冷所傷，渠[illegible]者，亦有胎中受毒，臟腑少血致之。此皆無辜種類之疾，並難治，宜服

一本三錢作二錢

青皮去穰　陳皮去白　蓬朮煨　川芎
北五靈脂　白豆蔻仁　雞心檳榔　蘆薈各半兩
木香　史君子肉炒　蝦蟆灰各三錢

右為末，豬膽汁浸糕糊圓麻子大，每服二十圓，米飲下。有熱，薄荷湯下。

魃病

千金 治孕婦被鬼魃，導其腹中，令兒病也。其證下利，寒熱去來，毫毛鬢髮不悅澤，及以婦人有兒未能行時，復有孕，使兒飲此乳，亦作此病。

龍膽草　北柴胡[illegible]　茯苓　桔梗

釣藤皮　芍藥　甘草炙　茯苓各十八銖
蜣螂二枚　大黃濕紙裹煨，壹兩

右剉散，以水壹升，煮取五合，為一劑。十歲已下小兒皆可服。若兒生一日至七日，分一合為三服；八日至十五日，分一合半為三服；生十六日至二十日，分二合為三服；二十日至三十日、四十日，盡以五合為三服，皆以得下即止。此為出腹嬰兒所作。若日月長大者，以次依此為例，必知多少，及有兒氣，可加人參、當歸各二錢半。一百日兒加一錢一字，二百日兒加二錢半，一歲兒加半兩。餘准此。

積滯

治積神效。

巴豆二十五粒，用水浸壹宿，五更初去皮，取心膜，不去油，另研　輕粉十文錢
滑石五錢　雄黃五錢

右為末，研飯為圓，如粟米大。周歲以下每用三圓，以上四圓，未效再加圓數。臨上有涎，或吐，亦無妨。如有虫，用苦楝皮少許、甘草二寸，煎湯，五更初空心將化虫藥服了，後用此取下。春季燈心湯下，夏季麻黃湯下，秋季蘇湯下，冬季葱白湯下。初生兒以一粒，放口中，乳汁下。

消乳圓 治乳積，吐乳，瀉乳，其氣酸臭，此由啼哭未已，以乳與兒，停滯不化得之。

丁香　烏梅肉　巴豆　縮砂仁

右為末麪糊圓每服七十圓米飲下

肥氣圓治食積肚硬熱渴或嘔吐因飲食無度多食過飽飽後即睡得之

烏梅八個取肉 巴豆十八粒去油 青皮五分去白 陳皮五分去白

右為末米糊圓粟米大每服七圓米飲下化積亦消

感應圓紅圓子治食積面目腫黃肚熱脹痛多因酷嗜不食或大腸乾結小便如泔或痢積酸臭服之大效方見

消積圓治氣積腹痛啼叫如蟲咬痛因調停其氣榮衛不和淹延日久得之蘇合香圓感應圓各等分和圓如粟米大紫蘇湯下三十圓立效方見

□□散取積後調理

石蓮肉去心二兩 蓬莪朮 益智仁 京三稜

甘草各六兩 青皮去白 陳皮各去白 厚朴

右剉散每服二錢水一盞生薑二片棗一枚鹽少許煎通口服鹽湯點鹽酒調亦可不拘時服

□□湯合和滋氣和胃消積每服一錢酥鹽下多服尤妙方見

發出

□□散治因喫食物肌肉羸瘦唇口吐沫腹中疼痛黑色虫不治

史君子 雷丸 定粉

輕粉半錢 青葙子 鶴虱一分

右為末用雞鴨卵和蒸為餅先將此藥隔日夜五更服將豬肉湯圓取下

四□子□每服一錢苦楝根少許煎湯調服近病亦效

化蟲圓

鶴虱 胡粉 檳榔 白礬

苦楝根皮 蕪荑 黃連

酸石榴皮

右為末以麪糊圓如麻子大一歲兒三圓以米水入香油三五滴下其虫小者化為水大者自下加雷丸或用豬瘦肉湯下

□□散治蛔虫寸白蟲

苦楝根 鶴虱 檳榔

豬牙皂角 史君子仁

好青黛 麝香

右同研勻每服壹字用淡豬肉湯食前調

□□圓治因喫物飲肚消瘦虫生腹中攪痛不可忍者

真胡粉 檳榔 川楝子 鶴虱

白礬

右為末米飲糊圓痛時服空心米飲下前服如麻子大小兒多有諸虫臟腑虛弱食肥甘則動腹痛叫哭倒身吐清水涎沫面色青黃飲食不進不生肌膚或

寒熱或沉沉默默，其虫不療，再生不已，長一尺則能害
人。一歲兒五圓，温漿水入清油一二點，打勻，温米飲下。
其虫小者化為水，大者自下。

嘔吐

驚吐 安神圓 治因驚吐嬭，面色青，藿香煎湯化開服。方見前
硫黃散 治吐并驚吐
硫黃半兩　水銀一分
右同研無星，黑色，每大小一字至一錢匕，水少小點，以指
纏綿磨，溫漆湯調勻可服，吐立止。兼治大人反胃，妙。
冷吐 香薷散 治脾胃傷冷作吐，每服二錢，水一盞，生薑、紅
棗煎溫服。方見右　白术散亦效。方見前

芽

熱吐 通心飲 治燥熱久傷藥，希作渴發吐，每服二錢，燈心
藿香葉煎湯服。方見前
涎吐 半夏圓 治胸膈停痰作吐。方見大方吐痰類下。一方單用半
夏泡七次，為末，薑湯下數錢，亦能止渴。有熱者，人參湯即小
柴胡湯。方見大方咳嗽類
積吐 香黃散 治脾胃停食不化，所吐酸臭，生薑烏梅煎服。
方見右　消積圓 方見前
風吐 大青膏 治胃脘生風，頻吐，用薄荷葉一皮煎湯化開，
兼服白术散。方見前　又方 風熱吐，朴消、白滑石為末，每服
半錢，漿水半盞，清油半兩，調勻服，吐定。

吐乳

[illegible] 治吐乳兼下痢不止 靈[illegible]圓 粟米大，米飲下一二
圓 方見大方嘔吐類
[illegible]圓 治嚥物嚥乳便吐，下水乳不得，飲食不下者。
白豆蔻 研焙爲末　甘草 生半炙半　硃砂 研為圓
右為末，逐旋安掌中，令他乾嗽，兒乾擦口中。
丁香散 治吐乳傷食
丁香　石蓮肉　枇杷葉 去毛炙，各等分
右為末，每服一錢，米飲調下。
[illegible] 治好感風冷，發熱作嘔，每服一錢，水一盞，生薑
二片，木瓜一片煎服。方見大方嘔吐類
[illegible]不時暴嘔 [illegible] 生薑二片，麝香少許煎。方見大方[illegible]
[illegible]散 治生時洗上牽延[illegible]，加半夏湯洗[illegible]生薑[illegible]
少許煎。方見大方[illegible]
[illegible] 治積吐嬭 四君子湯 加藿香末煎湯服。又治經年吐嬭
不停，或成片段，服過多積氣有痰，腹通，父母交感時
乳所致[illegible] 方見[illegible] [illegible]圓 方見前 兼用。
吐乳不止恐成慢驚風
右以靈砂一粒，青州白圓子三粒，同研末，米飲調下。量
大小與之。吐久虛甚者，對用靈砂，親試有效。靈砂方見大方[illegible]
青州白圓子方見大方[illegible]
又方 蓮心二十一箇，香附子三箇，吳茱萸七箇，丁香七箇，
一處新瓦上炒黃，研為末，以乳汁調付乳頭上，令兒吮

十四

食療用有驗　霍亂

總論吐瀉起於脾胃不調陰陽不順清濁相干或感風冷之氣傷於脾胃胃氣不調故嘔吐不食脾氣虛弱腹脹不調故泄瀉有脾虛損冷食外感風冷故先吐而後瀉有胃熱嘔吐發瀉夏月嘔吐發瀉為霍亂因胃熱引飲停留胃渠吐瀉發熱用香薷散大凡吐瀉不可便下止吐瀉藥先調脾氣秋冬之間多是傷冷生冷過度外感風寒多泄瀉熱當用[illegible]但吐不瀉因傷粘物滯脾有胃熱嘔吐湯水不休右胃冷嘔吐面青白四肢逆冷大凡吐瀉先調脾氣此大法也

白朮散 治胃氣不和脾虛[illegible]發為吐下每服二錢水一盞生薑二片烏梅半個[illegible]棗一枚[illegible]三寸煎溫服[illegible]方見[illegible]

[illegible]散 治陰陽不調[illegible]霍亂嘔瀉不止每服一錢蘇葉米飲[illegible]調服未效加生薑自然汁少許服

[illegible]湯 用生薑自然汁[illegible]大豆兒大小米飲下效

[illegible]和[illegible] 治夏秋冬暑[illegible]吐瀉小止每服二錢水一盞生薑二片木瓜一片煎服 以上方並[illegible]

[illegible] 治傷暑伏熱[illegible]惡心[illegible]乾[illegible]不思飲食或發霍亂吐利轉筋宜服[illegible]

[illegible] 治陰陽不和脾胃虛損吐下不止凡吐瀉五月內九分下一分補八月內九分補而一分下有熱者先用補脾後退熱竹葉石膏湯主之次用水銀硫黃末主之生薑水調下但霍亂一證吐利交作盡由飲啖生冷或胃熱之氣中脘節閉[illegible]發為此能通暢三焦分理陰陽[illegible]

[illegible]

[illegible] 若因虛被冷[illegible]用米飲調下特效須多服曾[illegible]

[illegible]調理[illegible]

[illegible]方 治霍亂

右以牛涎一合灌下[illegible]大豆[illegible]煎湯洗手足[illegible]

[illegible] [illegible]男左女右第二脚指上灸[illegible]三壯即愈

服蘆汁一二合自愈

泄瀉

[illegible] **白朮散** 治瀉下青色 方[illegible]

[illegible] 治[illegible]如泥[illegible]

[illegible]

一錢止用燈心[illegible]煎服

[illegible] 治臟腑[illegible]瀉[illegible]

白朮散 [illegible]

蘇煎薑錢或錢服冷藥脾虛生氣成泄瀉【固腸丸】出生氣方
風腸下瀉極用【金液丹】為末陳米飲下丸往方並見前
【肉豆蔻湯】治冷瀉不止每服一錢薑棗湯或陳米湯調 方見大方瀉門泄瀉類
【白豆蔻散】治腹痛洞泄腸胃虛冷
肉豆蔻 煨 青皮 炒 訶子 肉 乳香 各等分
右為末每服一錢米飲調下
【參蘇不調湯】【和中散】
木香 當歸 川芎 北前胡
柴胡 青皮 北梗 甘草 炙
赤茯苓 各等分
右剉散每服一錢水一盞生薑二片棗一枚煎空心服

方 二 十七

【附子理中散】【聖惠丸】方並見大方瀉門
【茯苓湯】【香連丸】方並見大方泄瀉類
腎泄【茴香丸】治腎虛泄瀉腰骨力弱小腹痛泄多即腰
右用二圓為末入鍾乳粉半錢以炒破故紙一錢半
肉豆蔻一錢大棗二枚煎取清汁乘熱調空心進下 見大方
大方科瘡瘍類
梅月天時行濕蒸苦自泄每服半錢一二丘豆蔻伍粒水半盞
煎 方見大方科傷暑類

下痢

【地榆散】治赤痢因入腸停積熱毒得之或點滴鮮紅
地榆 訶子 甘草 各等分

右為末每服一錢鹽米湯調空腹服
【又方】
地榆 壹錢 甘草 貳錢 芍藥 壹錢 當歸 貳錢
右剉散每服壹錢水壹盞煎溫服
【八正散】【香連丸】治腸胃有熱大便秘澁疼痛啼哭下痢赤
黃膿血便多濕腹痛小便不利乃積熱為毒為之須加黃連
大方見大方科瘡瘍類
【四生散】
罌粟殼 去蒂蜜炙 半生半炙 黑豆 壹合 半生半炒 甘草 半生半炙
生薑 半生半炙
右剉散每服貳錢熟煎溫服 如嘔食不入加人參少許

方 二 十八

【參苓白朮散】治冷下痢右黃以消胸滿作渴身熱腹脹譫語此
必有燥屎服此下之后與【小承】方見大方傷寒類
【參苓散】治白痢因腸胃虛弱受於寒氣所下不止腹痛不
食者
木香 炮 厚朴 薑汁炒 白朮 壹分 龍骨
當歸 洗 乾薑 炮 訶子肉 各壹分
右剉散每服貳錢水壹盞薑三片棗一枚煎溫服量
大小加減
【朴附圓】治滑冷下痢不禁
厚朴 附子 乾薑 陳皮 各壹兩
右為末糊圓粟米大每服三十圓米飲下日三服

香連圓 治赤白痢皆氣血不和為寒熱所傷冷熱相搏致
赤下白或赤白相雜裏急後重圓如粟米大 方見大方科滑泄瀉類
[illegible] 治同上 方見大方科痢類
戊己圓 治冷熱不調或乳哺失節泄瀉不止或下痢鮮
紅或赤多白少腹痛後重腸胃虛滑便數減食困倦一切
瀉痢並宜服之 方見大方科下痢類
[illegible] 治赤白痢
木香 [illegible] 黃連 去鬚 粟殼 去蒂萼蜜炙
僵蠶 [illegible] 甘草 各一兩
右用生薑二兩切同炒為末每服一錢米飲下 赤痢
生地黃[illegible]七寸白痢為[illegible]一錢並煎湯調下 如有熱小柴
胡湯解之 方見大方科傷寒類
石蓮散 治禁口痢因服熱性藥太過傷損胃氣並飲食口閉
四肢逆冷若穀道不閉黃汁長流亦治
蓮肉
右為末每服一錢空腹米飲調服
參苓白朮散 治禁口痢和胃進食或間用山藥細炒
半生半熟為末米飲調服亦效 方見大方科[illegible]
[illegible]圓 治滑泄不止一切瀉痢必效
當歸 硫黃 牡蠣 [illegible] 木香 半兩
右為末麪糊圓粟米大每服一七圓糯米飲入薑汁一
二滴送下

小駐車圓 治休息痢因腸胃虛弱紅白相雜兩三點滴下
發作不止 方見大方科下痢類
[illegible]雞子 治休息痢及疳瀉日久不能安者
右用雞子一枚打破用黃蠟一塊如指大銚內鎔以雞
子拌和炒熟空心食之
[illegible] 治[illegible]肚大喫食不成肌膚其下如泥粥汁青
白黑為冷黃赤為熱皆積聚所致 方見大方科[illegible]
[illegible]圓 [illegible]合積痢
木乳湯 治氣痢下如魚眼 方並見大方科下痢類

脾胃

益黃散 又名補脾散 溫脾養胃益元氣理泄瀉冒熱煩渴不
開陰陽虛實並宜服之或乳食不進羸困少力因而失治
變成風癇 方見[illegible] 為散[illegible]煎正脾生薑大棗子煎實熱服
涼藥後不能食并用此生胃中津液後服 白朮散 退熱 方
見前 早涼夜熱不可下只用煎三升許頻服稍愈後再服
三升候不渴無涎又投 白朮散 一服即安白水煎亦可如
渴飲水多者多服無妨盜汗虛汗亦用此藥止瀉治[illegible]
熱清神倍加白朮[illegible]多飲
阿膠散 阿膠一兩半麩炒 鼠粘子 一分炒香 馬兜鈴半
兩 甘草 一分 杏仁 七個去皮尖 糯米 一兩 為散每服一
錢用水煎服
四君子圓 正脾助胃

厚朴（去皮薑汁炒） 陳皮 甘草 阿子（去核）

史君子（去殼別研）

右為末煉蜜圓菉豆大每服三七圓 泄瀉積瀉米飲下 熱瀉加青黛米飲 冷瀉薑 中暑瀉香薷 時行瀉桑葉 赤痢鹽姑草 白痢烏梅 紫瀉鹽姑草

已上並用米飲下（鹽姑草竹葉菜是也）

〔六神湯〕理脾胃止吐瀉進飲食養氣

嫩黃耆 白扁豆（炒） 人參 白朮

白茯苓 粉草（各等分）

右為末每服貳錢蘇鹽湯（或加藿香葉亦可）正氣生薑棗子湯調下

〔大寧散〕治脾胃虛弱吐瀉 又治脾疳腹大身瘦 此藥補脾

調氣〔散〕治冷腹痛久冷泄瀉

陳皮 青皮 阿子肉 甘草（各壹兩）

丁香（伍錢）

右剉散每服貳錢水壹中盞生薑貳片煎空腹服

〔醒脾散〕

人參 白朮 豆蔻 甘草

乾薑 藿香（各等分）

右為末每服一錢或半錢薑湯下 如醒脾胃冬瓜子人米飲下

〔快氣散〕

桔梗 甘草 乾薑 縮砂

益智子 茴香 藿香葉（各等分）

右為末每服半錢水濕紫蘇木瓜煎湯下 調脾胃生薑棗子煎湯調服

〔■■■〕治脾胃不和（方見前）腹痛

〔四順清涼飲〕治挾熱作痛面赤壯熱四肢煩手足俱熱加青皮枳殼去穰切片入（方見前）

〔七氣湯〕治挾冷作痛面色或白或青四肢冷甚

青皮 陳皮 桔梗 蓬莪朮（煨）

辣桂 藿香 益智仁（各壹兩） 香附子（壹兩半）

甘草（炙叁分） 加半夏（■■■分）

右剉散每服叁錢水一盞薑三片棗一枚煎 不拘時候

〔■■■〕兼服治證同上（方見前）

〔■■■湯〕治邪正交爭冷熱不調作為腹痛嘔吐

枳殼（去穰炒） 桔梗（去蘆） 青皮（去穰） 陳皮（去白）

木香（叁錢） 當歸 粉草（各伍錢）

右剉散每服二錢水一盞生薑二片煎溫服

疝氣

〔■■散〕治疝氣作痛時時失聲腰脊痛■眼中無淚脚冷唇乾額上多汗或外腎釣上陰囊偏大

金鈴子（去核壹兩） 縮砂（■■■） 蓽澄茄 木香（各伍錢）

右為末每服壹錢大者貳錢鹽湯或好酒調服

[illegible]子圓 治同上作小圓如粟米大每服二十七粒金鈴子煎湯下

[illegible]散 治疝氣小腹痛引腰脊攣曲身不能直

芫花 醋炒 木香 檳榔 三稜 各半兩

茯苓 青皮 去白 全蝎 肉桂

附子 炮 硇砂 各等分

右為末將硇砂浸洗去土頭在湯瓶上候成霜二和醋醋打麪糊圓如菉豆大每服三十圓空心溫酒送下未效再服

又方金鈴子圓 治疝氣小腹痛引腰脊攣曲身不能直

木香 檳榔 三稜 蓬术 炮

青皮 去白 陳皮 川練肉 芫花 醋炒

辣桂 牽牛 各半兩 巴豆肉 壹錢不去油

右為末麪糊圓麻子大每三圓空心午前各一服薑湯下

[illegible]圓 治陰核氣結腫大釣痛多因啼怒不止傷動陰氣結聚不散得之或胎婦啼泣過傷令兒生下小腸氣閉加以風冷血水相聚水氣上衝於腎故先喘而後疝痛外腎木硬臍下痛楚不可忍[illegible]使則安以木通湯白前香[illegible]前湯調下得小便利為效[illegible]

當歸散 治疝氣入腹[illegible]掣引攣緊痛[illegible]

辣桂 牽牛 [illegible] 當歸 大黃

桃仁 [illegible] 全蝎 [illegible]

右剉散每壹錢入鹽煎溫服以利大便利后以青皮陳皮茯苓木香細末甘草為散生薑煎和胃否者不治

[illegible]圓 治盤腸內釣腹中極痛啼[illegible]

明乳香 沒藥 [illegible] 木香 薑黃 各等分

木鱉子 去殼研[illegible]

右以木鱉子搜和四味末為圓櫻桃大煎鉤藤湯化下一歲兒服半圓以魏香散

魏香散 用蓬莪朮半兩真阿魏一錢先以溫水化開阿魏浸莪朮一日夜焙乾為末每服一字或半錢煎蘇葉米飲空心調下

吐衄

[illegible]散 治吐血咯血

生蒲黃 油髮灰 等分

右研細每服一錢煎生地黃汁調下米飲亦可

生地黃汁方 治吐血衄血

生地黃汁取一合髮灰半錢調分作兩服食后少頃下

[illegible]方

生蘿蔔汁仰頭滴下鼻仍飲其汁

腫滿

[illegible] 治[illegible]

[illegible]

[illegible]

北梗　赤茯苓　陳皮　桑白皮炒
大腹皮　枳殼　半夏麯　真蘇子炒
紫蘇　甘草各貳錢　草果仁壹錢
右剉散每服一錢半水一盞生姜二片棗子一枚煎服若腳心凸起掌心平缺盆平背心平不治大喘氣粗不食乃腎水盈溢上行傍浸於肺亦不治
五苓散、三和助散相兼服（方見大方附腫脹類）
奇方治熱毒遊腫破草鞋入亂髮燒灰醋調傅熱毒處
三黃散貼腫毒
右用大黃黃柏黃連各等分為末猪膽汁調塗頭心及腳心又方硝石白麵等分研勻井水調睡時塗頭心效

單方治腳氣腫痛及熱腫
右商陸不以多少切碎酒煮熟徐徐溫連商陸飲喫腹肚盤腫同煮豬喫大人亦可服
盜汗
白朮散、安神圓、小兒驚圓、牡蠣麻黃根煎湯下（方並見前）
又方治心脏汗大人小兒皆有之大人乃心血溢盛而常發赤者是也小兒因驚得之有人常有盜汗不止或弱虛瘦醫不可乃心血溢盛為汗非虛也宜用藥收斂心血
川當歸　人參各半兩
右剉散用猪心一個可切三片藥亦分三服每服水一盞猪心一片煎服

黃耆建中湯治盜汗入米糖煎服效
牡蠣散治血虛自汗或病後氣虛津液不固自汗夜臥愈甚久不止則枯瘦短氣煩倦（方見大方自汗類）
奇方治腳汗白礬乾葛為散煎水洗效
又方治睡中汗出酸棗仁人參茯苓為細末米飲下半錢
項軟
天柱圓治風氣頸起軟頭不得正或去前或去后
蛇含石（大者一塊火煆醋淬七次）　川鬱金末少許
右碾細又入缽內研極細和麝香和勻用粳白米飯圓龍眼大每服一圓荊芥湯化下或又入生薑汁一二滴或用金銀薄荷湯早晨不拘時下或熱

項軟合用瀉肝圓方見前
五加皮散治頸軟
右用五加皮為末酒調塗傅頸骨上
健骨散治久患疳疾體虛不食及諸病後天柱骨倒醫者不識謂之五軟
白僵蠶為末三歲兒半錢薄荷酒調下後用生筋散貼
生筋散治如前
木鼈子（六個去殼）　蓖麻子（六十粒去殼）
右研細先抱起顏摩項上令熱津唾調貼之妙又方用附子生用去皮臍天南星切各等分生姜自然汁調貼項軟處

語遲

（□□圓）治受胎其母卒有驚怖邪氣乘心舌本不通四五歲長猶不能言

人參　石菖蒲　麥門冬去心　遠志取肉薑汁炒

川芎　當歸各貳分　滴乳香　朱砂各壹分另研

右爲末煉蜜圓麻子大每服十圓粳米米飲下

聤耳

（□□□）治腎經有熱上衝於耳遂使津液壅滯爲稠膿爲清汁耳內痛小兒因沐浴水入耳中濕氣停滯爲膿但不疼二證久不瘥變成聾耳

明礬煅　龍骨各二錢　黃丹　胭脂壹錢

麝少許

右爲末先以綿杖取去水次以鵝毛管吹藥入耳　若加海螵蛸末亦好

（□□□散方）胡粉和東方壁土等分爲末傅

（又方）蝦蟆燒灰存性搗爲末和豬膏傅

重舌

（□□）治重舌乃心脾俱有熱也心候於舌所主者血脾之脉絡出於舌下若心脾有熱則血氣俱盛附舌根而重生一物形如舌而類小是也有著頰裏及上腭者皆謂之重腭有著齒齦者曰重齦皆當刺去其血中用真蒲黃傅之或燒灰傅之或馬牙硝傅之或竹瀝漬黃柏點之隨消亦好

木舌

（□□）治木舌舌者心之候脾之脉絡於舌也臟腑壅滯心脾積熱熱氣上衝故令舌腫漸漸脹大塞滿口中是爲木舌若不急療必至害人每用一字研細竹瀝調下或用薑汁調服

（又方）黃蜀葵花研細黃丹半之同研點七次

（又方）川朴消一分紫雪壹分白鹽半分同研每半錢竹瀝井水調傅

滯頤　附之

（□□□□圓）治滯頤涎流出而漬於頤間也涎者脾之液脾胃虛冷故涎液自流不能收約法當溫脾

半夏　木香　丁香各半兩　川白薑生

白朮　青皮　陳皮各貳分半

右爲末糕糊圓麻子大一歲十圓二歲二十圓米湯下

（熱涎□□散）方見前驚門

（□□□□方）髮灰爲細末豬脂和傅燕窠泥亦好

（射干湯）治風熱腫痛咽喉

射干　川升麻各壹兩　馬牙消　馬勃各半兩

右爲末每服一錢水一盞煎食后溫服

（□□□散方）蛇退燒存性

右每服用半錢乳汁調下或用蟬房燒存性為末每用半錢乳汁調服

方旨諸熱

夜啼

[illegible]治心燥啼面赤小便亦赤口中熱腹上亦熱或有汗仰身而啼至曉方息加黃芩煎未效[illegible]加麥門冬車前子燈心薄荷煎或用燈心燒灰塗乳上與兒飲亦效方並見前驚候

[六神散]治腹痛啼哭面青口中冷氣四肢亦冷曲腰而啼或大便泄瀉青白糞及不吮乳

人參　山藥炒　白朮各半兩　甘草貳錢

白茯苓　白扁豆各炒壹兩

右為末每服一錢薑二片棗一枚煎一方加當歸白芍藥人參各二錢半甘草桔梗陳皮各一錢為散每服二錢水煎時時與服

[乳香散]治冷證腹痛夜啼面青手冷

[illegible]　乳香半錢另研

右研勻圓如芥子大每服七粒乳空時服

[illegible]治外客忤犯夜啼金銀湯化開服方見前

[黃土散]治小兒卒客忤

竈中黃土　蚯蚓屎各等分

右研勻和水塗兒頭上及五心良

鎮抑禁忌夜啼方服蘇合香圓以醋炭熏之又用方術驅之

口瘡乳上便啼身額必微熱急看口內或瘡或重舌依前口瘡重舌類治之其啼自止

顖陷

[illegible]治內臟府有熱渴引水漿致成泄利久則血氣虛弱不能上交腦髓故顖陷如坑不得滿平宜用黃狗頭骨炙黃為末雞子清調之傅

顖填　[illegible]

集說顖填者顖門腫起也脾主肌肉乳食不常飢飽無度或寒或熱乘於脾家致使臟腑不調其氣上衝為之填脹顖突而高如物堆垛毛髮短黃自汗是也若寒氣上衝則牢鞕熱氣上衝則柔軟寒者溫之熱者涼之各有方[illegible]以鎮氣小兒肝盛風熱交攻亦然未易退者

解顱　[illegible]

[illegible]治年大小兒頭縫開解不合腎主髓腦為髓海腎氣有虧腦髓不足所以腦顱開而不能合凡腦髓少如木無根不過千日終成廢人

大熟地黃洗焙八錢　山茱萸　[illegible]

澤瀉　牡丹皮　白茯苓各[illegible]

右為末煉蜜圓梧桐子大每服一二圓鹽水空心送下仍用天南星微炮為末米醋調傅於絹帛上烘熱貼之

[illegible]治頭骨開不合頭骨[illegible]解顱

細辛　桂心各半兩　乾薑[illegible]

右為末以乳汁和傅顖上乾復傅之兒面赤即愈

又方 蚯蚓炒焦為末用猪頰車中髓調傅頂上日三四度

有人作頭巾裹遮護之久而自合亦良法也

又方 驢頭骨不以多少燒灰研細以清油調傅頭縫中

薏苡圓 治所受肝氣怯弱致兩脚攣縮兩手伸展無力

手拳不展

當歸焙乾 秦艽 薏苡仁 酸棗仁

防風 羌活各壹兩

右為末煉蜜圓雞頭大每一粒至二粒麝香荆芥湯化下

脚拳不展

海桐皮散 治禀受腎氣不足血氣未榮脚指拳縮無力不能伸展

海桐皮 牡丹皮 當歸 熟地黄

牛膝各壹兩 山茱萸 補骨脂各半兩

右為末每服一錢葱白二寸煎食前服

行遲

鹿茸圓 治氣血不充骨髓不滿軟弱不能行或肝腎俱虛肝主筋筋弱不能束所致 一方加川牛膝五加皮酒浸鹿茸酥炙各另煎

又方 虎脛骨圓

虎脛骨酥炙 生乾地黄 酸棗仁浸去皮炒香 白茯苓 辣桂 防風 當歸

川芎 牛膝等分右為末煉蜜圓麻子大每服五圓空心木瓜湯下

五加皮散 治三歲不能行者

真五加皮酒浸 牛膝 酸木瓜乾各半分

右為末每服一錢米粥飲調入好酒兩點再調食前服日二劑

鶴節

地黄圓 治禀受不足血氣不充故肌肉瘦薄骨節呈露如鶴之膝乃腎虛得之腎虛則精髓內耗膚革不榮易為邪氣所乘日就枯瘁其殆鶴膝之節 並末方加鹿茸酥炙川牛膝各二錢修合服餌並同三歲以下與十圓三歲以上與十五圓方見前

龜胸

百合丹 治胸高脹滿其狀如龜此肺經受熱所致也或乳母酒麵無度或夏月熱煩熱乳與兒得之或乳母多食五辛而亦成此疾

川大黄煨一分 天門冬去心 杏仁去皮炒 百合

木通 桑白皮 甜葶藶隔紙炒 石膏各半兩

右為末煉蜜圓菉豆大每服五圓食后臨卧熟水化下

龜背

松蕊丹 治嬰兒生下不能護背客風吹脊入於骨髓致之或坐太早亦致傴僂背高如龜多成痼疾

松花 枳殼 防風 獨活各壹兩

麻黃　川大黃　前胡　桂心各十兩

右為末蜜圓如粟米大每服十粒粥飲下量兒加減

灸法 肺俞穴第三椎骨下兩傍各一寸半膈俞穴第七椎骨下兩傍各一寸半以小兒手中指中節為一寸艾炷如小麥大但三五壯而止

髮不生

[illegible]圓 治稟受血氣不足不能榮於髮

當歸末尾　生乾地黃　肉蓯蓉酒洗炙　楊芍藥各壹兩

胡粉伍錢

右為末煉蜜圓如黍米大每服十粒煎黑豆湯下兼磨化塗抹頭上

齒不生

芎黃散 治齒不生齒者由骨之所終髓之所養稟氣不足則髓不能充於骨故齒久不生

川芎　乾地黃　當歸　山藥

白芍藥各壹兩　沉香半兩　粉草叁錢

右為末湿鹽湯調服半錢用少許揩齒腳亦佳

[illegible]方 雄鼠糞二七粒兩頭尖者是每日用一粒揩齒根上至二十一日當生

瘡毒

[illegible]飲 治和解諸般瘡毒生[illegible]生乾地黃麥門冬去心煎服方[illegible]

[illegible]消毒飲 治同前方見前

[illegible]丹　[illegible]黃圓 小圓服治同上方見[illegible]

[illegible]治熱毒瘡毒

右用黃連大柏為末芭蕉汁調敷入口　諸瘡加輕粉有汁加黃丹　麝香各少許和勻乾摻

諸般惡瘡

[illegible]蕪荑[illegible]　不灰石雄黃

輕粉　水粉　蚌粉

右和勻先用鯽魚一個入真清油內煎令熟去魚以油調冷調藥傅瘡三日后以葱湯遍身洗浴所穿衣服並脫去洗淨乳母仍忌油膩肥汁紅酒煎炙及熱物等並

效緣瘡用真米醋調傅並效

鯽魚方 治小兒白禿瘡

鯽魚一尾重三四兩者去腸肚以[illegible]　雄黃壹錢

右為末生清油調傅先以虀鹽水洗拭后用藥

[illegible] 治頭瘡久不瘥及白禿

豆豉半升　龍膽草　蕪荑各壹分

右一處用溫[illegible]泥固濟炭火煅存性碾為末以生清油半斤熬取四兩下藥[illegible]攪勻得所蘸合收傅神效

凡入耳[illegible]極癢[illegible]睡時[illegible]一遍治白禿剃頭后一[illegible]

[illegible]方 治卒得瘰癧

右用赤爛牛[illegible]研細傅

濕癬瘡方 瘡頭黑深破之黃水出四畔浮漿
右用蛇退皮燒存性細研雞子清調傅
蠷螋瘡方 燕窠土研細豬脂調傅
癬方 水銀一分胡粉二分水研入雞冠血傅
濕癬瘡方 右用蛇床子為末先以韭菜根煎湯洗次用臘月豬脂調藥傅之
灸眉散 治眉叢中生瘡名曰鍊銀瘡
右用穿山甲前膊鱗炙焦為末清油輕粉調傅
鍊瘡方 鍊成松脂末和髮灰生黃丹塗傅
白斂散 治凍耳成瘡或癢或痛

小方 二　　卅三

黃蘗　白斂 各半兩
右為末先以湯洗瘡後用生清油調塗
三物散 治髮邊生軟癤名髮際瘡數年不愈者宜極妙
豬頸上毛　貓頸上毛 各一撮燒灰　鼠屎 一粒
右為末清油調傅或加輕粉尤妙
生附散 治凍爛腳成瘡
生附子 半个去皮臍
右為末麪水調貼之即愈
陰瘡方 治陰股間汗出先癢後痛十日後復發之陰腫生瘡
以火灸瘡抓去痂令乾以蜜傅却披麴作餅乘熱灸熨以
餳攤塗在餅上乘熱熨之冷則再灸再熨三四次[?]變為妙

胎毒瘡方 治一歲二歲內滿頭延及遍身生瘡皆因在胎
中父母恣情交合所致名曰胎蛆經久不差先用化毒
丹消毒飲服却用父小便以鵝翎刷洗瘡上青黛為細
末乾摻效
即效方 治頭上生瘡及肥斑瘡豬筒骨中髓調輕粉早傅
晚愈又用樹上乾桃燒灰清油調傅效 解毒散治亦可
瘑瘡方 治遍身如魚目無膿又名征虜瘡川升麻煎
煎白一盞入蜜二三匙以雞翎蘸鵝翎蘸拭瘡上
諸瘡生頭面南星貝母等分煎湯泡七次研為細末入
土朱少許乾則清油調搽濕則乾摻

口瘡

小方 二　　卅六

瀉心湯 治小兒心經蘊熱溫心有客熱重發於上焦遂成瘡
右用黃連一兩去鬚或加腦子麝香鵬砂為末每服一
字溫水調下服
瀉肺散 治心肺有熱瘡發斑駁取丹自咽有熱或熱發尖
栗與食亦佳 方見斑瘡門
青黛散 治心熱煩渴作成口瘡每用一字敷搽兒口中或
喫亦無妨乳母同服尤妙 方見…
傅藥 治滿口瘡爛
黃丹一兩　好蜜一兩　瓦盞盛飯上蒸一次久取出以鵝
翎刷瘡上效
貼藥 吳茱萸末醋調貼兩腳心移夜即愈吳茱萸性雖熱能引

熱湯洗下大良

【又方】天南星蜜陀僧爲末治口瘡[illegible]

【又方】生硫黄爲末新汲水調貼手心脚心效即洗去

軟癤

【猪胆散】治軟癤愈而再作用野蜂房一二箇燒灰存性以巴豆三七粒去殼煎清油三二沸去巴豆以油調搽數次效白礬枯爲末清油調傅亦效[illegible]

【又方】大秋殼一枚去穰令空乘地上磨令口平以稠穀糊搽四旁貼在癤上自破膿潮出盡更無瘢痕

【又方】治軟癤屢安再作者

右用桑螵蛸燒灰存性以清油調傅

【又方】鵝抱卵殼燒灰存性爲末入輕粉少許清油調傅此物難得只以鷄子抱退殼如上法用亦可

【赤石脂散】治及 赤石脂 各等分 當歸 去蘆 龍骨 [illegible]

右爲細末乾摻

脫肛

【[illegible]】治大腸虛寒或因服涼藥過度或久痢後臟冷所致圓如粟米大大者細嚼胡桃溫酒送下小者米飲[illegible]

方見大方科諸痔類

【[illegible]】治初病脫肛鼻梁青脉唇白齒根爛黄久病兩頰光唇赤唇爛多啼哭

黃瓜蔞[illegible] 白礬[illegible]

右將白礬入瓜蔞內固濟火煅爲末米糊圓每服三十圓米湯送下

【[illegible]】治脫肛黑色生殼方

右用巴豆殼燒灰芭蕉自然汁煑入朴消少許洗軟用真清油點三滴拔三角白礬煅過研爛真龍骨少許同研搽肛頭用芭蕉葉托上勿令便去出入令大兒抱定

【[illegible]】治大腸虛肛門出

龍骨 訶子肉 各半 没石子 大者 罌粟殼 去蒂 赤石脂 各等分

右爲末每服一錢米飲調下

【又方】香附子 荊芥 皂角 用煎水洗

【又方】以蔥湯洗令軟用芭蕉葉托上

【又方】五倍子朴消大腹皮煎水洗以赤石脂末摻在芭蕉葉上托入

【又方】萆麻子四十九粒研爛水調作餅子貼顖頂上立有效

【[illegible]】治脫肛不收

右用浮萍草不以多少杵爲細末乾貼患處

【[illegible]】治臟熱肛門脫出

右用紫背荷葉一大握又爲魚腥草搗爛如泥先用朴消水洗淨肛門[illegible]托入用藥於[illegible]下[illegible]自然入

又方用新磚一片燒紅，以醋澆之，乘熱即用帕布疊數重壓定，使熱氣上透，不可過熱，令病者以臀坐於布上，却覺布温，逐旋減之，以常得温熱為度。

灸法：頂上旋毛中三壯即入，又灸尾翠骨三壯，又灸臍中隨年壯。

遺尿

又方治腎與膀胱俱虛，冷氣乘之，不能約制，故遺尿不禁，或睡中自出。

辣桂　龍骨　雞腸　牡蠣灰

白茯苓　桑螵蛸各半兩

右剉散每服一錢，水一盞，姜三片，棗一枚，煎服。

同前方

又方

雞肶胵　雞腸　猪胞炙焦

右為末每服一錢，酒調下。男用雌雞，女用雄雞者。

尿白

茯苓散治乳哺失節，有傷於脾，致使清濁不分，色白如米泔而成，亦心膈伏熱兼而得之。

京三稜　蓬莪朮　縮砂仁　赤茯苓各半兩

青皮　陳皮　滑石　甘草炙，各二錢

右為末每服一錢，麥門冬燈心煎湯調下。

又方大甘草頭煎湯服。

淋閉

葵子散治諸淋澀小便不通

葵子　車前子　木通　瞿麥

桑白皮　赤茯苓　山梔子仁　甘草各等分

右剉散每服一錢，井水一小盞，葱白二寸，煎，食前服。

導赤散治血淋，仍以末飲調油髮灰少許，空心灌下。方見

尿血方

生蒲黃　生地黃　赤茯苓　甘草各等分

右剉散每服一錢，水一小盞，煎，調油髮灰少許，食前服。

順經散治十餘歲因驚之候，心氣下行，小便淋瀝，日夕三四十次，漸覺黃瘦，宜服。

車前子炒　琥珀別研　益智去殼　金毛狗脊去毛

白茯苓去皮　石燕子大者，煅，醋淬七次，研　石韋去毛，各一錢

右為末每服一錢，韭湯調，日二服。

大便秘

沒藥散治風與滯血留蓄上焦，胸膈高起，大便不通。

沒藥　大黃　桔梗　枳殼各二錢

木香　甘草各一錢

右剉散每服一錢，姜二片，水一盞，煎服。

陰腫

三白散治膀胱蘊熱，風濕相乘，陰囊腫脹，大小便不利。

白牽牛二兩　桑白皮　白朮　木通去節

陳皮去白，各半兩

右為末每服二錢，姜湯調，空心服。

桃仁圓治啼呼怒氣所擊於下結聚不散水穀不行發為此疾

桃仁（去皮麩微炒） 辣桂 牽牛（炒取仁）
白蒺藜（炒香搗） 牡丹皮 北大黃（各弍）

右為末煉蜜圓如麻子大每服五圓或七圓青皮木通葱白鹽少許煎湯灌下或煎大流氣飲研青木香圓

蟬退散治陰囊忽腫多坐地為風或虫蟻吹着

右用蟬退半兩水一梳煎湯洗腫處其痛立止腫亦消再溫再洗洗后仍與五苓散加燈心煎服又方用葱圓內蚯蚓糞甘草汁調塗

傳棄地龍散治外腎腫硬或瘡或風熱叅腫及陰瘡

乾地龍不以多少為末先以葱椒湯於避風處洗次用津唾調傳其上外腎熱者雞子清調傳或加牡蠣少許

又方地龍糞研生薄荷汁調傳

牡蠣散治外腎腫大茎物通明

牡蠣粉研極細先以津唾塗腫處次用粉傳

又方卵腫研桃仁唾調傳

遇仙方治風熱外腎腹赤腫痛日夜啼叫不歇日退皮如鷄卵殼愈而復作用老杉木燒灰入膩粉清油調傳效

卒暴

捷方治卒然腹皮青黑而死灸臍上下左右去臍各半寸并鳩尾骨下一寸凡五處各灸三壯仍用酒和胡粉傅

其腹

又暴脹滿欲死半夏不以多少微炒為末酒和為圓如粟米大二三五粒薑湯或蜜湯下

又方懸梁死趁白…下部及鼻中立活或用菖蒲末著舌底又吹入兩鼻兩耳中效

又中惡欲死甘草濃煎湯服立驗

斷乳

畫眉膏

梔子（三箇燒存性） 雄黃 朱砂（各少許）

右為末入生清油輕粉少許調勻候兒睡著濃抹兩眉醒來自不喫乳未效再抹即驗

氏小兒方卷第十二

風科得效方卷第十三

建寧路官醫提領陳志　刊行
南豐州醫學教授危亦林　編集
江西等處官醫副提舉余賜山　校正

風科

論雜風狀

中風大法有四：一曰偏枯，二曰風痱，三曰風懿，四曰風痺。夫諸急卒病多是風，初得輕微，人所不悟，宜速治之。偏枯者，半身不遂，肌肉偏不用而痛，言不變，智不亂，病在分腠之間，溫臥取汗，益其不足，損其有餘，乃可復也。風痱者，身無痛，四肢不收，智亂不甚，言微可知，則可治，甚即不能言，不可治。風懿者，奄忽不知人，咽中塞，窒窒然舌強不能言，病在臟腑，先入陰，後入陽，治之先補於陰，後瀉於陽，發其汗，身轉軟者生，汗不出，身直者，七日死。風痺、濕痺、周痺、筋痺、脈痺、肌痺、皮痺、骨痺、胞痺，各有證候，形如風狀，得脈別也，脈微澀，其證身體不仁。

中風[illegible]證

口開者，心氣閉絕也；遺尿者，腎氣閉絕也；手撒者，脾氣閉絕也；眼合者，肝氣閉絕也；鼾睡者，肺氣閉絕也。備此五證，尤不可治。證中總見一證，猶當審餘證以救療。蓋以初中則眼合，口多痰上壅者，亦多難治。遺尿、口開俱見為惡，心為五臟主君，腎為一身根本，誠不可閉絕也。

中風要說

凡中風脈無不大者，非熱也，是風脈也。中風有冷熱，陽病則熱，陰病則冷，冷則用溫風藥，熱則用涼風藥，不可一槩用也。凡中風皆不可吐出涎，人骨節中皆有涎，所以轉動滑利，中風則涎上潮，咽喉中滾響，以藥壓下，涎再歸骨節可也。不可吐出，若吐之，時間快意，非久枯了手足，不可不戒。小兒驚風亦不可吐出，卻涎亦與大人同。方其發搐搦之時，不可把捉手足，把住則涎不歸，手足當不隨，只宜寬縱之可也。

中風須大作湯劑，方有成效。若風歸手足，名曰小中，不宜用正風藥深治，但用平和湯劑，雖不能為全人，亦可留連歲月，戒之戒之。

虛證

[illegible]　治男子婦人血氣虛弱，虛風攻注，肌體顫掉，肩背刺痛，手足拳攣，口眼喎斜，半身不遂，頭目旋暈，痰涎壅盛，語言謇澀，行步艱難，心忪氣短，夜多盜汗，四肢拘倦，鼻塞聲重，頭疼，脾胃不和，心腹刺痛，腸鳴不快，少力多困，精神不爽，不思飲食，嘔吐惡心，[illegible]臍腹[illegible]，產後[illegible]，氣癃，百病皆可服之。

天台烏藥（去木）　桔梗（去蘆）　川白芷　川芎

甘草炙 陳皮去白 白朮各叁 麻黄去根

枳殼麩炒 人參半兩

右爲末每服三錢紫蘇木瓜煎湯調下去白朮加乾薑僵蚕名烏藥順氣散 卒中風氣不順手足偏枯流注經絡四肢骨節疼痛或身如板片與動不得筋脈拘攣先宜多服得手足開微汗爲效又脚氣步履艱難脚膝軟弱婦人血風老人冷氣上攻胸臆兩脅刺痛喘嗽心腹脹服爲散每服四錢生薑三片紅棗二枚煎服或問拔身躰不能屈伸溫酒調服退身擁痺成癱瘓常宜服常服疏風通滯氣調榮衛進飲食大有神效 一方每料加天麻一兩沉香五錢亦效並不拘時候

小續命湯 治中風不省人事喎斜半身不遂口眼喎斜手足顫掉語言謇澀肢躰痿痺神情昏亂頭目眩重痰涎拘攣不能屈伸骨節煩疼不得轉側亦治脚氣緩弱久服之瘥有病風人常服不可缺以防瘖瘂

麻黄去節 人參 黄芩 白芍藥

川芎 甘草 杏仁去皮尖 防己

桂各壹兩 防風去蘆兩半 附子炮去皮臍半兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片棗二枚煎不拘時候溫服取汗隨人虛實與所中輕重也●筋急拘攣語遲脚弱加薏苡仁●治脚氣加人參黄耆芍藥以避中寒服后稍輕再加當歸全愈●腳氣痛弱不能轉側心神恍惚加茯神遠志●骨節煩疼有熱者去附子倍加芍藥●煩燥大便澁去附子倍芍藥加竹瀝●臟寒大便自利去黄芩加白朮附子●骨肉冷痛者加肉桂附子煩燥多驚者加犀角●嘔逆腹脹人參半夏●自汗者去麻黄●語言謇澁手足戰掉者加菖蒲竹瀝●大便秘胸中不快加枳殼大黄●氣塞不通加沉香●有痰頭暈數片●發渴麥門冬乾葛根●身疼秦艽●上氣喘腫喘急防風桑白皮以上所加各一兩●小兒慢驚煎取藥汁一盞入生薑汁并煎一二沸日三服夜二服●夏又有熱者減桂一半●冬加麻黄一兩●多加黄芩一兩秋加當歸四兩●冬加附子半兩●風癱加川芎一兩●一方加木香縮砂羌活各一兩川烏炮三分亦效●一方無防己用前星末半錢龍腦一字頻擦牙上令熱即自開

大省風湯 治諸風風涎壅盛口眼喎斜神昏眩暈語澁手足搐搦半身不遂及歷節風痛筋脈攣急

川芎 半夏 防風去蘆 甘草半兩炙

全蠍去毒 附子生去皮臍 川烏生去皮臍 木香

南星半兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑十片煎溫服不拘時候氣虛加沉香 氣逆氣喘加前胡 不利有痰加半夏人參 頭痛頭疼加天麻半兩全蠍二枚 熱加香薷 風左癱右瘓口眼喎斜口噤不能言手足頑麻於本方中

去附子川烏

順元散治卒中昏不知人口服喎斜半身不遂咽喉作聲痰氣上壅六脈沉伏或浮盛兼治痰厥飲厥及氣虛眩暈

川烏二兩 天南星 附子各一兩炮 木香半兩

右剉散每服三大錢水一盞半生薑七片煎稍熱服

感風濕卒中五積散合和服 不省人事細辛皂角少許爲末或只用半夏爲末以蘆管吹入鼻中候噴嚏少蘇然後進藥 痰涎壅盛每服加全蝎五枚仍服養正丹每服三七粒鎮墜之以其用硫黃黑鉛皆有利益則痰涎隨去矣因氣中者以沸湯化蘇合香圓一粒乘熱灌下仍用前藥汁濃磨沉香汁少許同煎一沸服之

四肢冷厥用靈砂丹歲丹二七粒服

三建湯治男子婦人中風虛極六脈沉伏舌強不能言語痰涎併多精神如癡手足偏廢不能舉動此等證狀不可攻風只宜扶虛

天雄 附子 川烏並生去皮

木香不見火 沉香各一錢半

右剉散每服四分水二盞生薑十片煎七分空心溫服

[illegible]治一切風疾氣血俱虛陰陽偏廢卒暴中風僵仆昏塞涎潮搐搦不省人事失音舌強手足嚲曳口眼喎斜或癱瘓偏枯半身不遂語言蹇澁舉止錯亂四肢麻痺並治頭癲癇倒臥[illegible]或角弓反張目睛直視口禁閉絕牙関緊急并治風搏經絡凡骨節疼痛不作蝉吮皮膚搔癢頭久暈眩項強拘急不能回顧及腎臟風虛腳膝疼痛步履艱難偏風流注一邊屈伸不得無問新久並能治之

川烏頭炮去 大附子炮去 白附子炮各 白僵蠶炒去嘴

白蒺藜炒去刺 五靈脂各一兩 白礬枯 沒藥研各半兩

朱砂研 細墨磨汁 麝香各一錢半研

右爲末用墨汁和藥每兩作六圓窨乾金箔爲衣每服一圓生薑半兩和皮擂取自然汁化藥爲度用熱灰酒半盞溫熱調前藥溫服量病人酒性多少更飲酒一二升投之以助藥力次用衣被蓋覆使卧汗出爲效勢輕

每服半圓不以時候如有風疾常服尤佳補益五臟固密真元通流關節祛逐風邪壯筋續骨神效

[illegible]湯治風補血順榮衛通血脉并腰腳膝沉重緩弱無力及治手足風累驗

續斷 杜仲去皮薑汁炒去絲 防風 牛膝酒浸焙

萆薢 細辛 白茯苓 人參 辣桂去皮不見火

當歸切焙 甘草炙各半兩 川芎 獨活

秦艽去土 熟地黃各一兩

右剉散每服五錢水一盞半煎七分空腹熱服若左臂不遂得疾者右而手指不便無力試諸藥不效者不半劑可愈血虛耐弱加鹿茸肉蓯蓉各半兩

【[illegible]】治一切諸虚不足風疾血氣交攻凝滯脉絡拘攣筋攣氣不升降癱瘓疼痛痰涎壅盛脾胃不和飲食不進此藥去風和氣活血大有神效凡治風不可專用風藥攻之愈急則愈甚服此輕者一月重者三三月自然愈矣且無升作大血氣和平榮衛調順則風證不攻而自去

附子炮　人參　麻黄去節　黄芩

防己　香附子去毛　杏仁去皮　川芎

當歸各壹兩　茯神兩半　陳皮　防風各一兩

白芍藥伍兩　沉香　川烏炮各半兩　半夏兩半

桂壹兩　白朮貳兩　天台烏藥各兩　乾姜[illegible]兩

黄耆叁兩　甘草　熟地黄各壹兩　生乾地黄壹兩

右二十四味除八味去風八味和氣八味活血同剉散每三錢水一盞半薑三片棗一枚煎空心通口服常服效

【眞珠圓】治肝虚受風邪所干卧則魂散而不守狀若驚悸

眞珠母[illegible]　當歸　熟地黄各[illegible]　人參

酸棗仁　柏子仁各壹兩　犀角　茯神

沉香　龍齒各半兩

右爲末煉蜜圓梧桐子大朱砂爲衣每服四五十圓金銀薄荷煎湯食后呑下

【[illegible]風膏】治口眼喎斜

右用草麻子去殻碾碎塗在手心以一盂子置在手心草麻子上用熱水置盂中候口眼正則急取盂去左塗右手心右喎塗在手心口眼纔正急洗去藥只隨病喎處左右貼亦可又治産難若胎衣不下研塗兩脚心纔生下便洗去

【又方】用桂心酒煮取汁故紙蘸貼患處左喎貼右右喎貼左即正

【又方】[illegible]蓖麻子搗爛並取汁和大麥麪作餅灸令熱貼之即正便止不令太過

【又方】大鱔魚一條以針刺頭上血左斜塗右右斜塗左以平正即洗去鱔魚放之

【[illegible]】治諸風癱瘓手足疼痛步履艱難服藥無效久服令步履輕健行動如此大和氣血通行榮衛補虚排邪有益

寛氣

虎脛骨酥炙　川當歸[illegible]　川附子[illegible]

大川烏炮去皮[illegible]　川羌活　川芎

獨活　赤芍藥　白朮　杜仲[illegible]

萆薢　防風去蘆　肉桂去粗皮　肉蓯蓉[illegible]

川牛膝酒洗　黄耆去蘆　金毛狗脊[illegible]　白茯苓去皮

白蒺藜[illegible]　人參去蘆　天麻[illegible]　川續斷各壹兩

右剉散以生絹袋盛之用好無灰酒一斗浸之密封瓶口春三日夏二日秋七日冬十日每服一盞溫過空心服神效留滓日乾或焙乾爲末酒糊圓溫酒下

【[illegible]散】治卒中風痰厥壅塞頭項強急肢體煩疼筋脉攣[illegible]

氣不和發疹發熱先以解之（方見大方劑）

人參羌活散 治風壅痰實頭目昏暈遍身拘急頭項強急肢節煩疼壯熱煩渴

前胡　羌活　人參　防風

天麻　赤茯苓去皮　薄荷葉　蔓荊子

川芎　甘草　黃芩　枳殼去瓤

桔梗　川獨活各壹兩

右剉散每服四錢薑三片桑白皮七寸煎不拘時候

天麻散 治中風痰盛服熱藥不得者

南星炮錢　木香壹錢

右剉散每服四錢生薑十片水一大盞煎溫服

防風通聖散 治一切風熱頭目昏痛肢體煩疼咳嗽喘滿涕唾稠粘口苦咽乾腸胃結燥

防風　川芎各半兩　石膏壹兩　滑石三兩

當歸壹兩　赤芍藥　大黃各半兩　甘草炒

荊芥穗各貳錢半　薄荷葉壹兩　麻黃去根節　白朮

連翹　黃芩　桔梗　牛膝酒浸去蘆

人參　半夏薑製各半兩　山梔子參錢

右剉散每服四錢水一盞生薑三片煎溫服不以時候

三黃湯 治中風手足拘攣百節疼痛煩熱心亂惡寒終日不欲飲食

麻黃去根節壹兩　黃芩三分　獨活四分

清神散

右剉散每服四錢水一盞半煎不以時候服取汗為度

心熱加大黃半兩氣滿加枳實一分氣逆加人參三分心悸加牡蠣三分渴加瓜蔞根寒加附子一枚炮煎熟入

[illegible]散 治左癱右瘓口眼喎斜口噤全不能言半身不遂手足頑麻

防風去蘆　天南星湯泡各參兩　甘草炙壹兩

右剉散每服四錢生薑十片水一大盞煎熟服

愈風散 治因食熱物過度或成中風其狀手足如火燒燥眼赤腮內瞤動筋脈拘攣痰涎壅塞大小便閉澁依證用之大效（方見前熱證方）

四順清涼飲 治血熱蘊結壅滯遂成風證煩渴喘悶譫妄發狂舌強口噤

瀉黃散 治風熱上攻目赤頭痛咽疼齒牙兩頰腫痛口乾煩躁[illegible]解酒毒

當歸　薄荷　羌活　防風

梔子　甘草　大黃　川芎

防己　桔梗各壹兩

右剉散每服四錢水一盞半燈心二十莖青竹葉七皮煎食后服小兒急驚可服二錢

清神散 消風壅化痰涎治頭昏目眩心忪面熱腦痛耳鳴鼻塞聲重口眼瞤動精神昏憒肢體疼倦頸項緊急心膈煩悶咽嗌不下

藿香 人參去蘆 羌活去苗 防風去蘆叉各
川芎去土 荊芥穗去土 甘草炙各貳兩 石膏研
細辛去苗洗焙各半兩
右為末每服貳錢薄荷湯調服或入末茶少許食后服
消風散治同上或加石膏亦可 一方加天麻治頭痛如神
川芎石膏湯治風熱上攻頭目眩痛咽乾煩渴痰涎喘嗽
又治中風偏枯調理癆傷復道病
川芎 芍藥 當歸 山梔子
黃芩 大黃 菊花 荊芥穗
人參 白朮各半兩 滑石肆兩 寒水石
桔梗各弍兩 甘草叁兩 縮砂仁壹分 石膏
防風 連翹 薄荷葉各壹兩
右剉散每服三錢水一盞煎食后溫服熱甚者為末冷水下
消風散治諸風上攻頭目昏痛項背拘急肢體煩疼肌肉
蠕動目眩暈耳鳴眼澀好睡鼻塞多嚏皮膚頑麻瘙癢癮
疹又治婦人血風頭皮腫癢眉稜骨痛旋運欲倒痰逆
荊芥穗 甘草 川芎 羌活
人參 茯苓 白殭蠶炒 蟬退去頭足
厚朴去粗皮薑汁炒 陳皮去白各半兩
右為末每服二錢茶清調下如久病偏風每日三服便
覺輕減如脫着沐浴暴感風寒頭痛身重寒熱倦疼用
荊芥茶清調下溫酒亦可可并服之小兒虛風目澀昏交
急慢驚風用乳香荊芥湯調下半錢並不拘時候一方
治口眼喎斜半身不遂多因下元虛弱為風所乘者服
三生飲次服補劑却用茶清調下青州白圓子
□□□治一切風毒上攻頭面腫痒痰涎壅塞口眼不利
口舌乾燥風毒下注腰腳沉重腫痛生瘡大便多秘小便
赤澀中風癱瘓一切諸疾
川大黃 薏苡仁 白茯苓 茯神
山梔仁 蔓荊子 威靈仙 大棗
白芷各半兩 香墨燒醋淬 麝香研各壹錢 仙靈脾葉洗
川烏炮去皮臍一兩炒黃去皮
右為末煉蜜搜如麥飯相似以真酥塗杵臼擣萬杵如
彈子大用金箔為衣每服旋圓如彈子大用
薄荷自然汁同溫酒化下兩圓 中風涎潮昏塞煎
皂角白礬湯放溫化四圓灌下 癱瘓風每日服三
五圓漸覺有效 常服一圓除痰利膈溫酒食后下
小兒驚風入臟粉少許薄荷汁化下半圓立效 治癮
疹搔痒下一圓忌動風毒物
稀涎散治中風牙關緊急不省人事並解
上膈壅熱痰涎不利咽喉腫痛一切熱毒
鬱金二分 巴豆去殼心膜出油 雄黃研各壹分
右為末醋煮麵糊圓菉豆大每服七圓用熱茶清下吐
出頑涎立蘇未吐再服如牙關緊閉灌藥不下者即以

刀又鈌匙斡開口進下。

【大秦艽湯】治風癱瘓四肢重著或軟瘓疼痛或拘攣麻痺顫掉口乾目赤煩熱睡臥不寧

條參 去蘆　川羌活 去蘆　枳殼 去穰　秦艽 去蘆
赤芍藥　苦梗 去蘆　前胡 去蘆　川芎
白芷　黃芩　薄荷　桑白皮 去赤
天麻　防已　防風　粉草
荊芥穗　赤茯苓　木瓜　川牛膝 去苗 各等分

右剉散每服四錢水一盞半薑三片煎溫服不以時候

【開關散】治卒暴中風昏塞不省牙關緊急藥不得下咽

細辛　薄荷葉　牙皂 去子　雄黃 各一分

右研為末每用少許銅管吹入鼻中候噴嚏然後進藥或用白梅搽牙更以菖蒲末著舌下牙關即開倉卒用。

通治

【□□□】治中風客於心脾二經舌強不能言半身不遂口眼喎斜神氣不清一切風氣並皆治之

附子 炮　防風 去蘆　天麻　酸棗仁 炒去殼
羚羊角屑　官桂 去粗皮　甘草 炙　羌活 各半兩

右剉散每服半兩水二盞煎八分去滓入竹瀝兩匙再煎三兩沸溫服不拘時候

【加味寧志圓】治因事驚恐致留心包精神不守事多健忘譫言妄語如有所見不得安眠或□□潮作手足抽掣或

心虛煩悶。

天南星 炮　丹參　真珠　真琥珀 研　圓白半夏 [illegible]
枯礬 研　大朱砂 [illegible]兩細研為衣

右為末生薑自然汁煮麪糊為圓梧桐子大每三十五圓淡薑湯下心氣狂甚加鐵胤粉一兩　氣不順人參湯下　驚悸金銀器薄荷心湯　上熱煩燥淡竹葉麥門冬湯　寧心安志石菖蒲湯　痰盛喘急桑白皮湯　小兒急驚麥門冬青竹葉湯　慢驚冬瓜仁木香湯下

【[illegible]】治風虛濕冷邪氣入臟狂言妄語精神錯亂肝風發則面青心悶吐逆嘔沫脇滿頭眩不聞人聲偏枯筋急曲踡而臥心風發則面赤翕然而熱悲傷嗔怒目張呼喚脾風發則面黃身體不仁不能行步飲食無味夢寐顛倒與亡人相隨肺風發則面白欬逆唾膿血上氣奄然而極腎風發則面黑手足不隨腰痛難以俛仰痺冷骨疼諸有此證令人心驚志意不定恍惚多忘服此安心定志聰耳明目通臟腑諸風並皆治之

白鮮皮　白朮　芍藥　桂心
川芎　當歸　杏仁 去皮尖　防風 去叉
甘草 炙各一兩　獨活　麻黃 去節　茯苓 各三兩

右剉散每服四錢水一盞半薑七片棗二枚煎溫服

【[illegible]圓子】治男子婦人半身不遂手足頑麻口眼喎斜痰涎壅塞及一切風癇藥不能治者小兒驚風入人頭風

洗腦風婦人血風

半夏一兩 川烏一兩 白附子二兩 天南生一兩
天麻一兩 全蝎五錢 防風一兩 生麝香半錢

右為末薑汁糯米糊圓梧桐子大每服一二十圓淡薑湯不以時吞下癱瘓風溫酒下日三服一二日后當有汗便能舒展經三五日頻呵欠是應常服除風化痰治頭疼不見驚風薄荷湯下二三圓

救急稀涎散 治中風忽然若醉形體昏悶四肢不收涎潮於上膈氣閉不通 稀涎散

猪牙皂角 四挺肥實不蚛者去黑皮 白礬一兩光明者

右為末研勻每服半錢重者三字溫水調灌下不至大嘔吐但微出冷涎一二升便醒次緩調治不可大吐恐虛人

勝金丸 治風涎暴作氣塞倒卧或有稠涎諸藥化不下者

甜瓜蒂 一名苦丁香日乾為末

右每用一二錢加輕粉一字以水半合同調勻灌之良久涎自出如涎未出含沙糖一塊下咽涎即出不損人

白龍丸 治卒暴昏憒不知人事牙關緊急藥不下咽

黑牽牛末 二錢 薄荷末 半

右用生薑自然汁調藥少許灌入鼻中立醒一方用牽牛木香尤良

又方 治長歷痰飲不省人事

只用生清油一盞灌入喉中須臾逐出風痰立醒然后

隨證用藥

天方 治中風痰壅不能治

猪牙皂角 去皮弦子炙黃者 玄胡索 藜蘆 青黛 各一錢

右為末每用一字以新汲水調成稀糊令患者仰臥男左女右將藥入病人鼻內覺藥味到喉少酸令患人坐起令咬筆管一枚涎盡為度

通關散 治中風不省人事涎潮口噤語言不出手足彈瘓得病之日便進此藥可使風退氣和不成廢人若有此證無藥去處用之得力

柏葉 一握去枝 葱白 一握連根

右細研如泥以無灰酒一升同煎一二十沸去滓溫服不拘時如不飲酒須分作四五次方進能藥

[illegible] 治癱風瘓風大風一切諸風仍治腳氣并撲損傷折及破傷風服過百粒即為全人方能出汗

紫色浮萍 不以多少

右以七月半旬或望日採紫背浮萍者先以盆盛水以竹篩攤萍於水盆上曬乾研為細末煉蜜圓如彈子大每服一粒豆淋酒空心食前化下

豆淋酒法 用黑豆半升揀洗令淨炒令煙出以無灰酒三升浸一晝夜去豆取酒用之亦可治[illegible]

[illegible] 治中風身體強直不得屈伸反張

只取桑枝細切一升以酒二升浸一宿每日溫酒服

半升酒盞再作

又方治大人小兒禁口風

皂角 蘿蔔如無以子代之

右以皂角爲末以蘿蔔同釅醋研雞翎蘸藥塗牙齦即

又方治中風口噤不知人事産後中風同

右用白朮四兩水三升煎一升頓服

又方治中風通身冷口噤不知人者

右用川獨活四兩好酒一升煎至半升分溫服

又方治失音

槐花一味炒香熟三更后床上仰卧隨意服亦治咯血

又方治中風心煩恍惚或腹中痛滿或時絕而復蘇

竈心土五升搗爲末以冷水八升和之取汁服口噤者

以竹瀝灌下亦愈

又方治中風手足偏廢不舉

川山甲左癱用右足 右癱用左足 紅海蛤如棋子者

大川烏頭生用各半兩

右爲末每用半兩搗葱白汁和成厚餅約徑一寸半貼在所患一邊腳中心用舊絹緊縛定於無風密室中椅子上坐用湯一盆將貼藥腳於盆內浸仍用人扶病人恐汗出不能支持候汗出即去了藥汗欲出身麻木得汗周遍爲妙切宜避風自然手足可舉如病未盡除半月二十日以后再依此法用一次自除其根仍須治風補理藥速效以自養

又方治痛風數年不能舉日夜伸吟不效圓大效

川烏頭去皮 生乾地黃

草烏頭 木香貳錢半

五靈脂 麻黃去根節

自然銅火煅醋淬 虎脛骨

乾朮 滴乳香

敗龜板

右研細如粉煉蜜爲丸龍眼大每一兩重作十二圓以帶皮生薑自然汁化開一圓熱酒服更以酒送下病在下空心食前服病在上食后停少時服一日二服口有少麻勿疑

又方治氣虛感風或驚恐相乘肝氣受邪使上氣不守正位致頭招搖手足顫掉漸成目瞪

獨活 正地骨皮 北細辛 大川芎

菊花 防風去叉 甘草各等分

右㕮咀每服三錢水一盞半煎取六分清汁入少竹瀝再煎食后服

又方治丈夫婦人手足麻痺不已或冷地水不可攤瘓等疾

生川烏去皮 五靈脂 威靈仙

右各焙乾同研爲末醋糊圓梧桐子大每服七粒加至

丸，粒芫湯吞下，婦人當歸酒湯下，空心服，病甚者加至十五丸，忌茶、豆豉、麪、神。

[illegible]治中風牙已緊，無門下藥。

天南星[illegible]半錢 龍腦一字 用揩牙令熱，牙自開。

又治暗風倒地，比細辛、皂角各等分，為末，每用一字，搐鼻中。

[illegible]方 治諸風癇，久服甚效，巴豆大便中出。生白礬一兩，研，好臘茶半兩，同研，為丸，梧子大，三十丸，用荊芥湯下。

[illegible]治手足拳攣，痛不可忍者。

乳香 沒藥（另研） 地龍（去土） 全蝎（去毒）

草烏（[illegible]） 烏藥（炒） 麝香（壹兩） 蜈蚣（[illegible]）

川烏（[illegible]生用）

右為末，煉蜜圓梧桐子大，每服七圓至十圓、十五圓，用麝香少許，好小酒送下，空心服，服至七日，累[illegible]至半月。或渾身發風，用經月方效，多服其病安全，后常服生川烏、沒藥浸酒，日二服，通氣驅風湯加乳香、沒藥、生川烏、麝香少許，酒調服；不飲者，木瓜湯下，服此忌熱食一時。

[illegible]治手足頑麻，痰涎壅盛，頭目昏眩，有時拘急。

大天麻 大南星（[illegible]） 防風（各[illegible]） 薄荷葉（半兩）

右為末，酒煮薄麪糊為圓，[illegible]服二十圓，荊芥生薑湯送下。

[illegible]治暗風癱瘓，中風所致，語言蹇澀，不時偏枯，肢節疼痛，緩頭不能[illegible]，口眼喎斜，言語澀，便利，耳聾，寒脾背拘引。

羊腎（壹具） 黃耆 芎藭 桂心

當歸 人參 防風 甘草

五味子（各一兩） 玄參 芍藥 茯苓（各[illegible]）

磁石（[illegible]） 地骨皮（[illegible]） 生薑（[illegible]）

右剉散，以水一斗，煮羊腎，取五升，下諸藥，取二升，分三服。

[illegible]治中風癱瘓，不遂，手足彈曳，口眼喎斜，或旋運偃仆，涎潮搐搦，卒中急風，不省人事，每服二十圓，黑豆淋酒下；風痺肢節疼痛，[illegible]用生地黃汁調酒下；腰腳沉重，行步艱辛，筋脈拘攣，俯仰不利，賊風所中，痛如錐刺，皮膚頑厚，麻痺不仁，或血脈不行，肌肉乾瘦，生葱酒下，或生[illegible]茶亦可；風濕[illegible]無力，或腫或疼，不能舉步，兩腳生瘡，膿血浸潰，痒痛無時，愈而又發，並酒下；打撲閃肭，筋骨內損，已經多年，每遇天陰時發疼痛，沒藥酒下。

乳香 川烏 沒藥 五靈脂

白膠香 地龍 白薑 半夏

五加皮 赤小豆（各等分）

右為末，糊圓梧桐子大，[illegible]湯引如前，空心服。

[illegible]治諸風緩縱不隨，語言蹇澀，痰涎壅盛，心怔健忘，或發顛狂，並皆治之。

白芍藥（各兩半） 柴胡（去苗） 桔梗（各[illegible]）

川芎（[illegible]） 熟山藥 麥門冬（去心） 黃芩（各[illegible]）

杏仁（去皮尖麩炒黃別研）[illegible] 大黃（[illegible]）[illegible]

神麯（研） 蒲黃（[illegible]） 大豆黃卷（炒） 肉桂（[illegible]）

白蘞（[illegible]） 當歸（去苗） 防風（去苗） 白朮（[illegible]）

羚羊角末 麝香（研） 龍腦（研[illegible]） 人參（[illegible]）

白茯苓（去皮） 芎藭（[illegible]） 乾薑（[illegible]） 阿膠（[illegible]）

牛黃（研[illegible]） 犀角末（[illegible]） 雄黃（研飛[illegible]） 金箔（[illegible]）

右除棗杏仁並另研一味末及牛黃麝香雄黃龍腦四味

別為末入餘藥和勻煉蜜棗膏為圓每兩作十圓以金

箔為衣每服一圓食後溫水化下

舒筋圓 治諸風癱瘓手足不隨口眼喎斜言語謇澀肩目

瞤動頭昏腦悶筋脈拘急不得屈伸遍身麻痺百節疼痛

皮膚瘙癢抓成瘡疥又治婦人血風渾身癢痛頭疼眼暈

及腸風臟毒下血血下不止服之者效久服令人顏色和

悅充強輕健鬚髮不白

川烏（去皮臍[illegible]） 荊芥穗（[illegible]）

右為末醋麪糊圓梧桐子大每服二十圓酒或熱水任

下有疾食前日三四服無疾早一服

[illegible]圓 治男子婦人手足癱瘓口眼喎斜痰涎壅盛吐涎沫

及小兒驚風搐搦並皆治之

半夏（[illegible]） 川烏頭（去皮臍半兩生用）

白附子（生用） 天南星（[illegible]）

右件為末以生絹袋盛於井花水內擺出末盡者更以手

搦令出以滓更研再入絹袋擺盡為度於瓷盆中日曬

夜露每日一換新水攪而復澄春五日夏三日秋七日

冬十日去水曬乾如玉片碎研以糯米粉煎粥清為圓

如菉豆大常服二十圓生薑湯下不拘時如癱瘓風溫

酒下小兒驚風薄荷湯下三五圓

[illegible]圓 和氣宇散風痰亦可常服

右以蘇合香圓（[illegible]）與青州白圓子（[illegible]）打和薑

蘇湯化下

[illegible]散 治暗風忽然仆地不知人事良久方醒

蛇黃（不以多少[illegible]）

右為末每服二錢溫酒下數服便愈年深者亦效

[illegible]圓 治暗風百日內者

天南星（[illegible]） 朱砂（[illegible]） 琥珀（[illegible]） 真金箔（[illegible]）

右拌勻以獖豬心血為圓梧桐子大每服十五圓人參

或麥門冬湯下臨臥服

[illegible]圓 治暗風年深日近發搐不省人事

好辰砂（半兩） 好雄黃（[illegible]）

右用烏雞心內血和圓梧桐子大每服十圓以獖豬

心湯吞下如不省人事則灌下仍灸百會穴九壯

[illegible]圓 治諸風[illegible]疼痛癱瘓無定[illegible]百藥所不效者

穿山甲（[illegible]） 全蝎（[illegible]）

麝香 草烏生去皮 地龍去土 沒藥別研
乳香別研 松脂半兩 蜈蚣去頭足
白僵蚕薑汁炒 五靈脂
右為末酒糊圓菉豆大青黛為衣每服二十圓不拘時
温酒送下空心食前服

[illegible]湯 治挾氣中風已微微去其痰或兼有熱氣者斟
酌服

天雄 南星炮 薄荷葉
地龍去土 木香 全蝎 防風
沉香各等分 麝香別入
右剉散每服四錢水一盞半生薑五片煎熟入麝香少許
服不拘時候

[illegible]圓 大風疎氣
川烏 香附子
右焙乾為末酒糊圓量數服之若只用草烏當防其麻
木人非然肌體肥壯之人及有風疾人宜常服

[illegible] 治腎臟風壅積滯腰腿沉重
威靈仙酒浸焙
右為末煉蜜圓梧桐子大更初服用温酒下八十圓平
明微利惡物如青膿即是風毒積滯也如未動其夜再
服百圓后喫少粥補之

[illegible]圓 兩肢[illegible]不伸等證曾有人自幼年酒多良而

風痰為酒使痰注骨節四肢不以[illegible]遂[illegible]服此有效
茯神心木 白茯苓 黃芪 白术
黄精 羌活 五加皮 川烏炮去皮
薏苡仁 木瓜 生薑麴 神麴炒
天雄炮去皮 白芍藥 乳香別研 沒藥研
防風 獨活 當歸 玄胡索
桑寄生 海桐皮 木香 陳皮去白
枳殼去穰 南星 地龍去土 荊芥穗各一兩
麝香
右用豬肝一具洗淨煮存性研爛同酒煮為糊圓如梧
桐子大每服三十圓温酒吞下不飲木瓜湯下

[illegible]圓 疎風活血起羸痿治腳疾烏髭髮[illegible]紅顏駐
顏不老[illegible]人生風證切宜此藥
川烏 草烏 天台烏藥 何首烏
猪牙皂角 烏梅 烏豆
右剉如指面大以冬月無灰酒好醋各二升浸一宿瓦
銚內慢火煎乾取出曬焦揀何首烏一味別為末煮麵
六味焙乾為末以前煮藥餘酒醋及何首烏末和圓每
服三十圓酒吞下

[illegible] 治卒暴中風忽然手足顫戰口面喎斜舌強痰
盛搐搦或角弓反張目睛正視口噤閉絕每日三服
中風數年不能步履服至十圓便[illegible]新中風三服可痊

常服半圓，滋養五臟，補益真元，通流關節，祛逐風邪，強筋健骨。

金箔（[illegible]） 水銀（壹兩[illegible]）

硃砂（半兩） 好硫黃（壹兩） 自然銅（[illegible]）

白僵蠶（[illegible]） 南星（[illegible]） 生犀角（鎊半兩） 羚羊角（[illegible]） 乾蝎（[illegible]）

烏蛇（[illegible]） 白花蛇（[illegible]） 藿香葉（[illegible]） 官桂（[illegible]兩）

白芷 川芎 破故紙（炒） 蓽澄茄（[illegible]）

羌活（去蘆） 當歸（[illegible]） 防風（去蘆） 牛膝（[illegible]）

鹿茸（[illegible]） 附子（炮去皮臍） 川烏（[illegible]）

麝香（[illegible]） 沉香（[illegible]兩） 天麻（[illegible]） 木香（[illegible]）

安息香（[illegible]） 白附子（炒）

右先將二十六味為末，却連前五味拌和，入安息香膏搜和，再入臼中杵伍伯下，每一兩作十圓，每服一圓，空心細嚼，溫酒吞下。

[illegible]治十宗足指疼痛麻木。

附子 木香

右等分㕮咀，生薑煎服。木香隨氣虛實加減，如治足弱，去附子，用烏頭甚妙。

[illegible]治中風舌本強，難轉語，不正，神妙。

蝎梢（[illegible]） 茯苓（[illegible]兩） 龍腦薄荷（[illegible]兩）

右為末，每服二錢，溫酒下，或揩牙頰亦可。

[illegible]治脊膂手足頑，口瘡，腰腳重，一切風證疼痛不可忍，立有效。

仙茅（[illegible]） 陳皮 枳殼（[illegible]）

厚朴（[illegible]） 官桂 秦艽 當歸（各[illegible]）

白茯苓 白芍藥 白芷 川芎

半夏餅（[illegible]） 麻黃（[illegible]） 沒藥 甘草

川烏（炮） 白姜 乳香 川獨活（各[illegible]）

全蝎（[illegible]） 麝香（半錢）

右除乳香、沒藥、麝香並炒，再入不炒藥同為末，每服三大錢，炒大黑豆同木瓜煎酒旋調服，不拘時候。

[illegible]治丈夫元臟氣虛，婦人脾血久冷，諸般風濕毒氣，攻注腳手，筋脈緣攣，或發赤腫，行步艱辛，腰腿沉重，腳心吊痛，及上衝頭面腫痛，胸膈痞悶，不思飲食，腹脅刺痛，及一切痛風走注，渾身疼痛。

川烏（[illegible]） 草烏（[illegible]） 地龍（去土） 天南星（[illegible]）

乳香 沒藥（[illegible]）

右為末，入研藥和勻，酒糊為圓，如梧桐子大，每服五十圓，空心日午冷酒送下，荊芥茶亦可。

[illegible]治諸風癱瘓，風氣緣攣，半身不遂，口眼喎斜，手足拘攣，或生瘡，或語言蹇澀，心多驚悸，其狀多端，各隨所中。由氣血俱虛，腠理疏弱，風邪外中，真氣失守，邪正相干而

生焉。

自然銅壹斤（好者，用生鐵銚子內，以炭火燒，研細……）

麻黃（去節）　黑附子（炮，去皮臍）　烏蛇（酒浸，去皮骨，炙）　川烏（炮，去皮臍）

厚朴（去粗皮，薑汁炙）　防風　蒼朮（麩炒）　川芎

陳皮　白芷　白朮　芍藥（各三兩）

吳茱萸（湯泡）　南星（半兩）

右爲末，與自然銅粉相和勻，搗細，煉蜜圓梧桐子大。男女中風癱瘓，半身不遂，起止不能者，空心服，臨臥豆淋酒下一粒，六十日內必瘥。男女患筋骨腰膝疼痛，走注不定，坐則刺腰，日則刺背，行即入腳跟，亦用豆淋酒下，須臾必蒸，啜一盞，投之衣被，蓋覆出汗，然後更服一粒必差。或患五七日間未得汗，亦如前法服，纔入口汗即出，便安，依法服二十日定愈。治破傷風，頭麻風，諸風偏風，並用豆淋酒下一粒至二粒，即見功效。丈夫元臟氣虛，臍下撮痛不可忍者，以檳榔一箇，酒磨一半，又生薑自然汁少許，同煎五七沸，研二粒服之，須臾以小麥麩醋拌炒，熨臍下便止。治瘧疾，氣發時，有檳榔兩箇相就者，用檳榔一箇中分破，半生用，半炙黃，一處爲末，酒一盞，蔥白一莖，同一處煎[illegible]，候盡內候酒得所時，先呷酒口，檳榔酒蔥白和藥一粒，爛嚼，以煎酒嚥之，但依法服，立效。須臾瀉下三二度，隨即便愈。忌些小風疾，即一服差。忌動風有毒物、伏食。

活絡圓 治左癱右瘓，手足頑麻，語言蹇澀，渾身疼痛，筋骨拘攣，不得屈伸，項背強直，下注腳膝，行履艱難，骨節煩疼，不能轉側，跌撲閃肭，外傷內損，並皆治之。

草烏（炮，去皮）　川烏（炮，去皮臍）　乳香（研）　沒藥（各壹兩）

生黑豆（壹升，以斑蝥貳拾壹箇，去頭足，同煮，候豆脹爲度，去斑蝥不用）

右爲末，醋糊圓梧桐子大，每服三十圓，溫酒下，不拘時。常服通經絡，活血脈，疏風順氣，壯骨輕身。

川烏散 治癱瘓風，手口搐搦，不能舉物。

五加皮　海桐皮　川烏　牡丹皮

川芎　赤芍藥（各半兩）　乾薑　肉桂（各壹錢）

右爲末，每服三錢，水一盞，將古銅錢一箇入清油內浸，每煎藥入錢同煎，不拘時服。

透冰圓 治遍身白疹瘙癢不止，切不可全用風藥治之。蓋寒邪伏於肌膚，搏凝滯而成，或天色冷則重，或因患風中，若遇天晴日暖則輕，宜用[illegible]爲妙，更用此酒服，累用神效。頭氣[illegible]方見前。

枳實（不拘多少，麩炒黃，去白）

右剉散，每服貳大錢，用酒浸少時，去枳實，但飲酒最妙。用枳實煎水洗患處亦佳。

[illegible] 治臂腿間忽一兩點痛，著骨不可忍。
芫花根倒爲末，米醋調，隨大小傅之。
天仙膏 治卒中風口眼喎斜。
南星大者 白及一錢 草烏大者 僵蠶七箇
右爲末，用生鱔魚血調成膏，傅喎處，覺正便洗去。
灸法 治風痺癱瘓及瘡等，右摘蓖麻葉軟草貼壁，草節湯洗。
[illegible] 取新竹截尺許長，用兩磚對立，相去八寸，置竹在上，每截破二片，仰安磚上，急著火，磚外兩頭各置碗以盛瀝，瀝盡以綿濾，澄清，夏秋須沉冷水中，防瀝酸，大熱有風人亦可單服，冷暖隨人，勿過度。荊瀝亦然。
灸法 治口喎斜即效。
耳垂下麥粒大，灸炷三壯，左灸右，右灸左。
灸法 治卒中風涎壅塞，氣如牽鋸，服藥不下，宜於關元丹田二穴多灸之良。
治卒中風口噤不開，灸頰車二穴，在耳下八分小近前，灸五壯，隨愈。中風失音，不能言語，緩縱不隨，先灸天窗二穴五十壯，其穴在頸大筋前曲頰下扶突穴後動應手陷中。息火，仍移灸百會一穴五十壯，其穴在頂正中心。灸畢還灸天窗五十壯，始發先灸百會，則風氣不得泄，內攻五藏，喜閉伏，仍失音也。所以先灸天窗，次百會佳。一灸五十壯，悉泄火勢，復灸之，視病輕重，重者一處三百壯，大效。凡中風服藥劇者，但是風穴，悉皆灸之三壯，無不愈也。勿疑惑不灸，忌者勿很盡灸。

癘風

[illegible]方 治癘風即大風惡疾癩是也。雖名曰風，未必皆因風，大率多是嗜慾勞動，氣血熱，發汗泄不避邪風，使澣氣與衛氣相干，則肌肉不仁，榮氣泣濁則胕熱不利，故色敗，皮膚瘍潰，鼻梁閉壞，或自作不仁極猥之業所致，久則或遍身白皮脫落如蛇蛻狀。
右用桑枝灰一斗，熱湯淋取汁，洗頭面，次用大豆及綠豆漿添熱水三日一浴，一日一洗面，卻用側柏葉蒸膝乾白膠香各等分爲末，蜜圓，溫水下三七粒，日三服。
仙方 治大風惡疾，雙眼昏，咫尺不辨人物，髮眉自落，鼻梁崩倒，肌膚瘡如癬，若不可救，此方特效。
右用皂角刺三斤，炭火蒸久，曬乾爲末，濃煎大黃湯下一匕，服旬日間，眉髮再生，肌膚悅潤，眼目愈明。
[illegible] 治多啖炙煿成此癘風，茶清下三四服效。方見大方科積熱類。
浴法
麻黃根 地骨皮 草烏頭各貳兩
右剉散，研朴硝二兩勻和，每用藥一兩，水一桶，椒一合，葱三十莖，艾葉一兩，同煎十沸，用水醋一中盞，又打勻，去滓，坐溫室中，白用手巾搭四肢，候湯可浴，即浴，令汗透面上如珠，流，更坐室中，或睡片時尤佳，汗解，方著衣。

者

避風而出，五日再浴，如此兩上浴，便服換骨丹。

換骨丹

九肋鱉甲 蜈蚣 各壹條

右以鹽泥固濟，候乾火煅存二分性，為末。巴豆半兩，去皮膜，順手研。青州棗壹拾枚，去核，入巴豆，實在棗中，火燒令焦，存巴豆五分性，將棗巴豆研爛如泥，入前二味末，研勻，以醋煮糊圓如菉豆大，每服七圓，虛中四五圓，用溫甕汁下，候利惡物如膿血爛魚腸即住。三兩服未利，更加三圓，次服遇仙丹。

遇仙丹

人參 紫參 各壹兩 苦參 貳兩 白僵蚕 [illegible]

右為末，麪糊圓梧桐子大，每服三十圓，溫鹽湯吞下，食前，日二服，次服疎風散。

疎風散

山梔子仁 壹兩 大黃 白滑石 熟地黃 一兩

右為末，入朴消半兩，令勻，每服一錢，食后，淡茶清調下，次以佛手膏。

佛手膏 去黑靨紫瘢

斑猫 [illegible] 去翅足 巴豆 壹拾粒 去殼 杏仁 貳十粒 去皮 砒霜 壹錢 另研

紅娘子 貳拾箇 去翅足 硇砂 壹兩 黃蠟

鉛粉 各半兩 雄青 壹兩 硫黃 黃丹 各三錢

膩粉 [illegible] 菉豆 乙合 槐角 三錢 清油 四兩

亂髮 壹兩

右用油煎，令髮化盡，次下紅娘子，次下巴豆、槐角等，逐味下，焦者漉出，方下硫黃、鉛、消及用粉等，以箄子不住手攪，令勻，滴水成珠為度。用時先將針刺瘢核，用藥一粟米大，放針處，次日揭擦，有黑臭膿血出，三兩日自瘥，少次服去毒丹。

去毒丹

赤芍藥 甘草 白滑石 各半兩 朴硝

大黃 各壹分 巴豆 去皮殼別研入 黑牽牛 壹兩 半生半炒

右為末，麪糊圓菉豆大，臨卧服十五圓，金銀薄荷湯下，加至三十圓，次服甘草散。

甘草散

甘草 白滑石 各半兩 山豆根 壹兩 大黃 一分

右為末，每服一錢，蜜湯調下，日二服，次服解毒圓。

解毒圓

[illegible]根 叁兩 甘草 炒 半兩 大黃 壹分 朴消 壹分 別研

右為末，麪糊圓如菉豆大，每服二十圓至三十圓，白湯下，次服福神丹。

福神丹

訶子 五個 巴戟 炒 黑牽牛 生各半兩 甘遂 [illegible]

赤小豆 [illegible] 生

右為末，麪糊圓菉豆大，每服十圓至十五圓，甘草湯下。

次用水膏藥

水膏藥 傳貼破處及白脚上瘡令生肉

陳皮 去白半斤炒黄色 陳米半斤炒 藿香

馬蹄香 各四兩 麝香 一錢別研

右爲末入麝香用冷水調掃傳瘡上有膿血如拭破即煎桃柳湯洗再上藥此十方乃秘傳有驗大要病人須能如法將息禮懺敬而信之

通天再造散 治大風惡疾

鬱金 一兩半 大黄 一兩炮 白牽牛 六錢半生半炒

皂角刺 一兩炮黑年者

右爲末每服五錢日未出面東以無灰酒下盡量爲度晚利黑頭小虫病稍輕者止利如魚腸臭穢物忌毒半年但食稠粥軟飯漸生頭毛皮膚如常甚者不過三兩次須將理不可妄有勞動及終身不得食牛馬驢騾等肉犯者死不救

三[illegible]圓 治如前

當歸 熟地黄 川芎 荆芥穗 各二兩

防風 北細辛 各一兩去葉 桂心 一分

右剉散先以醋膏升浸一宿漉出焙乾再以生地黄一斤搗汁浸一宿焙乾酒一升浸一宿焙乾碾入乳香半兩以餘酒醋地黄汁糊熬餅爲圓梧桐子大用好川烏頭一箇炮裂去皮臍切[illegible]半兩浸酒[illegible]圓[illegible]下十[illegible]圓

八葉湯 淋洗大風瘡

桑葉 荷葉 地黄葉 皂角葉

[illegible]葉 蒼耳葉 菖蒲葉 何首烏葉

右等分晒乾燒存性爲末如面藥用洗手面身體大風惡疾瘡殘茶毒膿汁淋漓眉鬚脱落手足指脱頑痺漏痒眼昏耳聾鼻塌唇翻聲啞之惡無越於斯負此病者百無一生病且愛戀妻妾役著名利不仁之行死而無悔深可悲傷凡遇此疾切須戒鹽及一切口味公私世務宜屏置

癧風

排風湯 治五臟風癧風亦治脚氣腫痛每服三錢水一盞半生薑四片煎溫服 方見前

消風散 治中風諸風迷仆涎潮口眼舌強語蹇或皮膚瘙癢隱疹或吹冷拘攣不論表裏淺深服之效 方見前

[illegible] [illegible]氣和血則風散 方見中氣門

烏藥順氣散 風服之則氣順血行癧風自解 方見大方脚氣類

[illegible]圓 治風癧筋骨 方見前

大[illegible]圓 治諸風癱瘓

川烏 炮去皮臍 川五靈脂 乳香

[illegible]藥 各[illegible]兩 生麝 [illegible]

右乳香以乾竹葉包裹用熨斗火熨過即研成末餘藥末和勻再碾滴水圓彈子大每服一圓薄荷酒磨下

〔[illegible]圓〕治風寒濕毒與血氣搏筋骨疼痛四肢麻痺攣痛

天麻 川牛膝 天南星 宣州木瓜 肉蓯蓉 洗切焙

熟附子 虎骨 各酥炙一兩

大當歸 各半兩 乳香 沒藥 五靈脂 各半兩

生麝香 一錢

右為末以藥酒煮麪糊圓梧桐子大每服三四十圓食前溫酒或豆淋酒下木瓜湯下亦治腳氣

歷節風

〔[illegible]〕治白虎歷節風短氣自汗頭眩欲吐手指攣曲身體魁瘰其腫如脫其痛如掣其因飲酒當風汗出入水受風寒濕毒之氣凝滯筋脈藴於骨節或在四肢肉色不變晝靜夜劇痛徹骨如虎齧不可忍久不治令人骨節蹉跌一名厲風須大作湯圓救治不可以淺近之劑則無驗

羌活 去蘆 附子 炮去皮臍 秦艽 去蘆 桂心 不見火

木香 不見火 川芎 當歸 去蘆 川牛膝 去蘆酒浸

桃仁 麩炒 骨碎補 防風 去蘆各半兩 甘草 炙

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片煎不拘時溫服

〔[illegible]〕治走注歷節諸風軟痛卒中倒地跌撲傷損

草烏頭 去皮臍 熟地黃 或生 南星

半夏麴 白僵蠶 烏藥

右為末酒糊圓梧桐子大每服五七粒空心日午夜卧溫酒下如跌撲傷損痛甚薑汁和酒研十粒塗傷處卒中倒薑汁茶清研五七粒灌下立醒

〔[illegible]湯〕治歷節風四肢疼痛如槌鍛不可忍

附子 炮去皮臍 乾薑 芍藥 茯苓

甘草 炙 桂心 各三兩 白朮 四兩 人參 三兩

右剉散每服四大錢水二盞煎食前服一方去桂心用乾地黃二兩

〔烏頭湯〕治病歷節痛不可屈伸

烏頭 五枚㕮咀以蜜二升煎取一升去烏頭 甘草 麻黃 去節

芍藥 黃耆

右剉散每服四錢水一盞半入蜜煎去滓空心服或加老薑桂心大棗不用麻黃黃耆治寒疝腹中絞痛賊風入腹攻五臟拘急不得轉側叫呼發作有時使人手足厥冷

〔[illegible]散〕治白虎風走注疼痛發則不可忍或攣痛不得屈伸

虎骨 酥炙 花蛇 酒浸 天麻 防風 去蘆

川牛膝 酒浸 白僵蠶 炒去絲 川當歸 去蘆 乳香 別研

桂心 不見火 甘草 炙 全蠍 麝香 別研

右為末每服一錢溫酒調不拘時服豆淋酒亦可

〔[illegible]圓〕治白虎歷節諸風疼痛遊走無定狀如蟲齧晝靜夜劇一切手足不測疼痛及腳痛

川烏 全蠍 黑豆 地龍

右為末入麝香半字糯米糊圓如綠豆大每服七圓甚者十

睡夜臥令肘空溫酒下假出冷汗一身便差 方加赤
足蜈蚣一條以草烏代川烏尤妙

獨活寄生湯 治腰腳冷痹解風寒暑濕之毒亦治腳氣
方見大方科腰痛類

麻黃散 治歷節無汗宜發汗
羌活壹兩 華陰細辛 黃耆各半兩 麻黃去節壹兩[illegible]
右剉散每服五錢水二盞煎至八分三四服有汗慎外風

[illegible]圓 治白虎歷節疼痛甚肉理枯虛生蟲遊走痒痛兼治
癱瘓半身麻木殺傳尸癆蟲效
正川椒[illegible]
[illegible]

右為末好酒浸白糕為丸如梧桐子大每服三四十丸
食前鹽湯下治癱瘓痒蒸湯下腰痛茴香酒下腎冷鹽[illegible]

[illegible] 治手足攣曲骨節間痛甚
革麻子去皮 黃連[illegible]
右用新水二升於磁瓶內浸藥密封七日后取出逐日
侵晨面東以浸藥水吞革麻仁一粒七日后添兩粒微
利無妨以療大風亦效

[illegible]方
右用三年釅醋五升熬煎三五沸切葱白三斤煑一沸
漉出以帛蘸暴熱病處熨之

又方 雞子搗[illegible]三遍[illegible]
雞子患者下飯用黃肥雞爲炒亦可用抱雞來殼去其
[illegible]

又方 用芥菜子[illegible]雞子白調之

[illegible]圓 治白虎歷節風及諸般風濕流注四肢大風鶴膝
一切風疾四肢拘攣不能坐臥凡係骨節去處皆疼痒腫
夜痛發歇諸藥不效者服之兩料痊愈矣
尋風藤壹兩 五加皮去骨壹兩 虎脛骨 烏藥
石楠葉 蒼木各伍錢 三角尖壹兩[illegible]
骨碎補去毛 青木香 威靈仙 川續斷
當歸 乳香 川羌活 北細辛各壹分半
青藤根壹兩 川牛膝 防風伍分 南木香[illegible]
石菖蒲[illegible] 蘇木 甘草節[illegible]
生薑壹兩半 大川烏一隻[illegible]
右二十四味剉碎用無灰酒一壜將藥盛於布袋內放
酒壜中以紙封繫以鍋盛水將壜於鍋內用慢火自
辰時煑至午時連壜取出每日不拘時候隨意溫服藥
酒旋旋[illegible]作[illegible]半料用小壜酒依上煑服

癜風

[illegible] 治肌肉頑麻紫癜白癜風
荊芥穗 蔓荊子去白 蚵蚾草[illegible] 威靈仙[illegible]
何首烏 防風去蘆 甘草炙 各等分
右為末每服二錢食後溫酒調下

知驗方 治癩風詩曰紫癜白癜兩般風附子硫黄最有功
薑汁調勻茄蒂蘸擦來兩度更無蹤 嗟
先以布擦洗其瘡令損却以茄蒂蘸藥擦一說白癜風
用白茄蒂紫癜風用紫茄蒂

又方 硫黄一兩米醋煑一日海螵蛸二箇並爲末浴后以
生薑蘸藥熱擦過風少時數次絕根

又方 鷄子一枚用釅醋浸一宿以針刺小竅滴青煤為汁入
砒霜并菉豆末少許和匀用石扎擦破青布蘸擦

又方 雄黄　硫黄　黄丹　密陀僧
天南星 各等分
右為末先用薑汁擦患處次用薑蘸藥末擦后漸黑次
日再擦黑散則無恙矣

灸法 治白癜風灸左右手中指節宛中三壯未瘥報之
凡有贅疵諸痣但將艾炷於上灸之三壯即除

得效方大全婦人良方卷一

建安路官醫提領陳　志　刊行
南豐州醫學教授危　亦林　編集
江西等處官醫副提舉余　賜山　校正

產科兼婦人雜病科

濟陰論

夫濟世之道莫先於醫論醫之難濟陰猶急何則婦人之病比之男子十倍難療或云七癥八瘕九痛十二帶下共三十六病雖有名數又詳證狀推原其理無非血病多因經脉失於將理產蓐不善調護內作七情外感六淫陰陽勞逸飲食生冷遂致榮衛不輸新陳干忤隨經絡而為凝結為癥瘕流溢為滲漏悲痛害傷以致所患不一而止犯時微若秋毫感病重於山岳是也故女子十四而天癸至天謂天真之氣降癸謂壬癸水名故云天癸而衝任脉主之衝任者血之海也月水者經絡之餘也蓋婦人以血為本心生血脾行血榮衛四肢如環無端灌注百脉餘者為月候以時而行若水溢自流不自知覺設纔病不作而氣躰充盛而有子矣其有來多來少或過期不來或未期而先來多差不一而病生焉其來時則一二日之前腰腹滿脹或頭痛作熱百節煩疼惟然後期尚此則發為虛熱自汗如以五心內熱是為虛勞而小水閉燥或乘肺則咳

或喉痛寒留滯血與氣搏則為腹痛敗血結塊時發寒熱則為瘀瘕或風寒凝滯經血化為水流溢四肢謂之血分淋不能御血與水并浮腫肌肉謂之虛腫或衝任氣虛內為過度風邪冷熱之氣入於胞門積浪與血兼下冷則多白熱則多赤冷熱不調赤白相半或為赤白帶下若衝任勞損經海動傷脾虛胃弱不能約制其血淋瀝然暴下故謂崩中漏下下五色各應五臟五臟俱虛五色并下以致昏暈積悶喘急逆仲逆亂多志發狂妄語小便不禁甚者血之為病也復有生於嬌貴之家愛憎在念而氣逆于中故氣有一息不行血有一息不運則胃腹脹痛昏冒嘔噦倦之不自勝持飲食不為肌膚致成損患治療之際謂

寫上調經次之斯可定法受孕之後切宜避忌胎殺所遊如經云刀犯者形必傷泥犯者竅必塞打擊者色青黯繫縛者相拘攣甚至母殞驗若反掌斷不可忽半產一證非如正產正於如果中栗熟其殼自開兩無所損半產則比之採斫新栗碎其膚殼損其皮膜然後取得其實半產正類此以其胎臟傷損胞繫斷去而後胎墜下皆因月未滿足誤服藥餌忽寒邪熱毒所傷忽躁跌打傷跌撲或犯禁忌或衝任脈虛漏下所致生死形候亦如正產參詳大抵半產須加十倍調治或外證喘咳及瘀痛作傷皆宜不語或脈斷絕或食飲減或變痓候經復生全其有無驗道皆是作瞑不喘候調可治也復有市井之家村落之婦忽情安

作偷生不正或多日久厭於養育往往以早藥毒之遂為兔敗血不下衝心悶亂喘脹虛汗交作死者固記闇者可不為戒治之者須以解毒行血藥救則十全二三矣蓋夫正產有娠六七月切忌恣情交合八月亦忌飲酒呼怒洗頭臨產必難產婦亦以陣面健兒為喻可謂老矣臨產之初先脫尋常所穿衣以籠竈頭及竈口則易產不可喧鬨宜謹選一熟善坐婆及得力家人扶持無使揮霍致令產婦憂恐惟當食軟飯藥粥之類若腹中痛且令扶行或痛或止名曰弄痛不可便行試水手探聽產母坐臥切須熟忍當服催生符藥却不可曲腰眠睡如連腰引痛眼中如見火色此是兒轉蓋腎則系於腰胞系於腎貼於脊更丞

腹轉其頭如急疼者即其驗矣又須令人扶策徐徐而行若行步艱難即凭物立須臾扶策再行直至腰腹相引陣痛頻頻又服催生藥勉強扶行痛陣轉甚難於行立認是產時將至然後坐草切勿太早恐子在腹中難於轉側及胞漿先破子道乾澀皆至難產務要產婦惜力若心中熱悶以白蜜一匙新汲水調下若熱悶未解以生雞子一箇打破吞服直待兒迫產門頭面端正然後令人抱腰其抱腰之人不得傾斜則兒順其理自然易產又有臥產者須待臥定背平著席體不傴曲則兒不失其道必無難產之理時當嚴寒宜居深密室內四邊塞閉常燒炭火多飯清水以防血暈血悶血溢妄行血虛發熱之證如冬末春初天

色凝寒宜密閉產室下垂帷幕內外生火常令暖氣如春
仍下裹衣服不可去綿方免胎寒血結母致難產矣又至
產訖先令飲童子小便一盞勿使就睡且令閉目而坐須
之方可扶置於床宜仰卧立膝勿令伸足膝熱亦宜頻喚
醒產室無得風著其肌致生他疾兒產下切未可以得男
為喜恐爲紅汗之證得女爲憂恐致敗血衝心之患惟當
頻燃艾醋等湯藥常焠醋煙以防眩暈遂逐漸進少白粥毋
令過飽其有破水之後經日而不產者又當隨證細辨身
重體熱作寒面黑舌青反舌上冷母死子活面赤舌青母
活子死唇口俱青吐沫子母俱斃倉皇之間救治最不可不
審且當預與病家言之若胎衣不下者停待稍久非惟產

母疲倦又且血流入胞中為血所脹上衝心胸喘急疼痛
必至危篤宜急斷臍帶以少物繫臍墜之時尤宜用心
拴緊然後截斷不爾則胞上掩心而死須使其子血脉不
潮入胞中則胞衣自當痿縮而下縱淹延數日亦不害人
子治療多見之惟欲產母心懷安泰終自下矣未可輕信
坐婆妄用手法因此而殂正產後中風口眼喎斜角弓反
張六脉緊大自汗過多虛極生風唇青肉冷剛柔二痓項
背強硬手足痙急咬牙嚼舌血崩不止昏暈頻發厥絕氣冷口
鼻黑起出血不止虛熱變生名胃絶肺敗喉中氣急喘促
不息煩渴殊甚惡露斷絶名孤陽絶陰五七日內還方下
床或憂怒太過一月之內或傷於房事或亂行針灸以致

眼澁口噤肌肉瞤搐腰背強直語言不出頭目難舉猶宜
審諦辨此候等及諸雜病與男子等當以理血藥為助臨
治之際宜以意消息而加減之

護胎

驗胎散 婦人經脉不行已經三月欲驗有胎

川芎 壹兩半生用不見火

右為末空心濃煎艾湯調下方寸匕覺腹內微動則有胎

芎蘇散 治外感風寒渾身壯熱眼暈頭旋或洪項背或當
風取涼致令頭目昏痛增寒甚至心胸煩悶姙娠不可輕
易投劑止宜用此以散表邪及治痰飲嘈雜煩悸嘔逆不
食腹滿此藥至和而且平嘔加白术腹脹枳實虛煩竹茹

頭煩大渴麥門冬知母水停心下微吐逆茯苓頭痛川芎
腰痛加白芍藥 方見大方科傷寒類

黃龍湯 治姙婦增寒壯熱頭痛身疼加川芎川白芷生薑
葱白煎得微汗解 方見大方科傷寒類

消暑散 治姙婦傷暑頭疼惡寒身熱躁悶四肢疼痛背項
拘急唇口乾燥

柴胡 肆兩　甘草 貳兩　石膏 捌兩

右剉散每服叁錢水壹盞生姜伍片煎不拘時候溫服
若氣虛體冷加人參壹兩

加減安胎飲 凡婦人妊娠不能僻於坑廁轉惡心擇食怕
鬧飲冷但喜鹹酸止經候明氣血弱者宜服此藥定腹

[?]安胎飲治溫養[?]令母臟氣平和陰陽全備免有損墮之虞盛
者受胎母無疾耳溫胎保養之劑亦非所宜此方非治胎
動不安腹痛漏下或胎奔上刺心短氣大效漏胎下血不
可用僭燥熱藥

條參去蘆　嫩黃耆去蘆　揚芍藥　大川芎
熟地黃酒洗切炒　川續斷去蘆　側柏葉炒　阿膠蛤粉炒
粉草　大當歸去尾各等分

右剉散每服肆錢水壹盞半生薑叁片金銀器各壹件[?]
漏下不止加熟艾壹握又如胎動口噤唇青下利不止
亦用熟艾壹兩酒叁盞煮至貳盞去滓灌之即安

[?]治妊娠或因房室驚觸勞力過度傷動胞胎或
食毒物致令子宮虛滑經血淋瀝若不急治敗血湊心子
母難保日漸胎乾危亡不久

桑寄生　當歸去蘆酒浸　川續斷酒浸　川芎
香附子去毛炒　茯神去木　阿膠蛤粉炒成珠子
白朮各壹兩　人參　甘草炙各半兩　陳艾葉壹兩
烏梅去核半兩

右剉散每服肆錢水壹盞半生薑伍片煎不以時溫服

治漏胎因血胎上衝手足逆冷欲死

右用生艾汁貳盞同阿膠白蜜各貳兩煎壹盞半稍熱服
之無生艾濃煎熟艾一方加竹茹一大塊同煎

治胎動出血產門痛　黃連為末酒調壹錢日三服

[?]方治漏胎下血不止胞乾子母即死
生地黃汁一升好酒五盞煎五沸分三服或為末酒服

[?]湯治胎孕不安

黃芩　白朮　縮砂　當歸各等分

右剉散每服叁錢水壹盞半煎溫服

[?]散治妊娠從高墜下或為重物所壓觸動胎氣腹
痛下血服此後覺胎動極熱胎已安矣

縮砂不拘多少

右於熨斗內炒令熱透卻用皮取仁研為末每服一二錢
熱酒調服不飲酒者煎艾鹽湯或米飲不拘時候調服

[?]湯治受胎一月或兩月嘔吐擇食緣中脘宿有
痰飲經水止後氣滯所作名曰惡阻

陳皮　白茯苓各壹兩半　半夏壹兩　白朮炒各半
粉草叁錢

右剉散每服肆錢生薑三片烏梅壹箇煎食前服未效加生薑汁

[?]飲

紫蘇　厚朴　白茯苓各伍錢　半夏
甘草各叁分

右剉散每服三錢水壹盞生薑伍片棗貳枚煎溫服客
熱煩渴口生瘡者加知母前胡腹冷下利加桂心胃
中虛熱大小便秘加黃芩頭疼加細辛川芎

[?]湯治妊娠飲食過度

木香不見火，二錢半　人參　白茯苓去皮，等分
右為末，麪糊圓菉豆大，每服二十圓，熟水下，不拘時候。
[illegible] 治妊娠氣不和，飲食不美。
白术炒　紫蘇各壹兩　白芷微炒　人參各叁兩
訶子皮　青皮去白　川芎各弍分　甘草壹分，炙
右㕮咀，每服叁錢，水壹盞，薑三片，煎，不拘時候。
[illegible] 治惡阻，奇效。每服三十圓，空心薑湯服。方見大全[illegible]
[illegible] 治妊娠將理失宜，或勞役胎動不安，腹痛重墜，
阻滯胎氣，[illegible]下，或子臟挾疾，久不成胎，或受妊不能固
養，痿燥不長，過年不產，日月雖滿，轉動無力，或致損墮。
麻仁去殼　當歸洗焙，半兩　乾薑炮　肉桂去皮
秦椒去目，炒出汗　石膏　石斛剉，去根
黃芩　糯米　貝母　甘草炙
大豆黃卷各等分
右為末，煉蜜圓彈子大，每一圓，溫酒或棗湯化下，空心嚼
下亦可。方內用此黃芩、麻仁，此二藥之藥，人疑不服，殊不
知妊娠中有風，風中有熱，風熱既盛，其胎必困。黃芩能去
子熱，麻仁能去子風，亦可服。右參苓白术散。
參苓白术散方見大方科脾胃類
[illegible] 治妊娠二三月，胎動不安，或曾受此苦，每遇有懷
至期損墮，可預服此，以養胎氣，不補胎損，其危甚於正產。
杜仲去皮，薑汁炒斷絲　川續斷酒浸焙，各弍兩

右為末，棗肉煮爛，杵和為圓梧子大，每服七十圓，空心
米飲送下，日三服。
[illegible] 治妊娠恣情飲酒，或食生果、羊、雞、毒物，
致令百節酸疼，大小腑秘澀，面赤口苦，心煩腹脹。
川芎　苧根　揚芍藥　麥門冬去心
當歸去蘆　白术各壹兩　糯米半合　甘草炙，半兩
右㕮咀，每服三錢，水一盞，煎，溫服，不拘時候。
[illegible] 安胎扶虛，助陰滋血。
熟地黃酒洗，再焙　大當歸壹兩，去尾，剉片，焙
右為末，煉蜜圓梧子大，每服三十五圓，溫酒下，與枳殼
散兼服，或單服。枳殼散恐有胎寒腹痛之疾，二藥皆不
群，誠為妙，仍用平胃散、鹽湯調助脾進食。
[illegible] 治妊娠[illegible]，頭痛，寒熱往來，五心煩悶，四肢不和。
人參　陳皮去白　白术　麥門冬去心，各
甘草弍分半　厚朴去粗皮，切，薑炒　茯苓　竹茹各五分
右㕮咀，每服三錢，水一盞半，生薑三片，煎，不以時溫服。
[illegible] 治妊娠苦煩悶者，以四月受少陰君火氣以養精，
六月受少陽相火氣以養氣，若母心驚膽寒，多好煩悶，名
子煩。
防風去叉　黃芩各三兩　麥門冬去心，壹兩　白茯苓肆兩
右㕮咀，每服四大錢，水壹盞半，竹葉十數片，煎，溫服。一
方去黃芩，加人參半兩。

知母圓治産難及日月未足而痛如欲産者

知母

右為末煉蜜圓如雞頭子每服一圓溫酒嚼下日三服

榆白皮散治胎滑易産治妊娠漏胎去血及臨産驚動太早産時未至穢露先下致使胞胎乾燥臨産艱難並宜服之

榆白皮　葵根　瞿麥各壹兩　大麻仁去殼

木通半兩　川牛膝叁分去苗酒浸切焙

右剉散每服三錢水一盞半煎溫服

知母散治妊娠心脾壅熱口乾渴苦煩悶

赤茯苓　黄芩　黄耆各叁兩　知母

麥門冬去心　甘草各貳兩

右剉散每服三錢水一盞[illegible]桑白皮[illegible]煎[illegible]入竹瀝一合服不拘時候胎臟受熱最宜服之一方去黄耆知母加地骨皮犀角屑[illegible]各三分

紫蘇散安胎寬氣進食瘦胎易産設或居處失宜偶然頓仆胎痛漏胎下血兼服芎歸湯枳殼散

大腹皮　紫蘇　枳殼去瓤　桔梗去蘆

粉草　縮砂　香附子各等分

右剉散每服三錢水一盞半煎七分食前服

冬葵子散治妊娠小便不利身重惡寒起則眩暈及水腫

冬葵子叁分　赤茯苓去皮貳分

右為末每服三錢米飲調服不拘時候利則住服如大

通利見效加薑或少許小便頓

大腹皮散治妊娠大小便赤澀浮腫

枳殼去瓤麩炒　大腹皮　甘草各壹分　赤茯苓去皮叁分

右為末每服貳錢濃煎葱白湯調下不拘時候

鯉魚湯治同上

當歸去蘆酒浸　白芍藥各叁分　白茯苓肆分　白术伍錢

右剉散每服肆錢用鯉魚壹尾不拘大小破洗鱗腸白水煮熟去魚每用魚汁壹盞半生薑七片橘皮少許煎至一盞空心服如胎水未盡再服

全生茯苓散治婦人病食飲如故煩熱不得臥而反倚息以胞系了戾不得溺故致此病名轉胞但利小便則愈以此藥中有茯苓故也

赤小豆湯治妊娠手腳腫滿攣急

赤小豆　商陸乾各等分

右剉散每一兩用水一盞煎七分盞取清汁服

防己湯治妊娠腹腳腫痛

茯苓　白术各壹兩　乾薑　甘草

杏仁湯洗去皮尖各壹兩

右剉散每服肆錢水一盞半煎食前服

安胎和氣散治胎冷腹脹虛痛兩脅虛鳴臍下冷疼小便數大便滑

訶子煨去核　白术各壹兩　陳皮　高良薑炒

麥芽不見火　白芍藥　陳米炒　甘草炙各半兩
右㕮咀每服肆錢水壹盞半生姜伍片煎不以時溫服
忌生冷
[紫蘇飲]治胎氣不和懷胎近上脹滿疼痛謂之子懸又
治臨產驚恐氣結連日不下
紫蘇葉壹兩　川當歸叁分　人參　川芎
白芍藥　陳皮各半兩　甘草炙壹分　大腹皮半兩
右㕮咀每服叁錢水壹盞半生姜四片葱白七寸煎空心服
[illegible]治小便淋瀝名曰子淋或作轉胞治不愈者
麥門冬　通草　滑石各壹分　當歸去蘆
燈心　甘草炙各半兩　人參　細辛各壹分

方　十二

右為末每服叁錢煎麥門冬湯調不拘時服一方止用
檳榔赤芍藥各等分水煎空心服屢效
[桑螵蛸散]治妊娠小便不禁
桑螵蛸拾枚炙
右為末每服貳錢空心食前米飲調下
[白薇散]治妊娠遺尿不知出
白薇　白芍藥各等分
右為末每服貳錢食前溫酒調服
[當歸芍藥湯]治妊娠腹中㽲痛心下急滿
白芍藥　白茯苓　當歸去蘆　澤瀉
川芎各壹兩　白朮壹兩半

右為末每服叁錢溫酒或米飲調空心食前服忌生冷
[illegible]治妊娠下痢赤白腸鳴後重穀道疼痛
乾薑炮　黃連去鬚　縮砂仁炒　芎藭
阿膠蛤粉炒　白朮各壹兩　乳香三錢別研　枳殼去穰麩炒半兩
右為末用鹽梅三箇取肉入少醋糊同杵勻圓如梧子
大每服四十圓白痢乾薑湯下赤痢甘草湯赤白痢乾
薑甘草湯下不拘時服
[illegible]治懷身下痢赤白絞刺疼痛
雞子壹箇烏者尤妙就頭作竅傾出清者留黃
黃丹壹錢入前雞子殼內打令黃勻以厚紙裹黃泥固濟火上煨取焙乾
右為末每服二錢米飲調下一服愈者是男兩服愈者

方　十三

是女
[illegible]治妊娠婦兩腳浮腫名曰脆腳因脾衰不能制
水而化為水所致每服二三錢薑棗煎服為末蘇湯調亦可
方見大全[illegible]
[illegible]治妊娠風壅相交咳嗽痰多心胸滿悶
百合蒸　紫菀茸洗　貝母去心　白芍藥
前胡去蘆　赤茯苓去皮　桔梗去蘆炒　甘草炙各半兩
右剉散每服肆錢水壹盞半生姜五片煎不以時溫服
[illegible]治妊娠中風頭項強直筋脈攣急言語蹇澀痰
涎不消或發搐不省人事名曰子癎宜服
羚羊角鎊　川獨活去蘆　酸棗仁炒　五加皮去木各一分

薏苡仁炒 防風去芦 當歸酒洗去芦 川芎
茯神去木 杏仁去皮尖各四錢 木香不見火 甘草炙各錢半
右㕮咀每服四錢水壹盞半生薑五片煎不拘時溫服
治妊娠作瘧寒多不食方見大方科傷寒瘧門錯類未效當加常山
清脾湯 治妊娠作瘧熱多者
青皮 厚朴去粗皮薑汁炒 白朮 草果仁
柴胡去芦 茯苓 半夏湯洗 黄芩
甘草 人參各等分 常山一半
右㕮咀每服四錢生薑五片地骨皮少許煎不拘時
溫服或加麥門冬去心貳拾粒未效服勝金圓方見大方科瘧疾類
消風散 治妊娠頭旋目暈視物不見腮項腫核若加涎壅
危在須臾急宜服之
石膏 甘菊花去梗 防風去芦 荊芥穗
川羌活去芦 羚羊角鎊 川芎 大豆黄卷炒
當歸酒洗去芦 白芷各壹兩 甘草半兩
右㕮咀每服四錢水壹盞半入好茶半錢煎食後通口
服有一妊婦患此服之病減七八獲安分娩其眼帶吊
起人物不辨後服四物湯加荊芥防風更服天門冬飲
子但以此二藥相間服目漸稍明只忌酒麪煎炙燒煿
鷄羊鵝鴨豆腐辛辣一切毒食并房勞及稍溫藥如不
然眼不復明矣蓋此證為虛身多痰火閉衣著裯褥厚
蓋伏熱在裏或服補藥肉食熱物太過致令胎熱所臨
壅極風衝入腦所致
天門冬飲子
天門冬去心 知母 茺蔚子各壹兩 防風去蘆
五味子 茯苓 川羌活去蘆 人參各七錢半
右㕮咀每服四錢生薑三片煎食後溫服
治傷寒熱病護胎方
乾浮萍 朴消別研 大黄微炒 蛤粉月
藍根各壹分
右為末水調叁錢塗臍上安胎解煩極妙一法伏龍肝
末水調塗臍下乾則換或用井中泥塗心下乾即換
罩胎散 治妊娠傷寒大熱悶亂燥渴恐傷胎臟
蚌粉半兩 嫩卷荷葉焙乾壹兩
右為末每服二錢入蜜少許新汲水調下食前服研家
園生葛汁服亦安
治妊娠咳嗽方
麥門冬去心 紫菀去土各壹兩 桑白皮炙 杏仁麩炒去皮尖
甘草炙各壹分 桔梗米泔浸一夕焙二分
右㕮咀每服三錢水二盞竹茹一塊鷄子大煎至一盞
入蜜半匙去滓頻服
又方 治如前
貝母去心剉麩炒令黄
右為末研砂糖拌和令勻圓如鷄頭大含化一圓神效

當歸圓 治姙娠小便難飲食如故
當歸去尾　貝母炒　苦參各叁兩　滑石半兩
右為末，煉蜜圓如小豆大，米飲下二十圓，不拘時候。
八味圓 治法見前，方見大方，此斷氣瘦。
治姙娠大便秘方
防風貳兩　甘草壹兩　枳殼去穰麩炒各二兩
右為末，每服壹錢，沸湯點，食前日二三服。
治姙娠洞泄寒中方
厚朴　乾薑 式味等分，厚朴薑汁炒
右為末，糊圓梧桐子大，米飲下二十圓，食前服。
八正散 治姙娠心氣壅，胎氣八箇月散，壅手足浮腫急痛不安難產
瞿麥剉　木通剉去皮　滑石　大黃剉煨
萹蓄　車前子　山梔仁　甘草炙各等分
右剉散，每服叁錢，水壹盞，燈心壹握，同煎熱服。
治姙娠失音不能言方
奇病論曰：人有重身九月而瘖，何也？岐伯對曰：胞之絡脈絕也。何以言之？胞絡者，繫於腎，少陰之脈貫腎繫舌本，不能言。治之奈何？曰：無治也，當十月復。
產前軟胎方
甘草　生薑　烏梅各等分
右剉，水壹盞，先產前服，使令胎骨軟，產宮受氣滿不致作

紫蘇飲 治姙娠氣悶，或為喘呼，心悸煩亂，叫呼重者，急驚
兩腸滿脹，腹滿連臍急痛，坐臥不安，氣急逼迫，胎驚者
白茯苓去皮　川芎各壹兩　麥門冬去心壹兩　黃耆蜜炙
當歸溫酒浸　木香不見火　條參　甘草各半兩
右剉散，每服肆錢，水壹盞半，生薑伍片，煎溫服，不拘時候。常服至分娩亦無恙，安養胎氣甚佳。
保生散 安胎益氣易產，令子緊小，令母無病
人參　訶子去核煨　麥蘖炒　白朮炒
神麯炒　橘紅各等分
右剉散，每服叁錢，水壹盞半，煎，空心服。
枳殼散 瘦胎易產，抑陽降氣，兼治胎中一切惡病
枳殼麩炒　粉草壹兩
右為末，每服貳錢，沸湯調，空心日三服，至七月方可服。忌登高廁。大便秘澀加防風，體弱加大當歸去尾、木香各等分。胎肥壅滯，動止艱難，臨產難生，加乳香、香附炙效。
枳殼能逐水，消脹滿逆氣。若臨月多服，則當產之時無脹滿逆氣，產道順而易生，誠有補於世也。又治腸中諸疾，下氣寬腸，加炒去毛香附子壹兩，為末，鹽湯調下。治氣攻刺背脅疼痛，葱白湯；脾寒血氣成塊作痛，熱酒調。
大小便不通，白牽牛為末，加入，葱湯調服。
治兒在腹中哭方 多年空屋下鼠穴中土壹塊，令產母噙之，即止。一方川黃連濃煎汁，母呷之。

□□□如抱一甕

茱萸　川烏去皮臍　柴胡

白僵蠶炒去嘴　川巴戟去心　巴豆不去油　芫花醋煮各等分

右爲末煉蜜圓桐子大每服二十粒蜜酒吞下惡物即

時取下愈

雜論　轉女爲男法

論曰陰施陽化所以有娠遇三陰所會多生女子但懷娠三月名曰始胎血脈不流象形而變是時男女未定故令於未滿三月間服藥方術轉令生男也其法以斧置妊婦牀下繫刃向下勿令人知恐不信者令待雞抱卵時依此置窠下一窠盡出雄雞此雖未試亦不可不知凡受胎三

十八

月逐物變化故古人立胎教能令生子良善長壽忠孝仁義聰明無疾蓋須十月之內常見好境象無近邪僻真良教也

胎殺所直　正月床　二月戶　三月門　四月竈　五月身　六月床　七月碓　八月廁　九月門　十月房　十一月爐　十二月床

日遊胎殺所在　甲己日門　乙庚日碓磨　丙辛日井竈　丁壬日廚　癸戊日米倉　子丑中堂　寅卯辰酉竈　巳午門　未申離下　戌亥房

保產

收生法　凡橫逆等難產當以手法爲主收生之人擇揀老成良善臨期須心平氣和推以手亦且立言叮嚀詳審

其穩乃可不可用爆性之藥恐其驚惧因而傷兒如橫產謂兒先露手或足者其法當令產母安然仰臥收生之人徐徐先推兒下體令直上漸通手以中指摩其肩推上而正之漸引手攀其耳令頭正扶兒身正照路順却投催生藥安詳上草自然易產若逆產謂兒先露足者治法亦令產母仰臥不得用力亦不得驚恐收生之人徐徐推其足就一邊直上使兒自順若良久不順又漸漸推兒頭就一邊令其順下待兒身轉順門路正當却服催生之藥即產又如偏產謂兒頭偏拄一傍雖逼近產門亦露正頂止露額角者治法亦令產母仰臥收生之人輕輕推兒近上以手正其頭令兒頭頂端正向產門又有兒頭後骨

十九

偏拄穀道露額者治以綿衣炙暖令熱裹手急於穀道外傍徐徐推之漸漸近上然後上草又如礙產謂兒頭雖正產門而不能生下者或因兒轉身臍帶攀掛其肩致不能生者治法令產母仰臥收生之人輕手推兒近上徐徐通手引中指按兒兩肩理脫臍帶兒正即產又有坐產謂兒將欲生產母疲倦不能行立久坐椅蓐抵兒生路不能下生者治法當於高處懸帛手攀或絹帛一條令產母手攀輕輕屈足良久兒即順生更有盤腸產者臨分娩產腸先出兒即隨產俗用冷水噀產母面其腸自收此法虛弱之人切不可用恐驚傷成疾一方用□□□即蓖麻子肆拾玖粒研爛塗腦頂上其腸收上如收上即以水洗去頂上蓖麻又有

久而其腸為風吹乾不能收者，以磨刀水少許火上溫過，以潤其腸，煎好磁石湯一盃，令產母服，其腸自收矣。

補中湯 養新血，去瘀血，補虛扶危，治月未滿半產。

乾薑炮　阿膠剉炒　芎藭　五味子各壹兩
白朮　黃耆去蘆蜜炙　當歸酒浸去蘆　赤芍藥各壹兩半
人參　木香不見火　杜仲剉炒去皮　甘草炙各貳兩

右剉散，每服肆錢，水壹盞半，煎通口服，不拘時候。

安胎飲 治妊娠自四五月至七八月，因而築心氣疾欲絕，用此探之，若不損則痛止，子母俱安，若胎已損，即便墮。

當歸酒浸去蘆　芎藭各壹兩

右剉散，每服肆錢，酒壹盞，煎令欲乾，却入水壹盞，再煎三二沸，溫服。如口噤者，斡開灌下，如人行五七里，再進一服，不過三服便生也。

催生散 治難產，因婦自有難易，其或橫逆，皆因坐草太早，努力過多，兒轉未逮，或已破水，其血先乾，或先露手，謂之橫，或先露足，謂之逆，夾生之不容，窘迫之間，兩命所係，不可不知此藥之功也。人多不服，以為極賤之藥。大凡產難，或一日兩日，未見水血先下，如舟坐灘，殊不知香白芷、百草霜能固其血，服之如魚得水，必自轉生，兼治月水不調，崩中等疾。

香白芷　百草霜各等分

右為末，每服貳錢，童子小便、米醋各半呷許，沸湯調入

六七分，熱服，見功甚速，再服即分娩矣。或用蜀葵子四十九粒，白滑石末叁錢，順流水煎湯，調空心二服，如人行五里即下。

龍蛻散 催生秘傳

蟬退壹兩燒存性　大蛇蛻壹尺燒存性　滑石半兩　葵子壹兩微炒

右為末，每服壹錢，煎順流水微溫，攙調下，不可使熱湯。

遇仙雄黃丹 催生

雄黃不夾石者　朱砂各壹錢半　草麻子十四个去皮　大蛇蛻壹尺

右為末，漿水飯和圓彈子大，臨產時先用椒湯淋洗臍下，次安藥於臍內，用蠟紙數重傳藥上，以闊帛繫定，須臾即生，急取下藥，一圓可用三遍。

加味芎歸湯 治產五七日不下，垂死者，及矮石女子交骨不開者。

右用川芎、當歸各一兩，自死龜殼一箇酥炙，生男女者婦人頭髮一握燒存性，共為散，每服叁錢，水一盞半，煎服，約人行五里，生胎死胎俱下。如無自死龜殼，用鑽龜廢殼亦可。

勝金散 治難產，逐敗血，即自生。若橫逆，則轉活；子死腹中，則胎軟膨寬，即產。祖宗秘傳，千金不換，用者敬之。

王不留行　酸漿死胎倍用　茺蔚子　白蒺藜去刺
五靈脂行血宜生用

右各等分為散，每服叁錢，取利方：水壹盞半，入白花劉寄奴子壹撮，同煎溫服，大效。

驗方 催生隨其便而用之

右用清油同蜜等分少許湯調頻服 蜀葵子炒爲末服

順流水溫㬉調亦下死胎 好京墨新汲水濃磨服之

墨水裹兒出立效 敗筆頭一箇燒灰以藕節研自然汁

溫酒調下效

催生湯 治難婦欲產痛陣尚疏難產經三兩日不生胎死

腹中或產母氣乏委頓產道乾澀産時竟痛非疏陣後便服

蒼朮貳兩米泔浸切炒黃色 枳殼去穰麩炒

白桔梗 陳橘皮去白 楊芍藥 白芷

大川芎各壹兩 大當歸去蘆洗 交趾桂去粗皮不見火

半夏湯洗 粉草 麻黃去節 乾薑去皮

厚朴去皮姜汁製炒 南木香不見火 杏仁去皮尖別研 白茯苓各伍錢

右爲末每服貳錢順流水溫㬉調下若覺熱悶白蜜湯

下或剉散入真米醋一合煎方內用楊芍藥內桂能開

通子宮其餘藥味皆助氣之藥閉塞自通麻黃內通陽

氣陽氣盛則血行即產矣外邪冬寒去積聚皆得其宜

寒月用之甚爲的當暑月之時恐難輕服但以五苓散

用葵子炒心煎湯調下或暑清滑胎易產散先破

則胎轉難產用白蜜清油候以熱酒令得所頻服除氣

既潤即分娩矣

催生丹 治產婦生理不順產育艱難宜服之

十二月兔腦髓去皮膜研如泥 通明乳香壹分研細

母丁香末壹錢 麝香研壹字

右件研以兔腦髓圓如雞頭穰大陰乾用油紙密封貼

每服一圓溫水下即產

烏金散 治難產熱病胎死腹中或因頻仆或從高墜下或

房室驚搐或臨產驚動太早觸犯禁忌產時未到經血先

下惡露已盡致胎乾子死身冷不能自出但視產婦面赤

舌青是其候面青舌赤母死子活唇青吐沫子母俱斃又

有雙懷或一死一活其候難知須臨期觀變

熟地黃洗焙乾 蒲黃 大當歸

交趾桂 楊芍藥 軍薑去皮 粉草各壹兩

小黑豆肆兩 百草霜伍錢

右爲末每用貳錢米醋半合許沸湯六七分侵起溫服

疑貳之際且進佛手散酒水合煎三二服探之若未死

子母俱安若胎已死立便逐下的知其胎死進此藥後

更進香桂散須臾如手推下常用催生更加好滑石末

半兩葵子五十粒搗損黃秋葵七八皮葱白二寸順流

水煎湯調下方內用滑石能利小便黃秋葵行氣逐血

葱白內通陽氣氣盛血行即產和宗以來用此藥救療

不知其幾

香桂散 下死胎

麝香別研半錢 官桂末壹錢

右和勻作一服溫酒調下須臾如手推下莫殊研末酒

調一匕服亦効未効再吏服

【奪命圓】專治小産下血至多子死腹中其人增寒手指脣口爪甲青白面色黃黑或胎上搶心則絶悶欲死冷汗自出喘滿不食或食毒物誤服草藥傷動胎氣下血不止胎尚未損服之可安胎已死服之即下

牡丹皮去骨　白茯苓去黑皮　桂枝去皮

桃仁湯浸去皮尖麩炒　赤芍藥各等分

右爲末煉蜜圓如彈子大每服一圓細嚼淡醋湯下速進兩圓至胎腐爛腹中危甚者亦出

【[illegible]丹】治難産子死腹中昏沉脉微每服一百二十粒煎乳香湯服兩手更把石燕子各一枚即當胎下人活或只用朴消末每服一錢童便好酒調下效方見大方科產後類

【備急圓】治姙婦熱病大便秘脈實死胎已下不知人溫水下七圓即活方見大方科救急類

【[illegible]散】治姙婦欲産時不肯伸舒行動多是曲腰眠卧忍痛兒在腹中不能得轉故脚先出謂之逆生須臾不救母子俱亡

右用烏蛇蛻一條蟬蛻二七箇頭髮一握並燒爲灰分二服溫酒調併進二服仰卧霎時或用小綃針於兒脚心刺三七刺用鹽少許擦刺處即時順生母子俱活

【[illegible]散】臨産腰疼方可服之

延胡索　[illegible]　白[illegible]　白芷

蒲黃　當歸　桂心各等分

右爲末臨産陣痛時燒鉎刃鐵令通赤淬酒調下三錢服一二盃立產

【[illegible]丹】右用乳香研細以猪心血爲圓梧桐子大朱砂爲衣日乾每服一粒如催生冷酒化下良久未下再服一粒若大段難產以蓮葉心蒂七箇水二盞煎至一盞放溫化下一粒良久未下可再服之效驗如神兼有不下者如胞漿先下惡水來多胎乾不得卧時須先與四物湯及通真圓補養其血氣方見次更濃煎葱湯放冷令坐婆洗産戶須是款曲洗令氣上下通暢仍更用酥調滑石末塗產戶裏次服前催生藥則萬全矣如胎死不下者用黑豆三合好醋半升煮令豆爛取汁一盞放溫化下丹一粒須臾下矣萬一未下亦可再服如胎下胞衣不下者服此亦便下若胎橫逆不順即先服神應黑散再服此藥復以催之合藥時要五月五日午時極妙或七月七日三月三日及初上辰日亦可

【[illegible]法】産婦坐草時取路傍草鞋一隻用鼻絡小耳繩燒灰溫酒調服如得左足者男右足者女覆者兒死側者有驚自然理也似非切要之藥催生極驗

【[illegible]散】臨産腰疼方可服之

人參為末 乳香各壹錢 辰砂弍錢

右同研臨產時急用雞子清一箇調藥末再用生薑自然汁調冷服如横生倒生即時端順子母平善

（又方）治子死胎不下胞破不生此方累效救人萬[illegible]

用[illegible]不以多少黃色者手搓碎為末又細如粉不用酒以手指撚之每服二錢用熱灰酒一盞同煎至八分溫口服立生如神

療難產日久氣力乏不能生兼或宿患胞乾不產

右用赤小豆二升以水九升煮熟取汁入炙了明阿膠一兩同煎少時一服五合未效再服不過三四服即產此古方用之極驗

又方 救疾難經日不生 雲母散

右用雲母粉半兩溫酒調服入口當產不順者即產 萬全

治横逆產理不順手足先出或子死腹中

右以伏龍肝細研每服一錢酒調服兒頭戴出妙更用搽產母臍中亦效或用兔絲子末車前子末酒調服一

又取其父名書其足上即順生

治死胎不下方其證指甲青舌青脹悶甚者口中極臭先以平胃散一貼作兩服每服酒水各一盞同煎至一盞卻投朴消半兩研細再煎三五沸傾出候微溫服盡其胎即化血水而下 方見大方科調理門

治產難胞衣不出方 兒死腹中欲絶半夏白斂各一兩為末酒服一錢若產難只一服横生二服倒生三服兒死四服或加代赭瞿麥各三兩為佳

（又方）治難產日月未至而痛如欲產者

右以知母二兩為末蜜圓雞頭大溫酒化一圓服

治難產胎衣不下及生產數日併死胎不下者效

右用草麻子一兩去殼雄黃二錢研細成膏塗母右腳心纔下即速洗去不洗則腸出用此膏子塗頂上腸自入如聖之妙

又論治產後血流入胎衣中為血所脹不得下治之稍緩脹滿腹中上衝心胸疼痛喘急服此以逐去衣中之血血散脹消胎衣自下 牛膝湯

附子炮去皮臍半兩 牡丹皮一兩 乾漆壹分搗碎炒令煙盡

右為末釅醋壹升大黃末一兩同熬成膏和藥圓如梧子大溫酒不拘時下五七圓

治產兒已出胞衣不下臍腹堅脹急痛甚及子死腹中不得出者 方

牛膝酒浸 瞿麥各壹兩 滑石弍兩 赤小豆弍合

當歸酒浸 木通各壹兩半 葵子壹兩弍錢半

右判散每服三錢水一盞煎不拘時服

（經驗方）治胞衣不下及死胎不下服之神效 方見大方科[illegible]

又法治横生逆產諸藥不效者灸右腳小指尖頭三壯艾炷如小麥大下火立產

產戒忌不可便飲酒及多以酒調藥服之酒散五臟四肢致成百病凡一切藥止用水煎為上一兩服後方可

●產後

黑神散 治產後惡露不盡或胎衣不下攻衝心腹胸膈痞滿或臍腹堅脹撮痛及血運眼花口噤產後瘀血諸疾又名烏金散

熟地黃 生用 蒲黃 當歸 乾薑 炮

桂心 芍藥 甘草 半兩 黑豆 炒去皮 各半斤

右為末每服二錢酒半盞童便半盞同煎調下或去蒲黃用綿紙量虛實用之

黑龍丹 治產後一切血疾產難胎衣不下危急惡疾垂死者但灌藥得下無不全活神驗不可言因敗血上衝心痛頭痛欲死大效

當歸 五靈脂 川芎 良薑

熟地黃 各壹兩

右細剉以沙合盛赤石脂泥縫紙筋鹽泥固濟炭火十斤煆令通赤去火候冷取開看成黑糟色取出細研却入後藥

百草霜 伍兩 硫黃 乳香 各壹錢半

花蘂石 琥珀 各壹錢

右細研與前藥再研和勻米醋煮麪糊為圓如彈子大每服一圓炭火燒令通赤投於生薑自然汁與童子小便入酒漉出研細用其酒調下

血竭散 治產後敗血衝心胸滿上喘命在須臾宜服

真血竭 如無紫礦代 沒藥

右等分輕手研細頻篩再研取盡為度每服貳錢用童便合酒半盞煎一沸溫調下纔產下一服上床良久再服其惡血自循下行更不衝上免生諸疾

[illegible] 治產後血氣衝心不記人事

芸薹子 生地黃 各等分

右同研入生薑七片酒水各半盞童便少許煎五分服

[illegible]方 治產後血上心已死

右用真[illegible]存性為末[illegible]醋一合調灌之立活

[illegible] 治產前胸中宿有痰飲產後多致咳噫

半夏 湯洗 白茯苓 去皮 陳皮 去白 白朮 各壹兩

丁香 縮砂 各伍錢 粉草 叁錢

右剉散每服肆錢生薑三片烏梅一箇煎食前溫服

牡丹散 治產後血暈悶絕狼狽若口噤撬開灌之必效

牡丹皮 大黃 蒸 芒硝 各壹兩 冬瓜子

桃仁 [illegible]去皮尖

右剉散每服伍錢水三盞煎至一盞半入芒硝再煎分二服欲產時先煎下以備緩急

[illegible]湯 治產後去血多成暈血割害人命須取効心悶氣絕紅花末酒調一匕服未效併服 方見前

又方 捨煙墨二錢火燒通紅醋淬滅火氣為末半匕溫酒調

京墨亦可。

又方 醋漆器燒微煙過面熏鼻，却不可太甚，恐虛怯人。鹿

又方 韭菜切入藏瓶中，以熱米醋燒紙密封瓶口，勿令泄

氣，以瓶嘴向產婦鼻，立醒。

又方 用半夏末少許吹入鼻中。

加味五積散 治產後敗血不散，陰陽相勝，作為寒熱，入米

醋半合煎。或外感寒邪，頭痛身疼，發熱不退，除木香、茴

香，加生薑、紫蘇葉煎。方見前 產後傷寒，多因血虛，以下諸

方選用。至於竹葉石膏湯、單小柴胡湯，雖是傷寒退熱

之劑，更宜審訂，似難輕用，恐致夭枉。

玉燭散 治產後乳脉不行，身體壯熱，頭目昏痛，大便澁滯，

悉能治之，兼腸燥熱下乳。

人參　白茯苓　甘草各半兩　桔梗炒

川芎　白芷各壹兩　當歸壹分　芍藥[illegible]

右剉散，每服二錢，水一盞煎溫服。如煩熱甚，大便秘者

加大黃二錢。

逍遙散 治產後血虛發熱，或日熱潮身疼，頭重心忪，口乾。

方見前

知母湯 治產後乍寒乍熱，通身溫壯，心胸煩悶。

知母參兩　芍藥　黃芩各貳兩　桂心

甘草各壹兩

右剉散，以水五升煮取半，分三服。或不用桂，用生地黃。

增損四物湯 治因產勞傷血氣，蓋血屬陰，氣屬陽，血氣一

傷，陰陽不和，以致乍寒乍熱。

當歸　人參　芍藥　川芎

乾薑炮各壹兩　甘草[illegible]

右剉散，每服肆錢，水壹盞，生薑三片，煎柒分服，不拘時候。

[illegible] 治產後煩渴潮熱，枇杷葉去白毛、人參、麥門冬

二十粒去心，煎湯服。方見[illegible]

[illegible] 治產後血虛自汗，發熱寒熱，口渴微汗，服[illegible]

劑不得者宜服。方見[illegible]

竹葉防風湯 治產後傷風，發熱面赤，喘而頭痛。

淡竹葉半把　防風　人參　桂枝

苦梗　甘草各半兩　葛根壹兩半

右剉散，每服三錢，生薑三片，紅棗一枚，煎溫服，使汗出。

頸項強，用附子炮去皮臍，剉如豆大，抄一錢同煎。嘔加

半夏少許。

陽旦湯 治產後傷風，十數日不解，頭微痛，惡寒，時時有熱，

心下堅，乾嘔，汗出。

桂枝　芍藥各壹兩　甘草炙　黃芩各壹兩

右剉散，每服三錢，水壹盞，生薑三片，棗子一枚，煎，不拘

時候溫服。自汗多，加炮熟附子一枚；渴者去桂，加栝樓

一兩半；下痢去芍藥，加乾姜一兩半；心下悸去芍藥，加

茯苓一兩；虛勞裏熱者，正藥之外，煎時入少膠飴為佳。

若脉浮緊無汗發熱者勿與服

[illegible]治產後惡露方下忽然斷絕晝日明了暮則譫語如瘧寒熱往來如見鬼狀此由熱入血室不即治之（諸藥不愈）

北柴胡（[illegible]） 半夏（湯洗） 人參（各壹兩） 黄芩（各壹兩）

粉草（伍分） 生乾地黄（貳兩）

右剉散每服肆錢水一盞半生姜三片紅棗一枚煎服未效再服四物湯加北柴胡有痰加半夏

[illegible]治產後敗血結滯發為潮熱心胸如火煩燥口乾諸藥不效

大川烏（去皮） 南星 半夏 白附子（各等分）

羌活（去蘆） 黄芩（各伍錢）

方一　卅二

右生用剉散每服三錢生姜五片水一盞半煎服效

[illegible]治產後血虛惡露未消氣為敗濁凝滯榮衛不調陰陽相乘增寒發熱或自汗或腫滿皆氣血未正所致

大豆（炒去皮）半兩 茯神（壹兩） 真琥珀（壹分）

右為末濃煎烏豆紫蘇湯下喘急自滿小便不利者亦效

枳朮湯治心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作名曰氣分

枳實（麩炒去瓤）半兩 白朮（壹兩）

右㕮咀每服四錢水一盞半煎溫服腹中軟即當散也

[illegible]治產後虛腫喘促利小便則愈

生薑（取汁） 半夏（湯洗） 白麴

右用薑汁搜麴和半夏為餅子炙焦熟為末糊丸

一錢小便利為効

[illegible]治產後因驚敗血上干於心作見鬼神言語顛倒[illegible]臥起不安

沒藥（另研） 琥珀（另研） 桂心 赤芍藥

當歸（各一兩） 細辛（去葉） 麝香（半分）

右為末每服半匕加上龍腦少許生薑自然汁溫酒少許調服服後三藥亦效

[illegible]加朱砂酸棗仁湯下效（方見右）

[illegible]童便調服即醒（方見大方科中氣門）

[illegible]生乾地黄當歸湯調下效（方見大方科心恙方）

[illegible]治產後血虛肉理不密故多汗因遇風邪搏之則變痓口噤不開背強而直如發癇狀搖頭馬鳴身反折須臾十發氣息即絕宜速斡開口灌藥稍緩即汗出如雨手拭不及不可治宜加大川烏細辛防風嫩黄芪（[illegible]）

方一　卅八

大豆紫湯治產後百病或中風痱痓背強口噤直視煩熱

獨活一兩半 大豆半升 酒三升

右以酒先浸獨活煎一二沸別炒大豆極焦煙出急投酒中密封候冷去豆每服一二合許得少汗則愈日數十服此湯能去風消血結在妊娠折傷胎死腹中服此差

獨活寄生湯治產後[illegible]風[illegible]筋脉攣急腰背搖攣半身不遂或因勞役大早[illegible]入服之立愈

有痰間服[illegible]（[illegible]）

[illegible]散 治産後所下過多，虛極生風，唇青肉冷，汗出目瞑，命在須臾，切不可用正風藥，宜投此。

乳香　硫黄　五靈脂　太陰玄精石

陳皮　桑寄生　河膠　卷柏生，各等分

右將前四味同研勻，石器內微火炒，勿令焦了，再細研，後入餘藥為末，用生地黄汁圓梧子大，温酒或當歸酒下二十圓，食前服。

麻黄根散 治産後虛汗不止。

當歸　黄耆　麻黄根　牡蠣煅為粉

人參　粉草各等分，小方 [illegible]

右剉散，每服肆錢，水壹盞，煎，温服，不拘時候。

立效方 凡産後忽冒悶汗出，不識人者，暴虛故也。破雞子參枚，吞之便醒。若未醒，可與童子小便一升，甚驗。大小便亦得，切不得用藥人者。又若久不識人，或時復發者，此為有風，因産血氣暴虛，風行脉中故也。若産後去血多者，又增此疾，與雞子不醒者，可急作竹瀝汁一服五合，須臾不定，再與五合，頻與三五服，差。

[illegible]散 治産後虛弱，敗血停積，閉心竅，舌強不語。

人參　石菖蒲　生乾地黄　川芎各一兩

細辛一錢　防風　朱砂各半兩研

右為末，每服壹錢，薄荷湯調下，不以時服。

孤鳳散 治産後閉目不語，白礬末一錢，熱水調服。

[illegible]散 治産後中風，口噤，牙關緊急，手足瘈瘲。

舉卿古拜 即荊芥也

右焙為末，每服二大錢，酒調下，有神聖之功。或用荊芥加當歸，尤妙，煎服一盞，以湯半，病者其中先熏。

右淋大豆荊芥湯，角弓反張，以豆淋酒下，尤快。

交加散 治産後中風。

生地黄五兩研取汁　生薑五兩研取汁

右交互以汁浸滓一夕，次日各炒黄，漬盡為度，乾為末，酒調服。午日腹痛，酒下三錢。産後猶不可缺，女人榮衛不通，經脉不調，腹痛如擾，氣多血少，結聚為瘕，及血風口噤，項強頭痛，壯熱，連閉並皆治之，用少酒尤速。産后血暈血悶攻心，眼倒欲亡者，如上湯引服，以熱灌之，效。

趁痛散 治産後身體疼痛，不能轉側，手足不能動搖。

當歸　黄耆　牛膝　肉桂

白朮各半兩　甘草壹分　獨活貳分

右剉散，每服伍錢，水伍盞，煎濃作二服，或入薤白二莖，生薑三片。此謂産后百節開張，血脉流走，遇氣弱則經絡分肉之間血多留滯，累月不散，則骨節不利，筋脉急引，故腰背不能轉側，手足不能動搖，身弱頭痛。若以傷寒治之，則汗出而筋脉動搖，手足厥冷，變生他疾，服此可驅除之。

如神湯 加桃仁、木瓜煎，治産後餘血不盡，流入腰腳，疼痛

至甚者加味仙靈散方見前
固經達氣湯除大黃入竹瀝少許煎治血露不行以致斷
絡腰痛小腹如錐刀刺痛及膚或有堅赤腫處恐為癰疽
急服此散劑前大黃
潔古湯治產後胸膈滿悶嘔吐不定
赤芍藥 半夏 澤蘭葉 人參
陳皮各一錢 甘草壹錢
右剉散每服一劑用水一盞生薑焙乾半兩煎至半盞
分三服熱服
產後嘔逆不止方
橘紅壹兩 半夏麴 甘草各半兩 藿香炙一兩

右剉散每服貳錢水壹盞生薑三片煎不拘時溫服
產後口乾二方渴而飲水者五苓散不飲水者理中湯虛
冷者加附子服後用亦效方見大方科傷暑及泄瀉嘔吐門
芎附散治產後敗血作梗頭痛諸藥不效者
大附子壹枚釅醋壹碗用火煅通淬醋令盡去皮
臍川芎壹兩同為末每服二錢茶清調下虛人最效
川芎茶調散治產後虛熱頭痛方見大方科頭痛類
芎烏散治產後挾氣頭痛不可忍
右用大川芎天台烏藥皮為末秤錘燒淬酒調下
二母散治產後惡露上攻流入於肺經咳嗽宜服如傷風
痰嗽者以參常傷風嗽門治之

知母 貝母 白茯苓 人參各半兩
桃仁 杏仁各生去皮尖各壹兩
右剉散每服三錢水一盞半煎不以時溫服如心腹痛
併服之尤有神效
旋覆花湯治產後血風感寒暑濕喘滿痰涎壅盛咳嗽坐
臥不寧
旋覆花 赤芍藥 前胡 半夏麴
荊芥穗 五味子 茯苓 甘草炙
麻黃 杏仁各等分
右剉散每服四錢薑五片棗一枚煎食前服
小參蘇飲治產後血入於肺面黑發喘欲死名孤陽絕陰

人參壹兩為末 蘇木壹兩
右用水兩碗煮取一碗去渣調參末服隨病加減服
大調經散治產後腫滿喘急煩渴小便不利方見
治產後血乾痞悶心煩去地黃加人參當歸方見
黃芪散治產後虛勞淋瀝不絕心腸短氣四肢乏弱不思
飲食頭目昏重五心煩熱面黃無力
牡蠣 川芎 熟地黃 白茯苓
龍骨各壹兩 續斷 當歸 艾葉
人參 五味子 地榆各半兩 甘草炙
右剉散每服二錢生薑三片棗一枚煎食前溫服
延胡索散治產後臍下痛名兒枕痛不可忍此神藥也

延胡索　桂心各半兩　當歸壹兩

右爲末，每服貳錢，熱酒調下，或用童便溫煖調尤佳。

失笑散　五靈脂、蒲黃炒爲末，溫酒服貳錢。

紫金丸　治産後惡露不快，腰痛，小腹如刺，時作寒熱，頭痛，不思飲食，又治久有瘀血，月水不調，黃瘦不思飲食，又有杀治之。

五靈脂水淘去石焙　真蒲黃末

右以好米醋調五靈脂末，慢火熬成膏，子次以蒲黃末搜和，丸如櫻桃大，每服一丸，水與童便各半盞，煎令化，溫服，少頃再一服，惡露即下。久有瘀血成塊，月信不利者，並用酒磨下。又治心腹痛欲死，百藥不效。

羊肉湯　治産後及産婦腹中痛，虛眩不能支持，兩脇當脹，氣上衝，前後相引痛，治之如神。

精羊肉肆兩　當歸　川芎各半兩　生薑壹兩

右剉散，以水拾盞煎叁盞，掠去沫，去滓，分四服，空心熱服，一日夜日再作，兩日滓合爲一日煎，當一劑服。

經效方　療産後血氣脇肋脹滿。

當歸捌錢　芍藥　苦梗　檳榔

枳殼各肆錢　桂心　青木香　柴胡各叁錢

右剉散，水二升煎取八合，空心分溫二服。

人參當歸散　治産後陰虛生內熱，煩悶不安。

人參　當歸去蘆　麥門冬去心　乾地黃

桂心各壹兩　白芍藥貳兩

右剉散，每服四錢，水二盞，先將粳米一合，淡竹葉十片，煎至一盞，去米、葉，入藥并棗三枚，煎，食前服。地黃用生，乾者虛甚則用熟者。

蒲黃散　治産後虛煩必效。

蒲黃不以多少，紙上炒，每一錢，東流水調，不拘時服。

熟地黃湯　治産後虛渴不止，少氣腳弱，眼昏頭眩，飲食無味。

熟乾地黃酒浸　人參各叁兩　麥門冬去心貳兩　栝樓根肆兩

甘草半兩

右剉散，每服四錢，水二盞，糯米一撮，生薑三片，棗三枚，煎，食前服。

[illegible]　血渴，方見前。

[illegible]　治産後瘧疾，寒熱相半者，或多熱者。

半夏湯洗　赤茯苓　草果去皮　甘草

川芎　陳皮　白芷各半兩　青皮去白

良薑　紫蘇各叁分　乾葛肆分

右剉散，每服三錢，生薑三片，棗二枚，水一盞半，煎，當發日早連進三服，無不安者。

[illegible]　治産後瘧疾多寒者。

肉豆蔻　草果仁　厚朴生　半夏

陳皮　甘草　大棗去核　生薑各等分

右剉散和勻，一半生，一半以濕紙裹煨令香熟，去紙，與生者和勻，每服伍錢，水二盞，煎，食前一服，食後一服。

石子湯治產后虛羸喘乏乍寒乍熱如瘧四肢疼痛面色
痿黃名蓐勞

猪腎壹雙去脂膜四破　香豉或無用知母　葱白
粳米　當歸　芍藥各貳兩

右剉散分作兩劑用水三升煮取一升去滓分三服或用
人參無芍藥

人參鱉甲散治產後蓐勞皆由在產內未滿百日體中虛
損血氣尚弱失於將理或勞動作傷致成蓐勞其狀虛羸
乍起乍臥飲食不消時有咳嗽頭目昏痛發歇無常夜有
盜汗寒熱如瘧背膊拘急沉重在牀服此大效

人參　桂心　桑寄生　當歸去尾　細剉
白茯苓　白芍藥　桃仁去皮尖　熟地黃洗焙
麥門冬去心　甘草各半兩　續斷壹分　牛膝各壹分
鱉甲炙　黃耆各壹兩

右為末每服先以猪腎一對去脂膜用水二大盞生薑半兩棗三枚煎至一盞去猪腎生薑棗入藥末二錢葱三寸烏梅一箇荊芥五穗煎空心晚食前溫服神妙

人參散治產後虛羸脾胃乏弱四肢無力全不思飲食心
腹脹滿

黃耆　人參　草菓仁　厚朴
附子各壹兩　白朮　當歸　白茯苓
木香　川芎　桂心　甘草

陳皮去白　良薑　訶藜勒皮各半兩

右剉散每服肆錢生薑叁片棗壹枚煎不以時溫服

黃耆散治產後風虛勞損羸瘦不思飲食四肢疼痛

黃耆　白朮　木香　羚羊角屑
人參　當歸去尾　桂心　白芍藥
川芎　白茯苓各半兩　甘草壹分

右剉散每服四錢生薑三片紅棗貳枚煎不以時溫服

小調經散產後性理變發喘急桑白皮杏仁煎湯調下見前

丁香散治產後心煩咳逆不止

丁香　白豆蔻仁各半兩　伏龍肝壹兩

右為末煎桃仁吳茱萸湯調下壹錢如人行五里再服

石蓮散治咳逆嘔吐心忪目暈不思飲食

石蓮肉兩半炒　白茯苓壹兩　丁香半兩

右為末每服叁錢米飲調不以時服

固經圓治產後血崩不止或因飲食酸鹹物過度

艾葉　赤石脂煅　補骨脂
木賊各半兩　附子壹箇炮

右為末陳米飲圓梧子大食前溫酒下二十圓米飲
可蓋此證非輕病乃產后有此是錯重傷恐不止鹹酸
不節而致多因驚憂恚怒臟氣不平或產后服斷血藥
太早致惡血不消鬱滿作堅亦成崩中此藥自難責效
不若大料煮芎藭湯加芍藥候定續次隨證諸藥治之

餘疾消穀嗜食兼治産後臟虛嘔吐不止
甘草貳兩炙　人參　白术　乾薑炮各壹兩
右為末煉蜜圓梧桐子大每服二十圓空心溫米飲下
當歸建中湯治産後勞傷虛羸不足腹中㽲痛吸吸少氣
小腹拘急痛連腰背時自汗出不思飲食産訖直至滿月
每日三服令人丁壯強健
當歸肆兩　桂心叁兩　白芍藥陸兩　甘草貳兩炙
右剉散每服四大錢生薑三片棗子二枚水一盞半煎
去滓入飴糖一塊再煎消服崩傷内衄加阿膠地黄
濟陰丹治産後百病百日内常服除宿血生新血令人有
子充實亦治男子吐血諸疾
木香炮　茯苓　京墨燒　桃仁去皮尖炒各壹兩
秦艽　甘草炙　人參　桔梗炒
石斛酒浸　蠶布燒　藁本各貳兩　當歸
桂心　乾薑炮　細辛　牡丹皮
川芎各兩半　川椒炒　山藥各叁分　澤蘭
熟地黄　香附子各肆兩炒　蒼术捌兩　大豆卷炒半升
糯米炒壹升
右為末煉蜜圓每兩作六圓嚼細食前溫酒醋湯任下
人參養血圓治女人禀受怯弱血氣虛損常服補衝任調
血脉宣壅破積退邪熱除寒痺緩中下堅脹安神潤顏色
通氣散悶兼治婦人懷身腹中絞痛口乾不食崩傷眩暈

嚼一作[illegible]

臥盆内乘熱熏候通手淋洗如冷傾入五升瓶内再煎
一沸依前用一服可作五度用洗了暖少時忌鹽藏鮓
醬濕麪發風毒物及用心力房勞等事
又方枳殼去穰貳兩煎湯溫浸良久
又方老鴉蒜草金星草煎湯用草不開孔縫熏可收一半
稍溫下手洗並收入而安
[illegible]
當歸養血圓治産後惡血不散發渴疼痛及惡露不快
腹堅脹兼室女經候不勻赤白帶下心腹腰脚疼痛
當歸　赤芍藥　牡丹皮　延胡索炒各貳兩
桂心壹兩
右為末煉蜜圓梧桐子大溫酒米飲任下三五圓食前
服痛甚細嚼嚥下
血神散治産後留血不消積聚作塊急切疼痛猶如遁尸
及心腹絞痛下利
當歸　芍藥　川芎　乾薑炮各等分
右為末每服二錢溫酒調下
當歸黃耆湯治産後腰脚疼痛不可轉側自汗壯熱身體
強氣短
黃耆　芍藥各貳兩　當歸叁兩
右剉散每服四大錢水一盞半生薑五片煎七合食前溫服
四順理中圓治新産血氣俱傷五臟暴虛肢體羸乏少氣
多汗纔産直至百晬每日常服壯氣補虛調養臟氣蠲除

生姜不禁加龍骨、
蒲黄散治產後大小便不利下無血、
車前子　黄芩　蒲黄　生地黄
牡蠣　芍藥各等分
右為末、空心米飲服方寸匕、忌麪蒜、
當歸散治陰下脫
當歸　黄芩各壹兩　芍藥壹分半兩　牡蠣煆壹兩
蝟皮燒存性貳分半、
右為末、每服二錢、溫酒或米飲調下、忌登高舉重、
硫黄散治產後勞陰脫
硫黄　烏賊魚骨各半兩　五味子壹分
右為末、搽患處
熨法蛇床子炒、末熱布裹熨患處、如亦治產後陰痛、
桃仁膏治產後陰腫妨悶
桃仁去皮尖研膏、枯礬末　五倍子各等分
右以末藥桃仁膏拌勻傅之
硫黄湯治產勞玉門開而不閉
硫黄四兩　吳茱萸　兔絲子各壹兩半　蛇床子
右剉散、每服四大錢、水一椀煎數沸、去滓洗玉門、日每洗
檉枝散治產後子腸下出不能收者、年深者皆治之
檉枝剉皮焙乾壹兩
一兩一本作壹錢
右用水伍升、連根葱五莖、漢椒一撮、煎至三升、去滓傾

又方四物湯去熟地黄、用生地黄、加青皮去穣、煎服效、
蘇麻粥治產後有三種疾、鬱冒則多汗、汗則大便秘、難於
用藥、惟此方效、方見大方科秘結類、
木通散治產後小便不通、
木通　大麻仁　葵子　滑石
檳榔　枳實、　甘草各半兩
右剉散、每服三錢、水一盞半、煎溫服、不拘時候、
灸法治產後小便不通、腹脹如鼓、悶亂不醒、緣未產之前、
內積冷氣、遂致產時尿胞運動不順、用鹽於產婦臍中
填可與臍平、却用葱白剝去粗皮拾餘根、作一束、切作
一指厚、安鹽上、用大艾炷滿葱餅子大小、以火灸之、覺
熱氣直入腹內、即時便通、神驗不可具述、
茅根湯治產後諸淋、無問冷熱、膏石氣結、悉主之
白茅根壹斤　瞿麥穗　白茯苓各貳兩　葵子
人參各壹兩　蒲黄、　桃膠　滑石
甘草各半兩　紫貝五箇燒　石首魚頭中石拾箇燒、
右剉散、每服肆大錢、生姜三片、燈心二十莖、煎溫服、或
為末、木通煎湯調下二錢、如氣壅、木通橘皮煎湯調下、
桑螵蛸散治產後小便數及遺尿
桑螵蛸拾個蒸炒　鹿茸酥炙　黄芪各壹兩半　牡蠣炒
人參去蘆　厚朴去粗皮薑汁炒　赤石脂各壹兩
右為末、空心粥飲調下二錢、一方無厚朴石脂有甘草

為得小腹滿痛肝經已壞難治（方大須散除去仁用醋）
加味五積散治產後因食動傷腹痛至甚水穀不化瀉泄（方附子或姜分入）
腸鳴除麻黃加高良薑熟綿附生薑烏梅紅棗煎（方見後）
四君子湯治產後腹微痛泄瀉不止烏梅陳米煎湯調服
方見小方科通治類
的奇散治產後泄瀉惡露不行此餘血滲入大腸為瀉分
過則穢濁泄瀉下瀉臭色物亦驗
大荊芥四五穗於盞內然火燒成灰不得犯油火入麝
香少許研沸湯一二呷調下此藥雖微能愈大病勿忽
黃連阿膠圓治產後熱證下痢赤白煩渴發熱小腑不利
每服三十圓陳米烏梅湯下（方見大方科咳嗽類）

理中湯治產後虛證下痢純白腹痛裏急後重手足冷加
木香煨肉豆蔻每服三錢陳米鹽烏梅煎空心服（方見大方科泄瀉類）
真人養臟湯治產後虛弱冷熱不調下痢赤白或有膿血裏
急後重臍腹疼痛日夜無度宜服（方見大方科泄瀉類）
阿膠枳殼圓治產後水血俱下腸胃虛竭津液不足大便
秘澀

阿膠（炒粉別）　枳殼（各等分）

右為末煉蜜圓梧桐子大別研滑石為衣溫水下二十
圓半日未通再服又一方蜜兌法（見大方科秘結類）
又方用葱涎調好茶為圓復以茶吞下必通或用葱白十
數莖煎點茶連葱嚼服神効不動真氣

及產出見羸瘦不復常者

人參　赤芍藥　川芎　菖蒲（炒，各壹兩）
當歸（貳兩）　熟地黃（伍兩）　烏梅肉（叁兩）

右為末蜜糊杵數千下圓如梧子大每服五拾圓至一
百圓溫酒或米湯下食前服
單方治產婦腹脹痛不可忍者取楸根為飲一服愈
提經方治用毒藥攻胎藥毒衝心外證牙關緊急口不能
言兩手強直握拳頭低自汗身微熱外證與中風相似
但其脉浮而軟十死一生醫多不識若作中風治之必
死無疑用白扁豆二兩生為末新汲水調下即效
內灸散治婦人產前產後一切血疾血崩虛損憊臍腹疼痛
氣逆嘔吐冷血冷氣凝積塊硬刺痛泄下青白或下五色
腹中虛鳴氣滿堅脹瀝血腰疼口吐青水頻產血衰顏色
青黃背傷力弱月經不調下血墮胎血迷血運血瘕時發
疼痛頭目眩暈惡心上心悶絕昏迷惡露不乾體虛多汗
手足逆冷並宜服之

藿香葉　丁香皮　熟乾地黃（洗焙）　肉桂（去粗皮，各壹兩半）
甘草（炙赤）　山藥　當歸（洗去蘆）　白朮
白芷（各捌兩）　藁本（去蘆）　乾薑（炮）　川芎
黃耆（去蘆，各）　木香（壹兩）　陳皮（去白，肆兩）　白芍藥（拾兩）
茴香（貳兩半）

右剉散每服三錢水一大盞入生薑五片艾一圓同煎

至七分，空心食前熱服。為末，溫酒調下亦得。如產後下
血過多，加蒲黃煎服。惡露不快，加當歸、紅花煎服。泄瀉
加肉豆蔻末煎服。嘔吐加藿香、生薑煎。上熱下冷，加制
香附。但是腹中虛冷，血氣不和，並宜服。產後每日一服，
則百病不生。丈夫虛冷氣刺心腹疼痛，尤宜服之。

●下乳汁

麥門冬散 麥門冬不拘多少，去心，焙，為末。酒磨犀角約
一錢許，調麥門冬末二錢，溫酒調下。適二服便下，不以時候。

涌泉散 治乳婦氣脈壅塞，乳汁不行，及經絡凝滯，乳內脹
痛，留蓄邪毒，或作癰腫。服此自然內消，乳汁通行。
漏蘆二兩半 蛇蛻十條，燒灰 瓜蔞十個，急火燒存性
右為末，每服二錢，溫酒調，不以時服，仍吃熱羹湯助之。

鍾乳散 治乳婦氣少血衰，脈澀不行，乳汁絕少。
右一味研細，每服二錢，濃煎漏蘆湯調下。

豬蹄湯 治如前。
母豬蹄一隻，治如食法 通草四兩
右以水一斗浸煮，得四五升，取汁飲。不下，更作。
梳頭木梳，於乳上梳下，效。

又方 治乳硬作痛
嫩桑葉生採，研細，米飲調，攤紙花貼病處。此證四十已
下可治，五十以上不可治。治之則死，不治則自得終其天年。

大全婦人 二十 得效婦人方卷之十四

新編大全婦人良方卷二

產科兼婦人雜病科

通治

四物湯 隨證加味，正劑單入
當歸 川芎 熟地黃酒洒蒸 白芍藥各等分
右剉散，每服四錢，水一盞半，煎至七分，去滓，食前熱服。
為末服亦可。若平常血氣不調及常服，只用本方，春加
當歸，夏加芍藥，秋加川芎，冬加地黃，各一兩半，日二三
服。○姙婦傷寒生寒，面青不思飲食，憔悴，陳皮、枳殼、白
术、茯苓、升麻。○產后服血藥心悶，地骨皮、芍藥。○翻熱，黃
芩、地骨皮、柴胡。○咳嗽，桑白皮、半夏、生薑、人參、甘草、
五味子、地骨皮。○損孕下血不止，頭痛寒熱，耳鳴，氣血
勞傷所致，黃芩、荊芥、生地黃、生薑、赤芍藥。○虛寒潮熱，
柴胡、地骨皮、白术、茯苓、甘草、秦艽、知母、黃芩、麥門冬、貝母、
人參、烏梅、棗子。○心腹脹滿，枳殼、青皮。○虛汗，麻黃根、
○產后潮熱，白术、北柴胡、牡丹皮、地骨皮。有熱，黃芩、
汗加浮麥。○腸風下血，枳實、槐花、枳殼、荊芥、黃芩、大腹
皮、紅內消、地榆、石楠皮、白鷄冠花，為散服，二十，為末，空
心鹽湯調下。○崩中，紅花、香蒲、炒蒲黃、半夏、丁
香、訶子、桂花、紅棗、艾葉、白芍根、蚌粉。○赤痢，黃連、阿膠、
殺子、紅內消、白芷、荊芥、牛膝、山梔、丹參、香附、茯苓、澤瀉

薑生地黄。○血風兩脇築疼或盤腸成塊大黄草撥乳
香。○胎動漏下不止當歸側柏阿膠甘草續斷平常經
血淋瀝不斷或多或少或赤或白非時漏下可多服有
效。○月水不通野苧根牛膝紅花蘇木當歸酒水同煎
○臨産小腹緊痛紅花滑石甘草燈心葵子。○閉經枳殼
大黄荊芥黄芩青皮滑石木通瞿麥海金沙山梔子車
前子。○安胎及胎漏下血阿膠大艾甘草蒲黄炒過
○産后腹痛血塊攻腸大艾没藥好酒。○産后病眼北細
辛荊芥羌活甘草菊花木賊石决明草决明。○女人赤
眼頭風疾川芎清茶。○赤眼生風防風黄芩。○産后浮
腫氣急腹大喉中水雞聲牡丹皮荊芥白术桑白皮赤
小豆大腹皮杏仁半夏馬兜鈴生薑葱白湯吞。○月水
不調血氣或多少或前后嘔逆心煩陳艾黄芪。○血弱
生風四肢痒疼行步艱難乳香人参没藥麝香甘草五
靈脂羌活獨活防風荊芥地龍南星白附子澤蘭烏藥
蒼术木瓜鹽湯下。○血氣腹脹甘草木香枳殼馬兜鈴
葶藶紫蘇藿香地黄空心服。○補血住崩百草霜敗棕
灰艾絹灰蒲黄炒過龍骨白礬。血成片地黄鵝翅。
黑血片人参白术。○白血片龍骨。○青黄木瓜。○五色
生麝香好酒。○鮮紅溫酒枳湯。○風痛赤眼荊芥牛蒡
子何首烏甘草防風羌活地黄鹽酒。○帶下肉桂蒲黄
百草霜甘草黑豆白术玄胡索白薑龍骨空心鹽酒。

血寒甘草烏梅柴胡桃柳枝。○感風勞嗽款花知母阿
膠半夏麻黄甘草馬兜鈴黄芩杏仁柴胡薑錢訶子烏
梅。○月經久閉肉桂甘草黄芪薑錢棗子木通紅花
○大便下血四肢寒熱腹脹乃腸胃有風槐花枳殼漏蘆荊
芥木香白雞冠花木通紅內消紫草石榴皮陳皮黄芩
青皮甘草白芍槐角。○霍亂人参川芎白芷蒲黄炒
阿膠白术茱萸續斷乾薑附子肉桂黄芪赤石脂甘
草蜜圓鹽梅湯下。○白帶用龍骨酒。○胎前産后腹
風乳香龍骨茱萸木香肉桂蒼术牡丹皮白薇人参甘
草澤蘭大椒茴香煉蜜爲圓木瓜酒下亦治帶下。○赤
白痢陳米飲。○心腹脹炒薑酒。○血氣艾醋湯。○渾身
勞倦爲末炒鹽酒陳青蒿鹽和調下。○虚證四肢寒甘
草牡丹皮澤蘭白薇蒼术桂心茴香蜜圓鹽湯溫酒下。
○嘔逆飲食不入加白术丁香甘草人参縮砂益智仁胡
椒。○經行腹痛腰背痛芸薹牛膝紅花吳茱萸當歸甘
草銀器燈心熟服。○虚渴人参乾葛烏梅瓜蔞根。○受
胎小腸氣痛木香銀器。○胎前嗽枳殼甘草款花知母
馬兜鈴半夏木通葶藶人参苦梗麥門冬。○腳腫大腹
皮赤小豆茯苓皮生薑皮。○産后不語失音訶子人参
砂蜜百藥煎。○陰陽交合經脈行亦石脂黄芩肉桂百
草霜敗棕灰肉豆蔻當歸木香龍骨白术茯苓地榆藕
節。○胎氣衝月服腳痒行步艱難枳殼甘草木通連翹

荆芥地黄羌活獨活山梔子灯心空心服。○氣楽小腹痛，玄胡索煎效。常服加茱萸，陽臟少使，陰臟多用

莪朮散

當歸去蘆 川芎 莪朮炮 甘草

揚芍藥 熟地黄生 茴香 白芷

右為末，每服二錢，鹽酒調下。月經不調，鍼器灯心。安胎，貧者生地黄。補虚調氣，生薑紅棗。遍身虚腫，當歸酒。小便不通，滑石末。心虚發狂，朱砂研調。敗血衝心，腹痛如刀刺，燒秤錘紅焠酒，不退，五靈脂酒。血閉身疼，炒薑酒。吐酸水，丁香七粒煎湯。血風上攻，服目浮腫，荆芥。小腹痛，木瓜。○渾身浮腫，烏豆湯或葱湯。胃惡，藿香。頭面腫，赤豆荆芥湯。下血不止，木香湯。冷嗽，桑白皮乾柿。頭痛，川芎細辛。血風熱潮，生薑紅棗。虚汗，麻黄根。吐不止，陳青高。血風腰疼，芸薹子搥碎。女人血結不通，手發攣急不知人事，齊茶一捏，順流水挪汁。手足痺，柳根浸酒。血海虚冷，大艾。腹脹不消，芝麻一合炒薑酒。月水不通，當歸浸酒。女人血氣成塊築心，梔子灯心。血崩赤白帶，真龍骨末，好紅酒調。血風中心，狂言亂語，渾身壯熱，桃柳枝七寸。血刺成塊不散，蓬莪蒁。如人痴氣膈，氣炒茴香酒。婦人不問虚熱傷風，血氣潮熱增寒，一切百病並皆服，隨證湯引投之，服以此藥調理，無不應驗。冷嗽，術紅。心躁，術酎酒。催生，順流水滑石為餘，根榆白皮，坏子乳香葵子，酸漿草汁煎湯或黄柿汞墮下者。胎衣不下，并加莪朮地黄竹青。行血養陰，生地黄，紅花，蘇木，陳艾，減揚芍藥，加赤芍藥補

加味五積散

厚朴薑汁炒 半夏泡 楊芍藥 枳殻十二錢炒

木香 肉桂各壹兩 陳皮 白薑壹兩三錢

蒼朮八兩米泔浸 桔梗 香附子炒去毛 茴香炒

粉草 人參去芦 茯苓去皮 川芎

當歸去尾 川白芷各半兩

右剉散，生薑木瓜入鹽煎服。陰證傷寒，生薑附子。血脈不勻，紫蘇。氣嗽，烏梅姜錢。勻，鉫棗子姜錢。補益血泊，蘇鹽。産后，生姜陳皮炒陳艾。胃冷不納食，陳皮霜秋。赤白帶，陳米。冷氣疾，木香茱萸。心躁背筋急，頭暈腰脚疼，生乾地黄當歸。脾虚，蘇葉粉粉。月中被驚，或因爭鬧，心頭結塊，五膈五噎，茴香棗子。口苦舌乾，吞酸噯氣，此為胃冷，生薑鹽。腰痛，桃仁木瓜杜仲川續斷。身疼，秦艽。諸虚，脾胃不和，羸瘦冷氣，蜀鹽。冷瀉，炒通生姜烏梅肉豆蔻陳米。

四物湯 治産前産後腹痛，體熱頭疼，及諸疾，繼孝未進別藥，即先服此，能除諸疾，逐敗血，生新血。

川芎一兩 川當歸二兩

右剉散每服三錢水一盞酒二分煎溫服爲末亦可
臨產先安排兩服煎產了速進之三日內日二服三日
外日一服、諸證失血傷胎去血產后去血崩中去血
金瘡去血拔牙去血不止及一切去血過多心煩眩暈
悶絕不省人事頭重目暗舉頭欲倒悉治若產后眩暈
宜加揚芍藥、產后腹疼不可忍者加桂心酒與童子
小便合煎並效、臨月服之則縮胎易產兼治產后諸
疾、瘦揃羸之腹中疞痛往來寒熱咳吸少氣不能支
持頭眩自汗腹內拘急每服用精羊肉壹兩薑十片水
二盞煎溫服、婦人室女心腹疞痛經脉不勻水煎、
妊婦胎氣不安產後諸疾酒煎、婦人血氣上喘下腫
等分爲末二錢空心煎艾湯服、產后及墮娠敗血衝
心腹脹氣絕者神效、難生倒橫子死腹中先用黑豆
一大合炒熟水一盞入童子小便一盞藥四錢煎至一
盞以上分爲二服未效再作、產后惡血注心迷悶喘
急腹痛依前用黑豆加生薑自然汁半合煎服、兼治
臟毒每服一錢半入炒槐花半盞水一盞煎不以時服
三丁瓜下血塊即愈、產后頭痛荆芥、吐血亦宜服

[illegible]大圓 隨證加減

當歸去尾　蒼术切炒　肉桂　防風
川芎　人參　白芍藥　白薇
熟地黃酒炒　牡丹皮　茴香　白术
白茯苓　桔梗　附子炮　澤蘭去各等分

右爲末蜜圓每服一圓、血崩經脉不勻赤白帶下炒
當歸酒下、血風癮疹瘙痒酒苛蜜湯、冷氣塊築心
腹嘔逆反胃炒鹽湯下、腸風瀉痢赤白痢月信不止
米飲下、血風勞倦胃當歸酒、頭疼服花荆芥茶下
月信不行篸夕紅脉不通產後諸風中風不語迷悶五
調紅花蘇木湯、胎漏下血氣刺心腹脹滿炒薑酒下

白薇散 隨證加減用湯引

白薇去土　川芎　熟地黃酒炒　桂心
牡丹皮去骨　甘草　當歸去尾　澤蘭葉
蒼术切炒　芍藥各等分

右爲末每服三錢、氣刺心疼痛艾醋澤蘭湯、頭痛
心燥米泔米飲、氣塞生薑湯、頭痛荆芥湯、胎前
潮熱氣急心悶生地黃燈心、產后腹脇吐逆藿香胡
椒、胎氣不安陳艾、下血不止糯米地榆陳艾、產
后血刺脇痛艾醋湯、小腹疼地黃薑汁好酒、產後
腰腿疼骨節痛木瓜白膠香沒藥好酒、月經不勻百
草霜溫酒若過多藕節酒煎又用陳艾阿膠、月水不
通杜牛膝野苧根蘇木紅花酒下、赤白帶心燥
腰痛沒藥、白帶黃芩切和鹽炒酒浸喫十服、胎衣
不下順流水酸車草、產后血氣當歸鹽炒好酒、產
后勞嗽糯米桑白皮、熱嗽生地黃芭蕉水、產前產

后潮熱，桃柳枝。臨產小腹緊痛，茶白皮葛根立便滑生。產前產后臟腑結秘，枳殼。丁血地榆。心神亂，銀器。大小便秘，麻仁蘇子。血風腳膝腫痛寒熱，生薑黃水柳根。血崩，竹青藕節霜梅。熱吐紅，山梔子竹青藕節。妳癰，蔓荊子酒煎調。

大烏雞圓 治胎前產後諸般疾患，並皆治之。

烏雄雞　烏藥五錢　海桐皮壹兩　草果弍錢半
石斛五錢　肉桂去皮壹兩　熟乾地黃洗焙弍錢半
人參去芦　白术各半兩　附子去皮臍壹兩　木香弍錢半
黃耆　牡丹皮各半　白芍藥　蓬莪茂
川烏炮　陳皮　紅花各壹兩　玄胡索
肉豆寇各弍錢半　蒼术米泔浸切焙各弍錢半　琥珀弍錢半

右剉散，用烏雄雞壹隻，湯挦去毛及腸肚，將藥安置肚中，用新瓷瓶好酒一斗同煮，令乾，去雞骨，以油單盛焙乾為末，煉蜜圓梧桐子大。每服三十圓。胎前產后傷寒，蜜糖酒服。胎前氣悶壯熱，炒薑酒。赤白帶下，生地黃煮酒。產后敗血攻心，童子小便炒薑酒。產后血塊築痛，玄胡索酒。胎前嘔逆，薑湯。催生，炒蜀葵子研入酒。安胎，鹽酒。室女紅脉當通不通，四肢疼痛，煎紅花研入酒。血氣攻刺，心腹疼痛，煎當歸酒。血暈，棕櫚燒灰入酒。血邪，研朱砂麝香入酒。血悶，煎烏梅湯入朱砂末。子宮久冷，溫酒或棗湯，空腹日一服。血風勞，人參酒。小便疼痛，炒茴香食鹽入酒。血散四肢，遍身虛浮黃腫，赤小豆研細入酒。常服，溫酒醋湯，並空心吞服。

大效內補圓 治產後虛羸，勞傷血過多，虛竭少氣，臍腹拘急痛，引腰背，面白脫色，嗜臥不眠，唇口乾燥，心忪煩倦，手足寒熱，頭重目眩，不思飲食，或勞傷衝任，內積風冷，崩中漏下，淋瀝不斷，及月水將行，腰腿重疼，臍腹急痛，及治男子婦人從高墜下，內有瘀血，吐血下血等病。

熟乾地黃二兩洗焙　真蒲黃炒各弍分半
阿膠搗碎蚌粉炒如珠　當歸去蘆酒浸焙　川續斷去蘆
乾薑炮　甘草炙　芎藭各壹兩　附子炮去皮臍
白芷　白术各叁兩　肉桂去粗皮　白芍藥各一兩
吳茱萸湯洗焙　茯苓炒各叁兩

右為末，煉蜜圓如梧桐子大。每服二十圓，食前溫酒下，漸加至五十圓。一方加杜仲、鹿茸、肉蓯蓉、北五味子。

大[illegible]散 治榮衛不調，血氣虛弱，面色痿黃，四肢無力，手足倦怠，盜汗併出，皮肉枯瘁，以漸羸瘦，飲食不進，日漸[illegible]，病后不能調理，變成[illegible]，用之神效。

木香　丁香　丁皮各叁錢　巴戟去心
紫蘇葉　白茯苓　蒼术炒　肉豆寇煨
附子炮去皮臍各五錢　沉香各叁錢　桔梗去蘆　甘草
茴香炒　山藥　白豆蔻仁　扁豆炒各四錢

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片紅棗煎溫服
上溺加黑豆炒止瀉加罌粟殼蜜炒

勝金丹 治月水過少不通久無嗣息血癖氣痛四肢浮腫嘔逆心疼虛煩勞悶面色萎黃崩漏帶下寒熱蒸煩頭疼齒痛血下無度淋瀝諸疾産前安胎臨産催生産后胎結疼痛傷寒煩渴泄瀉血運血勞筋攣痰盛頭疼敗血上衝血刺泄瀉咳嗽喘急咯血血塊起伏氣痞氣膈血滯腰痛小便不禁子死腹中傷寒汗不出血風腳手痺頑凡産后諸疾皆治之

牡丹皮去骨　川藁本　人參去蘆　川當歸去蘆
白茯苓　赤石脂　香白芷　交趾桂去皮

婦方二　八十

白薇去土　川芎　玄胡索　白芍藥
白朮米泔浸各一兩　甘草炙　沉香不見火

右件並用溫水洗淨曬乾搗羅為末煉蜜圓如彈子大每服一圓空心溫酒下凡妊娠臨月服此五六圓即易産如久無子息服二十圓當月有子并治積年血風半身不遂種種血疾不問年深日久皆療神效

大聖散 治血海虛冷久無子息及産後敗血衝心中風口噤子死腹中擘開口灌藥須臾生下便得無恙并治墮胎腹中攻刺疼痛橫生逆産胎衣不下血運血癖血滯血崩血入四肢應血臟有患及諸種風氣傷寒吐逆咳嗽寒熱往來遍身生瘡頭痛惡心經脈不調赤白帶下乳生惡氣胎臟虛冷數曾墮胎崩中不定因此成疾及室女經脈不通並宜服之常服暖子宮和血氣悅顏色退風冷消除萬病丈夫五勞七傷虛損一切疾病亦治之

一本臟作[illegible]

澤蘭葉　石膏研　白茯苓去皮　卷柏去根
柏子仁炒　防風去蘆　厚朴去粗皮姜汁炙　細辛去苗
人參去蘆　藁本去苗　乾薑炮　五味子
白芷　川椒去目及閉口者炒出汗　白朮各叁分
當歸去蘆　蕪荑炒　甘草炙　川芎各壹兩
生乾地黃壹兩半　官桂去皮各壹兩壹分　黃耆去苗各叁分
芍藥壹兩　白薇半兩　桔梗去蘆半兩　川烏炮各叁分
阿膠半兩　丹參各叁分　吳茱萸湯洗七次焙炒各壹兩

婦方二　八十一

右為末每服二錢空心熱酒調服若急有患不拘時候日三服

[illegible] 治經病及産後腹痛腹滿喘悶癥瘕癖塊一切心腹暴痛

甘草壹兩　桔梗　黃芩　大黃各半兩
當歸去尾　三稜　莪朮煨　官桂去粗皮
玄胡索　赤芍藥　厚朴　木香
檳榔　川楝子各[illegible]錢半

右剉散每服三錢水一盞煎熟服食前日三服惡物過多去大黃官桂加入黃藥子枳子龍骨各半兩或平人心脾急痛腹得利乃效后常服亦可

〔劉寄奴〕若睡後忽一點炎起，從發遍身亦痛，諸藥不效，用艾
炷如小指頭大，以水透濕紙，約五六重，覆其手痛處，
又用新水於頭上安放濕紙上，對捻痛處，却將艾炷於木
匙上，炙其發艾之人默念　大慈大悲救苦救難觀世
音菩薩摩訶薩，不燒三七遍，須臾諸痛悉除，所炙處亦
有膿水出，生痂，痂脫而後愈。

感冒

〔麻黃〕發散　四時傷寒，潮熱頭痛，時疫。
前胡　柴胡 各大毛　石膏　蒼朮 不判炒
藁本　赤芍藥　白芷　芎
乾葛　升麻 各五錢　麻黃 各二錢

右剉散，每服四錢，生薑三片，連鬚葱二根，煎，不拘時服。
春加黃芩　夏用正方　秋加麻黃　冬加豆豉。

〔解肌湯〕治勞傷躰熱，鼻血疾退熱。
柴胡　麻黃　木通　茯苓
犀角　蒲黃　黃芩　赤芍藥
葛粉　生地黃　甘草 各等分
右剉散，每服四錢，水一盞半，生薑三片，紅棗二枚，煎，不
以時溫服。

〔人參湯〕治經水適斷，熱入血室，寒熱如瘧，日晡服。若加生
乾地黃，每服三錢，水壹盞半，生薑三片，紅棗二枚，煎，溫服，
不拘時候。方見大方科，傷寒門，小柴胡湯。

〔桂枝紅花湯〕治傷寒發熱惡寒，四肢拘急，口燥舌乾，經脈
凝澀，不得往來。
桂枝　赤芍藥　甘草 各壹兩　紅花 壹兩
右剉散，每服伍錢，水一盞半，生薑四片，紅棗二枚，煎，溫
服，良久汗出而解。

〔海蛤散〕治傷寒血結胸膈，揉而痛不可撫近。
海蛤　滑石　甘草 各貳兩　芒硝 壹兩
右為末，每服二錢，雞子清調下，小腸通利則胃膈血散，
膻中血聚則小腸壅，既壅則膻中血不流行，宜服此
小便利血數行，更宜桂枝紅花湯，發其汗則愈。

〔烏金丸〕治陽毒傷寒，棄衣而走，不避親疏，妄言罵詈，以朱

砂為衣，新汲水下十圓，即於寒發再服，方見大方科積熱類。

〔人參散〕治血風勞嗽，不寒不熱，傷寒咳嗽，起坐不能，喘嗽。
人參　知母　秦艽　款冬花
麻黃　杏仁　苦梗　馬兜鈴
寒水石　南星　地骨皮　粉草 一
半夏 各等分
右剉散，每服三錢，水一盞半，麥門冬二十粒，去心，煎，溫
服。喘嗽加烏梅，氣急加杏仁。

〔□□散〕治虛勞肺熱，久嗽，身如炙，將成肺勞。
枇杷葉 去毛　桑白皮　款冬花　木通

紫菀　杏仁各等分　大黃減半

右為末煉蜜圓如櫻桃大食后夜卧含化一圓

貝母湯治諸嗽久不差

貝母去心薑製半兩　北五味子　黃芩　乾薑熟者減半
陳皮各壹兩　半夏　桑白皮　桂心
北柴胡各壹兩去苗　木香　甘草各壹分

右㕮咀每服伍錢水一盞半杏仁七粒去皮尖碎之生薑三片煎熱服

[illegible]治男子女人肺胃虛寒久嗽不已喘促滿悶咳嗽涎盛腹脇脹滿腰背倦痛或虛勞冷嗽咳唾紅痰及遠年日近一切喘嗽諸藥不效者並治之

罌粟殼半兩去穰蜜炙　枳殼麩炒　杏仁去皮尖　甘草炙各等

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片烏梅半箇煎食後臨卧漸漸熱服

[illegible]治痰喘氣急數服痊

齊州半夏湯洗七次切片　皂角去皮炙半寸　甘草炙半寸
生薑如指頭大

右以水一椀煮去半頓服

調經

[illegible]圓治婦人室女一切血氣經候不調臍腹疞痛面色痿黃心忪乏力腹脹脇痛頭暈惡心飲食減少崩漏帶下大腸便血積聚癥瘕並皆治療若以其名又人言之

不言此藥世訛之久不肯服者甚多殊不知獲效非常古書所載婦人仙藥不可輕忽修制和處豈同日而語哉服之旬顯其功耳

右以香附子不拘多少先搗去毛淨用好醋煮半日出焙碾為末醋糊圓如梧桐子大每服三四十圓米飲吞下不以時候

婦人數墮胎由氣不下降所以胎氣不固此藥尤妙一方加陳艾亦有加當歸鹿茸

[illegible]湯治血熱氣虛經候澁滯不通致使血聚肢體麻木肌熱生瘡浑身疼倦將成勞瘵不可妄投他藥但宜以此滋養通經

馬鞭草　荊芥穗　牡丹皮去骨　赤芍藥

枳殼麩炒　肉桂　當歸去蘆　川芎各等分

右㕮咀每服四錢水二盞烏梅一箇煎至一盞空心日四五服有此證服至半月或一月經脉自通百病皆除

[illegible]治血熱經水不調心煩口乾煩燥或遍身生瘡

赤芍藥　黃芩　川芎　甘草
荊芥　生乾地黃　麥門冬去心　瓜根

右㕮咀每服三錢水一盞半燈心十莖淡竹葉十皮煎溫服不拘時有寒熱加秦艽北柴胡此劑亦為第一方

[illegible]圓治月經或多或少或前或後時發疼痛醫者一例呼為經病不曾說得是陰勝陽是陽勝陰所以少效蓋陰氣乘陽則胞寒氣冷血不運行經所謂天寒地凍水

凝成水，故令依少在月後；陽乘陰，則血流散溢，所謂天暑地熱，經水沸溢，故令依多而在月前。當知其陰陽，調其血氣，使不相乘，以平為福。

紫石英（研細水飛） 人參 龍骨 川烏頭（炮）
桂心 禹餘粮（煅醋淬） 杜仲（炒去絲） 遠志（去心）
澤瀉 當歸 桑寄生 茯苓（酒浸）
熟地黃 五味子 石斛（去根） 牡蠣（煅）
甘草（炙） 川椒（去目及閉口者，微炒出汗，各半兩）

右為末，煉蜜圓梧桐子大，每服三十至五十圓，空心米飲下。

當歸丸 治天癸已過期，經脈不勻，或三四月不行，或一月再至，腰腹疼痛。素問云：七損七益，謂女子七七數盡而經脈不依時者，血有餘也，不可止之，但令得依時，不腰痛為善。

白朮（半兩） 黃芩 山茱萸（湯浸去核） 當歸
川芎 揚芍藥（腹痛加當歸、熟艾各壹兩；若冷，去黃芩加桂）

右為末，每二錢，酒調，空心日三服。養胎益血，安和子臟。

通經圓 治婦人室女月候不通，疼痛，或成血瘕。

桂心 青皮（去白） 大黃（炮） 乾薑（炮）
川椒（炒出汗） 蓬朮（煨） 乾漆（炒去煙） 川烏（炮）
當歸（去蘆） 桃仁（炒，各等分）

右為末，內四分用米醋熬成膏，和餘六分末成劑，臼中治之，圓如梧桐子大，暑晒乾，每服二十圓至三十圓，淡醋湯溫酒空心下，尋常血氣凝滯疼痛，數服立效。

鹿茸圓 補氣固血，治衝任不調，因虛生寒，月經行多，或來不及期，腹痛，怯風，臟腑不和。

鹿茸 五味子 茯苓 杜仲
赤石脂（煅，各壹兩半） 山茱萸 附子（炮） 乾薑
黑龍骨（各一兩） 肉豆蔻 白茯苓（各半兩） 乾地黃（壹兩）

右為末，酒煮麵糊為圓梧桐子大，空心食前熱米飲下五七十圓。一月血氣已安，去龍骨，加沉香半兩，可以常服。中年以後婦人，最宜服此。

三棱圓 治經脈不通，氣痛滯下，兼治血瘕，形如鐮鐵樣。

當歸（去尾） 川芎 牛膝（去苗） 芫花
三稜 莪朮（煨） 蒲黃 玄胡索
牡丹皮 乾薑 菴𦳝 白芷
地龍（去土，酒浸炒，壹兩） 大黃（另為末，以米醋壹升，文武火熬成膏）

右為末，入大黃膏和研，杵爛為圓，每服二十圓，氣痛，淡醋湯下，少當酒亦可；未通，紅花酒下。

經脈不利，即為水，水流走四肢，悉皆腫滿，名曰血分。其候與水相類，醫作水治之，非也，宜此。

人參 當歸 大黃（濕紙裹，飯上蒸，切，焙乾）
桂心 瞿麥穗 赤芍藥 白茯苓（各半兩）
葶藶（炒，別研，壹分）

右為末，煉蜜圓梧桐子大，每服十五圓至二三十圓，空心米飲送下。

治月信退出皆為禽獸之狀似來傷人先將綿塞
陰戶只頓服、
右以沒藥壹兩作圓散皆可服仰飲、
琥珀圓（大聖散）兼服治經行腹痛不可忍者立效
亦效（方見大方科）（大聖散方見前）
治婦人室女經候不調臍腹冷痛惡心腹常脹滿
至晚則增、
食茱萸（湯泡） 當歸（各等分） 熟地黃 白芍藥（各）
石菖蒲（炒） 川芎 人參（各壹兩）
熟艾（糯米飲打作餅焙乾）
右為末煮酒糊圓梧桐子大調縮砂香附湯送下五十

圓（方見大方科諸氣類）
治經水不行或崩中漏下一切血疾（方見前）
治婦人室女血閉不通五心煩熱、
紅花（一錢半） 大當歸 杜牛膝（各伍錢） 桃仁（一十五個去皮尖另研）
右為末每服二錢空心溫酒下
治經候不調臍腹脹腰腿無力煩渴潮熱身躰
拘攣肌瘦、
海桐皮 五加皮 牡丹皮 地骨皮
桑白皮（各等分）
右㕮咀散每服四錢生薑三片紅棗一枚清油數點水壹
盞半同煎空心溫服、

血氣
治血風血氣等疾、
五靈脂（炒） 莪朮 桂心 芫花子（炒各壹兩）
右為末每服二大錢酒半盞煎八分疾作熱服、
二氣圓治血氣不和作痛不止及下血無時月水不調、
真蒲黃（炒） 蓽撥（鹽炒）
右等分為末煉蜜圓梧桐子大每服三十圓空心溫酒
送下不飲米飲下一二服即止、
治一切血氣臍腹撮痛及產后惡露不行兒枕塊痛
血竭 沒藥（細研） 桂心 當歸（去蘆）
蒲黃 紅花 木香 延胡索

乾漆（炒） 赤芍藥（各等分）
右為末每服二錢食前熱酒調下、
治婦人室女七情傷感遂使血與氣併心腹作
痛或連腰脇或引背膂上下攻刺甚作搐搦經候不勻但
是一切血氣疼痛並可服之、
當歸（去蘆酒浸） 玄胡索（炒去皮） 蒲黃（炒） 赤芍藥
官桂（不見火） 片子薑黃（洗） 乳香 沒藥
木香（不見火各壹兩） 甘草（炙）
右㕮咀散每服四錢水一盞半生姜七片煎食前溫服吐
逆加半夏橘紅各半兩、
治婦人室女月水凝滯臍肋脹刺臍腹疼痛不可

及產後露不下血上攻心迷悶不省應有血氣腹痛並治

牡丹皮 去骨 赤芍藥 蓬莪朮 煨 荊三稜 醋浸炒

劉寄奴 去梗 熟地黃 酒炒 玄胡索 炒 當歸 酒浸

烏藥 官桂 各等分

右用前五味以烏豆一升生薑半斤切片米醋四升同煮候醋盡焙乾入後五味同為末每服二錢溫酒調空心食前服

治室女血氣相搏腹中刺痛痛引心端經行澀少或經事不調以致疼痛

橘紅 去白兩 玄胡索 去皮醋煮 當歸 去蘆酒浸各壹兩

右為末酒煮米糊為圓如梧桐子大每服七十圓加至一伯圓空心艾湯或米飲送下

治血氣心腹刺痛欲死諸藥不效服此頃愈

五靈脂 蒲黃 炒 各等分

右為末先用二錢醋調熬成膏入水一盞煎七分食前熱服

治血氣痛遊走及腰痛

右用莪朮不切片乾漆打碎各二兩同炒令漆焦香取出漆不用只以莪朮為末溫酒調下三錢腰痛胡桃酒下遊走痛冷水調下

治血氣刺痛 方見

治血氣絞刺痛 方見

治血氣攻刺刺痛大效 方見

血瘕

治血瘕血積經候不通

桃仁 大黃 各壹兩 虻蟲 炒黑半兩 川朴消 壹兩

右並為末以醇醋二升半銀石器中慢火煎取壹升五合下大黃桃仁等不住手攪欲下手圓下朴消更不住手攪良久出之圓如梧子大前一日不喫晚食五更初用溫酒吞下五圓取下如赤豆汁或如雞肝蝦蟆衣狀未下再作如鮮血來即止續以調血氣藥補之

治血瘕攻腹中有塊攻刺小腹痛重或腰背相引為痛久而不治黃瘦羸乏

琥珀 別研 白芍藥 川烏 炮去皮 川牛膝 酒浸

鱉甲 醋炙 蓬莪朮 炮 當歸 酒浸 桂心

木香 不見火 澤蘭葉 官桂 各半兩 麝香 另研

右為末酒糊圓梧桐子大每服七十圓空心溫酒米飲下

治室女月經不行臍下堅結大如杯升發熱往來此名血瘕加紅花 方見前

神麴 茴香 各肆兩 木香

丁香 各半兩 檳榔 肆枚 漆 椒 炒出汗

右除椒漆餘五味皆半生半炒為末用生熟漆和圓如彈子大茴香末十二兩鋪陰地蔭乾候外乾并茴香收器中極乾去茴香、膀胱疝瘕及疝墜五膈血崩產後

諸血滿下赤白並一圓分四服　死胎一圓皆綿灰酒下　難産炒葵子四十九粒搗碎酒煎下一圓　諸疾不過三服痃氣十服膈氣癥癖五服血瘕三圓當差

血蠱

木香圓 治脾氣血蠱氣血蠱風蠱水蠱石蠱

木香　沉香　乳香研　甘草炙各壹分
川芎　胡椒　陳皮　人參
晉礬各半兩　桂心　乾薑炮　縮砂各壹兩
茴香炒兩七　天茄伍兩亦小者乾研

右洗焙爲末每服二錢空心陳米飲調下忌羊肉

四白圓 治婦人諸疾繼續而生帶下淋瀝五邪失心愁憂思慮意思不樂飲食無味月水不調及腹中一切疾病有似懷孕連年累月羸瘦困弊或歌或哭如鬼所使但服此藥無不愈者

吳茱萸湯泡七次焙炒半兩　桔梗半兩　柴胡
菖蒲　紫菀去苗葉土　茵芋去鬚　肉桂去粗皮
茯苓　蜀椒去目及閉口者炒出汗　人參去蘆
厚朴去粗皮薑汁炒　巴豆去皮心膜出油炒研　皂莢去皮子炙各半兩
川烏炮去皮臍貳兩半

右爲末入巴豆和勻煉蜜圓梧桐子大每服三圓生薑湯下食后臨臥漸加至五七圓

血癖

[illegible]圓 治經水不調腹中積聚成塊流走作痛肌膚消瘦腹滿不收食用烏梅濃煎湯入鹽少許服之姜湯下亦可

方見大方[illegible]癖

大[illegible]圓 治痃癖冷氣兼疰氣心腹痛不可忍

麝香半兩別研　阿魏一分麵裹煨熟　五靈脂
桃仁去皮尖　三稜各叁分　芫花醋炒　檳榔各一兩
莪茂煨　桂心　沒藥別研　木香
當歸各半兩

右爲末入麝香令勻用粳米軟飯爲圓梧桐子大每服十圓不以時淡姜湯下

[illegible]方 治痃癖及血氣

右以獖豬肝一具可及拾兩者用巴豆伍拾粒去大皮剜在肝內用釅醋三盞慢火熬令肝爛熟去巴豆入砂鉢內研極爛入荊三稜末和就得所圓如梧桐子大每服伍圓食前熱酒下

[illegible]圓 治痃癖癥瘕血氣塊硬發歇刺痛甚則欲死或塊如小盤每作痛發入伏定方少止數年不愈者與[illegible]服即效

吳茱萸　良姜　白姜　當歸去蘆
赤芍藥　延胡索　破故紙　川椒
生乾地黃　劉寄奴　蓬莪茂　橘紅
青皮　川芎各一兩　荷葉灰四兩　熟艾貳兩

右為末醋煑麪糊丸梧桐子大每服三五十圓熱酒下

蓬莪茂散 治産前後腹痛胎不安或血刺痛者兼治血臟宿冷百節倦疼肌瘦怯弱多傷帶下久服盡除婦人一切疾病並宜服之

川芎　當歸去蘆　枳殻去穰　厚朴去皮薑汁炒
桂心　乾姜　芍藥　舶上茴香
青皮　苦楝子　木香　熟地黄酒炒
麥芽　三稜　蓬莪茂煨　茯苓去皮
神麴　人參各等分

右為末每服三分連根葱白二寸擘破鹽半錢煎服如大便不利入大黄煎却不入鹽若大便自利入呵子煎

腸覃

烏喙圓 治腸覃病因寒氣客於腸外與胃氣相搏正氣不榮繫瘕內著惡氣乃起其生也始如雞卵久久乃成狀如懷胎按之堅推之即移月事時下故曰腸覃亦治乳餘疾大小便不利并食有伏蟲臚脹癰疽毒腫久寒邪氣

烏喙炮去皮尖　半夏湯洗四分　石膏煨　藜蘆炒
牡蒙　茯苓各一分　乾姜炮　桂心各一分
巴豆去油研如膏

右為末煉蜜圓菉豆大每服三五圓食後酒或飲送下亦治男子疝瘕

食積

三稜煎 治血瘕血癖食積痰滯

三稜煨　蓬莪茂煨各二兩　青橘皮去白　半夏
麥芽炒各壹兩

右以好醋六升煑乾焙為末醋糊圓梧桐子大每服三四十圓淡醋湯下痰積多以姜湯送下

感應圓 治食積作塊臍痛方見大方積聚類

腸風五膈寬中散　分心氣飲　流氣飲子 方並見大方諸氣類

血風

人參荊芥散 治血風勞氣身體疼痛頭昏目澁心忪煩倦寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胸滿精神不爽或月水不調臍腹疞痛痃癖塊硬疼痛發歇或時嘔逆飲食不進或因産將理失節淹延瘦瘁乍起乍臥甚即着牀常服除一切風虛勞冷孕婦莫服

荊芥穗　人參　桂心　生乾地黄
北柴胡去苗　鼈甲醋炙　酸棗仁炒　枳殻去穰
羚羊角屑別為末　白术　川芎
當歸　防風　甘草各半兩

右剉散每服三錢水一盞半生姜三片煎熱服日二服

[illegible] 治血風攻頭腦旋倒地不知人事

右以蒼耳草心不拘多少陰乾為末不以時服一錢酒

[illegible] 治血風走注攻刺半身不遂麻痺瘙痒急風口眼喎斜言語蹇澁手足拘攣

烏頭(肯骨) 芫花 乾薑(各伍錢)

右爲末醋煮令乾更杵爲末再入桂心 天麻 海桐
皮 黑豆炒爲末入前藥和勻別用黑豆煮極爛研如泥
以豆汁調和前末研令爲圓每服七圓至十圓以黑豆
淋酒下忌一切毒物

大效活血散 治婦人血風中體骨節疼痛心膈壅滯少思飲食

川芎(各壹兩) 赤茯苓 赤芍藥 酸棗仁(炒)
桂心 當歸(去尾) 木香 川牛膝(各叁分)
羌活 枳殼(去穰麸炒) 甘草(各半兩)

右剉散每服三錢水一大盞姜三片煎不拘時熱服

[illegible]散 治血風身體疼痛手足無力心神壅悶

羚羊角屑 酸棗仁(炒) 生乾地黃 檳榔(各壹兩)
五加皮 防風(去叉) 赤芍藥 當歸
骨碎補(去毛炒) 海桐皮 川芎(各叁分) 甘草(半兩)

右爲末每服二錢溫酒調下

歷節風

[illegible] 治白虎歷節諸風疼痛遊走不定狀如蟲嚙晝靜
夜發一切手足不測痛

大八角川烏頭(三枚去皮臍生) 生全蠍(二十一枚)
生黑豆 生地龍(去土[illegible])

右爲末入麝香一字同研停勻糯米糊爲圓如菉豆大每服
七圓甚者十圓夜卧令膈空溫酒吞下微出冷汗便瘥

血虛

[illegible]補虛湯 治頭痛發熱多汗六脉虛細又脉或絶作血
虛治之服後藥見效

朮附湯加川芎先服(方見大方科中濕類) 十全大補湯加附子次
服(大方科虛損類)又服萬安圓(大方科虛損類)神朮散(大方科傷寒類)
內補圓 芎歸湯(方見[illegible])

[illegible] 有婦人頭痛悲風發熱六脉沉取無根浮取却有
乃是虛證

右用人參一二兩銀銚煎湯空心下二十粒五更又下
二十粒天明而愈(方見大方科痼冷類)

[illegible]湯 治血虛勞倦

鹿角膠 當歸(去尾) 黃芪(鹽炙) 肉桂
乾地黃(酒炒) 石斛 木香 白朮
白茯苓 鱉甲(醋炙) 秦艽 川巴戟
柑子皮(去白) 牡丹皮 天仙藤 甘草(各半兩)
人參(去蘆) 枳殼(各叁分)

右剉散每服水盞半生姜九片葱白三寸煎空心溫服

[illegible]散 治脾胃虛弱并脾血久冷

草豆蔻(去殼炒用) 甘草 高良薑(剉炒) 白朮
縮砂仁(各壹兩) 青皮(去白) 訶子肉(各半兩) 肉桂(壹分)
生薑(切小塊) 厚朴([illegible]) [illegible]

右爲末每服二錢入鹽少許沸湯點空心服及療腹疼

又治冷瀉尤妙腹痛最難得藥此方只是溫補藥耳特工止痛理不可知

顛狂

[illegible]治[illegible]惡顛疾歌唱無時踰墻上屋乃榮血迷於心包所致加遠志去心桃仁去皮尖蘇木紅花各一錢水一盞半煎方見前服後病退却用平胃散內減厚朴三分之二加生蒼朮二倍川升麻等分為末一半水一盞半煎一盞服之全安須常服以絕其根方見大方科脾胃類

小調經散治血熱顛狂加生姜生地黃同煎日三服須服百餘服即安凡婦人顛狂亦可頻服補心藥方見大方科驚氣類

煩熱

[illegible]治血風勞形體憔悴肢節困倦喘滿虛煩咳嗽少氣發熱汗多口乾舌澀不思飲食

五加皮　牡丹皮去骨　赤芍藥　當歸去蘆各[illegible]

右剉散每服三錢水一盞將青銅錢一文蘸油入藥同煎溫服頻煎時不得攪動不得吹日三服常服能肥婦人

逍遙散治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪頰赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜臥及血熱相搏月水不調臍腹脹痛寒熱如瘧又主室女血弱陰虛榮衛不和痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸

白茯苓　白朮去蘆　當歸去蘆酒浸

白芍藥　北柴胡去苗各壹兩　甘草炙兩半

右剉散每服三錢水一盞生薑三片麥門冬二十粒去心煎不拘時服一方加知母地骨皮

[illegible]治同上方見大方科[illegible]涼心退煩悶熱極難盛

寒水石　石膏　滑石　赭石

朴消各伍錢　甘草炙[illegible]錢

右為末每服二錢井水調下

朱砂膏治心臟驚熱至甚不省人事

朱砂　硼砂　金銀箔各五片

寒水石伍錢　腦子壹字　鐵粉[illegible]

石膏伍分　粉草三分

右為末每服二錢麥門冬二十粒去心煎湯調下

[illegible]治但惡寒發熱煩躁[illegible]發於中寒邪故也服之立效方見大方科傷寒類

黃芪散治熱勞羸瘦四肢煩疼心煩口乾不食

人參　黃芩　黃芪　大當歸各七錢半

北柴胡去蘆　麥門冬去心　地骨皮　赤茯苓各七錢

生地黃　赤芍藥　甘草各五錢

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片煎溫服

心痛

九痛圓治九種心痛一蟲二疰三風四悸五食六飲七冷八熱九去來此悉主之又治連年積冷流注心胸疼痛并冷氣衝上落馬墮車瘀血等疾

狼毒半兩 乾薑 人參各半兩 附子炮去皮臍各一兩
吳茱萸一兩炒 巴豆一枚去皮心膜炒不去油
右為末煉蜜和圓梧桐子大每服一圓空心溫酒下卒中惡心腹脹痛口不能言者服二圓立安

奇方 治血刺心痛
右用玄胡索不以多少新瓦上炒微黃不可焦為末每服三錢酒一盞煎服或陳米飲下不炒亦可用酒服効速

奇方 治忘心痛
南康真蚌粉為末炒赤以酒調熱服

腹痛

撞氣圓 治久積冷氣腹痛作攻兩脇或上心間刺痛發歎無時羸弱減食經年不愈或加嘔吐 方見大方科嘔吐類

當歸建中湯 亦效 方見大方科腹痛類

奇方 治臍腹刺痛不省人事一服立止者因憂思氣痛發
白芍藥 五靈脂 木通去皮，各五錢
右剉散每服四錢醋一盞煎一二沸再入水一盞再煎三沸去滓空心溫服

脇痛

木香散 治脇肋苦痛
木通去皮節 青皮去白 川楝子去核，同巴豆炒黃，巴豆不用 蘿蔔子炒 舶上茴香炒
莪朮 木香 滑石各半兩
右為末煎葱白酒調三錢服食後甚者再服

膂氣散 治兩脇刺痛攻心 方見大方科諸氣類

風痺

三痺湯 治血氣凝滯手足拘攣風痺氣痺等疾皆治之
川續斷去蘆 杜仲去皮切薑汁炒 防風 桂心
華陰細辛 人參 白茯苓 白芍藥
當歸 甘草各壹兩 秦艽 生地黃
川芎 川獨活各半兩 川牛膝 黃耆各壹兩
右剉散每服五錢水二盞生薑三片棗子二枚煎一盞不以時熱服但腹稍空服有人病左臂不遂後已痊平而手指不便無力試諸藥不效服此纔半而安

臂痛

舒經湯 治臂痛又名五痺湯亦治腰下疾
片子薑黃 甘草 羌活各壹兩 白朮
海桐皮 當歸去尾 赤芍藥各貳兩
右剉散每服三錢水一盞煎溫服如腰以下疾空心服以上食後服

五積散 乃五積散政每散合和治弱者或兩臂或一臂冷痺作痛起手甚艱每服四錢薑三片棗一枚木瓜一片水一盞半煎不拘時服未效再加川牛膝 方見大方科傷寒類仍間服

順氣和中湯 方見風科

控涎圓 治因食酒每與物過度痰飲與氣相聚所作臂痛每服二七粒柿蒂湯下得利或不利皆效 方見大方科痰飲類

【四物湯】治血滯作瘤疼痛加紅花煎方見前

搐搦

【白薇圓】治手足搐搦痰涎壅盛不省人事多因血虚七情所感而生宜將蘇合香圓溫酒化開多服後服此

白薇　紫石英火煅醋淬七次　琥珀別研
白芍藥　桂心不見火　川續斷酒浸　防風去蘆
山茱萸去核　當歸酒浸去蘆　柏子仁炒　川烏炮去皮
牡丹皮去木各壹兩　木香不見火半兩　麝香另研半錢

右為末生薑自然汁打米糊圓梧桐子大每服七十圓空心食前溫酒或米飲下

【琥珀澤蘭圓】治女子血實七情所感卒然手足搐搦狀類癇證却不可作癇治之宜多以蘇合香圓調服却投此立效

當歸酒浸去蘆　澤蘭葉　琥珀別研　羚羊角鎊
牡丹皮去木　防風去蘆各壹兩　麝香別研半錢　安息香酒熬去砂
生地黃　赤芍藥各壹兩半　鐵粉　橘紅各半兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每服七十圓空心食前溫酒或米飲下

泚濁

【[illegible]圓】治耳鳴心燥腰腳疼重腹內虛鳴臍下冷痛頻下白水如泔名湛濁證

肉豆蔻　白豆蔻　丁香　巴戟
丁皮　白茯苓　蒼朮　桂心
黑附炮去皮各壹兩　白朮　人參　山藥
桔梗　茴香　粉草各兩半

右㕮咀散每服三錢水一盞半生薑三片紫蘇葉三皮煎空腹溫服

【鹿茸圓】治渾身壯熱頭疼臍下疞痛下淡紅水

當歸去蘆　白芍藥　鹿茸酒浸去毛酥炙　[illegible]
川芎　白朮　大艾炒　側柏葉
赤石脂煅醋淬　川白芷　烏賊魚骨各等分

右為末蜜圓如龍眼大每服一圓空心鹽酒下或敗棕燒灰調酒吞下

【[illegible]散】治心躁四肢疼痰臍下五色腰腳臍中堅痛

貫衆根醋炙　地榆　阿膠　赤石脂
紫金皮　茴香　粉草　側柏各等分

右為末每服二錢米飲調下

【烏[illegible]散】治身熱口燥頭痛如破氣塊攻痛下黃水如葵汁

百草霜細研為度　紫金皮米泔浸煮焙乾　粉草炙

右為末每服二錢艾湯調或用淡醋湯空心服

【又方】加入　住紅蘇根金櫻子根　心嘈豬血入鹽炒酒吐紅飯飲　白月水木瓜當歸浸酒　赤白帶下葱白連根煎酒　血海虛冷下白不止用鯉魚一個去腸肚不去鱗將亂髮一塊入魚肚內黃泥固濟煅火內燒煙淡淡留性去泥研為末后入當歸酒甘草炒為末每服

一錢用溫酒調下

白濁

金鎖正元丹方見大方料理遺精類 秘精圓方見大方料理赤白濁類

四七湯 茯菟丹 治濁固本圓方見大方料理治濁類

崩漏

鎮宮圓治崩漏不止或五色或赤白不定或如豆汁或狀若豚肝或下瘀血臍腹脹痛頭暈眼花久久不止令人黃瘦口乾胸煩不食

代赭石火煅醋淬 紫石英同上 禹餘粮煅醋淬同

香附子各二兩去毛醋煮 陽起石煅研 芎藭

鹿茸燎去毛醋蒸焙 茯神去木 阿膠蛤粉炒 當歸去蘆酒浸

蒲黃炒各一兩 血竭半兩別研

右為末艾醋汁打糯米糊圓梧桐子大每服七十圓空心米飲下

柏子仁湯治憂思過度勞傷心經心主血心虛不能維持諸經之血亦能致崩中下血之患

當歸去蘆酒浸 芎藭 茯神去木 小草

阿膠蛤粉炒 鹿茸燎去毛酒蒸焙 柏子仁炒各一兩 香附子貳兩

甘草炙半兩 川續斷酒浸

右㕮咀每服四錢水盞半生薑五片煎空心食前溫服

秘方龍骨圓治半產後及下虛數月崩漏不止

白牡礪 北赤石脂 大赭石煅各 白龍骨

伏龍肝 海螵蛸 五靈脂 側柏葉各等分

棕櫚燒存性各多少 真蒲黃多少加入

右為末醋糊圓如梧桐子大每服三十五圓以十全大補湯三錢加嫩鹿茸去毛酒炙阿膠蛤粉炒各一錢半薑三片棗二枚烏梅一箇煎吞服立效

平胃散治脾血不固崩漏溢酒調下方見大方調理脾胃類

震靈丹治勞傷過度衝任脈虛衝任氣虛不能約制或暴下崩中或下鮮血或瘀血連日不止淋瀝不斷形羸氣乏條急因之並皆治之

赤石脂 海螵蛸去殼 側柏炒各五兩

右為末醋糊圓梧桐子大每服三十圓飯飲送下空心日三服神效

加味四物湯治經斷後多年忽然再行遂成崩漏腹痛寒熱加人參柴胡黃芩生薑紅棗煎兼用熟附圓四物湯方見前

熟附圓

大川芎 當歸 赤石脂煅 白龍骨

木賊去節 熟附子各等分

右用醋米糊圓梧桐子大每服五十圓米飲吞下漸安

益榮湯治經血得熱崩漏不止口苦咽乾經候不通宜服

延胡索 瞿麥穗 川當歸 牡丹皮

乾葛各一兩 石膏貳兩 蒲黃半兩 桂心

威靈仙各三分

右為末每服二錢水一盞薑三片煎食前溫服日二三服

琥珀湯治崩中下血諸藥多用止血補血之劑此方治陽乘陰前所云天暑地熱經水沸溢是也

右用黃芩不以多少為末燒秤錘淬酒調下

又方

黃芩　黃蘗各半兩　黃連三分

右用水四盞煎取一半去滓入炒阿膠末五錢滓再煎溫分三服空心腹痛加梔子三錢亦可

又方治積年血崩一服而愈

右以草血竭嫩者蒸過為末每服小酒盞下或收為末薑酒調服血竭草生於磚縫井頭少在地上

槐花散治血崩不止　烏梅七箇燒存性為末空心米飲服

又方　陳槐花一兩　百草霜半兩　為末燒紅秤錘淬酒下

五倍子散治血崩帶下

大艾四兩醋煮　五倍子二兩炒　烏梅半兩去核　川芎半兩

右為末每服二錢空心米飲下兩服止

當歸湯治有熱久患血崩一服稍安八服無恙

當歸頭尾用　熟乾地黃酒浸　白芍藥　大川芎

大艾葉　阿膠蛤粉炒　黃芩去朽各半兩

右剉散每服四錢水一盞半姜五片煎空心溫服

白梅散治白崩不止　白梅百花焙乾為末不用炒米炭

飲入燒鹽少許空心數服即效

又方　棕櫚絲瓜燒灰等分為末鹽酒或鹽湯下

又灸法治白崩小腹橫文當臍空直下百壯又灸內踝上三寸左右各百壯名三陰交

治漏下不止或赤或白灸交儀穴在內踝上五寸

帶下

白斂丸治衝任虛寒帶下純白

鹿茸酒蒸焙二兩　白斂　金毛狗脊燎去毛各一兩

右為末艾煎醋汁打糯米糊圓梧桐子大每服五十圓

空心溫酒下

地榆丸治赤白帶下不止腹內疼痛四肢煩疼不欲飲食日漸羸瘦

當歸去蘆酒浸　赤芍藥　牡蠣火煅取粉　熟地黃酒蒸

阿膠蛤粉炒　白芍藥　續斷各酒浸　地榆各一兩

右為末醋糊圓梧桐子大每服五十圓空心米飲送下

卷柏圓治腹臟冷熱相攻心腹絞痛腰腿俱疼赤白帶下面色萎黃四肢羸之

黃耆去蘆蜜炙　熟地黃洗　卷柏醋炙　赤石脂煅

鹿茸醋炙　白石脂　芎藭　代赭石煅

艾葉醋炒　桑寄生　鱉甲醋炙　當歸

地榆各壹兩　木香不見火　龍骨各半兩　乾薑炮

右為末醋煮糯米糊圓梧桐子大每服七十圓空心食前米飲送下

萬金散治衝任虛損，月水過多，崩漏帶下，淋瀝不斷，腰腹重痛，凡是五色帶疾，並皆治之。

禹餘粮（煅，醋淬） 赤石脂（煅） 龍骨（煅）

白芍藥 川芎 附子 熟地黃

當歸（各壹兩） 乾薑（炮） 肉桂（各半兩）

右為末，每服二錢，入麝香少許，空心米飲調，日二服。

香附散治赤白帶下。

百草霜（壹兩） 當歸 香附子 紫金皮

烏藥（炒） 伏龍肝（壹兩）

右為末，以水牛膏同茴香炒，舊酒調三大錢，不拘時候，通口服。忌卵、魚腥、母豬等肉。

白芷圓治婦人帶下，腸有敗膿，淋露不已，腥穢殊甚，遂至臍腹更增冷痛。此蓋為敗膿血所致，卒無已期，須以此排之。

白芷（壹兩） 單葉紅蜀葵根（貳兩）

白芍藥 白礬（各半兩，燒枯另研）

右為末，蠟圓如梧桐子大，空腹米飲下十圓或十五圓，候膿盡，仍以他藥補之。

白芍藥散治赤白帶下，臍腹疼痛，神效。

白芍藥（壹兩） 乾薑（半兩）

右為末，微炒黃色，每服二錢，空心米飲下，晚又服，半月

秋霜丹治赤白帶下。

真秋石為末，以棗去皮核，爛研為圓，梧桐子大，每服五十

圓，空心醋湯下。

求嗣

溫經湯治衝任虛損，月候不調，或來多不斷，或過期不來，或崩中去血過多不止，小腹有寒，久不受胎，曾經損娠，瘀血停留，小腹急痛，發熱下痢，手足煩熱，唇口乾燥。

吳茱萸（參兩，湯洗） 半夏（貳兩，湯洗七次） 當歸（去蘆）

人參（去蘆） 白芍藥 牡丹皮 桂心（去粗皮）

阿膠（蛤粉炒） 川芎 甘草（炙，各貳兩） 麥門冬（去心，兩半）

右剉散，每服四錢，水一盞半，薑五片，煎，空心熱服。經事來多不斷，以此吞服煖宮圓，亦效。

煖宮圓治婦人無子，煖子宮冷，服之神效。

附子（炮，去皮臍，一兩） 杜仲（炒斷絲） 地榆 桔梗

白薇（去土） 川牛膝（去苗） 川白芷 黃耆

紫參 厚朴（去粗皮，薑汁炒） 北細辛（去葉）

乾薑 蜀椒（各三分半）

右為末，煉蜜圓梧桐子大，每服二十圓，溫酒下。服之一月自然有孕。奇方四物湯下內圓，多服亦效。

抑氣散治氣盛於血，所以無子。尋常頭暈膈滿，體痛怔忡，皆可服之。香附子乃婦人之仙藥，不可謂其耗氣而勿服。

香附子（炒，杵淨，四兩） 茯神（去木，壹兩） 橘紅（貳兩）

甘草（炙，壹兩）

右為末，每服二錢，食前沸湯調服。仍兼進紫石英圓。

小温經湯治經血不調血臟冷痛此方甚平易用藥徑捷
當歸去尾 附子炮去皮臍 各等分
右剉散每服三錢水一盞半煎空心溫服

秦桂圓治婦人無子經進有效
秦元 桂心 杜仲炒斷絲 防風
厚朴各叁分 附子生 白茯苓各壹兩半 白薇
乾姜 沙參 牛膝 半夏各半兩
人參壹兩 細辛弍兩壹分
右並生碾為末煉蜜圓如赤豆大每服三十圓空心食前醋湯或米飲下未效更加圓數人覺有孕便不可服

陽起石圓治丈夫真精氣不濃不能施化是以無子
陽起石火煅紅研細 鹿茸酥炙去毛
兎絲子水淘淨酒浸別研 天雄炮去皮 韭子炒
肉蓯蓉酒浸各二兩已上 覆盆子酒浸 石斛去根
桑寄生 沉香別研 原蚕蛾酒炙 五味子各半兩
右為末酒煑糯米糊圓梧桐子大每服七十圓空心鹽湯或鹽酒下

濟陰丹治婦人久冷無子及數經墮胎皆因衝任之脉虛損胞内宿挾疾病經水非時暴下不止月内再行或前或後或崩中漏下三十六疾積聚癥瘕臍下冷痛小便白濁
以上疾證皆令孕育不成以致絶嗣方見前
灸法婦人絶子灸然谷五十壯在内踝前直下一寸

又法絶嗣胞門閉塞灸關元三十壯報之
婦人姙子不成數墮腹痛漏下灸胞門五十壯在關元左邊二寸是也右邊二寸名子戶

雜方

厚朴圓治婦人胃冷嘔吐不下食
厚朴去粗皮姜汁炒叁兩 附子炮去皮臍壹兩
右以生薑汁一升水五合煑令汁盡焙乾為末以酒煑神麯糊為圓梧桐子大每服三十圓不拘時溫酒下

芎歸湯治頭暈痛諸脉平和惟肝脉獨弱可預見有崩疾來及治血虛頭暈方見前佛手散

橄欖圓止渴潤咽乾
川百藥煎 烏梅 甘草 石膏各等分
右為末煉蜜圓如彈大每服一圓噙化

補肝圓治肌膚手足俱有血線路此怒氣傷肝血失常經以致如此服之神效
橘皮貳兩 當歸壹兩
右為末煉蜜圓梧桐子大每服三十圓溫酒下

八味圓治大小便秘澀此血弱不能榮養臟腑津液枯涸數服即愈方見大方科痔淋類

鹿茸圓治虛弱服剋劑大過致搐此肝血不足為剋劑所爍故令搐搦服此而愈方見大方科痔淋類

芎藭湯治冷證腦痛諸藥不效

香附子（貳兩童子小便浸乾為度）肉桂 延胡索（炒）
白芍藥
右為末每服二錢沸湯調不拘時候服
虎骨散 治腰上實肉處痛不可忍
右以麝香末半錢用酒調服
補心湯 治陰中生瘡名曰𧏾瘡或痛或痒如虫行狀淋漓
膿汁陰蝕幾盡治之當補心養胃
白茯苓 人參 前胡 半夏（湯洗七次去滑）
川芎（各叁分） 橘皮 枳殼（去穰麩炒） 紫蘇
桔梗 甘草（炙） 乾薑（各半兩） 當歸（壹兩叁分）
白芍藥（貳兩） 熟地黃（壹兩半）
右剉散每服四錢水一盞半薑五片棗一枚同煎食前服
狼牙湯 治陰中蝕瘡爛潰膿水淋漓臭穢
狼牙剉煎濃汁以綿纏箸頭大如蠶浸濃汁瀝陰中
雄黃兌散 治下部𧏾瘡
雄黃（研） 青葙子 苦參 黃連（各貳分）
桃仁（去皮尖研壹分）
右為末以生艾搗汁和如棗核大綿裹內下部未效更
加荷竹汁無艾只用綿裹散子內下部亦可
洗搨湯 療陰蝕
甘草 乾漆（各壹兩） 黃芩 乾地黃
當歸 芍藥（各貳兩） 龜甲（伍兩）

右剉散用水七升煮取一半去滓以綿帛納湯中以搨
瘡處良久即易日二度每搨湯可行十里許即裛乾捻
取甘濕散薄傳瘡上使遍可經半日又以湯搨搨訖如
前傳藥（甘濕散用蚺蛇膽青黛五月五日蝦蟆晴明麝香石）
藿香養胃湯 治陽明經虛不榮肌肉陰中生瘡不愈
藿香 白朮 白茯苓 神麴（炒）
烏藥 縮砂仁 薏苡仁 半夏麴
人參（各半兩） 蓽澄茄 甘草（炙各叁錢半）
右剉散每服四錢水一盞半薑五片棗二枚同煎不以時
妒精瘡
黃瓜蔞（壹貳箇）連皮穰子剉碎
右用無灰常酒一二升於沙瓶內煮存一升去滓時時
溫服酒盡再煮滓服如覺初時便服此藥即時痛止更
不成瘡如已成瘡服之其瘡自穿而痛自止
又方 凡未成瘡纔覺腫硬作痛以蔥旱熨之其法用中樣
小海味瓶口寬者以炭火入瓶內上以熱灰填滿平瓶
口用蔥葉及蔥白搥損令遍覆瓶口以手帕子裹定倒
執將瓶口向腫處任意輕輕熨之有驗
治茄子疾 心燥連綿黃水易治白水難愈烏金二豆散當
棗子煎溫服（方見前）
又方 生枳殼為散煮煎熏洗却用絹帛包枳殼滓納入陰中
即日漸消

洗方 茄皮白礬馬豬頭根朴消瀉同煮水熏洗加入炒石
灰少許尤封妙

傅藥 朴消為末黃瓜研爛調敷或用濃鈇漿水敷

下疳病心煩四肢痿瘠倫冷痛或腹中絞刺小蒜不散
豬肝蒜片煎服 方見前

又方 硫黃一兩大鯉魚一箇去頭皮納入藥故紙包黃
泥固濟火煅煙盡為末米糊圓梧桐子大每二十圓溫
酒下如下疳生蟲所下如柿汁臭穢心中疼痛悶絕虛
煩甚者不可治

磁石散 治子宮不收名瘣疾痛不可忍者
磁石 酒浸火煅

右為末糊米糊圓梧子大每服二十圓空心滑石湯下

鈇粉散 治同前
當歸 磁石 酒浸火煅各半兩 鈇粉
右為末米飲調下隔夜用角用薑湯日服此藥
刀水洗塗生門上

熏洗方 荊芥穗藿香葉臭椿樹皮煎湯熏洗即入

枯礬 草麻葉 有子 飛過白礬為末以紙片攤藥托入
摻藥先以淡竹根煎湯洗仍用五倍子白礬為末乾摻之
效治牛亦驗

敷藥 用溫鹽水洗軟却用五靈脂燒煙熏次用草麻子
研爛塗上吸入如入即洗去

治腫不收 麻黃荊芥茄種皮蛇床子貞杉木刺蝟皮為末
敷或煮水熏洗小麥朴消白凡五倍子葱白煮水淋洗

膏髮煎 腰鼓氣喧胃氣下泄陰中出血
髮灰 豬脂
右調停綿裹如棗核大納陰中

治腳亦腫
荊芥 石膏 地龍炒 薄荷
右剉散薑三片蜜少許煎服

治陰瘡 與男子妬精瘡略同 詳前

右用黃丹枯白凡萹蓄葉大各一兩硫黃半兩白蛇皮
一條燒灰荊芥 蛇床子各半兩研為末別以荊芥蛇床
子煎湯溫洗軟帛挹乾清油調塗濕則乾摻之

又方 青黛黃丹水粉五倍子肉鋪上拭肉中燒灰為末用
小絹巾入陰中挹乾如乾用荊芥薄荷柏葉煎水洗拭
挹乾清油調藥塗上

又方 先用黃芩海桐皮白凡韭菜根煎湯洗後用取豬皮
燒存性細研入輕粉在內剖下雞腸上膏調塗瘡上如
虫哭入陰內用雞子一箇煮熟去殼塗藥末於上綿子
兜入陰中向火多患處待痒即虫行若身微作寒服藿
香正氣散二三服

又方 貞平胃散加貫衆末每用二錢熟煮豬肝拌藥入陰
戶內數日可安

治疳瘡月后便行房致成湛濁伏流陰道疳瘡遂生瘡痒
無時先用胡椒葱白作湯一日兩三度淋洗却服後藥

赤石脂　龍骨　黑牽牛炒　兔絲子酒浸

黃耆鹽水炙　沙苑蒺藜炒

右為末蜜圓梧子大每二十圓熱棗湯酒澄上清者吞下

治陰中生瘡如虫咬痛可生搗桃葉綿裹納陰中日三四易

黃芩散治陰門生瘡

右用黃芩當歸川芎白礬黃連等分煮水熏洗即安

治陰門腫方

右以甘菊苗研爛百沸湯淋熏后洗

月經不行說一

二七天癸至七七天癸竭行早性機巧行遲智鈍通行則陰陽和合始能生子行年十四歲當時二十歲不行命如風燭朝不保暮有病發則死有不死百中無一亦令一生多病未嘗一日安然有四季行亦可又有一年一次者亦不甚佳或一生不循正道而行者晚年有僻疾則難治

洗心散方見前積熱類治陰中生一物所大牽引腰腹膨痛至甚不喊飲食皆因多服熱藥及煎煿或犯非理房事兼意淫不遂名陰挺每服弍錢生地黃湯調仍用金毛狗五倍子白礬水楊根魚腥草山黃連各一兩重為散分作四服以有嘴瓦罐煎熟預以銀錫作一長小筒下透罐嘴上貫挺

上藥無後效立效之服白薇散凌霄花少許煎湯見前三十

吳茱圓

食茱萸　吳茱萸湯洗焙　桔梗水浸一伏時焙

白茯苓　青皮去白　山茱萸去核取肉焙

舶上茴香鹽炒去鹽　五味子淨揀　海藻洗焙

大腹皮酒洗焙乾　川楝子去核　玄胡索各一兩弍分半

右為末酒糊圓如梧桐子大每服三十五圓木通湯下下虛加川烏炮去皮肉桂去粗皮各一兩腰腹疼甚加桃仁去皮尖麩炒別研青皮去白枳實去穰各一兩真南木香弍分半

一捻金圓服前藥未效却用

玄胡索　舶上茴香　吳茱萸炒　川楝子去核

青木香各弍兩

右為末粳米糊圓如梧桐子大每服三十五圓空心木通湯服又用梅花腦子半錢蠟牽粉一分水調刷上如陰畔生瘡以涼血飲每服弍錢加凌霄花少許煎空心服見前

四物湯治產育艱難或一歲一產可以此少間之每服弍錢加蕓薹子一撮於經行後空心服又方用

[illegible]湯弍兩加當歸乾薑弍錢搗樓根豆豉炒各半兩為散分作八服空心一日二服合滓亦於每月經行後便服每服亦加蕓薹子一撮尤妙

眼科龍木論

建寧路官醫提領陳　志　刊行
南豐州醫學教授危　亦林　編集
江西等處官醫副提舉余　賜山　校正

眼科

總論

人有雙眸如天之有兩曜乃一身之至寶聚五臟之精華其五輪者應五行八廓者象八卦凡所患者或因生食五辛多啖炙煿熱飡麪食飲酒不已房室無節極目遠視數看日月頻視星火夜讀細書月下觀書抄寫多年彫鏤細作博奕不休久處煙火泣淚過多刺頭出血多若此者俱喪明之本復有馳騁田獵衝冒塵沙日夜不息者亦傷目之媒又於少壯之時不自保惜逮至四十以漸昏蒙故善衛養者纔至中年無事常須瞑目勿使他視非有要事勿宜輒開則雖老而視不衰大抵榮衛順則斯疾無由而生榮衛衰則致病多矣且傷風冷則淚出虛煩則昏蒙勞力則眥赤白膜則脾家受毒生瘡則風熱侵肺黃乃酒傷於脾血灌瞳仁及赤色俱是心家有熱羞明見紅花為肝邪黑花則腎虛青花膽有寒五色花為腎虛禀熱不可一槩為治若虛不補而實不瀉亦難收效然上虛乃肝虛下虛乃腎虛肝虛則頭暈耳聾目眩腎虛則虛壅生花耳作蟬鳴大宜補肝益腎其有熱淚交流兩瞼赤痛乃肝之極熱迎風有淚為腎虛客熱凉肝瀉腎必得其宜至於五臟各以類推虛則生寒實則生熱補瀉之用須在參詳毫釐之差千里之謬餘則無非有所觸動或大病之後所患不一至如暴赤一證多因泛熱衝上或眠食失時飽食近火得之加以勞役失於調攝過食毒物變成惡證醫者不原本始但知暴赤屬陽或以散血之劑或以凉心之藥縱使退散遂致脾經受寒飲食不進頭目虛浮五臟既虛因成內障亦有見其不進飲食俾更服熱藥遂致三焦暴燥熱氣上攻昏澀眵淚或犯盛怒辛苦重勞遂生翳肉心氣不寧風熱交併變為攀睛證狀不一是為外障又若讀書博奕等過度而致疾者名曰肝勞不可但投以治肝之劑及作他證治之至於莫效惟須閉目珍護不極遠視庶乎可療若夫患風疹者必多眼暗先攻其風則暗自去婦人胎前產后用藥亦須避忌小兒所患切宜善治惟略加淋洗披鐮針灸斷不可施猶須戒其用手頻揉或因磕睛破至於莫救以上諸證專是科者宜留意焉

五輪之圖



白屬肺　氣之精　氣輪

黑屬肝　筋之精　風輪

上下臉屬脾胃　肉之精　肉輪

大小眥屬心　血之精　血輪

瞳仁屬腎　骨之精　水輪

風輪病因喜怒不常作勞用心晝凝視遠物夜勤讀細書眼力既勞風輪内損其候眥頭尤澁睛内偏疼視物不明胞胘緊急宜去風藥

血輪病因七情煩勞内動於心外攻於目其候赤筋纏眥白障侵睛胞瞳難開昏暮多澁日久不治失明愈深宜洗心凉血藥

肉輪病因多食熱物好喫五辛遠道奔馳食飽耽眠積風痰熱以致胞胘赤腫昏蒙眼涙常多倒睫澁痛瘀血侵睛宜疎醒脾藥

氣輪病因凌寒冒暑受飲寒漿肌體虛疎寒邪入内或痛或昏傳在白睛筋多腫赤視日如隔霧觀物似生煙日久不治變成白膜黑暗難開

水輪病因勞役不止嗜慾無厭大驚傷神大怒傷志加之多食酒麪好啖鹹辛因動腎經通於黑水冷淚鎮流於瞼上飛蠅相趁於睛前積聚風虛或漲或癢結成翳障多暗多昏宜補腎藥

八廓之圖



天廓　傳道　肺大腸

地廓　水谷　脾胃

火廓　抱陽　心命門

水廓　會陰　腎

風廓　養化　肝

雷廓　關泉　小腸

山廓　清淨　膽

澤廓　津液　膀胱

天廓病因冥中射獵月下看書多食腥鮮傷胃冥暑致天
廓有病内動視物生煙皆眼淚難開不能辨認
地廓病因濕漬頭上冷灌睛眸致令有病眼眩紫脉瘀血
生瘡
火廓病因心神恐怖赤脉侵睛血灌瞳仁熱淚如傾其瞼
瞼頭紅肺睛内偏疼熱淚難開
水廓病因大勞努力爭鬬擊棒開弓驟騎強力致令生病
常多驚昏暗眩淚多
風廓病因枕邊窗穴有風不能遮閉坐卧當之腦中邪風
攻於風廓以致黑睛多癢兩瞼常爛或昏多淚
雷廓病因失枕睡卧酒後行房血脉溢滞精宣閉滞風虛
内聚上攻故令皆頭赤腫瞼内生瘡倒睫拳毛遮睛努肉
山廓病因撞刺磕損致令肉生兩瞼翳閉雙睛若不早治
永沉昏暗瘀血侵睛
澤廓病因春不宣解冬聚陽毒多喫脂肥過食熱物致令
腦脂凝聚血淚攻潮有如霧籠復見飛蠅緣緣黑花常
滿難於瞻視

七十二證方

内障

○圓翳第一

圓翳者黑睛上一點圓日中見之差小陰處見之則大而
或明或暗視物不明醫者不識以冷藥治之轉見黑花瞻

此因肝腎俱虛而得也宜服后藥

補肝散

熟地黃　白茯苓去皮　家菊　細辛各半兩
芎藭三分　柏子仁一分　甘草半分　防風一分
北柴胡一兩去蘆
右剉散每服三錢水一盞半煎食后服

補腎圓

巴戟去心　山藥　破故紙炒　茴香
牡丹皮各半兩　肉蓯蓉一兩洗　枸杞子一兩　青鹽一分后入
牡丹枸杞各一兩
右爲末煉蜜圓梧桐子大每服三十圓空心鹽湯下

○冰翳第二

冰翳者如冰凍堅實傍觀自透於瞳仁内陰處及日中看之其形一同疼而淚出此因膽之氣盛遂使攻於肝而得之
宜服後藥

通肝散

山梔子　蒺藜炒去尖　枳殼去白　荊芥各半兩
車前子　牛蒡子炒各一分　甘草五分
右爲末每服二錢苦竹葉湯調食後服

○滑翳第三

滑翳有如水銀珠子但微含黃色不疼不痛無淚遮繞瞳仁

○澀翳第四

澀翳微如赤色或聚或開兩傍微光瞳仁上如凝脂色時

微澁痛而無淚出

○散翳第五

散翳形如鱗點或瞼下起粟子而爛日夜痛楚瞳仁最疼常下熱淚

前件三證並是肝肺相傳停留風熱宜服

決明散

白蒺藜去尖炒 防風 粉草炙 木賊

山梔炒去殼 草決明壹兩 青葙子 蟬退各壹分

右為末麥門冬去心煎湯食後調下

橫關翳第六

此證上橫如劒脊下面微微甚薄不赤不痛此者少

○浮翳第七

此翳上如冰光白色環遶瞳仁初生白小皆頭至黑珠上不痛不癢無血色相潮

沉翳第八

此病白藏在黑水下向日細視方見其白或兩眼相傳疼痛則早輕夜重間或出淚

偃月翳第九

此翳膜如凝脂一邊厚一邊薄如缺月其色光白無瑕疵

前件諸證並不可治皆是宿生所受當有此病縱強用藥終無效

○棗花翳第十

此候周回如鋸齒四五枚相合赤色刺痛如針視物如煙晨輕而昏重則痛楚迎風多淚昏暗不見

白翳黃心十一

此候四邊皆白但中心一點黃大小皆頭微赤時下澁淚團圓在黑珠上

前件不是肝肺相傳停留風熱宜服前[illegible]散后[illegible]

黑花翳十二

此候其狀青色大小皆頭澁痛頻頻下淚口苦不喜飲食蓋膽受風寒宜服

涼膽圓

黃連不見火 荊芥 黃芩 草龍膽各半兩

蘆薈 防風各壹兩 黃柏去皮 地膚子壹分

右為末蜜圓梧桐子大每服二十圓薄荷湯下

胎患十三

此候初生二三歲觀物則近看轉睛不快至四五歲瞳仁潔白昏蒙不見延至年高無藥可治蓋胎中受熱致損其目莫能治之

五風變十四

五色變為內障其候頭色相間頭疼甚却無淚出兼毒風脈熱所致日中如坐暗室常自憂嘆

雷頭風十五

此候熱毒之氣衝入眼睛中生牽引瞳仁或微或大或小

[illegible]睛全不見

驚振十六

此候因病目再被撞打變成內障日夜疼痛淹淹障子赤膜遶目不能視三光亦如久病內障

前件障證設有患者俱不可治所謂針刀難下手藥力並無功若強治之不過服還睛散然終難愈

綠風十七

此病初患則頭旋兩額角相牽瞳仁連鼻鬲皆痛或時紅白花起或先左而右或先右而左或兩眼同發或吐逆乃肺之病肝受熱則先左肺受熱則先右肝肺同病則齊發先服羚羊角散後服還睛散 方見前

羚羊角散

家菊　防風　川芎　羌活

車前子　川烏炮去皮尖各半兩　半夏泡

羚羊角　薄荷葉各壹分　細辛壹兩

右剉散生薑煎或為末食后荊芥茶清調下

烏風十八

此眼雖痒痛而頭不旋但漸漸昏暗如物遮定全無翳障或時生花此肝有實熱宜服

[illegible]散

郁李仁　荊芥[illegible]　甘草炙　大黃各半兩

右剉散每服二錢水壹盞半煎食后溫服

雀目

黑風十九

此眼與綠風候相似但時時黑花起乃腎受風邪熱攻於眼宜涼腎

青風二十

此眼不痛不痒瞳仁儼然如不患者但微有頭旋及見生花或勞則轉加昏蒙

前件二證宜服還睛散 方見前

○肝虛雀目二十一

雀目者肝臟虛勞時時花起或時頭疼年深則雙目盲小兒患者因疳得之

○高風雀目二十二

雀目一證病狀雖同中有異處蓋高風纔至黃昏便不見經年瞳子如金色所謂黃風者即此也

前件二證不可治

肝虛目暗二十三

此病遠視不明眼前花子頻起時目皆赤痛有時看一成二此乃肝虛宜服補肝散稍稍加涼劑與之 方見前

外障

肝臟積熱二十四

眼先患赤痛腫疼怕日淚澀難開忽生翳膜腫或初患一目不見以致兩目齊患此因作勞用力肝膈熱勞宜服

大決明散

石决明（壹兩） 草决明（炒） 羌活 山梔子（各壹兩半）
木賊（伍錢） 大黄（煨） 荆芥（各壹兩） 青葙子（炒）
芍藥（各壹錢）
右為末，每服二錢，麥門冬去心煎湯調，食後服。

傷寒熱病後目昏 二十五
傷寒病安後，服目疼痛紅腫，或喫毒物過多，壅熱上衝，致淚交流，澁痛難開，兼生翳膜，宜服前决明散，后春雪膏點之。

混睛 二十六
此候初時先赤而後痒痛，迎風有淚，閉澁難開，或時無事，不久又發，年深則睛變成碧色，滿目如凝脂，赤路橫赤如絲，此毒風積熱，宜服

地黄散
生地黄（壹兩） 芍藥（半兩） 土當歸（半兩） 甘草
右判散，每服三錢，水一盞半，煎，食后溫服。

努肉攀睛 二十七
此證或先赤爛多年，肝經為風熱所衝而成，或用力作勞，有傷肝氣而得，或痒或痛，自兩眥頭努出，心氣不寧，憂慮不已，遂乃攀睛，或起筋膜，宜服

[illegible]散
黄芩 大黄 防風 薄荷（各等分）
右判散，每服三錢，水一盞半，蜜少許，煎，食后臨睡溫服。

定心圓
石菖蒲 甘菊 枸杞子（各半兩） 辰砂（貳錢半）
遠志（去心，壹分） 麥門冬（去心，壹兩）
右為末，蜜圓梧桐子大，每服三十圓，食后熱水下。

兩瞼粘睛 二十八
此乃爛眩風是也，雙目赤爛粘滯，經年不安，或痒或痛，宜服消風散，桑白皮煎湯調下（方見風科熱證類，仍用驅風散洗）

○膜入水輪 二十九
此因黑珠上生瘡，稍安，其痕不沒，侵入水輪，雖光未絕，終亦難治。

釘翳根深 三十
此因心肝滯留偏熱，致使眼疼痛，生翳，經久其色如銀，釘釘入黑睛，此證不可治。

○黑翳如珠 三十一
此起在黑水上，如小黑豆，疼痛而淚出，不可用點藥，此乃腎虛受風熱而得之，宜先服羚羊角散，後服補腎圓（方見前）

○花翳白陷 三十二
此白翳旋遶瞳仁，點點如花白鱗砌者，乃因肝肺伏藏積熱，更喫熱物遂而得之，宜用點藥，後服前羚羊角散

水瑕深翳 三十二
此乃黑水內橫深瑕盤，青色沉沉深入，痛楚無時，蓋五臟俱受風熱，宜服

[illegible]散

蔓荊子 荊芥 苦竹葉 甘草各一兩
山梔子壹分去殼
右剉散每服三錢水一盞半淡竹七葉煎溫服

○玉翳浮滿三十四
此證黑珠上浮玉色不疼不痛翳根不紅不宜針割但服
前還睛散磨翳膏點之即愈 方見後

○因他病後生翳三十五
眼內他病得時漸漸不見初則微生翳膜後則遮睛損白
若此者無可治矣

○順逆生翳三十六
翳自上而生下者為逆自下生上者為順逆則難治順則
易安宜用點藥

磨翳膏
空青貳錢 片腦叁錢 蕤仁壹兩四合去皮殼
右於乳鉢內研合盛旋點之

○雞冠蜆肉三十七
翳生在瞼內如雞冠蜆肉或青或黑須翻出看之阻礙痛
楚怕日羞明蓋脾經先受熱后有所傳宜服決明散

○瞼生風粟三十八
兩瞼上下初生如粟米大漸漸大如米粒或赤或白不甚
疼痛堅硬有害肝臟瘀血所成宜服

消毒飲
大黃煨半兩 牛蒡子炒 甘草 荊芥半兩
右剉散每服三錢水壹盞半煎食後溫服

○胞肉膠凝三十九
眼胞皮肉有似膠凝腫高如桃李者時時出熱淚乃風毒
所注宜消風散及花草膏點之 方見風熱 消風散方見前

○漏睛膿出四十
此證頭目眼生瘡流出膿汁或如涎水粘睛上下不痛仍無
翳膜此因心氣不寧并風熱停留在瞼中宜服

白薇圓
白薇半兩 防風一 白蒺藜炒去角 石榴皮
羌活
右為末米粉糊圓如梧桐子大每服二十圓白湯下

○蟹睛疼痛四十一
此證如大豆出黑珠上疼痛不可忍又名損翳亦不可用
點藥宜服前決明散

○突起睛高四十二
風毒流注五臟不能消散忽然突起痒痛熱極所致宜服
前瀉肝散

○風起喎偏四十三
偏風牽引雙目喎斜淚出頻頻却無翳膜不痒不痛宜服
消風散用荊芥湯下 方見風熱

○倒睫拳毛四十四

此疾淚出澁痛，翳膜漸生，久後多年不安，眼皮漸急，
瞼倒難開，如刺刺疼痛，瞳仁不安，此乃脾受風熱，先服瀉
肝散，後服

五退散

蟬退洗　蛇退燒黃　荊芥　猪蹄退
穿山甲燒存性　川烏炮去皮　粉草各半兩　蚕退貳分半
右為末，鹽湯調下二錢

風牽瞼出四十五

上下瞼俱赤，而或翻出一瞼在外，此亦脾受風毒，宜服前
五退散。若患年深，瞼內俱赤，即不可治之

神祟疼痛四十六

眼無根因，忽然疼痛，或如針刺，或如火炙，及太陽穴掣痛，
早輕晚重，先宜灸福郄，服決明散方見前

旋螺尖起四十七

目疼痛生翳，膜尖起而赤，似旋螺，宜服前瀉肝散，次服前
決明散

鶻眼凝睛四十八

輪硬而不能轉側，此為鶻眼凝睛，此不可治

轆轤轉關四十九

此乃睛藏上下瞼，不能歸中，所以言之為轆轤也。其證亦
難治，然當日服後藥

天門冬　茺蔚子　知母各貳兩　五味子
防風各壹兩　人參　茯苓　羌活各兩半
右剉散，每服三錢，水一盞，煎，食後服

瀉肝散

麥門冬去心　大黃　黃芩　細辛
芒硝各壹兩　黑參　桔梗各兩半
右剉散，每服三錢，水一盞，煎，食后服

被物撞打五十

目被撞打，疼痛無時，瞳仁被驚，昏暗濛濛，眼眶停留瘀血，
用地黃膏貼去血，次服前決明散

地黃膏

生地黃壹兩　黃連壹兩　黃柏　寒水石各半兩
右地黃研自然汁和藥成餅子，要用時以紙貼目上，卧
但是撞打可用，凡風熱赤目熱淚出等眼，皆可用，以其
性涼能逐去熱毒耳

撞刺生翳五十一

因撞刺生翳，疼痛無時，經久不安者，復被物撞之，兼為風
熱所攻，轉加痛楚，昏暗不見，宜服

經效散

大黃　當歸　芍藥各半兩　北柴胡壹兩
粉草　連翹各壹分　犀角壹分
右剉散，每服三錢，水一盞，煎，食后服，仍用后磨翳膏點之

血灌瞳仁五十二
瞳仁爲血灌注，其痛如錐刺，皆無翳膜，視物不明者，或因有損，或由肝氣閉，血無所歸而灌注，宜引血歸肝
[illegible]圓
生地黃倍 赤芍藥各半 川芎乙兩 甘草五分
防風 荊芥 當歸尾各乙兩
右爲末，煉蜜圓如彈子大，食后荊芥薄荷茶嚼下。血既散而歸肝，又恐眼自生花，須再用前還睛散服之。
眯目飛塵五十三
塵埃飛揚入目，粘睛不脫，或被飛絲所侵，或被沙石所苦，疼痛引澁，揩碎不開，宜用後瞿麥散數

十七

天行赤目五十四
目忽然赤腫，晨昏痛澁，此天行時疾，或長幼傳染不安，雖因熱氣相傳，亦有輕重，且服前瀉肝散即安，虛人則用后五行湯洗。
暴赤眼後忽生翳五十五
此證輕則無妨，重則疼痛而白睛紅，花乃生翳膜，若是五臟積熱，宜先用前地黃膏，次服前瀉肝散。
瞼胞赤爛五十六
小兒初生下便有此證，至三四歲雙目紅而瞼邊赤爛，時復痒痛，經年不安，先服消風散，桑白皮煎湯調下，仍以后湯泡散洗。

風赤瘡疾五十七
眼兩瞼似朱砂塗而生瘡，黑珠端然無所染，此因風熱生於脾臟，若不治則生翳膜，宜服前五退散，次湯泡散洗。
衝風淚出五十八
風證至冬月極甚，發作不休，此因肺虛受風，遇風冷發膽
[illegible]
白僵蠶直者去絲嘴 旋伏花去梗 荊芥乙分 粉草 木賊半兩 細辛各半兩 黃桑葉乙兩
右剉散，每服三錢，水壹盞半，煎，食後溫服。
暴風客熱五十九
眼爲暴風熱所攻，白睛起障，覆黑珠，瞼腫痒痛，宜服前桑

十八

瞼硬睛疼六十
瞼中紅赤而堅硬，眼睛疼痛而淚出無時，怕日羞明，宜服前通肝散，若有障膜，用後春雪膏點之。
痛如針刺六十一
睛忽然疼痛如針刺，雙目根緊，急坐卧不安，此因熱毒在心，服洗心散，次服前還睛散方見大方科積熱類
痒極難任六十二
眼痒極甚，瞳子連眥頭皆痒，不能收瞼，此因清淨腑先受風熱得之，宜服
驅風一字散
川烏半兩炮 羌活 防風各乙分 川芎

荊芥
右為末每服二錢食後薄荷湯調下

起坐生花六十三

凡起坐生花或眩頭旋耳內蟬鳴此乃腎虛兼受客熱不節房事宜多服補腎圓

○瞳仁乾缺六十四

此證其睛乾澁全無淚液或白或黑始則疼痛后來稍定而黑不見此證不可治療

黃膜上衝六十五

黑睛從下生其黃膜上衝疼痛至甚閉澁難開此乃脾經受風食毒傷胃而得之宜服

[illegible]
犀角貳兩　黃芩半兩　白附子壹分炮
麥門冬去心壹分　車前子　羌活各半兩
右剉散每服三錢水一盞半煎食后溫服

赤膜下垂六十六

眼中有膜自上垂下遮黑睛或名赤脈侵睛風淚出怕日羞明此乃客熱上衝用後洗肝散點之次服前通肝散

小眥赤脈六十七　傳

小眥中生赤脈漸漸衝眼急宜早治此蓋三焦積熱得之宜服前犀角飲兼戒忌辛酸熱毒等物及房事方安

小兒通睛六十八

或兒撲損眼睛通者須頻頂後則見西畔者右振掉頭腦則睛方轉此肝受驚風宜服

牛黃圓
牛黃壹錢　犀角貳分　金銀箔各五片　甘草壹分
右為末蜜圓菉豆子大每服七圓用薄荷湯吞下

小兒疳瘡入眼六十九

眼胞生斑瘡疳氣衝透睛中疼痛淚出翳如銀片腫澁難開宜服

柴胡散
柴胡　黃芩　芍藥各半兩　甘草壹分
右剉散每服三錢水一盞煎六分入小兒加減服兼以藥淋洗之訖方服後

小兒瞼中生贅七十

眼瞼中生贅子初生如麻子大日漸如豆懸垂瞼內乃脾經風熱所攻宜加減服前伍退散

小兒斑眼七十一

小兒斑眼初生則遊癢久而生瘡翳障難開目兒見明時時出淚此因肝風所攻或因濕癢從虛熱上衝不可點宜服前退翳散兼方見小方科斑疹

小兒青盲七十二

胎中受風五臟不和嘔吐黃汁兩眼一同視物不明無藥可治

右七十二證方舉陳于前學者須其要詣眼科中用藥

不可太[illegible]有好[illegible]合為一丸不問虛實冷
熱悉皆服之群[illegible]爭功豈知補瀉溫涼之性各異其為
害也不可不戒之
[illegible]

磁朱圓 丹砂之畏磁石猶火之畏水今合用之其法
火入心能洪水入腎心腎各得其養則目自然明矣目疾
多由脾胃有痰飲漬侵於肝久則昏眩神麴倍於二味用
以建脾胃消痰飲極有奇效

神麴肆兩　辰砂壹兩　磁石貳兩[illegible]

右為末煉蜜圓梧桐子大每服五十圓食前米飲下
三服常服益眼力一方加夜明沙

駐景圓 治腎氣不足眼目昏暗瞳仁開[illegible]漸成內障

楮實子[illegible]　菟絲子[illegible]各貳兩　五味子
熟地黃　枸杞子　楮實　覆盆子
蓯蓉　車前子酒浸　石斛去根各壹兩　沉香
青鹽各半兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每七十圓空心食前鹽湯下

養肝圓 治肝血不足眼目昏花或生眵淚久視無力

當歸酒浸　車前子酒浸　防風　白芍藥
蕤仁　熟地黃　川芎　楮實各等分

右為末煉蜜圓梧桐子大每服七十圓不以時溫水下

羊肝圓 治肝經不足風邪內乘上攻眼暗淚出怕日羞明

[illegible]火痛[illegible]瞳仁[illegible]多見黑花或生翳膜[illegible]治之

草決明子[illegible]　黃連去鬚　[illegible]蒺藜炒去刺
防風去蘆　甘菊花[illegible]　肉桂去皮各五兩　蕤仁
羌活去蘆　人參各[illegible]兩　蔓荊子[illegible]
[illegible]　白茯苓去皮　細辛[illegible]　羯羊肝[illegible]
[illegible]

右為末煉蜜和杵伍佰下圓如梧桐子大每十五至二
十圓空心溫酒或溫水下日午臨卧日三服如久患外
障眼服諸藥未效者漸加服五十圓必效暴赤眼疼痛
食后用荊芥湯下二十圓

[illegible]圓 治肝腎俱虛眼常黑暗多見黑花或生障翳不明

菟絲子[illegible]　熟地黃[illegible]　車前子[illegible]

右為末煉蜜圓梧桐子大每服五十圓空心溫酒下

[illegible]圓 又**[illegible]圓** 治並同上各見入方[illegible]
[illegible]青鹽[illegible]四件合和鹽湯吞下二三十圓久服
除昏花增目力大效

[illegible] 治[illegible]眼[illegible]淚羞明

羯羊肝[illegible]

右以冬蜜研和入朱砂末少許頻研[illegible]食后臨卧服
[illegible]亦可點目

[illegible] 治久年眼生黑花不可者

椒目[illegible]　蒼朮[illegible]

右為末煉蜜圓梧桐子大每服二十圓臨卧茶下日可效
地黃圓治血虛赤腫臨卧吞調服方見雜科產後門
駐景補腎明目圓治男子婦人痛不生翳此便是元氣虛
腎經虛夜間小便二三次耗傷陽氣致生內障腦中有風
致鼻流清涕或膿脂流下或瞳仁開用此皆腎傷黑水散
也加炮附子枸杞子去生地揀菊花藥在醬紅棗煎食前
空心服仍以錦鳩青鹽小藥八味等圓藥和食前溫酒服
及四物散十全大補湯去熟地黃加附子枸杞子菊花茯苓
蘇香正氣散並用當歸茯苓服婦人服冷藥過多或崩或白
帶致令眼昏不見亦可服此急救諸方見大方科並見產後門

熱證

八正散治心熱衝眼赤腫澀痛熱淚羞明每服二錢水一
盞燈心二十莖苦竹葉七皮生地黃二根桑白皮七寸
煎食後臨睡服方見大方科積熱門

瀉肝散治諸般風熱風癢熱毒大人小兒生翳生膜生血
筋但是外障熱眼並可服若內障是虛則不宜服

黃芩　北細辛　甘草　熟地黃
大黃　山梔子　赤芍藥　當歸尾每細
牛蒡子　桑白皮各等分　菊花去梗

右剉散每服肆錢水壹盞半煎溫冷服合滓煎早食午
食晚臨卧各壹服忌豬魚酒麪糯米鹹酸熱油諸般
毒物眼乃一身之主如不能忌口藥亦無功自當此身
忌每日大熱麪糯米豬肉雞鵝或以葱韭蒜醬西瓜菓核棗子
柿子銀杏王瓜梔子生薑可喫

鎮肝圓素問云久視傷血血主肝故勤書則傷肝而目昏
肝傷則自生風而熱氣上湊目昏益盛不宜專服補藥當
益血鎮肝而目自明

熟地黃兩半　黃連去鬚　決明子炒各壹　防風
甘菊花　羌活　桂心　朱砂研
沒藥研各半兩

右為末煉蜜圓梧桐子大食後熟水下三十圓日三服

八正散治風熱毒氣上攻眼目腫痛或卒生翳膜或赤脈
努肉或澀癢羞明多淚或始則昏花漸成內障但是一切
暴風客熱並宜服之

黃芩　甘菊花去梗　木賊　草決明子
石膏　赤芍藥　川芎　川羌活
甘草　蔓荊子　石決明

右剉散每服三錢水一盞半生薑伍片煎食后服

敗毒散治熱眼澀痒熱證每服三錢加薄荷桑白皮煎方
見大方科傷寒類

羊肝圓治肝經有熱目赤睛疼視物昏澀

羯羊肝壹具生用　黃連去鬚別研為末

右先將羊子肝去筋膜於砂盆內擂爛入黃連末杵和
為圓梧桐子大每服五十圓不拘時候熟水下

[illegible]湯 治眼暴赤時行赤腫作痛

黃蘗（用力者去粗皮以多少）

右以濕紙裹黃泥包煨候泥乾取出每用一彈子大紗帛包水一盞浸飯上蒸熟乘熱熏洗極效此方有金木水火土故以名之一圓可用二三次

[illegible] 治赤眼

右用生地黃肥者洗淨研細絹帛包之仰卧以藥搭在眼上初似碍而痛少頃清涼小兒赤眼黃連為末水調貼腳心其赤自退

又方 治血灌瞳仁生障瞖

右用生地黃研細和大黃末[illegible]以帛鋪二寸搭在眼上可再易之

黃連湯 治火眼

[illegible]黃連（去毛[illegible]） 杏仁（去皮尖） 北棗（[illegible]）

右用新瓦盆存貯入水八分以布羅蓋慢火熬存二三分放在地上去火毒候冷存在湯瓶上蒸溫不要熱病者仰卧令人滴藥汁在眼尖角近鼻若候口中有苦味即是藥透如未知苦則一面滴數次即安其效如神

蔓荊散 又名小洗肝散治赤腫澁痛多淚

[illegible]根 蔓荊子 荊芥 梔子

甘草

右剉散每服三錢水一盞煎先熏後服食后用之

[illegible]散 治眼目赤腫瞖障羞明

鵬砂（[illegible]） 腦子（壹分） 通明朴硝（半兩）

右為末入乳鉢研拜用細絹羅過每用一小錢光弦者點津液沁藥末入目中閉窶時令藥自方開眼淚出效

[illegible]散 治仝前

木賊（[illegible]） 菊花（去梗） 羌活各半兩 香附子（去毛） 細辛（[illegible]）

右為末每服二錢用好茶少許同煎食后服

又方 治眼有血絲或有紅線及生瞖此是熱眼服前經效[illegible]

又方 治眼關不得開怕日此是風熱壅閉所致宜[illegible]

[illegible]散 加前胡連根葱白二莖煎服若臟腑閉加大黃小兒[illegible]瞖障及瘡疹不得開加生桑白皮七寸同煎根葱能瀉肺膜不生瞖便退（方見大方科傷寒類）

石決明散 治眼生外障不問男女小兒皆治兇服經效散不退却進此藥

石決明（壹兩火煆） [illegible] [illegible]（壹兩） 谷精草（壹兩）

人參（[illegible]）

右各於地上出火毒研末每服二錢沙糖冷水調食后

[illegible]方 治眼赤腫及治每睡起時赤須臾又白名血熱非肝病也

右以生地黃白然汁以粳米半斤三次浸三次曝乾用砂瓶煎湯一升令沸下地黃及米煮成薄粥半飽飢[illegible]

一兩炙即瞖三次立效、

貼藥治眼腫痛十分大者、

右以生地黃自然汁調搽過白丸治眼胞上痛即止、

又方治風熱上衝昏肉攀睛、

右用青絲少許研爛入片腦子少許貼眼上頻效

風證

消風散治昏澀風痒加荊芥煎湯服

蝉花散治肝受風毒眼目昏暗漸生翳膜、

蝉退 木賊 白蒺藜

羌活 甘菊 京芥穗 甘草

右為末每服二錢食后茶清調下、

洗肝散治肝熱風毒攻眼昏淚出痒

白蒺藜 防風 甘草 甘菊

生川殭蚕 白南星

右為末每服貳錢沸湯少塩點服、

還睛散治風眼氣眼昏淚痒翳膜或頭風牽引眼小

飛爛並治之、

石決明 防風

羌活 蝉殼 甘草 荊芥

細辛 蛇皮 茯苓貳兩

蒺藜 苦藥 蒼术

右剉每服二錢米泔或茶清食后調下

洗風散治風熱攻眼赤腫、

京芥穗 梔子仁 牛蒡子 蔓京子

甘菊花 細辛 甘草 防風

白蒺藜 黃芩 川芎 大黃

黃芩 木賊 草决明 蒼术

右為末每服弍錢紫蘇或蜜湯調食后臨卧服、

蒼术散治風毒攻眼昏淚癢痒、

蒼术 防風弍兩 白蒺藜

弍兩 荊芥穗 甘草

右為末每服二錢入塩少許沸湯點服或用消風散夾

和尤佳、

洗眼散治爛眩風亦治胬肉攀睛澀痒昏淚、

防風 龍膽草 銅青 五倍子

淡竹葉

右為末每服半錢熱湯一合泡停冷澄清洗拔效、

又方治爛眩風此眼有虫細如絲色赤而長滋生不已

覆盆子葉不以多用

右洗淨研自然汁以皂紗帛蒙在眼上以筆蘸藥汁於

上下眼胞當有細虫出於紗上或研細著藥於紗上便

睡亦可此方治眼暗不見物冷淚浸淫不止及青盲者

其法搗取自然汁澄陰乾入飯男子乳化開點入目中

即仰卧更入少許腦子尤好三四日間視物如年少、

【湯泡散】治爛弦風眼癢痛淚流兩瞼赤爛及瘡毒藥不效用
此藥久須以湯下從瘡中流出其淵竹小中江效
黃連　炎竹葉（各壹兩）　柏樹皮（半兩用）
右剉散以二升水煎至五合稍冷用滴目內兩眥及洗
爛處日三四次。
【洗方】治爛弦風赤眼。
五倍子（搥碎去蛀末）　蔓荊子（揀淨）
右用水煎澄清溫熱洗或用桑枝灰淋水洗亦效
【又方】青礬火煅研細炎毒每用半錢熱湯一盞泡溫洗爛
弦及拳毛倒睫效。
【又方】治眼癢多因布巾拭破了眼角致成爛弦風不得癢

白礬（壹兩煆過）　銅青（叁錢）
右同研細和勻如色白再加銅青每用半錢熱湯一合
泡澄清以手蘸開眼如法洗必溫不可拭乾但閉目坐
待藥止自然眼開勿藥冷將合蓋盞面於湯瓶上坐溫
又洗一日洗四五次即效。

氣證

【治氣眼方】治因怒氣或食熱物或飲酒而致目赤眼胞
紫脈內生赤脈加大黃煎服後加川芎治氣眼
【治氣眼方】治同上挾熱者服之特效（附中氣眼）
【治目障方】治久患雙目不睹光明遠年近日內外氣障
風熱攀睛拳毛倒睫一切眼疾。

羌活（治腦熱頭風）　密蒙花（治羞明怕日）　木賊（治翳障）　川白芷（治頭風）
北細辛（治大腦頭風）　蔓荊子（治頭風）　麻子
川芎（治頭風）　黃芩（退熱）　石膏
藁本（治頭風頭痛）　甘草（解諸藥毒各等分）
右為末每服二錢食後臨臥蜜水一盞調下或茶清或
淘米第二遍泔水調下進三服至十日漸明二十日大效

翳障

【撥雲散】治目內翳障兼治痘瘡後餘毒不散目生翳膜
真蛤粉（另研壹兩）　穀精草（壹兩生用）
右和勻每服二錢用生猪肝一片三手指大批開摻藥
在上捲定再用麻線外扎濃米泔一椀煮肝熟為度取

出稍冷食后臨卧細嚼却用元煮肝米泔送下忌一切
多般毒物。
【又方】治目赤后暴生翳。
右以雞不食草（搐鼻中）立瘥。
【夜明散】治內障及因病赤眼食蝕物而得者
夜明沙（淘淨）　當歸（去蘆）　蟬退（去足）　木賊（去節各三兩）
右為末用白羯羊肝四兩湯煮爛搗如泥入藥末圓如
梧桐子大食后溫熟水下五十圓百日眼如故矣。
【又方】治雀目翳障服之眼可復明（方見前）
【又方】治外障眼
右以猪膽一枚用銀石銚煎成膏入冰片腦子少許攪

入眼中瞞翳輕又將豬膽白膜皮陰乾合作小繩如釵大小止用一頭燒作灰待冷點翳數日后翳退如神

[illegible]散　治內障有效

生熟地黃切焙　川椒去目及閉口者微炒

右等分為末煉蜜圓梧子大空心鹽湯米飲下五十圓

[illegible]方　治瘡疹入眼及昏暗翳尤妙

右用兔子糞焙為末每服用好茶清調下即安須待瘡疹安后服此

[illegible]散　治風熱內外障氣眼疾

川獨活去蘆　川羌活去蘆　川芎　射干

仙靈脾　防風去蘆　甘草　井泉石

蒼术各半兩　草决明　丹參　白术

石决明各三分

右件為散每服三錢水一盞半煎温服食後臨卧日三服

[illegible]散　治內障眼

蟬退　蛇蛻　蚕紙　烏雞卵殼

男子髮

右並燒存性研為末每用一錢和羊肝湯吃不以時候

[illegible]圓　治內障眼

熟地黃　麥門冬　車前子

右等分焙乾研煉蜜圓用湯送下二三十圓甚效

[illegible]　治眼目昏翳

蟬退洗曬　蒼术米泔浸[illegible]　熟地黃洗焙

川芎　白蒺藜炒去刺　茺蔚子

羌活　木賊去節[illegible]　甘菊

荊芥　石决明煅各半兩　杏仁去皮尖

兔絲子酒浸　蛇皮洗淨焙　防風各半兩

右為末煉蜜圓如彈子大每一圓食后細嚼薄荷茶下

[illegible]膏　治遠年近日翳膜遮障攀睛瘀肉連眶赤爛視物昏暗不覩光明隱澀多淚迎風難開治之神效

爐甘石[illegible]

黃連[illegible]

[illegible]

桑木灰[illegible]

龍膽草[illegible]

右件同白蜜四兩一處入在一瓷黑瓶器內文武火慢熬以竹篦子攪如漆色不粘手為度切勿犯生水仍不用鐵器熬候藥成依舊以瓷器盛頓每服用如芝麻大新汲冷水半盞化開洗三日不用每日洗數次無妨藥盞須用紙蓋不可犯灰塵哉赤目極有功效

[illegible]丹　治昏翳

黃蠟　黃丹水飛各壹兩　蛇蛻壹分燒灰　水銀壹分

初生烏雞卵殼

右以柳木槌研細前件為餅臨卧用之候天明將水照眼藥隨水中脫去

點眼方 神驗眼藥
朱砂半分　海螵蛸壹分
右入乳鉢内同研細水飛過澄取又用少許黃蠟溶化
入藥待要用時就火炙開如蘿蔔子大臨卧用一圓點
入眼角緊合眼睡著次日用温湯洗下未全退者更用
一服極妙
通治
點眼猪膽子 治眼目諸疾
右用猪膽一枚入蜜一錢在内線扎定甘鍋内滴入水
煮熟冷水内浸取出候乾傾入小罐内竹筋點眼四角
洗方 羌活散 治肝經風熱攻眼赤腫羞明漸生翳膜
當歸尾　赤芍藥　黃連去鬚　杏仁各伍分
銅青三分　薄荷葉叁分　防風五分
右剉散每用二錢極沸湯泡蓋熱先熏后洗冷則再煖
用日兩三次又方沸湯白鹽入少許閉目沃洗鹽亦散血
淋洗法 治眼睛腫脹突出新汲水沃眼中數換水明白之
又以麥門冬桑白皮山梔仁煎湯通口服之
內障 治遠年日近不覩光明内外障眼攀睛瘀肉瞎睚
赤爛瞳難開怕日羞明推後行淚視物不明時見黑花
或臉生風粟或翳膜侵睛目腫疼痛並皆治之此藥神效
兼治口瘡天蛇頭瘡
白沙蜜壹斤　黃丹肆兩　硇砂　乳香
青鹽　輕粉　鵬砂　腦子各貳錢
麝香各半分　金星石　銀星石　井泉石
雲母石各壹兩　黃連去鬚　烏賊魚骨各半兩
右件藥於淨室中不得令雞犬婦人見用銀石器慢火
先炒黃丹令紫色次下蜜候熬得沫散其色皆紫次入
臘月雪水三升再熬二十餘沸將餘藥研成末一處同
熬用筋滴於指甲上成珠不散為度以厚紙三張鋪在
筲箕上傾在紙上濾過再用瓶子盛放在新水内浸三
晝夜去火毒其水日一易之看病眼輕重臨晚用筋蘸
藥點大眥頭以眼澁為度若治内障用麪水和成條捏
作圓子臨卧置眼上仰藥在内如此用之一月見效
治赤眼後生翳膜方
右以蘭香子淨洗曬乾每用一粒以筋點大眥頭閉目
即瞖膜在目内團圓旋轉藥力過即不轉須臾自隨眵
淚出若翳膜在上如魚眼然再易一粒以病退為度
洗眼方
輕粉　防風　馬牙消　餅子銅青
右為末每用一字温湯調不拘時洗立效
小兒疳眼 治疳瘡入眼
草決明　青稻子　乾葛　槐花
敗荷葉水上者壹片
右為末每服米泔水調下二錢如四五十日病人此藥

若半年以久則眼老睛昏，宜合后藥

香白芷　香附子　連翹　甘草

蟬退

右荆散每服二錢，水一盞煎去滓，調前藥服，仍忌熱味

〔浮萍散〕治斑瘡入眼，大人小兒皆可用之

浮萍　陰乾為末

右每服二錢，以生羊子肝半個入盞內，以杖子割碎，沒水半合絞取肝汁，調下，食后。不甚者一服差，已傷目者十服見效。

〔[illegible]〕治眼痰肉攀睛風痒淚出不止

朴消 [illegible]　白丁香 [illegible]

黃連　貳兩為末

右取水入磁香瓮內熬至七分，淘出令經宿水面浮牙者取出控乾，以布袋盛風中懸至風化，將黃連末熬清汁曬乾消用，猪膽羊膽和加蜜燉熟之效。

〔[illegible]膏〕治風眼疼痛不可忍者，流之妙。

好崖蜜半斤　黃連伍錢　沒藥弍錢半　黃丹 [illegible]

右入蜜同熬，黑前黃連成稠汁，入三味藥內煎熬，稠更入沒藥末同熬數沸，濾去滓，仍用后通天散搐鼻。

〔通天散〕治偏正頭疼，一切壅滯，明目。

赤芍藥　川芎　黃芪　黃芩

玄胡索　草烏頭　當歸　乳香 [illegible]

右為末，每服少許，紙撚子蘸藥搐鼻取效。

〔飛絲入眼疼痛方〕

右用清菜汁點如神　刮指甲上細屑，蘸頭髮津液點小眉入眼中，其絲自聚，援去　又方，飛絲害左目，以石菖蒲搥碎，塞右鼻中；右目即塞左鼻中，百發百中

〔[illegible]〕治飛絲入眼，令人睛脹疼，甚痛不可忍

新筆兩三管，濡好墨，更換頻運眼上，飛絲纏筆而出，即效

〔灸法〕目中痛不能視，上星穴主之，其穴在直鼻上入髮際一寸陷者中，灸七壯；仍先灸譩譆穴，其穴在肩膊內廉第六椎兩傍三寸，其穴抱肘取之，灸二七壯；次灸風池，其穴在顳顬後髮際陷中，與中府正相當，即是，側相去各二寸

青盲無所見，遠視䀮䀮，目中淫膚白膜覆瞳子，巨窌主之，其穴在鼻孔下夾水溝傍

眼暗，灸大椎下數節第十當脊中，安灸二伯壯，惟多愈佳，至驗

風翳，患右目灸右手中指本節頭骨上五壯，炷如小麥，患左手亦如之

目卒生翳，灸大指節橫紋三壯，在左灸右，在右灸左，良

〔灸法〕目不明，淚出，目眩，瞳子癢，遠視䀮䀮，昏夜無見，目瞤動與項口參相引，喎僻口不能言，刺承泣穴，在目下七分，直瞳子

拾遺十六方

明目圓 治年深日近翳膜障昏淚出無所見一切目疾

熟地黃酒洗焙 兎絲子酒洗 車前子 麥門冬去心

薏苡仁去皮 決明子 地膚子 茺蔚子

枸杞子 黃芩 五味子 防風去蘆

澤瀉 細辛去葉不見火 杏仁一兩去皮尖 葶藶一兩炒

青葙子各一兩 桂皮半兩 羊肝

右為末圓如梧桐子大每服三十圓熱水下日三服忌

戒生姜糟酒炙煿等熱物

還睛圓 治頭旋腦虛眼目昏暗

生犀 人參 白朮 當歸

芎藭 木香 茯苓 丁香

牛膝酒炒 茯苓 天麻各半兩 腦麝少許

右為末好酒三升生羊膽一枚熬成膏圓如梧桐子大

每服三十圓麝香酒下

地黃圓 治肝腎虛熱風毒上攻眼目淚出

石斛去苗 防風 枳殼去瓤麩炒 生乾地黃

熟乾地黃各半斤 川 杏仁去皮尖

右為末煉蜜圓梧桐子大每服三十圓食前溫酒或米

飲鹽湯亦可忌一切動風毒等物

散 治目赤腫痛 每食腫痛如

李大不得開者

黃芩 大黃 菊花 甘草

防風各壹兩 當歸半兩

右判散十歲已下每服二錢水一盞煎空心服

散 治小兒赤熱腫目

川大黃 白礬 朴消

右為末冷水調作餅子貼目上

散 治風熱腫赤難開

雄黃水飛 辰砂各一分 細辛半兩 腦麝少許

右為末口含水以少許搐鼻中

圓 治諸般眼患因熱病後毒氣攻目生翳膜遮障服

此漸漸消退不使針刀

青葙子炒 防風 枳殼各壹兩 茺蔚子

細辛各半兩 枸杞子 澤瀉 生乾地黃

石決明 當歸 宣連 車前子炒

麥門冬去心各一兩

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓食后麥門冬

煎湯送下

散 治目生翳膜內外障

海螵蛸 生龍腦少許

右為末極細用熱湯浸起以銅筋點之五七次

治暑月行路眼昏澀者

生龍腦草汁壹合　黃連參寸剉碎

右用生絹捩出汁，點入目中。

羚羊角散 治十六般內障，多年昏暗，或近日不明，淚出眩爛，一切目疾並皆治之。

羚羊角鎊屑水煮　人參壹兩　密蒙花三兩

覆盆子　蠐螬炒黃各壹兩　茺蔚子　決明子各半兩

地膚子　甘草　枸杞子各壹兩　菊花壹

槐花各半兩

右為末，食后用飯飲調下二錢。

點眼藥 右用大田螺一箇，淨養去泥，然后入瓦合中，以腦麝少許入田螺內，攪中封起，候十日餘開，即便成水，點之。

洗眼碧雲散

銅青參分　滑石壹分　玉膏半兩　輕粉

麝香各少許

右為末，每用少許湯泡洗。

敷藥[illegible] 右以[illegible]麥炒令黃色，為末，用鵝涎調，逐時塗[illegible]

[illegible]圓

青羊膽各壹　青魚膽　鯉魚膽各壹枚　熊膽壹分

牛膽半兩　麝香少許　石決明壹兩

右為末，麪糊圓梧桐子大，空心茶下十圓。

[illegible]散

龍腦　曾青　水晶各半兩　真珠末

琥珀各壹分

右為末，夜后以少許點眼立效。

空青圓 治沉翳細看方見，其病最深。

空青貳分　五味子　車前子　細辛各壹兩

防風　生乾地黃　知母各壹兩　石決明壹兩

右為末，煉蜜圓如梧桐子大，每服十圓，空心茶送下。

眼科龍木論卷之

世醫得効方卷第十七

口齒咽喉方卷第十七

建寧路官醫提領陳志　刊行

南豐州醫學教授危亦林　編集

江西等處官醫副提擧余賜山　校正

口齒兼咽喉科

總說

口爲身之門，舌爲心之官，主嘗五味，以布五臟焉。又心之本脈係于舌根，脾之絡脈係于舌傍，肝脈絡于舌本。三經爲四氣所中，則舌卷不能言；七情所鬱，則舌腫不能語。至如心熱則舌破生瘡，肝壅則出血如涌，脾閉則白胎如雪，此舌之爲病也。口又稍不然，蓋熱則口苦，寒則口鹹，虛則口淡，脾冷則口甜，宿食則口酸，煩躁則口澀，乃口之津液通乎五臟，臟氣偏勝，則味應乎口。或勞鬱則口臭，凝滯則生瘡。生瘡者夜不可失睡，晝不可就寢，當此必甚。唇乃屬於脾，皆有病則多唇齊，經以治脾。齒乃骨之餘，腎主營養，呼吸之門戶也，故腎衰則齒豁，精盛則齒堅。又手陽明大腸脈入於牙齒，灌於大腸，壅則齒浮腫，虛則宣露，挾邪則上攻面目，[illegible]則齒[illegible]，牙爲脫落。[illegible]之咽者，咽也；喉者，候也。咽接三脘以通胃，故以之咽物；喉通五臟以系肺，故以之候氣。[illegible]諸[illegible]熱則腫，寒則縮，[illegible]則聲嘶[illegible]

[illegible]咽喉閉塞也。[illegible]則不能[illegible]，乾則不能發聲。又因飲食辛熱，或復嘔吐，咯傷咽系，乾枯之所致也。其與喉痹不同。又有懸癰，其腫附於咽喉嚨，亦如喉閉狀。在懸雍上腭，及閉下咽道之[illegible]，[illegible]俗語[illegible]以後一十八種證辨之。

口病

[illegible]散　[illegible]　治心脾有熱，口瘡[illegible]

[illegible]散　治[illegible]熱，口瘡[illegible]

[illegible]　治[illegible]口臭[illegible]

[illegible]丸　治口破生瘡，不欲飲食。

[illegible]湯　治虛熱口瘡，[illegible]

丹母散一十粒[illegible]

[illegible]散　治上腭壅毒，口舌生瘡，咽喉腫痛，少許摻患處。

寒水石（煅）[illegible]　辰砂[illegible]　生腦子（半字）

右爲末，日夜數次用。小兒瘡疹及口瘡，先以五福化毒丹掃抹，用此藥立效，方見小方科瘡疹類。

[illegible]散　治口瘡與氣[illegible]，久而不差。

黃連（半兩）　螺青[illegible]

右爲末，臨卧置一字在舌下，不妨嚥津，遲明定。一法以銅綠易螺青。

[illegible]散　治上腭[illegible]，舌上瘡，咽喉腫痛。

升麻　赤芍藥　人參[illegible]　桔梗[illegible]

乾葛 各壹兩 甘草 半兩生

右㕮咀每服肆錢水一盞半生薑五片煎溫服不拘時候一方加薄荷黃芩 紫

[illegible]治一切壅熱咽喉閉腫不能嚥物口舌生瘡舌強言語不正腮頰腫痛

蒲黃 青黛 鵬砂 焰硝 甘草 各等分

右為末每用手指捻摻於喉中津嚥或呷少冷水送下頻頻用之

[illegible]治毒熱口瘡或下虛邪熱

右用乾薑黃連為末摻瘡上初若不[illegible]痛應手而愈

[illegible]治口瘡

黃蘗 蜜塗炙紫色 滑石 研各半兩 五倍子 炒

右為末和勻每服半錢許乾摻瘡上良久可飯食奇效

[又方]治滿口瘡爛 [illegible]

[杏粉散]治口瘡以涼藥傅之不愈者

杏仁 十粒去皮尖 輕粉 壹字

右研杏仁調勻臨臥傅瘡上必須吐之勿嚥

[illegible]治口瘡久氣攻爛久不差者

右用黃柏半兩青黛一錢為末臨臥安舌下

[illegible]治口氣熱臭

香白芷 川芎 各等分

右為末煉蜜圓如雞頭大食後臨臥噙化一圓

[益智散]治心氣不足口臭

右用益智去殼 甘草 為末時復乾點下或沸湯點服

[illegible]治口臭口乾舌瘡

寒水石 煅 鵬砂 二兩 腦子 麝香 各一錢

牙硝 半兩 甘草 二兩

右為末甘草膏搜為圓麻子大用含嚥

[又方]香附子炒去毛為末早晚以少許揩牙上

[遠志散]治口瘡立效

五倍子 遠志 去心各半兩

右為末摻少許於舌上吐出而瘡已矣

[又方]朴硝 寒水石 各一錢為末朱砂少許和勻傅瘡上

[又方]生薑自然汁漱口數次涎出而效

[illegible]治口瘡

[illegible]砂 火煅存性為末摻口內瘡上即安

[illegible]治口吻邊生瘡浸淫不愈

[illegible]火煅為末入輕粉用飯甑上滴汲調傅瘡上立效

[illegible]治口瘡及咽痛

地龍 去土炙 吳茱萸 去梗炒 各等分

右為末米醋入生麵調塗足心神效

[又方]右以吳茱萸為末水調傅足心效最宜治小兒口瘡不肯服藥者一貼而愈

蠟礬丸治下虛上壅口舌生瘡
右以白礬為末用湯化以洗足
脣病
菊花丸治脾肺氣虛憂思過度榮衛不和脣裂瘡腫或口吻生瘡容色枯瘁男子失精女子血竭悉宜服之
甘菊花　肉蓯蓉（酒浸焙）　枸杞子　巴戟（去心各等分）
右為末煉蜜圓梧桐子大每服三五十圓米湯下
瀉黃飲子治風熱蘊於脾經脣燥坼裂無色
白芷　升麻　枳殼（去瓤麩炒）　黃芩
防風（去芦）　半夏（湯洗七次）　石斛（去根）　甘草（各一分半）
右剉散每服四錢水一盞半生姜五片煎七分不以時服
薏苡仁湯治風腫在脾脣口瞤動或生結核或為浮腫
薏苡仁　防己　赤小豆（炒）　甘草（炙各三分）
右剉散煎同上
橄欖散治脣緊燥裂生瘡
右以橄欖不拘多少燒灰為末以豬脂和塗患處
白灰散治口緊脣小不能開合飲食不得不急治則死此亦奇病以此方治之得效名曰緊脣又名瀋脣
用白布作燈炷如指大安斧刃上燃炷令刃上汗出拭取傅脣上日二三度故青布亦得或青布灰以酒服亦可和豬脂塗傅　又以蛇皮揩拭燒為灰傅之　又以蠐螬灰末豬脂調傅　又燒亂髮蜂房六畜毛燒灰豬脂調傅　並見寶條亦名馬齒莧煮汁洗緊脣
灸法治緊脣不能開合灸虎口男左女右又灸承漿三壯穴在脣前脣下足陽明之會
舌病
升麻柴胡湯治心脾虛熱上攻舌生瘡舌本強頰兩邊腫痛
柴胡　升麻　芍藥　梔子仁
木通（各一兩）　黃芩　大青　杏仁（去皮尖各三分）
石膏
右剉散每服四錢薑五片煎食後服
金沸草散治風寒傷於心脾令人增寒發熱齒浮舌腫
方見大方科傷寒類
正舌散治中風舌本強難轉語音不正神效
蠍梢（去毒二分）　茯神木（剉焙乾一兩）　薄荷（二兩焙）
右為末每服一二錢溫酒調食後服
五福化毒丹治脣舌腫破生瘡煩渴方見小方科瘡疹類
栝蔞散治風濕其舌強不能語
栝蔞　桂心（各二分）
右為末每用一錢安舌下或用正舌散治之
治木舌腫滿口中氣不得吐
右用臘茶陳白梅巴豆七粒去殼同搗如膏以薄荷水調稀刷口中得下咽片時即瀉一二行以粥補之舌巴
平灸又方以薄荷水洗之

待作時

又方 右以釜底黑煤研勻內外塗舌良久即已 又方 以蒲黃

海螵蛸爲末內外皆塗之

又方 治大人小兒重舌腫起舌下

右用朴硝研水漱咽喉外其內用成塊者含涎出乃止

一方 地蝍虫和薄荷研汁帛包蘸舌下腫起 重舌極

證用指去爪先於舌下筋上擦至根漸深擦入如此

三次又用指蘸水取項后燕窠小坑中筋自上赶下至

小窩深擦入亦三次小兒若飲乳勝前則病去矣

又方 治血熱舌忽然腫破

右以釜底煤醋調傅舌上下脫去更傅能先決出血竟

傅之尤佳 一法用塩等分調

又方 治舌上生白胎乾澁語話不真

白蜜 薄荷自然汁 各等分

右以生薑片先蘸水揩洗竟用朱砂雄黃鵬砂腦爲

末傅之良未效更加玄明粉

又方 治熱壅舌上出血如泉

五倍子 微炒 白膠香 牡蠣粉 各等分

右爲末每以少許糝患處或燒鐵篦熱烙孔上

又方 治舌衄

蒲黃 微炒 螵蛸 青黛 各等分

右爲末每用少許擦患處少待溫鹽水漱之

[illegible]方 治連月飲酒咽喉爛舌生瘡

右以水中螺螄肉用葱豉薑椒煮汁飲三盞差

治重舌 新蒲黃爲細末數傅之吐去又傅凡五七次愈

亦治舌腫滿口不能出聲傅之立安

又方 五靈脂米醋一椀同煎含漱旋嚥即立安

治舌無故出血名曰舌衄 炒槐花爲末摻之而愈

治舌腫滿口 好鵬砂爲末用薄批生薑蘸藥揩腫處即消

治舌上腫咽 好猪胞以針刺舌下兩邊大脈血出即消切

勿刺著中央脈令人血不止則以火燒銅筯烙之不止

則殺人或以釜下墨醋調傅舌上下脫去再傅須臾而

消此患人多不識失治則死

治懸癰 凡舌腫舌下必有噤虫狀如螻蛄臥蚕有頭有尾

頭小白可燒鐵烙烙頭上即消

治舌大 槐花新尾上炒香熟三更后床上仰臥隨意而

食亦治咯血

齒病

治腎圖 八味圓 治虛壅牙齒痛浮腫 方見大方 [illegible]

治齒[illegible] 治齒疼痛搖齒者兼去而齒之左右上下非獨非腫

不能嚼食食後先溫湯煎一服以火[illegible]皮煎湯漱之空心

以羊腰一對切片不令斷以[illegible]摻子[illegible]末內之

拜用蒿末散一錢和勻摻腰子以荷葉包火煨熟食之而愈

方見大方 [illegible]

牡 作蛀

[illegible]散 治風蚛牙疼，腫痒動搖，牙齦潰爛，宣露出血，口氣等疾，悉能治之。

地骨皮　香白芷　川升麻　防風

細辛　川芎　槐花　當歸

藁本　甘草 各等分

右末，每用一字，揩擦牙或痛處，即取二錢，用水一盞[illegible]，黑豆半合，薑三片，煎溫漱，候冷吐之，就服亦無妨。或用金沸草散，煎漱亦佳。

[illegible]圓 治牙疼不可忍者。

[illegible] [illegible]　生附子角 [illegible]　巴豆 [illegible]

右爲末，用蒸餅爲圓，如黍豆大，以新綿裹一圓，咬之，有延即吐去。

[illegible]散 治同上

蝎梢 [illegible]　附子臍　蜈蚣頭 [illegible]

川烏頭尖 [illegible]

右爲末，先用竹簽刺痛牙齦，次以此藥一粟米許在痛處，甚者不過兩三次效。

細辛散 治風蚛牙疼，牙齦宣爛，牙齒動搖，腮頷腫痛。

草烏　白芷 [illegible]　細辛　荊芥 各[illegible]兩

紅椒　牙皂　鶴虱　蓽撥

縮砂仁 各半兩

右爲末，每用少許擦痛處，有延吐出，不得嚥，少時以鹽水漱口，頻頻擦用立效。

二陳湯加細辛、枳殼，用生薑、棗子煎，治[illegible]齒痛，仍以[illegible]等分，井水煎，候溫，含漱良久，吐涎自流出。[illegible]

[illegible]散 治惡血齒痛。

右用川五靈脂，米醋煎汁，含[illegible]。

[illegible]散 治毒血齒痛，入升麻煎。[illegible]

荊芥散 治牙宣出血或痛。

右用槐花、荊芥、[illegible]等分爲末，擦牙，仍煎點服。

[illegible]散 治齒出血。

[illegible]　白芷　細辛 各四[illegible]分

右爲末，擦牙，次以竹茹、竹皮濃煎，入鹽少許，含[illegible]。治牙宣，鮮紅者[illegible]，紫黑者[illegible]和湯，仍以鹽泥[illegible]末，揩牙上。[illegible]

[illegible]方 治牙疼。

胡椒　[illegible]藥 [illegible]　乳香 [illegible]

右爲末，若左邊疼，用少許搐入左鼻，又吹入左耳；如右疼，搐右鼻，吹入右耳。

[illegible]方

蒲黃末　乳香末　白芷末　雄黃末 [illegible]

右和勻，以[illegible]蘸藥一字，[illegible]左右，[illegible]用[illegible]咬在痛牙上。

擦牙方

鶴虱　細辛　白芷　甘松各等分

右為末每用少許擦痛牙上如有蛀孔用藥入蛀孔中效

治牙蛀孔 右以蕪荑仁安蛀齒上有縫就塞之立效

治風蛀牙疼 馬夜眼上以刀兒薄起一片子，以在所患牙縫中，或咬在痛處，瀝出風涎即止，不可嚥。

乳香丸 治蚛牙痛。

光明白礬枯過　滴乳香各等分

右為末溶蠟量多少和成膏，旋圓看蚛牙孔子大小，填之，其痛立止，神效。又方入胭脂少許和，令深桃紅色，只作散，遇牙疼痛，用一字以指擦，良久，溫鹽湯漱口。

治牙疼 白僵蠶直者不以多少，用生薑一片切同炒候赤黃色為度，去薑不用，為末，每用取不蛀皂角，剝去黑皮，以手指蘸湯於皂角黃上擦取汁，調殭蠶末，指痛處即止。

治風牙 治風牙疼腫，不拘新久，一服立效。

高良薑一塊約二寸　全蝎一枚瓦上焙乾

右為末，以手指點藥如齒藥用，須擦令熱徹，須臾吐出少涎，以鹽湯漱口，大妙。亦治腮頰腫痛。

定痛散 治一切齒痛，不問久新風蛀痛立效。

全蝎四十枚　細辛洗去葉　草烏去皮尖　乳香別研各一錢

右為末，每用少許擦患處，須臾以鹽湯水灌漱。

獨活散 治風熱氣上攻，齒齦浮腫，或連頰車疼痛，或膿血出。

羌活　川升麻　柳枝　槐角子

獨活　地骨皮　藁本去蘆　槐白皮

右剉散，每服一兩，水一椀，入鹽少許，煎熱含冷吐之。

防風散 治牙疼。

防風　鶴虱各等分

右剉散，濃煎，噙漱立效。老鶴虱草研爛，塞痛處亦可。

消風散 治齒熱痛，斷腫有汁，先傅以消風散，又以朴硝傅其上。又法用川升麻煎湯漱口，以細辛末擦，若見風刺齒，各等分。

香附散 治冷證齒痛

香附子　紅川椒　故紙炒各一錢　蓽撥乙錢

右為末和炒鹽貳錢擦傅。

川芎散 治面腫牙疼不可忍。

川芎　白芷　細辛各等分

右為末，擦兩三次，指湯漱口止。

秘方擦牙散 治牙疼，遇喫冷熱，疼痛尤甚。

良薑　細辛　大椒　草烏尖

右為末，以指蘸少許擦牙上，齊少時，開口流去涎，妙。

牙痛有內證

熱者怕冷水用牙消薑黃雄黃京末　冷者怕熱湯
用乾薑蓽撥細辛　不怕冷熱乃風牙用豬牙皂角
殭蠶蜂房草烏　有窠者蛀牙用雄黃石灰沙糖用藥
了並用溫水灌漱之為佳

取虫方治牙有虫而痛
韭菜頭連根洗淨爛擣同人家地板上泥和勻擦痛處
腮上用紙貼之一時頃取下細細虫在泥上可以絕根

揩漱方治熱毒牙動牙宣出血
香附子去皮毛剉碎用薑汁浸一宿曬乾為末漱口揩
齒齒堅無動無血矣

又驗方治牙疼

露蜂房　人桑皮
右等分燒灰去火毒擦牙或以烏桕根韭菜根荊芥根
葱根四味煎湯漱

又方治一切牙疼
甘松香　甘草　川烏去皮臍　北細辛去葉
硫黃半錢　香附子炒去毛二錢
右為末以手指蘸少許揩牙上立效后用鹽湯灌漱效

秘方治經歲牙疼
楓香脂為末入每夜香爐內灰拌篩過常日洗面時用
揩牙上求無折痰更臨睡以溫水淨漱為佳

小秘方治牙齒宜露出血

百草霜　小茴香　香附子炒去毛　真蒲黃炒各等分
右為末揩牙齒上立愈

荊芥散治牙疼
陳芫花一撮甘草節五錢細剉各煎先用芫花湯漱吐
去後用甘草水噙少時效

治蛀牙疼方蒼耳草為末擦三五次虫即無

治風蛀牙痛家用牙絲瓜燒存性為末擦痛處立止

治血風蛀牙方
雄黃　乳香各一錢　麻黃半錢　白芷一字
右為末研勻痛時先以荊芥穗咬在痛處口涼去之次

用皮絲燃津濕之點藥少許隨痛邊塞耳內

又方露蜂房炒川椒一錢為末每二錢煎入少鹽

又方風蛀痛牙用針刺杏仁上清油燈上煙熏熱乘熱就定痛
牙以杏仁搭之又復重搭七次絕不痛但其痛牙遂時
落去斷根

治虫蛀牙痛
紅川椒三錢　明乳香一錢
右同研細溶蠟圓如麻子大每用一圓塞孔中

牙齦腫痛散
天花粉　白芷　赤小豆　鬱金
荊芥　薄荷葉各等分

右件日乾為末，煖水調塗痛處。

治牙齒藥 牢牙去風冷，蚛蝕宣露，不問老少，用之捷效。

槐枝　柳枝（各長四寸）　皂角（不蛀者七莛）
鹽四兩　降真香　白膠香（各兩半）

右同入瓷瓶內，黃泥固濟，煉火燒一夜，候冷取出研細，用如常法。

牙齒日長方

牙齒逐日長漸漸脹，開口難，為飲食蓋髓溢所致，只服白朮煎及煮水漱。

治牙齒肉腫方 多因食鹹熱物而得

生地黃汁一椀，猪牙皂角數挺，火上炙熱，蘸汁盡為度，或為末付齦內上，隨即消縮，或不消，末傳，即消。

灸法 以線量手中指至掌後橫紋，折為四分，去三分，將一分於橫紋后臂中灸三壯，隨左右。又以兩手交叉，以中指頭盡處是穴，灸七壯，永不疼（手背上）。又灸右腿七壯，隨左右。又法，灸耳垂下牙盡骨上三壯，未效加壯數。

又法 治口齒蝕生瘡。

承漿一穴，在頤前唇下宛宛中，可灸。

又方 治唇吻強齒斷痛。

兌端一穴，在唇上端，鍼入二分，灸三壯。

固齒法 治齒痛。

東向坐，不息四通，上下琢齒三十六下。

頰車開不可合，欲令大醉，睡中搐鼻噴，則自正。

又南星末生薑汁調，傳兩頰，合一宿愈，去風也。

又法 一人以手指牽其頤，以漸推之，則復入矣。推當疾出其指，恐嚙傷。

灸法 治失音頰車蹉，灸背第五椎，一日二七壯，又灸足內踝上三寸宛宛中，或二寸五分，名三陰交穴。

喉病

秘傳咽喉一科

一十八種喉風證

一單蛾風 其形圓，如小筯頭大，生於咽喉關上，或左或右，關下難治。

二雙蛾風 有兩枚在喉關兩邊，亦圓如小筯頭大，關下難治。

三纏舌風 自舌下再生重舌者是。

四牙落風 牙齦上聚成瘡毒者。

五木舌風 其舌粗似炙熟猪舌，不能轉動者。

六舌黃風 口舌上腫痛黃色者是。

七咬牙噤口風 近牙齦頭作脹，口噤不開者。

八魚口風 如魚吸水者，不治。

九聚毒喉風 喉閉聚毒涎，咽稠實熱寒熱，仍分上下三關，破毒下關難治。

十懸蠱毒風 □□食搶□外，微形如雞卵者。

十一搶食風 一名飛絲毒，□□食腥而發泡者。

十二縱頰風腮臉結腫者是從牙齒頭破此毒若成須要半月調理。瘧 色

十三纏喉風風自口發過喉下方死者是也亦有寒熱如瘧甚者傷人命、

十四松子風口內滿喉赤如猪肝漲吞則閉閉塞飲食不能者是用藥後口內散點松子樣腫則喉閉聲如雷則不治、

十五崩砂甘口風自舌上牙齦上下腫赤口內作泉如湯熱牙齦漸爛甚者不能食齒、

十六連珠風自舌上作毒或初成一箇碎而又作一箇以至三五七九箇者是、

十七蚪子毒或在腮臉痒爛或在喉閉舌下作泉如蝌蚪者是、

十八走疰瘰癧風頸項結核五七箇及膚赤腫作寒熱者

針灸訣

第一穴風府穴腦後入髮際一寸治咽喉諸證及毒氣歸心等項惡證並皆治之無有不效（針入三分…令人失瘖乃針）

第二穴少商穴在手大指表近虎口一邊指甲與根齊離爪如韭葉許針入二分病甚則入五分咽喉諸證皆治

第三穴合谷穴穴法以授治牙關不開則陽谿穴[illegible]刺一刺出血入二分閉穀即開又有一路潮熱者有作寒者於合谷穴用針左轉發寒右轉發熱（即虎口）

第四穴是上星穴在頂前入髮際一寸治頰腫及纏喉風等證又氣急者實熱針足三里虛熱灸足三里以手從膝取中指梢盡處是穴、

根腳咽喉常發者耳垂珠下半寸近腮骨灸七壯二七尤妙又灸足三里穴在膝下三寸䯒骨外、

赤眼挑耳後紅筋針攢竹穴即安穴在兩眉頭陷中、

實熱

一用敗毒散加黃芩半夏連翹倍用桔梗用生薑薄荷煎痰盛者加石膏同煎即效先服此藥早晨服則午時攻作午後則子時攻作天明退用針則無此攻作若服此藥后首利即換作虛熱醫治藥不可用服敗毒散后失聲即服加減秘傳降氣湯（方見大方科虛實證及諸氣類）、

二用生料消風散加玄參全蝎薄荷白水煎服

三用前二藥不退用生料瀉心散更加一二味去風毒藥為妙（方見眼科熱證及大方科熱類）

四用前三藥不退用防風通聖散立效（方見風科熱證類）

虛熱

一用雙解散乃升麻葛根湯消風散加玄參黃芩薄荷煎

二用秘傳降氣湯加生薑黃芩（已上方見大方科虛實類及風科總論諸風類）、

三如痰盛用桑白皮湯磨沉香吞養正丹仍用枳梗半夏湯芩术附湯等藥調理（方見大方科[illegible]）、

又一證上秘下滑用秘傳降氣湯吞岩蜜丸附子理中
圓如無用桑白皮湯亦可（方見大方科氣類又見前喉痹類）

【解毒雄黃丸】用消毒飲水煎時時嚥漱（方見小方科痘瘡類）

咽喉生瘡多因虛陽發上不由實熱若秘傳降氣湯去陳皮加黃芩煎
仍於喉下咽管口灸三壯即愈（方見大方科調氣類）

【七寶散】治咽喉腫痛氣結諸項等證於內麝香旋入有孕
者不可用麝香不問冷熱虛實並皆通用若痰盛者如頑藥
內所用不應於中略加膽礬少許立效或吐無妨

鬱金（叁兩） 大朱砂 南雄黃（各半兩）
麝香 乾胭脂 綠豆粉（貳錢） 白礬（半生半枯）
光粉（各伍錢）

右為末研薄荷汁同研少許調服

【防風散】虛者少用實者多用

防風（去蘆壹兩） 羌活 黃藥子 白藥子（半兩）
殭蠶（炒） 硼砂 大黃（...） 荊芥
細辛 川芎 紅內消 鬱金
山豆根 甘草 牙硝（各...） 薄荷葉（...）

右為末研薄荷汁同瓷少許調服

【玄明粉】用朴消十斤防風一斤煎水泡溶却用布併花葉
紙濾過七遍却於霜下露天露一夜却取內牙消再用
防風水淋滌淨用瓦鍋熬煎成塩却再入罐以用塩泥
固濟炭火燒一時通紅為度出火去毒研為末每一斤
用甘草三兩每服一茶匙溫熟水調如實熱煩渴口乾
燥作煩者可略加鵬砂腦子入口噙化乾喉風立效

【追風散】黃丹 朴消 猪牙皂角（燒灰） 縮砂殼（燒灰各五錢）

右為末每服少許以鵝毛蘸入口中舌上下及腫處用
水灌漱如喉閉毒已破瘡口痛者用猪腦髓蒸熟淡蘸
醋實立效

如病時可有身體痛於所服藥內加川芎羌活同煎效

死候

毒氣歸心胸前腫滿氣煩促下部洞泄不止

【重舌】木舌 川烏尖 巴豆 為末米醋調塗患處即效木舌須
先服勝金散開閉效（又方見舌病類）

帝鍾風即喉閉帝鍾長腫有長數寸者虛實用前藥外以
食塩煨過鵝毛蘸下即消不須掛破又則傷人

【煉針法】
烏頭（去皮壹兩） 巴豆（壹兩） 硫黃（半兩） 麻黃（伍錢）
木鱉子（拾箇） 烏梅

右用藥同入甕石器內水煮一日洗擇之再用止痛藥
浸藥乳香當歸花蕊石各半兩又如前水煮一日取出
用皂角水洗再於大肉內煮一日仍用瓦屑打磨淨端
頭粒子油塗常近人氣為妙

合瘡口 白礬 黃丹 麝香爲末以銅筋點瘡口上、
又方 滑石 黃丹爲末點瘡口效（仍用□者量兩貳錢甘草貳錢爲散煎服尤妙）
破毒妙方
白礬 巴豆（去殼） 紅內消 草烏尖
猪牙皂角 薄荷（各貳錢）
右爲末好酸醋調鵝毛刷入口內勿吞仍以塩湯灌漱
雄黃散 治纏喉風喉閉先兩日胸膈氣緊取氣短促忽然
咽喉腫痛手足厥冷氣閉不通頃刻不治、
巴豆（去皮生熟各半生者去殼熟者去殼燈上燒存性） 乾姜黃茹（去片）
雄黃（皂角子大透明者細研） 鬱金（一枚蟬肚者爲末）
右爲研勻每服半字茶清少許下如口噤咽塞用小竹
管納藥吹入喉中須臾吐利即效、
又方 川升麻四兩剉碎水四椀煎至一椀灌下、
又方 皂角三根搥碎挼水一盞灌下或吐或不吐即安、
取喉中涎
草烏尖 殭蠶 蒡根 嗽嚼
紅椒 白礬 山豆根 皂角（各等分）
右爲末用霜梅搗藥爲圓如指頭大含化一圓取下涎
然後用塩湯灌漱吐出不可吞、
開關潤喉蓬萊雪
梅花腦子 生麝香（各半字） 鵬砂（叁錢） 朴消（伍錢）
薄荷葉 百藥煎 全蝎（去毒） 防風（去叉）

粉草（上各伍錢） 明乳香 沒藥（各叁錢）
右爲末每服少許以小匙挑乾摻咽間及瘡上如在關
下摻舌上並旋旋嚥下仍用薄荷桔梗甘草煎水噙漱
或用生薄荷研勻然汁調成膏入口噙化亦妙、
開喉閉
薄荷 山豆根（各伍錢） 麝香 腦子（各半錢）
朱砂（叁錢） 甘草 青塩 川烏（各伍錢）
右爲末每用半錢臘月內裝萊汁夏月取來挼水或爲
水調如淨唾稠粘用芭蕉水調下或蜜圓指頭大含化
去涎方（併碎法）
草烏尖四箇青腾搗爲末先用酸醋煮皂角調鵝翎刷
傳赤腫處開口流去涎即將綿繩一指頭大以布線繫
定蘸前藥末吞嚥至腫毒處即抽出凡如此一二次其
毒即破開口流出去盡涎血都以前合瘡口藥點上傳
久溫塩水灌漱后進食亦可
又開喉閉
南星 半夏 川烏 草烏
甘草（各伍錢）
右爲末用米醋煎成膏傳毒上、
宣利方
巴豆（去殼） 雄黃 鬱金 猪牙皂角
大黃（各伍錢）

右為末飲圓如菉豆大、每七丸五更三點以冷茶清吞下如未利再下四五圓、

通後補劑

紫蘇　藿香　甘草

右剉散每服四錢水煎空心服、

乾咯風

朴硝　川烏　當歸　牛膝各伍分

麝香　腦子各半分　鵬砂叁分　荊芥

薄荷　甘草　葛粉各五分　全蝎七个去毒

右為末用清米泔調香用蘿蔔汁調生薑汁調如不能吞用皂角切如棗子埋熨葉入口內含化或新芨汁

調下立効、

喉食風

桔梗　川烏　草烏　防風

甘草　大青根各五分　全蝎七个去毒　紫河車五分

右為末每服用酒一盞連根葱一莖紅椒七粒灯心七莖同煎三四沸食后熱服如不安再用酒一盞入茶蓮五粒同煎少時𢣱服之末效用雀湯調下如落心肺間刺痛用宣藥利下如久不治則變為飛絲勞毒能傷人命

喉閉住痛生薄荷研蜜調成膏送入喉咽下立效如涎多未退再用如更不開可通頂又用葱頭兩箇搗碎一半牙窮頭處立開效

治誤吞銅鐵金石竹木刺雞鵝魚骨哽

川山豆根　山蜈蚣　山茨菇　威靈仙

滑石　馬牙硝　金星鳳尾草各乙两

急性子弍兩　苧麻根伍分　菉豆粉伍錢

甘草節三分滴湯三角　磚伍錢則中製乙兩

右為末白及五兩與糯米糊一處和劑成錠子如梧桐子大每用一錠冷水磨化即下骨哽君金石銅鐵則以

生薑汁磨化下

口舌咽喉　丁癸之

得効方卷之十八

外科精要

建寧路官醫提領陳　志　刊行
南豐州醫學教授危　亦林　編集
江西等處官醫副提舉余　賜山　校正

正骨兼金鏃科

秘論

骨節損折肘臂腰膝出臼蹉跌須用法整頓歸元先用麻藥與服使不知痛然後可用手

凡脚手各有六出臼四折骨每手有三處出臼脚亦三處出臼手掌根出臼其骨交互相鎖或出臼則是挫出鎖骨之外須是搦骨須鎖骨下歸窠或出外則須搦入內或出內則須搦入外方入窠臼若只用手擦斷難入窠十有八九成痼疾也

手六出臼四折骨　凡手臂出臼此骨上段骨是臼下段骨是杵四邊筋脉鎖定或出臼亦剉損筋所以出臼此骨須拽手直一人拽須用手把定此間骨搦教歸窠看骨出那邊用竹一片夾定一邊一邊不用夾須在屈直處夾才服藥後不可放定或時又用拽屈拽直此處筋多吃藥后若不屈直則恐成疾日後曲直不得

肩胛上出臼只是手骨出臼歸下身骨出臼歸上或出左或出右須用舂杵一枚小凳一箇令患者立凳上用杵撑在下出臼之處或低用物墊起杵長則凳凳起令一人把住手尾拽去一人把住舂杵令一人助患人放身從上坐落骨節已歸窠矣神效若不用小凳則兩小梯相對木棒穿從兩梯股中過用手把住木棒正棱在出臼腋下骨節蹉跌之處放身從上墜下骨節自然歸臼矣

脚六出臼四折骨　或脚板上交脛處出臼須用一人拽去自用手摸其骨節或骨突出在內用手正從此骨頭拶歸外或骨突向外須用力拽歸內則歸窠若只拽不用手整入窠內誤人成疾

脚膝出臼與手臂肘出臼同或出內出外亦用一邊夾定此處筋脉最多服藥後時時用屈直不可定放又恐再出窠時時看顧不可疎慢

脚大腿根出臼　此處身上骨是臼腿根是杵或出前或出後須用一人手把住患人身一人拽脚用手盡力搦歸窠或是挫開又可用軟綿繩從脚縛倒吊起用手整骨節從上墜下自然歸窠

背脊骨折法　凡剉脊骨不可用手整頓須用軟繩從脚吊起墜下身直其骨使自歸窠未直則未歸窠須要墜下待其骨直歸窠然後用大桑皮一片放在背皮上杉樹皮兩三片安在桑皮上用軟物纏夾定莫令屈用藥治之

脚手骨被壓碎者須用麻藥與服或用刀割開甚者用剪剪去骨鋒使不衝破肉或有粉碎者與去細骨免膿血之

損然後用大片桑白皮以二十五味藥和調糊藥糊在桑白皮上夾在骨肉上莫令差錯三日一洗莫令臭穢切治之又切不便輕易自恃有藥便割便割便急須要詳細當視當行則行尤宜子細或頭上有傷或打破或刀傷骨碎用藥糊角縛不使傷風切須記之 用藥治傷則用糊藥封角切不可使風入之淫腫其惡血自消散不攻瘡口

正骨金瘡脉候

正骨金瘡須看脉候如傷臟腑致命處一觀其脉虛促危矣傷處淺命脉虛促亦爲後患傷至重命脉和緩永無虞也脉有虛有實有去來有蹄寄或被傷臟脉不死者必閉脉氣重則無傷或傷至死處止閉脉無別脉洪大則難醫血用兩件藥後脉不轉動者宜從藥若脉漸漸傳轉此則可治無傷或血出其者脉不要洪大只要平正定脉只其血不曾出者亦無惡血在內者其脉欲洪大不要蹄滯亦不要遲退來去恐其變凶看傷脉每與內科脉不同或傷內或致命或難醫處被傷者命脉便已去矣此等切勿治之

十不治證

顛撲損傷或被傷入於肺者縱未即死二七難過 左脇下傷透內者 腸傷斷一半可醫全斷不可治 小腹下傷內者 證候繁多者 脉不實重者 老人左股壓碎者 傷破陰子者 血出盡者 肩內耳後傷透於內者皆不必用藥

用藥加減法

傷有淺深治其吉凶用藥如折骨者則用後二十五味接骨只治之并加自然銅白芷乳香沒藥川芎各五錢或若傷臟腑用清心藥加川芎當歸去黃藥各三錢 或肚腸傷破加白及五錢同後清心藥服 或被傷浮腫不退加皂角黃柏皮半兩入紫金皮散內傳之 或頭破傷風亦用紫金皮散加皂角黃柏皮傳之立退 或筋斷接筋者用二十五味加續斷半兩 或諸處傷痛不止者仍用二十五味加川芎伍錢 或惡血污心不下者後清心藥加大黃伍錢 或氣滿痛加木通丁香藿香三錢同二十五味服之 凡加減末者加末散者加散其餘只依本方不用加減 孕婦顛撲傷損先用安胎藥后服二十五味接骨去草烏川芎餘依本方

腸肚傷治法

肚上被傷肚皮俱破腸出在外只腸全斷難醫傷破而不斷者皆可治療 腸及肚皮破者用花蕊石散傅線上輕用手從上縫之莫待粘出用清油撚活放入肚內 肚皮裂開者用麻縷爲線或槌桑白皮爲線亦用花蕊石散傅線上須用從裏重縫肚皮不可縫外重皮留外皮開用藥摻待生肉

又用藥加減法

凡損若不折骨不碎骨則不可用自然銅於散內除去恐

痰涎不用半夏、老人有傷者骨脉冷每用加當歸川芎
川烏木香丁香人參五錢去白芍藥生地黄此亦是二十
五味内加減老人即服此、或傷臟腑者不用者、如有
血并痰從口中出者用清心藥加丁皮川芎半夏入二十
五味内同服、退腫角血或皮冷加乾薑五錢入退腫藥
内擲腫上腫及血自然消散或皮膚熱者加黄柏皮皂角
五錢入腫藥内角腫處自然退

用麻藥法

顛撲損傷骨肉疼痛整頓不得者先用麻藥服待其不識痛
處方可下手或服後麻不倒可加曼陀羅花及草烏各五錢
用好酒調些小與服若其人如酒醉即不可加藥、被傷
有老有幼有無力有血出甚者此藥逐時相度入用不可
過多亦有重者若見麻不倒者又旋添些更未倒又添酒
調服少許已倒便住藥切不可過多

用摻藥法

瘡口血出不止則用方中止血藥傅之如洗開後瘡孔大
者宜先用降真香龍骨沒藥摻之肉即生止瘡孔上須用
油單貼待膿血汁出莫待蔽塞如冬月用藥以薄荷葉貼
瘡孔一日一度湯洗又用藥摻如肉上滿瘡口用手搦不
痛如好肉一般即用收瘡口藥傅上却貼以貼風藥瘡口
立收若未生實肉切不可先收瘡口裏面恐有患也

傷破肚皮用藥法

如傷孔大肚腸與脂膏俱出放入内則用縫如孔小只有
膏出先用清心藥與服用手擠其膏不用縫此膏出者已
無用了不可復入肚中反成禍只須擠去不妨此是閑肉
但放心去之肚内被傷者專用退利大小腸不可待秘恐
成重患、

打撲及樹木壓損身痛者

打撲樹木壓或自高處攧下者此等傷皆驚動四肢五臟
必有惡血在内專怕惡心先用清心藥打血藥及通大小
腸藥次第先服臨服加童子小便入藥内立效專用大小
腸洗利恐作隘塞利害甚清心藥加前方通利大小腸
藥服之自然俱通無悶亂無惡血污心以次用止痛藥服
之即止、

去惡血法

顛撲傷刀石傷諸般傷損至重者皆先服清心藥次服清
小便藥三服去血藥或被傷者血未結打從瘡
口中出或結在内用藥打入大腸時即泄出或被打被攧
被木壓恐血未積者用藥打散四肢或歸臟腑者或歸上
膈者打從口中吐出或歸中膈打入大腸泄出先用清心
藥次服止痛藥即二十五味藥中加減用

用服藥湯法

凡藥皆湯使藥力行速但用清心藥前後用童便一盞
同服或止痛藥傷者只用薑湯煎心湯調二十五味藥

服之蒲苛湯亦可、凡傷或刀傷及拾內臟腑恐作煩悶欲血之退如折骨者用童酒服接骨藥傅之如骨節被重打重撲重木及石壓着皆用先服湯使法並未用酒服如輕撲損損初則用童酒調下二十五味藥立效

通治

撲刀傷接骨方

臘月豬脂　黃蠟(上洗煎)　鉛丹　自然銅

密陀僧　朱砂(壹兩研)

右用新鍋鼎先鎔脂次下蠟於冷處下密陀僧鉛丹自然銅緩火再煎入水中不散更出鼎於冷處下諸藥用柳枝攪勻瀉入甕器內不住手攪至凝固如彈子大且用芭皮之類襯之極冷方收、凡傷碎骨者木石壓碎骨者先用此藥火化開糊骨上然後夾定用此藥服之須作小圓如梧桐子大每服十圓葱酒調下或傷損深者捻成條入孔中淺者用油單為膏藥貼之甚者燈心裹木夾之如藥力散再覺痛更一服痛即止又痛甚者貼之即止、

又方 二十五味 治撲損傷骨碎傷折筋斷刺痛不問輕重悉能治之大效

香白芷　紫金皮　劉寄奴　川當歸

赤芍藥　白芍藥　黑牽牛　生地黃

川芎　川牛膝　乳香(可加減)　沒藥(可加減)

破故紙　木通(去節)　自然銅

木香　藿香　木賊　官桂(可加減)

羌活　獨活　半夏

骨碎補　草烏　川烏

或加土當歸熟地黃　杜牛膝

金刃傷到出口者去自然銅骨碎補骨折者用之然須於此方內且去自然銅隨欲好時却入用之早服成他疾

右先揀出自然銅官桂沒藥乳香不炒者其餘藥或焙或火焙或日曬乾皆可炒後入不炒四味同研為末煉蜜糊圓如彈子大用黃丹為衣或被撲傷損金刃錯鐵不問輕重每服一圓如被刀傷全斷損內子宜先以溫苛湯或木瓜湯薑湯燈心湯吞下皆可或損碎骨乃折骨用自然銅其他不用如骨折碎刺痛不止加乳香沒藥白芷川芎各伍錢入諸藥中生薑酒下或不作圓為末亦可功效如神

又方 治撲撲接骨刀傷

川當歸(半兩)　鉛粉　硼砂(貳錢)

右為末每服貳錢濃煎蘇木汁調下若損在腰上先喫淡麵半椀了服藥若在腰以下先服藥後喫淡麵仍不住呷蘇木汁更以糯米粥入藥末三錢拌和攤在紙上或絹上封裹損處如骨碎更須用竹木夾定以紙或衣包之、

清心藥方

降真香　香白芷(醋炒)　蘇木(酒水炒)　枳殼(水浸)
藿香(酒炒)　丁皮(鹽水炒)　紫金皮　木香(煮水炒)
丁香(不見火)　木通(去節)　山梔子　大黃
蓮子肉(酒炒)　沉香　人參　當歸(酒紙裹)
川芎(煨)　羌活　獨活　花蕊石(醋炮)
烏豆　燈心(少許)　赤芍藥(各等分)

右為末或大小腸不通服此亦可用五膈寬中散同服立效或惡血污心或煩悶暴死每服二錢薄荷湯或燈心湯調下或童子小便尤好為散水煎服亦可如瘀血口中出加半夏

自然銅散　治打撲損傷骨折斷正骨科中經驗方也

乳香　沒藥　蘇木　降真香
川烏(去皮尖)　松明節　自然銅(火煅醋淬[illegible]各[illegible]兩)
地龍(去土油炒)　真血竭(各五錢)　龍骨(半兩生用)
土狗(十個油浸焙名螻蛄)

右為末每服五錢用無灰酒調下如病在上食后服病在下空心服服之自頂心尋病至下兩手再周遍一身下至兩足遍病處則颯颯有聲患人自覺藥力習習往來

又方

用自然銅[illegible]

右研細水飛過用當歸沒藥各半錢和勻每服三錢酒調頻服仍以手摩痛處

[illegible]　治重物壓迮或從高墮下作熱吐血下血出不能禁止或瘀血在內胸腹脹滿喘粗氣短兼能打去惡血

當歸　大黃(炒各等分)

右為末每服二錢不以時溫酒調下

[illegible]凡墜壓死者急安好處以手袖掩其口鼻上一食頃眼開先與熱小便若初覺氣絕不能言急擘開口以熱小便灌之打撲悶絕亦用先以此利去瘀血

活血散　治患者血脈不和筋急行步不可服之寬筋

乾地黃(酒浸)　當歸(酒浸)　白芍藥　續斷(酒水炒)
白术(煨)　川芎(各半兩)

右為末煉蜜圓梧子大每服三十圓溫酒下

[illegible]　治男子婦人外傷內損狗傷蟲咬車馬[illegible]手足折傷一切疼痛腹中瘀血刺脅發心左癱右瘓走注疼痛難以屈伸及婦人經氣入腹血脈不通產後敗血灌注四肢及吹奶腫痛

花桑枝([illegible])　栗楔([illegible])
細墨([illegible])　皂角刺([illegible])
大黑豆([illegible])　亂髮([illegible])
[illegible]　乳香([illegible])

右件為末[illegible]圓如彈子大如膏乾更入蜜[illegible]

痛甚一圓，輕者半圓，以無灰酒一盞，乳香一豆大，先磨乳香，以酒盡，煎三五沸，臨臥溫服，以痛處就床，欲汗則被覆，仍用藥塗傷處，切忌一切動風物。婦人服入當歸末一錢，孕婦勿服。

[illegible]治從高墜落，車被打傷，折打損，叫呼不絕，服此呼吸之間不復大痛，三日筋骨相連。

當歸 炒，令香　桂心　川芎 炒　蜀椒 去目，汗

甘草 炙，銼，分　附子 炮，去皮臍　澤蘭 炒，各壹兩

右為末，酒服二三錢，日三服。如小兒被奔車馬所損傷，其膝皮肉決，見骨節，絕死少蘇，啼不可聽聞，服之便睡，十數日便行走，其神驗如此。忌海藻、菘菜、生葱、豬肉、冷水。

[illegible]治一切金刃所傷，筒箭及打撲傷損，身體損傷，大小傷，或至死者，以於傷處摻藥，其血化為黃水，打撲摻藥便差，更不疼痛。如有損血入臟腑，熱煎童子小便入酒少許，調一大錢服之，立效。若牛觝腸出不損者，急內入，以桑白皮尖茸當線縫合，用及縫上摻藥，血止立活。如無桑白皮，用生麻線亦得，並不得封裹瘡口，恐作膿血。如乾，以津潤之，然後摻藥。方見大方科失血類。

內損

[illegible]治打撲傷折，內損，肺內損，咽血不止，或瘀血停積於內，心腹脹悶。

紫金藤皮　降真香　續斷　琥珀 研

無名異 研，水飛　琥珀 別研　蒲黃

牛膝 酒浸　當歸 酒浸　桃仁 去皮尖，炒　大黃 濕紙裹煨

朴硝 別研，各壹兩

右為末，每服二錢，濃煎蘇木、當歸酒調，并進三服，利即愈。

[illegible]治打撲內損，筋骨疼痛。

沒藥　乳香　芍藥　川芎

川椒 去目及閉口者　當歸 各半兩　自然銅 火煅，醋淬

右為末，用黃蠟二兩溶開，入藥末，不住手攪勻，圓如彈子大，每服一圓，用好酒煎開，乘熱服之，隨痛處臥，霎時連進有效。

打撲傷損

[illegible]治打撲傷損，敗血流入胃脘，嘔黑血如豆汁。

芎藭　當歸　白芍藥　百合 [illegible]

京芥穗 各等分

右剉散，每服四錢，水一盞，酒半盞，煎，不以時服。

[illegible]治從高墜下，或打撲傷損，腰脇心腹作痛，加紅麴末少許，童子小便同酒調，空心熱服。如無紅麴，紅酒亦可。方見大方科諸氣類。

[illegible]治從高墜下，及打撲損傷。

麝香　水蛭 各壹兩

右用水蛭剉碎，炒至煙出，研為末，入麝香研勻，每服酒調一錢，以當下蓄血，未效再服，其應如神。又治折傷，用

水蛭熟酒調一錢食頃知痛更進一服痛止便將折骨藥封首至安乎方去

[illegible]散 治打撲傷損不問皮破與不破損傷並能治之用冷水調金刃傷方見大方科腑胃散

[illegible]散 治諸傷百損如被打破傷損久年時時發痛難忍被傷瘀不破皮而內損者尤宜服此

川烏　草烏各炮　當歸

蘇木　大黃　生乾地黃　白芍藥　紅麴各半兩

麝香少許

右為末用酒煮一瓦瓶放冷服如覺頭麻無害但二烏頭生用有力恐太猛所以用爐火煮炮

紫金丹方 療墜馬落車傷腕折臂

當歸炒　桂心　甘草炙　川芎兩半　附子炮　澤蘭各炒一兩　蜀椒去目出汗各七錢半

右為末每用酒服二錢立效忌海藻菘菜生蔥冷水等

通導散 治傷損瘀血凝滯大痛大便不通方見大方科

花蕊石散 治傷損大吐血或因酒食飽低頭掬損吐血不止並血妄行鼻口俱出但聲未失無不效者

百草霜　蚌粉各等分

右為末每一二錢糯米飲調下側柏枝研汁尤效速當如指一字皮破灸瘡出血舌上出血並乾摻立止

鐵扇方 細研銅末服之頗效

[illegible]散 治杖傷及打撲損傷血氣錯亂昏迷不省急服次效方見小兒方科

接骨散 治打撲傷損折骨

半兩古文錢不拘多少以鐵線貫之用鐵匣盛以炭火煅通紅碗盛好酒米醋各半升鐵鉗開匣取錢於酒醋中淬盡澄去酒醋以溫水淘洗如此三次淘洗數多尤妙火毒不盡令人患啞既淨焙乾研細入乳香沒藥水蛭等分同為末每服半字或一字生薑自然汁先調藥次用溫酒浸平服若不傷折即時嘔出若損折則藥徑下如金線纏上筋神效初服忌酒三日

刀斧棒杖傷

[illegible]散 治棒杖刀斧傷疼痛不可忍者

防風去蘆　南星湯洗

右剉散每服三大錢水酒各半盞生薑七片同煎通口服甚者不過三服立效

[illegible] 治金瘡

直龍骨　海螵蛸　五倍子　赤石脂

黃丹研如粉不用炒尤佳　石膏煅

右剉或等分用如傷大先以冷鹽水洗淨卻用黃桑生葉塗兩傷待水乾皮斂即乾散付發百中若小小傷只以冷鹽水罯洗便斂此真截妙良

奪命散 治刀刃所傷及從高墜下木石所壓損瘀血凝積心

腹疼痛大小便不通

紅蛭（用石灰慢火炒令焦黃色）兩　大黃　黑牽牛（各二兩）

右爲末每服二錢用熱酒調約人行四五里再用熱酒調牽牛末二錢催之須下惡血成塊以盡爲愈

又方 治打撲傷重瘀悶絕

右用蒲黃不以多少爲末熱酒灌下

取箭鏃

又方

天水牛（一個獨角者尤緊以小瓶盛之用硇砂一錢細研水少許化開浸天水牛自然成水）

右以泉水滴箭鏃傷處當自出

神仙刀箭散 妙不可言

右以桑葉陰乾爲末乾貼如無旋熨乾貼之

又方 乞狗數箇擣取汁滴上三五度箭頭自出

治箭鏃入骨不可拔

巴豆（半粒）　蜣螂（大者乙箇去頭翅）

右各去殼同微熱研勻塗傷處斯須痛定必微痒且忍之候不可忍便撼動拔之立出以黃連貫衆湯洗了用牛膽製風化石灰傅之

鍼灸傷

內托黃芪圓 治鍼灸傷經絡膿流不止

黃芪（八兩）　當歸（三兩）　肉桂　木香

乳香（別研）　沉香（各乙兩）

右爲末用菉豆粉同薑汁煮糊圓梧桐子大每服五十丸不拘時候熱水下

消煩

四聖散 治傷重瘀悶欲死者用此打血利大小便

花蕊石散　黑神散（見前方）　大聖散　蒲黃散（見上方）

人參（去蘆）　當歸（去蘆）　牛膝　川芎（米泔浸少炒）

白芷（各少）　蘇木　大黃（各半兩）　蓮子肉（去心半兩）

右爲末和圓童子小便調服或木通湯亦可惡血立下

傅藥

接骨方 治打撲傷損手足

右用菉豆粉新鐵銚內炒令真紫色新汲水調令成膏厚傅損處須教徧滿貼以紙花將杉木皮一片縛定其效如神

治刀傷磕損血不止痛難禁用葱白一大握炒熟搗爛乘熱縛定痛與血隨止葱冷再易可效

治傷損用生赤礬細研爛取汁以溫酒服之傅傷處署平復及被踏按者全需用之大效

治折骨傷筋痛不可忍生地黃一斤切藏瓜薑一斤生薑四兩炒令勻熟以布裹傅傷處冷則易之奇效腫重加赤小豆半升

接骨散 治打撲傷損折骨出臼及一切腫痛未破令內消用生地黃研如膏木香爲末以地黃膏攤紙上摻木香末

一層又再攤地黃貼上明旦痛即止效

（又方）治刀傷血出不止欲死用花蕊石散無效者用絕好降真香一片用瓷瓦片刮下石碾二細傅之大效

（又方）白滑石二兩黃丹五錢爲末乾摻斂金瘡止疼痛

右以劉寄奴爲末摻之立效

（又方）以門臼後塵傅之

（接骨散）治手足折傷可服可敷半日後痛止手足堅牢無

右以川當歸鉛粉各半兩硼砂二錢同研細蘇木煎汁調化一大錢損若在上先喫淡粥却服損在下先服藥后食仍頻喫蘇木汁別作糯米飲拌和藥攤貼損處以絹帛裹之骨碎用竹木固夾甚妙

（白灰散）治惡瘡刀斧傷見血

白石灰末不以多少韭菜汁調陰乾爲末少許傅上擦少許血止便安如腸潰出桑白皮綫縫合罨上帛繫定

（又方）蠶蛾沙生用爲末摻勻綿裹之隨手瘡愈血止

（黃丹散）治金瘡并一切惡瘡

上等黃丹　軟石膏火煅 以多少

右研細和勻如桃花色摻傷處甚妙

（又方）胡孫頭草黃花子如蒺藜骨朵者狗人謂之草血竭以其能止血也用其子爛嚼傅傷處血立止

錄、時珍本草作骨朵、按錄正字通俗字定曰、胃朵省衛人縫所乘以骨飾之、或其飾者之、宋鹵簿用骨朵、即長柄手撾之類、衛士執訓在前、後作柔柄骨朵、曰朱漆之童打軟耕錄元制、都長乃侍衛之至親近者三日一更輪入直負骨朵于肩、佩環刀、于禁或四人八人所以虞世旧之曾記宋景文筆記云、關中人以腹大為胍肶、胍音孤、肶音都、俗因謂杖頭大者曰胍肶、後訛胃朵、宋手声、擬此訛胃朵為胍肶之論、又曰朵俗各之

一層又再攤地黃貼上明旦痛即止效

（又方）治刀傷血出不止欲死用花蕊石散無效者用絕好降真香一片用瓷瓦片刮下石碾二細傅之大效

（又方）白滑石二兩黃丹五錢爲末乾摻斂金瘡止疼痛

右以劉寄奴爲末摻之立效

（又方）以門臼後塵傅之

（接骨散）治手足折傷可服可敷半日後痛止手足堅牢無

右以川當歸鉛粉各半兩硼砂二錢同研細蘇木煎汁調化一大錢損若在上先喫淡粥却服損在下先服藥后食仍頻喫蘇木汁別作糯米飲拌和藥攤貼損處以絹帛裹之骨碎用竹木固夾甚妙

（白灰散）治惡瘡刀斧傷見血

白石灰末不以多少韭菜汁調陰乾爲末少許傅上擦少許血止便安如腸潰出桑白皮綫縫合罨上帛繫定隨手瘡愈血止

狗人謂之草血竭

傅傷處血立止

黄蘗半斤　半夏肆兩

右為末每用半兩生薑半兩生地黄取自然汁調塗瘀處如折斷用繒帛封縛次用杉木皮扎定乾則頻上薑地黄汁潤

又方 治金刃或打傷及碎首血出不止

降真香五倍子鐵面上削下銅青各等分為末傅傷處

又方 治刀斧傷

隔年四月苧麻揉令極軟覆在傷處縛定血止用野苧葉亦可

又方 水龍骨即船上多年油灰為末傅傷處用帛片扎定皮裂開以桑白皮線縫合用蘇木五倍子末封之

又方 治傷至重但不得透膜者

海味中鹹白鰾揀大片色白而有紅絲者成片鋪在傷處以帛子扎之血止如膏脂出不傷內膜者即剝去傷人須心緊以熱熨斗不令其知於新剝項上一遍膏脂即入以桑白皮線縫合用血竭草木賊蘇磁石為末乾傅瘡上即合

又方 五月五日採馬鞭草　鉄莖草　血見愁即自然……揀爛同風化石灰為末塗之即愈

治血頭皮不收方 蘿蔔葉研細罨傷處以帛縛之

又方 治打撲有破傷出血流注

半夏為末調塗傷處一宿不見痕

又方 治瘀血流注紫黑或傷眼上青黑

大黄為末用薑汁調塗一夜一次上藥一宿黑者紫二宿紫者即白矣

洗方

洗傷藥 治從高墜下及一切傷折筋骨瘀血結痛

荊芥去梗　蔓荊子　白芷　細辛去苗

防風去蘆　桂心　川芎　丁皮

羌活各壹兩

右為末每用一兩鹽半匙連根葱白五莖漿水一五升煎五七沸去滓通手淋洗痛處冷即再換宜避風

破傷風

玉真散 治風自諸瘡口入為破傷風強項牙關緊欲死者

防風去叉　天南星湯泡七次各等分

右為末每服三錢童子小便一大盞煎熱服

香膠散 治破傷風口噤強直

魚膠燒存性一兩　麝香少許

右研勻每服二錢酒調不飲酒米飲下一方蘇木煎酒下

奪命散 治久新諸瘡破傷風項強背直腰反折口噤不語手足抽掣眼目上視喉中鋸聲及破傷灌膿

麝香一字研　丹砂一錢研　生黑豆二錢同研

草烏三兩半生用半炮去皮臍米泔浸同研

右為末和勻破傷風以酒一盞調半錢服神效如出汗前

頭先用酒一盞調服半分却以藥貼前瘡上

破傷濕

牡蠣散 治破傷濕口禁強直

牡蠣取末粉傅瘡口仍以末二分煎甘草湯調下

舒筋法

舒筋法 治破傷後筋攣縮不能伸他病筋縮亦可用大竹管長尺餘鑽一竅繫以繩掛于腰間平坐貼脚足搓之勿計工程久當有效

退腫

蒼术散 治打撲損傷皮不破浮腫者及角血用此退之

紫金皮　蒼术　猪牙皂角 鹽醋炒

雞腳風藥　骨碎補 各等分

右為末糊水調糊腫處

紫金皮散 治一切打撲損傷金刃箭鏃浮腫用此效

紫金皮 醋炒　天南星　半夏　黃柏 鹽炒

草烏 炮　川烏 炮　川芎 米水炒　川當歸 焙

杜當歸　烏藥　川白芷 鹽水炒　破故紙

劉寄奴　川牛膝　桑白皮 各等分

右為末生薑薄荷汁入兼水調糊腫處或傷處皮熱甚加黃栢皮生地黃五分有瘡口者勿封其口四畔用此糊之

麻藥

草烏散 治損傷骨節不歸窠者用此麻之然後用手整頓

猪牙皂角　木鱉子　紫金皮　白芷

半夏　烏藥　川芎　杜當歸

川烏 各五兩　舶上茴香　坐拏 酒煎熟　草烏 各壹兩

木香 叁錢　傷重刺痛手近不得者更加坐拏草烏各伍錢及曼陀羅花伍錢入藥

右並無煆製為末諸骨碎骨折出臼者每服二錢好紅酒調下麻倒不識痛處或用刀割開或用剪去骨鋒者以手整頓骨節歸元端正用夾夾定然後醫治或箭鏃入骨不出亦可用此麻之或用鐵鉗拽出或用鑿鑿開取出後用鹽湯或鹽水與服立醒

合瘡口

松皮散 治金刃箭鏃傅瘡口兼能生肉

老龍皮 貳分 末　生石灰 貳傅瘡者用瓦盞上用瓦蓋火四畔上下煉一夜至曉取研細

右為末傅之止血收瘡口立效

又方 合瘡口黃丹白滑石研細傅之

又方 黃連木香檳榔為末傅之

又方

降真香　牛膝　石灰　人骨 醋炒

真龍骨　老松皮 各壹兩

右用黃牛膽一枚將小竹管插膽中以石灰末從管中入膽內掛高處日乾要用刀破開同諸藥為末傅瘡肚中不痛自愈

大乙膏 治金瘡箭鏃不問輕重用此傅之并治癰疽瘡毒

油　枝　止截　日

白芷　乳香（火製）　沒藥　蒼朮
白膠香　石膏（煅炒）　黃丹（各伍錢）
右為末，用真清油四兩，桐油頁者亦可，以黃蠟一兩，先
煎柳枝攪，次入白芷等四味，煎少頃，却入膠香、石膏
得同煎，試欲成珠，却入蠟同煎片時，用生布濾過，瓦器
後藏，用油單攤之，撿傷傳瘡口，自然肉不痛速愈。

正血杖瘡口方　藏血用此，瘡大者以燈心蘸入孔中。
白膠香（碓存）　老松皮　白芷　龍骨
血竭（各壹兩）
為末傳之。

又方
土朱（火煅醋淬一次，上火煉一日）　人骨（火煉者）　老松皮
龍骨（各等分）
右為末傳之，妙。

又方　雞內金焙為末，傳之立止。

乳香膏　老金瘡杖瘡神效。
乳香（叁錢）　沒藥（叁錢）　白芷　當歸
羌活　獨活　川牛膝　川芎
自然銅　石膏　劉寄奴　黑牽牛
黃柏皮　破故紙　白膠香　生地黃
熟地黃　赤芍藥　白芍藥　黃丹
紫金皮（各錢下）　黃蠟（壹二兩）

捶刷　傳　度擡服

右為末，用真清油四兩煎沸，却入藥同煎，留膠香、黃蠟、
黃丹末入，用柳枝不住手攪，試將欲成膏，却入三味，更
試成膏，生布濾淨，用瓦器盛，水傾在水中，用箄籠開貼
傳瘡，口孔深者，撚成膏條，穿入孔中，不問淺深，放瘡上
作熱加輕粉、梅花腦子、朴消入膏內貼（又搭可再用，貝下藏須封裹）

斷筋
小香散
白膠香末傳之。又方，金沸草根擂汁，塗筋封之，可相續。

止痛
乳香散　治打撲傷損，痛不可忍者。
白朮（炒）　當歸　粉草　川白芷
沒藥（別研）　交趾桂　明乳香（別研）
右為末，入別研藥令勻，每服二錢，酒調，不以時服。

應痛圓　治折傷後為四氣所侵，手足疼痛。
生蒼朮（半斤去毛）　破故紙（半斤生半斤炒）　舶上茴香（六兩炒）
骨碎補（半斤去毛）　穿山甲（去膜桑灰炒後為度，生用）
生草烏（半斤剉如麥大）
右用草烏半斤，用生薑一斤連皮，生薑一斤擂爛，草烏
一處淹兩宿，焙乾，連前藥同焙為末，酒煮麵糊為丸，如梧桐
子大，每服五十丸，酒或米飲下，忌熱物。片時少麻無妨。

尋痛圓　止痛清心，行氣活血如神。
草烏（去皮尖生用）　乳香（火熨）　沒藥（火熨）　五靈脂（各三錢）

生麝香少許

右爲末酒糊丸如指頭大朱砂五錢研爲衣每服一丸薄荷生薑研汁磨化痛止

世醫得效方卷之十八

外科精要十九卷

建寧路官醫提領陳志 刊行
南豐州醫學教授危亦林 編集
江西等處官醫副提舉余賜山 校正

瘡腫科

總説

人之一身血氣周流則平若冷熱不調喜怒不常飲食不節稍有壅聚則隨所發見。癰癤屬表易治疽癌瘭痼發屬臟腑發於腦背頤上最爲難治徑一寸二寸爲癤三寸五寸腫圓赤爲癰八寸爲疽癌瘭痼各不同其色亦異有圓見之凡初覺壅聚結熱疼痛腫赤疼痛堅硬或見或不見治之如救溺救焚不可緩也若按而后痛者其膿深小按即痛者其膿淺按之軟而復者有膿按之強而不復者無膿瘀亦腫高者爲實軟慢冷腫者爲虛初作宜宣熱拔毒外以洗滌角傳以斂其瘡癥是大要法也已潰則排膿止痛朝夕亦洗滌以舒其毒氣膿盡則生肌傅痂次第施治不可愴惶失序亦不可拘一酌量輕重形證逆順寒則溫之熱則清之虛則補之實則泄之導以針石灼以艾炷破毒攻堅以平爲期其有五善證者飲食如常一善實熱而小便澁二善肌肉好惡分明三善用藥如所料四善外無雜證五善七惡證者渴而喘大小便滑一惡內未潰肉

黑而陷二惡已潰青腐面黯背黑三惡發背透膜四惡未潰肉先潰面青五惡發痰六惡發吐七惡所謂五善見三必瘥七惡見四必危外證形候不治者亦五缺盆平滿背脊平滿掌心平滿脚心平滿臍頭凸出逆證者有五大渴痛不止一逆聲細色脫二逆腹藥嘔吐三逆睛細白大四逆肩胛全身轉不得五逆難治者亦有六證兩臉紅似坏漿心病深得之久全不腫起亦不覺痛乃臟腑受病深病處硬如牛領之皮又如石榴之狀用藥三五日不軟者病深病人無時喜笑神氣脫病深口小肉陷常出青白膿汁

一作痛

不疼痛內壞病深病處貼膏藥後出鮮血黑血間雜血瘀深又云初發疽時一粒如麻豆大身躰便發熱生疽處肉亦熱腫大而高多生疼痛破後肉色紅紫此爲外發雖大若盆椀如用藥有理則全活必矣初發疽時不拘大小身躰無熱自覺倦怠生疽處亦不熱數日之間漸漸開大不腫不高不疼不痛低陷而壞爛破後肉紫色黑此爲內發未作之先臟腑已潰爛則不治矣復有心腎肺癰腸癰附骨疽證心癰者乃心經有熱或好飲酒或嗜熱物積聚成熱久而不散黑發於皮膚之外氣血不流凝滯而生雖曰原道頗險而實可治宜用托裏活血之劑攻出外來腫高不陷可保無虞若陷入裏亦不可恃如不飲食急須扶脾能食瘡已破穿見肉膜亦未爲害但要洗滌淨潔以生肉秦揉四畔自然而愈腎癰乃與內腎相對皆由腎氣衰敗

人　干　針

而成實起皮赤者易安陷入皮黑者難瘥如精神清爽顏色紅潤飲食不減多起少卧此爲善矣也顏色黑青飲食全減斯爲可憂惟須詳審速療肺癰乃將理失宜勞傷氣血風寒之氣乘間而入內舍於肺及挾邪熱其氣結聚或作寒熱脉數而實是也腸癰乃榮衛相干氣爲敗濁小腹如腫大小便或澁或復汗出或復寒熱是也若腹皮急按之濡身無熱乃陰冷所成小腹堅痞按之痛身有熱乃結熱所成脉數膿已成不可下脉遲緊膿未成或下瘀血而愈附骨疽痛深按之無益著骨而生膿水腐潰碎骨出盡方愈治之宜熱去毒又當温腎未可專用凉劑更在針烙其病務詳淺深剌拔其根則易愈不爾則順脉流走徧躰

惜哉

洪腫卒致不救情哉至於所患之時備或多於外證未潰已前發渴乃臟腑焦燥痢下乃引飲無度已潰而渴則膿血去多津液中乾或復腸胃暴虛遂成下痢躰虛受寒則嗽聲不息氣逆挾熱則痰盛於胸熱毒不泄爲二便秘澁毒氣迫心爲嘔噦驚悸陰陽交爭血氣不和寒熱併作臟腑傷敗便血迸出毒氣攻外煩燥異常惟須大方科臬同治可也至於諸瘡備當辨其大略丁瘡含蓄毒氣瘡頭黑硬如釘四畔帶赤如火癰根突起痛癢異常隨變焦黑未幾腫大而光轉爲濕爛深孔透肌如大穿針之狀外證心驚頭疼拘急惡寒四肢痛強或寒熱交作煩舌間赤黑點點如珠若毒入腹心則煩悶嘔逆恍惚癡眠其死可立而

待台之當清心行血破毒拔丁則或愈矣瘰癧生於項腋之間凡人少小以來動輒蓄怒或憂思驚恐抑鬱不伸遂致結核日積月累風熱毒氣聚至於是腫濕閉瘡起伏無已甚則牽連頸下延至心胸外諸處寒熱往來或痛或不痛治之須用斑貓地膽使其根從小便中出或如粉片或如塊血或如爛肉皆其驗也治者不早則無及矣痔瘡之由多發於項腋陰僻肛門之間治之失時即生寒熱凡癰疽諸發隨所在處苟有宿膿腐肉折骨停當其間皆為之漏治法温散風冷收水生肌用窒塞之藥必得痊平惟須戒房事耳癮疹為病風熱在表天時炎暄而燥氣乘之則為赤疹天時寒涼冷氣折之則為白疹治之須疎風行氣氣行則消矣其有疥癬等瘡各自不同浸淫不已皆由脾肺風熱或心腎久虛所致熱則平血解毒冷則清心温腎又何患其不瘥矣

五發形圖

癰發

腫赤高起或長或大



此疾或在婦人乳傍上為血宮積滯氣壅血凝而成也內有壞血其病易治內有白膿其病難治

疽發

腫赤堅硬



此疾初發之時毒氣在皮作熱堅硬百節疼痛煩渴不已昏沉不省人事破后疽出血如香多口出膿汁七日之后忌用藥者鮮血難治

疔發

內陷大色不變

此疾初發之時不寒不熱腫處疼痛紫黑色不破裏面壞爛二十以前者積熱所生四十以后者皆血氣衰也須早為治十可全一二也

瘭發

四畔生牛蛋黑硬



此疾初發之時疼痛二十已后四十以前者皆積傷之毒入胃壅聚而成也四十以后六十以前者乃血閉不能行壅熱積血得之如出清水汁難治

痼發



此疾發時渾身壯熱手足不遂增寒頭痛煩渴多汗嘔逆四肢沉重五臟煩悶是其候若出米泔滓者難治

秘傳十方

治一切癰疽不問發背發作痛疼痛並宜服此即便消
散其效如神是名前鋒正將

荊芥　薄荷　山蜈蚣　老公鬚
天花粉　茹薏　苦片　敗荷心
川白芷　猪牙皂角炒切　赤芍藥已上各等分
淮烏大者一個煨去皮　紅內消錢半　甘草每料用節　地[illegible]錢一入去

右為末每服二錢薄荷茶清調下欲快利用酒調效若
服經日未見效恐是藥滯血可加當歸羌活如熱重
雄黃酒調乳癰加童草根研汁調其餘俱只用酒下不
飲麥門冬去心煎湯亦可但較緩耳

凡因內消無用此藥退潮止渴解熱是名引兵先鋒以仲
麻葛根湯表散後服此

木通　瞿麥　荊芥　薄荷
白芷　天花粉　甘草　赤芍藥
麥門冬去心　生乾地黃　山梔子　車前子
連翹各等分

右剉散每服二錢燈心生地黃煎熱潮加淡竹葉煎溫
服上膈食前下膈空心老人氣虛者宜加當歸羌活
數藥諸般癰發腫赤痛不可忍未成角散已成角破用至
瘡口合而止是名四面楚歌

京芥剉細　赤芍藥　大柏皮　土當歸

山大黃　土白芷　天南星　赤小豆
商陸乾切片如指子大　白及　赤斂
白斂　草烏　寒水石煨或炒各等分

右為末生地黃自然汁調角四畔或芙蓉葉根汁鋪用商
陸根研汁末漬則藥易敷上或有大起處則留出瘡口

洗方諸發已破未破皆洗如成膿潰爛最要洗淨去敗肉
生新肉洗后淨乾再用角貼換藥一日一次谷水師日日明

大柏皮　澤蘭　荼草　荊芥
赤芍藥　山大黃　土白芷　土當歸
獨活各等分

右剉麁散用水一斗入葱白大撮摘葉同煎熏洗如已
爛入猪蹄下滌風骨肉煎可免乾痛淨洗為度

替針丁香圓

草烏尖　硇砂　白丁香堅者

右為末醋調點瘡破者令速潰但有急則無如刀易
快其針一法亦妙見后

內護治癰發已成未成服內消三五日不效或年四十以
上氣血衰弱成者速潰未成者速散服至瘡口合而止內
能固護去舊生新是名固壘元帥又名加味十奇散

當歸酒浸　桂心不見火　人參　土芎
香白芷　防風去蘆　桔梗　厚朴薑汁炒去皮
甘草[illegible]　乳香別研　沒藥另研

右煎八味各等分同為末每服二錢酒調日三服病愈
而止不飲者麥門冬去心煎湯或木香湯
治諸發已潰去舊生新老人氣血虛弱宜補之此消後服
至愈而止是名護壁都尉
防風去蘆　厚朴製同上　桔梗　白芷
黃耆各半兩炙　川芎　甘草　柳桂
當歸各參錢　人參貳錢
右為末每服二錢空心溫鹽酒調服至瘡口合後更服
為佳不飲酒木香湯兼服降氣湯尤妙方見前
生肉神異膏治癰疽壞爛及諸瘡發毒
右為末洗后掺瘡上外用綿子覆蓋相護凡洗後破爛
者用此貼之
止痛拔毒膏治一切瘡發負爛不可近末破則貼破已破
則生肉杖瘡丁瘡皆用之
班猫肆拾　柳根肆拾　木鼈子肆拾去殼　乳香
沒藥　麝香少許　松脂三錢
右用真清油十四兩煎黑柳條焦枯濾去渣入黃丹五
兩滴入水中成珠為度却入諸藥攪勻入瓷器中收
了后用神妙
斂瘡口黃丹散
黃丹煅　白礬枯　龍骨　寒水石
乳香一　木香不見火　黃連　黃芩
檳榔　膩粉各參錢　腦子少許
右為末隨瘡乾濕用之乾則用溫鹽湯洗濕淨乾却掺
其上用不可太早須膿血去盡脂好方用不然則又畧作
通治
紫車散治癰疽初發腫痛或少年熱盛發背等患宜宣毒
利下熱退為度大人小兒四季皆可服之
紫背車螯鹽泥固濟火煅通紅地上出火毒用　輕粉
甘草各貳錢　大黃五錢　黃芩　漏蘆去頭
瓜根各半兩
右為末每服二錢薄荷湯下速利酒亦可
單煮大黃湯治同上氣血衰者不可用
大黃　甘草
右剉散每服三錢水一盞半煎空心服利下熱毒
五香散升降諸氣宣利三焦疏導滯氣發散邪熱治陰陽
之氣鬱結不消諸熱蘊毒腫痛結核或似癰癤而非使人
頭痛惡心寒熱氣急
木香　丁香　沉香　乳香
藿香各等分
右剉散每服三錢水一盞半煎食后溫服
五香連翹湯治一切惡核瘰癧癰疽惡腫等病
青木香即舶上木香　沉香　薰陸香即乳香

丁香　麝香　升麻　桑寄生
獨活　連翹　射干　木通各貳兩
大黃蒸，壹兩

右剉散，每服肆大錢，水二盞，煎一盞，空心熱服，半日以上未利再服，利下惡物為度，未生肉前服不妨，以折去熱毒之氣。本方有直深芒硝，恐泥者不能斟酌，故缺之，知者自當量入。

竹瀝

平補散，利後不止，手足冷，此藥補之，溫脾正氣。
白朮　甘草　白薑
茯苓　木香各壹錢　肉豆蔻貳箇，煨　陳皮各貳錢

右為末，服前藥後則可服，鹽湯調二錢，日三四服，利止手足溫，食進，却住服。

加味十全湯，治老人虛弱，瘡疾臨愈宜服。
黃耆　生乾地黃　當歸酒浸　川芎
人參　白茯苓　粉草　白芍藥
桂心不見火　烏藥　白朮米泔浸，麩炒　陳皮
北五味子揀炒，已上各五錢

右

右剉散，每用一兩，水一盌，薑五片，棗一枚，同煎，分作二服，滓可曬乾，再為末服。

附

真方不換金正氣散，治疽瘡未安之間，偏身寒熱，或先寒後熱，先熱後寒，或連日作，或間日作，必先嘔痰而後寒熱，大汗出，然後止。服此祛寒邪，正脾氣，痰飲自消，寒熱不作。

蒼朮米泔浸一日，剉，炒　大厚朴去粗皮，切，薑汁炒
粉草炙，一兩　真橘紅揀淨去白，各肆兩，炒
半夏湯洗七次　藿香葉　人參去蘆　木香去蘆
白茯苓去皮，各一兩

右剉散，每服三錢，水一盞半，生薑三片，紅棗二枚，煎八分，入鹽少許，溫服，不拘時候。

阿膠飲子，治一切癰疽發背，挾痔瘡疾，癰癤毒，並治之。
明阿膠剉，蛤粉炒如珠，一兩　真橘皮半兩　粉草一兩

右剉散，分作三服，水一盞，煎，低溫，病在上食後服，病在下空心服，累效。

忍冬酒，治癰疽發背，初發時便當服此，不問疽發何處，婦人乳癰，若鄉村或貧乏無得藥材者，度心服之，大有神效。
忍冬藤生取五兩，不犯鐵

右各生用，水二椀，慢火煎一椀，入無灰酒一大椀，再煎十數沸，去滓，分三次溫服。如無生者，用乾者，終力淺。更生取葉一把，擂爛，入餅子酒少許，生餅酒尤佳，調和稀稠得所，傅瘡四面，中心大留一口泄毒。

慢

蠟礬圓，治癰疽發背，瘰癧漏瘡，惡瘡，衛護內膜，驅解諸毒，自然內消。
通明白礬生用，二兩

右為末，以黃蠟一兩二錢，溶汁，就爐上入礬拌和，乘手圓如梧桐子大，每服十五圓，熟水或冷酒下，常服之漏

瘡用油髮灰和雞內金末外塞
粉乳托裏散　癰疽初發使服，或毒氣入裏衝心煩悶吐嘔
咳嗽以至泄瀉，急用此服，托裏逐出毒氣，自內發起，用外
又能消，已發未發皆可服之，神效
真菉豆粉二兩　明乳香半兩以燈草同研或箬葉盛盞火焙乾令細研
右為末，每服二錢，新熟水調下，或生甘草煎湯調，食後
少時細呷，常要藥味在胸膈間，則毒氣不能攻心，或瘡
已潰，悔用當歸一錢、辣桂二錢，煎湯調下，仍以加味不
換金正氣散為佐，小兒豆瘡陷入亦能救之，瘡壓攻心
嘔悶亦用
五味子湯　治腎水枯竭，運用不上，致令口中乾燥，舌上堅
硬，或如雞內金
北五味子　綿黃耆去蘆　條參去蘆
麥門冬去心，各兩半　粉草半兩
右剉散，每服半兩，水一盞半，煎，不以時溫服，日夜五七次
神白膏　貼五發未破
南星　大黃
蚌粉　大柏皮各一兩　小赤豆一合
右為末，取芭蕉頭研取油，調角四畔，加乳香、沒藥尤妙
乳香膏　止痛
木鱉子去殼細切　當歸各一兩　柳枝二八寸，寸剉之
同以清油四兩慢火煎令黑色，次用后
白膠香明淨者剉用刀細切入前油化開篩子濾之
右再事治之，煉藥銚令淨，再傾前藥油煉在內，候
溫入黃丹壹兩半，以兩柳枝攪極得所，再上火煎，不住
手攪，候油滑起，住攪，滴在水中，成珠不散為度，秋冬欲
軟，春夏欲堅，傾在水中，出火毒，搜成劑收之
追毒丹　治瘡疽黑陷者，用針刀開瘡，內追毒丹使之潰，然
後去敗肉排膿，隨證治之；癰疽、疔瘡、附骨疽，並皆治之
巴豆去殼膜研不去油
雄黃、黃丹各一錢　白丁香　輕粉各一錢
右件研細，加白麪三錢，滴水為圓，如麥狀，針破瘡內之，
覆以乳香膏，追出膿血毒物，漏瘡四壁死肌不去，不可
治，亦以此追毒，去死肌，乃養肉令愈，瘡小者用一粒，大
者加粒數用之
太乙膏　治五發癰疽，一切惡瘡，軟癤，年深日遠，已成膿未
成膿，貼之即效；蛇虎蝎犬，刀斧所傷，並可內服外貼；發背
先以溫蔥湯水洗瘡，拭乾，用帛子攤藥貼，仍用水下；血氣
不通，酒下；赤白帶下，當歸酒下；咳嗽，喉閉，纏喉風，並綿裹
含化；一切風赤眼，貼太陽穴，後用山梔子湯下；打撲傷損，
貼藥，仍以橘皮湯下；腰膝痛，貼之，鹽湯下；唾血，桑白皮湯
下；諸漏，先以鹽湯洗，若諸瘡癤，量大小以紙攤藥貼之，
並每服一粒，旋圓如櫻桃大，以蛤粉為衣，其藥可收十年
不壞，愈久愈烈，神效

玄參　川白芷　川當歸去芦　官桂去粗皮
赤芍藥　大黄　生乾地黄各一兩
右剉如大豆大，用清油二斤浸，春五夏三秋七冬十日，
濾去滓，油熱得所，次下黄丹一斤，滴油入水中不散為度。
善應膏治諸般惡瘡腫毒、發背腦疽、癰疔牙腫、打撲接骨、
閃肭、刀斧傷、杖瘡、蛇蟲毒、狗馬咬、湯火、漆瘡、疥癬，貼之即
愈。又治婦人吹乳，以藥圓如梧桐子大，新汲水下二十圓。
腸癰瘍癰亦可為圓吞服，溫酒、米飲或北棗、甘草煎湯皆
可。不可犯葷手及火焙。
上等黄丹別炙研極細　白膠香　明沒藥
滴乳香各別研　大當歸　川白芷　杏仁去皮尖

柳枝

大黄　草烏　川烏　赤芍藥
檳榔　生乾地黄　土芎　滴青別研入
亂髮皂莢洗，已上各一兩
右除乳香、沒藥外，將磁石銚盛香油一斤，浸藥一宿，慢
火煎熬，諸藥黑色，再入葱白、亂髮煎少時，用生絹帛濾
去滓，留下一兩藥油，復將所濾油於慢火上熬起，將黄
丹入油內，用長柳條攪，候不住手攪，候有微煙起，提起
藥銚，將柳條點滴在水面上，凝結成珠不散，方成膏。如
不成珠，再熬，直待成膏，提起藥銚，攪無煙出，却入乳冷（香）
沒藥、白膠末，攪勻，傾出磁器內，將元留下浸藥銚一併
收拾器內，用新汲水一日一換，將藥器坐放水內三日，

正

出火毒方可用之。如膏藥硬，約量加黄蠟、清油入膏內，
攪勻得所。熬膏藥中火候[illegible]
玄武膏治癰疽發背、疔腫、內外臁瘡、瘰癧下諸惡瘡及頭
項癰腫，不問已潰未潰皆可用，尤能排膿散毒，止疼生肌，
累有神驗。若丁腫，先用銀篦或鹿角針於丁瘡中間及四
畔針破，令惡血出，以追毒餅如小麥大搽入孔中，却以此
膏貼之。如瘡壞爛至甚，難以藥貼，則將皂角二三片煎油
調勻此膏如稠糊，薄傳之，膿水或轉多，不數次傳之乾癒。
大巴豆去殼，另研　木鼈子去殼，各五錢　黄丹研細，四兩
真清油十兩　槐柳嫩枝各二十條，長一寸
右依前法煎熬成膏貼用。

金絲膏治傷筋動骨，撲痛閃肭，風毒惡瘡，風濕筋寒諸病。
當歸尾　川白芷　杏仁去皮尖　玄參
猪牙皂角去皮弦　草烏生，剉，各一兩　白膠香明者，別研，一兩
連鬚葱白各七根　滴青半斤　乳香明者
沒藥別研，各半兩　黄蠟四兩　男子亂髮洗淨，一團如雞子大
右用清油一斤，將七味依前法熬，濾却，入膠香、滴青攪
勻，下黄蠟，又攪無煙，方下乳香、沒藥。
貼膏法：如瘡有膿血不淨，痂瘢閉礙，須用藥水洗淨拭乾，
候水氣乾，却用膏貼。貼後有黄水膿血出，須用絲揩從
側畔出，一日一換。黄水膿血止，兩日三日一換，貼至愈。
其餘正法治癰癤，不問老少，初發腫作，覺見稍大，便以紙

一片冷水浸搭瘡上，被其上一點先乾者，即是正頂，先以大筆管一箇安於正頂上，却用大馬蜞一條（本草名水蛭）安其中，頻以冷水灌之，馬蜞當吮其正穴，膿血出，毒散是效。如毒大蜞小，須用三四條，方見功效。若吮著正穴，蜞必死，用水救活。其瘡即愈，累試奇效，乃去毒之一端也。血不止，以藕節上泥止之，白茅花亦效。

追毒餅 治諸般惡瘡，因針開了口，後又閉合，生膿作痛不可忍，用此捻成小麥子大，入放瘡中，永不閉，膿水自出，瘡自乾好。

極好信石　好雄黃　雄黃
大朱砂各一分　輕粉少許

右研為細末，糯米糊圓如麥子大，若瘡口閉合生膿，將藥入内，仍以膏藥貼之。

内追毒丹 清心解毒散瘀。

大朱砂　雄黃各五分　生麝香一分　生犀角
琥珀肥嫩者　黑角沉香各五分

右為末，煉蜜圓梧桐子大，每服二十圓，燈心薄荷湯下。

雜證，乾葛飲 治發背作渴。

黃芩　朴消各五分　乾葛一兩

右剉散，每服三錢，用枇杷葉去背上白毛，淨洗，同煎，不拘時服。

蘇子降氣湯、縮砂香附湯。（方見六卷諸氣類）

人參敗毒散、參苓白朮散（方見大方科傷寒陽毒及脾胃類）

以上諸藥，升降散毒，理脾和氣，凡諸癰疽臨愈，皆可投數服。癰疽緣氣滯血凝，氣聞香則行，初發亦宜縮砂香附湯。

六一湯 諸發愈後宜服。

黃耆炙六兩　甘草壹兩

右剉散，每服三錢，水一盞半，薑三片，棗二枚，煎，空心服。

八味圓 老人氣血衰弱，發背作渴不止，宜服。（方見大方科虛損類）

嘉禾散 治疽後氣弱不食。（方見大方科脾胃類）

乳香圓 治發背及一切疽瘡潰爛，痛不可忍者。

當歸　川芎　交趾桂　川白芷
真菉豆粉各五錢　羌活　獨活
五靈脂　乳香別研　沒藥別研，各叁錢　白膠香伍錢

右為末，煉蜜為圓如彈子大，每服一圓，用薄荷湯嚼下。手足諸般損痛不能起者，加大草烏一味，用木瓜鹽湯細嚼下。

黑附圓 治氣虛血弱，老人疽發後四肢倦怠無力，或煩渴好飲水不止者。

黑附子壹箇，炮，去皮臍，鹽水浸　白茯苓伍錢，去皮　川楝子壹兩，去皮核
茴香壹兩，炒　破故紙壹兩，炒　熟地黃淨洗，切，焙，炒，壹兩
交趾桂伍錢，不見火，去粗皮　大當歸壹兩，去尾

右為末，煉蜜圓如梧桐子大，每服三十圓，空心鹽湯或鹽酒下。如覺脾虛食減，亦用參苓白朮散兼用。

禁腫法凡春初雷始發聲時急以兩手指雷聲雜拜者也
後七日勿洗手此后有一切腫及蠍螫惡注腫瘡摩之
隨手即消

乳癰

瓜蔞散如不愈者並依前方治之
瓜蔞　明乳香
右為末每服二錢溫酒調下熱者加石膏末少許

又方
草烏　柴胡　小赤豆　朱砂　拒霜相葉　陰乾
右為末井花水調金角四畔黃頂用前敷藥亦妙

又方仙人掌草一握小酒糟一塊生薑一大塊擂爛入桂
末少許炒酒服留滓吞腫處良止更不成瘡

乳勞癰

火炊草　皂角刺　川山甲　黃蜂窠
右各燒存性為末入輕粉生清油調勻傅瘡上

又方赤小豆一升酒研爛去滓溫酒服留滓傅患處

又方蔓荊子擂爛炒酒服滓貼患處

又方乳勞癰爛見心者貓兒腹下毛甘鍋內煆存性為末
乾摻或清油調入輕粉少許

吹乳結實疼痛陳皮一兩甘草一錢水二碗煎一碗分二
次服又用荊芥羌活獨活煎湯熏之溫則洗之安

一方消毒飲加連翹三錢黃瓜蔞仁三十粒搥損每服四
錢水一盞半煎食後溫服方見小方科

又方皂角刺燒灰蛤粉明乳香少許為末熱酒下揉散方可

奶頭裂取秋后冷露茄子花裂開者陰乾燒存性灰水調
傅未秋時但裂開者亦可用

灸法

癰疽、腫堅硬不破各曰石癰當上灸百壯

諸癰疽毒開闊不止疼楚殊甚以艾炷四枚圍著所作
處同時下火各灸七壯灸至十一壯佳

大蒜頭橫切如錢貼其中心頓小艾炷灸之五壯而止

若形狀稍大以黃秆紙蘸酒敷貼認先乾處為筍腳於
先乾處灸之或兩處先乾此白灸但五七壯而止

又法以指從四圍尋按遇痛處是根就此重按深入自
覺輕快即此灸之

凡癰疽展大如龜形且看頭向上下先灸其角兩腳次
灸其尾或紅筋走緊而長須盡處灸之須留頭並后兩
腳勿灸若盡灸之不惟火氣壅聚彼毒無所走散又攻
入裏也或辨認不明以白芷三分汶椒桑白皮各一分
蔥白十莖水一碗煎入醋半盞淋洗少頃其節自現
可以辨認

心癰

涼血飲即引其先鋒方治心肺有熱或作實熱口乾好飲
水渾身拘腹內作熱頭面赤色

作次

宜用內托散，即前錄正將方，治同上，兼用散角洗貼。
已潰，多服加味十奇散。以上二方並見前。

腎癰

八味圓，治腎虛嗜慾過度，外挾寒邪，發為癰腫，不可施以涼劑，宜服。方見消渴
加味十奇散，治同上，兼用葱白、橘葉、椒葉、豬蹄湯淋洗，仍貼金絲膏。方並見前

肺癰

桔梗湯，治男子婦人欬而胸膈隱痛，兩脚腫滿，咽乾口燥，煩悶多渴，時出濁唾腥臭，名曰肺癰。小便赤黃，大便多澁，實者先投參蘇飲四服，虛者先投小青龍湯四服，並用生姜煎。

棗子煎熟服。此二方見大方科傷寒
和劑雞皮通治類

桔梗去蘆　貝母去心　大當歸酒浸　瓜蔞仁
枳殼去穰炒　薏苡仁微炒　桑白皮炒　甘草節
防己去皮各一兩　百合蒸半刃　黃耆一兩半　正地骨皮
知母　杏人　北五味子　甜葶藶略炒

治

右剉散，每服四錢，水一盞半，生薑五片，煎不以時溫服。咳不治，加百藥煎；熱加黃芩；大便不利，加煨大黃少許；小便澁甚，加木通、車前子煎；煩燥加白茅根；咳而疼甚，加人參、白芷。

葶藶散，治肺癰咳嗽，氣急喘臥不安，心胸脹滿。
甜葶藶子二兩半隔紙炒　百合炒　白附子

北五味子炒　甘草節　羅參　欵冬花
百藥煎略一　大朱砂五錢　紫苑一兩去苗

右為末，每服二錢，燈心湯調下。

牡丹散，治肺癰胸乳間皆痛，口吐膿血，氣作腥臭。
川升麻　苦梗　薏苡仁　地榆
黃芩　赤芍藥　牡丹皮　生甘草各等分

右剉散，每一兩，水一升半，煎五合溫，溫日三服。

補肺散，治肺癰已吐出膿血，以此潤護。
真鍾乳粉一兩　白滑石二兩

右為末，每服三錢，茶飲調下。

理肺膏，治肺癰正作，咳唾不利，胸膈迫塞。
訶子去核　百藥煎　五味子微炒　條參去蘆
欵冬花蕊　杏仁　知母　貝母
甜葶藶子　紫苑　百合　甘草節各五錢

右為末，用白茅根淨洗，秤三斤，研取自然汁，入磁石器中熬成膏，更添入好蜜二兩，再熬，旬候冷，調和前藥為圓，如梧桐子大，溫水吞下。

加味敗毒散，治上膈壅熱而成肺癰，兼感風寒，重者加入黃芩、瓜蔞仁、薄荷、當歸、川白芷、半夏、烏梅、桑白皮，每半料各五錢，生薑、生地黃、燈心、白茅根煎，熱甚如大黃。

內護排膿散，理肺癰吐膿後，宜服排膿補肺。
嫩黃耆二兩　川白芷　北五味子炒　人參各一兩

右為末煉蜜圓，如小指頭大，綿仰入口噙化，旋旋嚥下
食后服臨臥服

裕

葦葉湯

薏苡仁　瓜瓣仁　桃仁去皮尖各一兩

右剉散，每服四大錢，水二盞，先以葦葉一握煎，取一盞，
去滓入藥，煎六分，食後服，或吐膿血勿怪。

五香白朮散，寬中和氣，滋益脾土，生肺金，進美飲食。

沉香　木香　明乳香　丁香
藿香葉各半兩　白朮　羅參　白茯苓
薏苡仁　山藥　扁豆　桔梗
縮砂　白豆蔻　粉草　蓮肉各一兩

之

右為末，每服二錢，用棗湯調，空心服；棗湯亦可，有汗加浮麥煎湯下
雲母膏，治一切內外癰瘡，依和劑方修合，煎北梗耳草湯
吞服，服畢便就枕，有熱者，當歸膏亦可圓服，湯引同上，見前
加味十奇散，治肺癰已散，不咳不疼，服此去舊生新，內餒
閔濟方見前。

肺癰證，始萌易治，膿成難治，診其脈數而實，已成，微而濇，
漸愈，面色白，嘔膿而止者自愈；有膿而嘔，食面色赤，吐
膿如糯米粥者不治。男子以氣為主，得之十救二三；婦
女以血為主，得之十全七八，歷試屢驗。

灸法：治肺癰，正作吐膿血不已，肺腧灸二七壯，在三椎下
三椎上各去脊一寸半，乃灸譩譆二穴二七壯，其穴在

湖

肩髆內廉第六椎兩傍三寸，抱肘取之。

腸癰

敗醬散，治脈數身無熱，腹無積聚，按之濡，此為腸癰，久積
陰冷所成，宜服。

薏苡仁二兩半　附子半兩，炮　敗醬一兩一分

右剉散，每服四錢，水一盞半，煎，空心服，小便利為效。

牡丹湯，治腸癰，小腹腫痞，按之即痛如淋，小便自調，時時
發熱，自汗出，復惡寒，其脈遲緊者，膿未成，可下之，當有血；
洪數者，膿已成，不可下。

大黃炙　桃仁去皮尖各半兩，麩炒　牡丹皮一兩　冬瓜子三分
芒消二分

右剉散，作一服，水三盞，煎八分，去滓，入芒消再煎，滿頓
服，不拘時候。未效，用敗毒散，方見大方科傷寒類。

薏苡湯，治腸癰，腹中疞痛，煩毒不安，或脹滿不食，小便澀，
婦人產後虛熱，多有此病，縱非癰，但疑似間，便可服，就有
差互，亦無害。

薏苡仁五兩　牡丹皮　桃仁各三兩　瓜瓣仁四兩

右剉散，每服四錢，水一盞半，煎，不拘時服。

蠟礬圓，治腸癰內托神妙，方見前。

附骨疽

蟾蜍膏，治附骨疽久不差，膿汁敗壞，或骨從瘡孔出。

大蝦蟆一枚　亂髮雞子大　豬脂油四兩

右以猪脂油煎前項藥傳玉濃凝如膏貼之凡貼先以
桑白皮烏豆煎湯淋洗拭乾煆龍骨爲末按瘡口四畔
令易收歛却用貼之
黑　焦鯽膏、治附骨疽未破已破或膿出不盡者
右用黑色鯽魚一箇、去腸入白塩令腹滿用線縛定用
水一盞、銅石器中煮水盡乾焦爲末用猪油調傳已破
者乾掺少痛勿訝
痊　又　赤木圓、治附骨疽膿汁淋漓、久而不瘥已破未破皆可用
赤木（[illegible]所浸去皮曬令黑色焙乾）　舶上茴香
破故紙炒　川練子剉炒　茯苓　土茴香
川白芷　桃仁各去皮尖炒

右爲末老人加黑附子、煉蜜圓梧桐子大毎服五十圓
温酒或塩湯呑下
便毒
雙解散、治便毒内蘊熱氣外挾寒邪精血交滯腫結疼痛
辣桂　川大黄　白芍藥　澤瀉
牽牛炒取末　桃仁去皮尖炒　甘草半分
去尖作去皮
右剉散毎服三錢、水一盞半、生姜五片、煎食前日二服
先小便快熟從小便出后大便利、皆是褐毒
五香連翹湯、治便毒腫結因敗精搏血留聚而成立效方見
復元通氣散、便毒初發用此
一本方内無白芷
穿山甲酒浸炙焦　天花粉酒浸一宿焙　白芷

當歸　甘草　舶上茴香炒　白牽牛炒
延胡索炒去皮　南木香各等　青木香半兩
右爲末毎服二錢溫酒調食前服不飲者木香煎湯服、
五苓散、疎利小便、以泄敗精、葱二根煎湯、調下、方見大方科傷暑類、
蟠葱圓、治便毒腫聚内消神效、方見前
四順清涼飲、治便毒熱腫、大便不通、方見大方科積熱類、
木香流氣飲、治便毒、餘虚氣閉、大便不通加大黄如許煎、
食前服方見大方科諸氣類、
護壁都尉方、治便毒已消内托可常服、方見前
傳藥、治毒漬時用白及没藥乳香血竭爲末、掺、效
又方、治便腫痛、
雄黄　乳香各二錢半　黄柏一錢
右爲末、分作兩服、以新水調傳自平、
灸便毒法
用細草或軟篾、隨所患左右手量中指自手掌盡處
横丈量起、通三節至指盡則住、不量指爪截斷、却將此草
於手腕横紋量起引草向臂當中、草盡處即是穴、艾注
如麥大灸二三壯、腫散痛止即安、
偏癰
古方、治偏癰俗名[illegible]、欲作未作之時即之即愈、
灰棒子兔角七片、[illegible]大爆黄色、去皮踩地上出
大毒、研如末用酒調服、

又方一服即散
牛蒡子　破故紙　黑牽牛　大黃四兩煨
右等分爲末酒調下
又方治便毒初發
以生薑一大塊米醋一合同薑熬醋盡取干者擣泥敷
作麯即效并治瘰癧卽人家行步地上有高塊者是
有

癮疹

清肌散治風寒暑濕外搏肌膚發爲癮疹偏身搔
痒或赤或白口苦咽乾或作寒熱即敗毒散一兩半加天麻
薄荷各三錢蟬退二七個去足翼分作六服每服水一盞
半生薑三片煎溫服取效右見大方科傷寒門類
加味羌活散治風寒暑濕外搏肌膚發爲癮疹憎寒壯
熱偏身搔痒隨臟氣虛實或赤或白心神悶亂口苦咽乾
羌活　前胡各乙兩　人參　桔梗
甘草炙　枳殼麩炒　川芎　天麻
茯苓各半兩　蟬蛻去頭足　薄荷各叁錢
右剉散每服二大錢水盞半生薑三片煎不以時服
加味烏荊圓治癩疹上攻頭面赤腫搔痒搔之皮便脫
落作瘡作痒而痛淋漓走注有如虫行
川烏湯洗浸三五次去皮尖焙乾　荊芥穗各半斤　薄荷五兩
杜當歸洗焙乙斤酒浸三日
右爲末好醋煮米粉糊爲丸梧桐子大每服五十丸溫酒下

偏

麯术散治因浴出腠風冷搏身體疹搔之隨手腫突及眩
暈嘔噦
白术乙兩　神麯炒乙兩　甘草乙分
右爲末每服二分米飲調下一方以土朱研炒冷酒調
下二分不飲以茶調下
消風散治遍身瘙痒癮疹搔痒神效方見頭目科
茶調散治風熱癮疹方見頭目科
胡麻散治風氣挾熱癮疹搔痒
胡麻子五兩　苦參　荊芥穗　何首烏各二兩
威靈仙　防風　石菖蒲　牛蒡子炒
菊花　蔓荊子　蒺藜炒去刺　甘草炙各
右爲末每服二分食后薄荷湯或好茶清下
治偏身瘡疹疼痛成瘡
白殭蠶一兩炒黃色爲末分四服酒調服
傅藥　明礬朴消爲末井水調鵝羽掃傅
又方　赤小豆荊芥穗爲末雞子清調薄傅
洗方　蚕沙以新水煎濃温洗

諸瘡

熱證平血飲治偏身生瘡膿血腫痛且痒
乾葛　赤芍藥　升麻各乙兩　粉草五分
加天麻　蟬蛻
右剉散與人參敗毒散合和生地黃當歸前生地黃麥門冬

去心煎不拘時候，大效。嚴氏方見傷寒雜證類。
小牛黃圓，治心肺積熱，腎臟風毒，攻於皮膚，時生疥癩瘙
痒難忍，時出黃水，及大風手足壞爛，眉毛脫落，一切風疾。
玄參　荊芥穗各四兩　苦參半斤　大川烏
宣連各乙兩　真牛黃一錢半
右為末，水糊圓梧桐子大，每服三十圓，熱水或茶清下。
一方，加麻黃、防風、皂角，末為膏，入煉熟蜜為圓服。
牛黃清心圓，方見風科通治類。
天麻煎，治風毒入胃，及心腎經絡，攻注百節疼痛，頭目虛
腫，痰涎不利，下注腰腳，緩弱生瘡，婦人血風，男子癩風，乃
風濕腳氣，攻注皮膚，瘙痒癮疹，偏正頭風。

丸

川烏頭炮去皮臍　草烏頭水浸二日，去皮，各四兩
荊芥穗四兩　乾薄荷半兩　杜當歸酒浸三日，切，焙
右為末，醋糊圓如梧桐子大，茶清下三十圓。
酒蒸黃連圓，治同上。方見大方科消渴類。米飲下三十圓。
荊黃湯，治惡瘡生背膈，頭腦四肢要害處，連進一二服，得
利即效，不利再服。方見大方科積熱類。
當歸飲，治心血凝滯，內蘊風熱，發於皮膚，遍身瘡疥，或腫
或痒，或膿水浸淫，或發赤疹瘔瘰。
當歸去蘆　白芍藥　川芎　生地黃洗
白蒺藜炒去尖　防風去蘆　荊芥穗各乙兩　何首烏
黃耆去蘆　甘草炙，各半兩。

右剉散，每服四錢，水一盞半，生薑五片，煎，不以時溫服。
連翹飲，治諸惡瘡，紅赤痛痒不定，心煩口乾，及婦人血風，
紅斑圓點，開爛成瘡，痒痛，流黃水汁。
連翹　赤芍藥　當歸　京芥
防風　牛蒡子炒　川芎　梔子
黃芩　瞿麥　木通　生乾地黃
瓜根　麥門冬　甘草各等分
右剉散，每服四錢，水一盞半，燈心二十莖，煎，不以時服。
赤小豆湯，治少年氣血俱熱，遂生瘡疥，變為腫滿，或煩，或
渴，小便不利。
赤小豆炒　當歸炒，去蘆　商陸　連翹仁

梔

赤芍藥　漢防己　木豬苓去皮　桑白皮各
澤瀉各半兩
右剉散，每服四錢，水一盞半，生薑五片，煎，不拘時候，溫
服。熱甚者加犀角二錢半。
蟬蛻散，治飲酒後遍身痒如風瘡，抓至血出，其痒止後痛。
蟬蛻去頭足，二十個　薄荷葉半兩
右為末，每服二錢，小酒調服，不拘時候，立效。
虛證，四生散，治上攻下注，耳鳴目痒，鼻赤齒浮，或作口瘡，
下注陰濕，四肢瘙痒，遍身生瘡，及婦人血風瘡。
黃耆圓，治腎臟風虛，下注腰腳，生瘡，行步艱難。方見大方科虛損類。
增益四物湯，治一切惡瘡。

蒺苻

驗

川芎　當歸　地黃　甘草
芍藥各等分　防風　荊芥　鳳尾草各減半入
右剉散每服三大錢水一盞半煎服經驗
五香連翹湯治風氣風瘡瘡除升麻大黃獨活木通乳香
五味忌食冷物服後小水必通方見前
五苓散加瞿麥大退治同上此方得之艱用之取效
數藥合掌散治偏身生瘡百藥不效
檳榔伍個為末　硫黃研細五錢生者　膩粉半兩
右和勻每服一錢安於手心內油調夜臥時塗外腎不
得洗手但擦手令乾可也一二日瘡即愈
通治多年惡瘡不瘥爛搗馬齒莧傅之亦治反花瘡其形

滓

如花開之狀燒灰以豬脂塗傅　又方雞腸草研細取
汁拂其瘡以塗蓋之或為末豬脂調傅極效
赤小豆方治善惡瘡疥或赤腫無不愈者
右用赤小豆七七粒為末傅之愈或以水調傅瘡及四
傍赤腫處落則再傅又方剉散每服二錢水一盞煎服
仍用新汲水調藥傅綠赤豆粉和物既乾難揭則用芭
根為末和之便不粘此法尤佳

仍

烧

殺蟲方
雞心檳榔一兩　黃連　川山甲十八片燒存性　射香半分
右為末用臘茶末調塗三五日 后用葱湯洗
惡瘡上

掺　被
衣
浴　被

白膠香用末色青一　明白礬二分　黃色黃丹各半
右為末先煃過酸漿水洗拭乾用清油調傅
又方貝母為末入雄黃少許摻上
菖蒲末治偏身熱毒瘡痛而不痒手足尤甚粘著衣被
不得睡分取菖蒲為末布於席上使病者恣臥其間仍以
衣被覆之五七日瘡愈惡瘡之瘡爛用芝麻亦可
葵花散治一切瘡
鬱金　黃連　黃柏　梔子仁
葵花各等分
右為末冷水調成膏貼瘡痛處神效
松脂散治一切惡瘡疥癩所不識者

故

水銀　甘草　黃柏　黃連
松脂黃明者　膩粉　蜂窠以為炙
右取水銀放在掌心以唾擦為泥入瓷器中用清油和
勻生塗細稀調先以溫水洗瘡帛拭乾塗之一切無
名之瘡或痛或痒元有黃水者塗之與治疥尤妙
一掃散治一切瘡疥但相對而生者便是不問乾濕
日近年深用之立效
蒺藜三分　真輕粉十錢　蚌蛤粉壹分　通明雄黃五錢
水粉壹兩
右為末用大鯽魚一個入香油煎候熟去魚用油冷調藥
擦瘡未効可加信石末少許研香入于粉近陰處勿用

殺疥蟲、水銀倖研細、臘猪脂煮熟、徧身擦上立効、
真平膏散、治癰疽後作瘡、或炎水泡、破瘡延㬠、大崩壞、及
一切瘡、用清油調傅、瘡濕則用乾糝、立愈、痂爛欲歛、
徵黑 二黃膏、治一切瘡疽、
試 清油三兩、煎巴豆二十粒、微黑去巴、入黃蠟一兩化訖、
硫 研雄黃、硫黃各一錢、溫入成膏、淨洗搽傅二三次、神効、
疥 瘡疥後瘡可用、
神異膏、治一切瘡疥、
蝎 全蝎（去毒） 皂角（剉一錢、去皮弦） 巴豆（去皮、去殼） 蛇牀子（參錢、炒）
清油壹兩 黃蠟半兩 輕粉半字 雄黃（細研、熔化）
右先用皂角、全蝎、巴豆、煎油變色、去了三味、入黃蠟化
開、取出冷處、入雄黃、蛇床末、輕粉、和勻成膏、先用苦參
湯溫洗了、以藥擦瘡上、神效、
淨肌散、治一切惡瘡、
雄黃 海螵蛸 大柏皮 宣連
水粉 輕粉 升粉 杏人
右為末、用真清油調傅、
瘡 又方、治大風瘡、楓木子燒存性、為末、加真輕粉、杏油調傅、
烏梅膏、治諸瘡胬肉、如蛇出數寸、用硫黃細研、於肉上薄
傅、即便縮、諸瘡中新胬出肉、以烏梅肉蜜和擣、作餅子
如錢厚、以貼瘡上、
苦楝膏、治大人小兒瘡疥及惡瘡、

苦楝皮燒灰、以猪脂調傅、
下減 青黛散、治中部生濕瘡、熱痒而痛、寒熱、大小便澁、食肉或
攸 身面微腫、多食魚蝦發風熱物得之、
馬齒莧四兩、研爛、入青黛一兩、再研勻、塗上、立有神效、
仍服八正散、日三服、方見大方科積熱類、
洗方、苦參湯、
苦參 蛇床子 白礬 荊芥穗
品 右等分、用水煎、放溫洗、
驅風散、
紅椒（開口者、去目、炒） 連根葱頭（采蒲）
右同煮水、淨洗、用絹衣浥乾、即愈、
指縫搔痒成瘡、有孔出血不止、多年蚕繭燒灰傅
之、即安、
火氣入瘡、黃柏皮為末、摻之立愈、若可煎塗亦可、方見熱類、
漆毒成瘡、磨鐵漿中泥塗之、即愈、又方、蟹黃塗之效、
翻瘡、神降散、治走皮瘡、用桑寄生一小把、本類桑根取皮
一撮、白芷、黃連、煎湯溫和、以烏藥先洗、候露出盡、拭乾傅之、
滿天皂角（炒焦存性） 麻竹大葉（燒存性）
厚黃柏 鷹爪黃連 風擇葉（乾） 白芷
右等分為末、清油調傅、神效、慎勿哭啼、
凍 凍瘡、以茄子根濃煎湯洗、并以雀兒腦髓塗之、
指 又方、治足上凍爛生瘡、黃丹為末、用猪脂調傅、

人面瘡用貝母為末小葦筒灌其瘡口數日成痂而愈
白癩瘡毎旦瘡上退白皮一升許如蛇蛻宜服解毒雄黃圓三四服即安方見風科熱證類
甲疽瘡綠礬散
綠礬半兩炒乾 蘆薈一錢半 麝香一字
右研如粉以絹袋盛藥納指於袋中線扎定痊爲度
月蝕瘡胡粉散
胡粉炒微黃 白礬煆 黃丹煆 輕粉各貳錢 胭脂壹錢 麝香少許 黃連淨
右為末先以溫漿水入鹽洗拭后摻藥乾則用清油調
瘸獺瘡先用本人小便燒秤錘令紅投於小便中方與洗瘡皮黑白去然後以帛拭乾用滴青五文細研用油煎三筒以盐燒成油調滴青塗之三日效
頭上風屑極痒用藜蘆根不拘多少為末先洗頭須避風候稍乾剔用末摻定須將末入髮至皮方可緊縛兩日
腎臟風瘡瘡十方
活血驅風散治肝腎虛為風毒所入濕痒生瘡
當歸去尾 川芎 白芷 華陰細辛
白蒺藜炒去刺 桃仁浸去皮尖 白芍藥 半夏洗
五靈脂 甘草各叁錢 蒼术炒 杜仲去粗皮薑汁炒去絲
辣桂 天麻 薏苡仁 橘紅
檳榔 厚朴去粗皮薑汁炒 枳殼去穰各四錢
右判散每服三錢水一盞半生薑五片棗二枚煎去滓入乳香末少許以佐心氣使心腎相交旋熱去桂乳香加黑豆煎服
青木香圓疏導腎經風水腎虛挾邪浮腫多用安腎圓少用青木香圓夾和鹽湯下屢效方見大方科諸虛類
小牛黃圓治腎虛挾熱陰囊痒痛多瘡方見前
烏荊圓治肝腎風瘡方見風科通治類
神授圓治外腎濕痒方見風科癮疹門風類
不換金正氣散疏導脾腎濕氣方見大方科時疫類
華物稀烟洗汁方大腹皮一升苦參剉各三兩煎湯溫洗拭乾以津液塗潤次用油髮燒存性入白及末少許傅
遂日煎湯空心洗猪或加乳香末仍服蠟礬圓以髮灰末米飲調香下方見前
腎臟風發瘡疥
雞心檳榔破開以黃丹合在內濕紙裹煨 全蝎 硫黃各一錢
右為末入輕粉半錢麝香少許每用末半錢於磁器內收每用少許清油調抹兩掌擦外腎以兩掌掩兩乳各睡至醒次日又用經驗
又方大紅川椒去目水浸半日夾生杏人研膏擦手心上法亦效
外腎生瘡用抱雞卵殼黃連輕粉各等分為末煎過清油調塗又附子白芷五倍子煎水洗

煅　　　年　　　乾

陰䘌瘡

豆粉壹分　蚯蚓貳分

右用水研塗上，乾又傅之。

陰囊上瘡

甘草煎湯溫洗，却用蠟茶末乾傅貼。

陰頭生瘡

右用溪螺殼於泥中螺旋搞者為好，於鍋中煅過，為末，先以鹽水洗三七次，后以螺藥傅之。　此

妬精瘡

右用大田螺兩箇，和殼煅過存性，為末，入輕粉，掺所患處，即可安。　煅　粉

又方，治年少陽道興起，當泄不泄，不泄強泄，脹斷嫩皮，初如針眼，大，畏疼，不敢洗刮，日久攻入皮肉，連莖潰爛一二寸許。用荊芥、黃柏皮、馬鞭草、甘草、生葱煎湯，洗去膿靨，以訶子燒灰，入麝香少許，乾掺患處，仍斷房事數月。臨睡喫冷水兩三口，勿令陽道興起，脹斷瘡靨，靨落房即安矣。　瘡

津調散，治妬精瘡，脹汁淋漓臭爛。

黃連　欵冬花各等分

右為末，以地骨皮、蛇床子煎湯，用軟帛浥乾，津調藥塗之，最忌不得用生湯洗，恐瘡愈增燃。

痱子，滑石粉

焙

綠豆粉、蚌殼煆，兩　滑石壹兩，研

右為末，和勻，以綿撲子蘸撲，仍以膩粉佐之。

滴凡

蛇纏瘡，用雄黃為末，醋調塗，仍用酒服。凡為蛇傷及蜂蠆、蜈蚣毒虫、顛犬所傷，皆可用。又方用鏡面草入鹽研，細上，立效。

挪粉作粉

痱子瘙痒方

新汲井水、挪青蒿汁，調蛤粉傅之。雪水尤妙。

粉

洗方，治諸般惡瘡。

黃柏、茵蔯、荊芥、葱白、藿香，煎水，溫溫淋洗。

癬

癬瘡

癬

胡粉散，治一切癬，神效。

胡粉壹分　砒霜半分　大草烏壹箇，生用　硫黃　膽礬

麻　草　傾　狀

蠍梢柒枚　雄黃雞冠　班猫壹箇　麝香少許

右為末，先以羊蹄根蘸醋擦動，次用藥少許擦患處。

烏頭圓，治宿患風癬，遍身黑色，肌膚麻木，痒痛不常。

草烏頭一斤，刮洗去皮，令極淨，攤乾，用清油四兩，鹽四兩，同藥入銚內炒，令深黃色，傾出，剩油只留鹽，并藥再炒，令黑色，煙出為度，取一枚，擘破，心內如米一點白者恰好，白多再炒，趁熱擂羅為末，醋糊圓如梧桐子大，每服三十圓，空心溫酒下。然草烏性差熱，難制，服五七日間，以烏豆煮粥解毒。

通身牛皮癬方

何首烏　川烏　草烏，去皮尖　何首烏　白芷

蘇木（各等分）
右㕮小片，臘月猪脂油煎焦，候冷，入鹽少許，磁器收貯。
常用一匙，空心酒調下。
又方，雌黃末入輕粉、猪脂調抹。
又方，斑猫（去翅足三兩，以米同炒，米燒為灰存性，再炒）
右用紅棗一枚，湯泡，剝去皮核，與藥同研爛，先以手抓
破癬，然後搽藥，不可犯好肉，恐有毒。
昨葉荷草散 治一切癬，無問風濕氣血與夫相染而生者。
昨葉荷草（壹兩，上日乾） 枯礬（壹錢） 雄黃（半錢）
右為末，以羊蹄菜根先蘸醋揩癬上，令痒破，即以藥末
乘濕塗傳，不過三兩次而愈。（更服何首烏散，合和服，方見瘡科）
灸法，八月八日，日出時，令病人正當東向，后髮際手舉兩
手，將尺兩邊取肩頭小垂際骨解宛宛中，灸之，兩火俱
下，各三壯若七壯，十日愈。

腨瘡

牛黃金虎丹 治足兩生瘡，下連大指，上延外踝、腨骨，每發
兼旬，昏暮痒甚，爬搔出血，如泉，痛楚不可忍，夜分漸已，明
日復然。每服一圓，新汲水下，腨脛有所下，即愈。
天雄（炮去皮臍，二兩） 白礬（枯過） 天南星（湯洗）
天竺黃（研） 膩粉（研，各壹兩壹錢） 牛黃（二錢，研） 雄黃（研，二兩半，飛過）
生龍腦（研，半錢） 金箔（隆八片為衣）
右為末，煉蜜搜和，每一兩半作十圓，金箔為衣。

應效三聖散

花蕊石散（方見產科） 追風獨活散（方見風科通治類） 復元通氣散（方見前）
右各一匙，合和酒調，空心服。
又方，治瘡生於腳脛骨下，狂瘡，俗謂之裙口瘡，或因物打
撲而成者，其瘡口狹，皮內極闊，皮薄如竹膜，極痒痛，終日
黃水流，延蔓而生，甚者數年不愈，又易於染過他人，患此
者須忌房室，則易愈。此外臁瘡皆治之。
韭菜地上地龍（焙乾為末），入輕粉，清油調傳，臺大血亦可。
又方，治腳肚上生瘡，初則如粟，漸大，爪搔不已，成片包腳
相交，黃水出，痒不可忍，又成痼疾，最難愈。
百藥煎研細，津唾調，逐旋塗傳，自外而入，先以貫衆煎
湯淋洗，後用藥。
又方，石榴皮煎取濃汁，稍冷拂瘡上，冷如冰雪，即成痂。
又方，用鱔魚數條，黃色者尤妙，打死，先用清油塗其腹，
下置瘡上，盤屈，令偏，帛子繫定，食頃覺瘡痛不可忍，然
後取鱔魚看腹下，有針眼大竅子，皆蟲也。如未盡，再以
數條依上再縛，蟲去，又卻用死人腳脛骨燒灰，清油調
傳，或以骨灰一兩，入好茶末二錢，同調亦可。
又方，亦可治打撲腳脛上成瘡，此最難愈。
檳榔（半兩） 龍骨（壹分） 輕粉（半分） 乾猪屎（燒存性）
右為末，先以鹽湯淨洗瘡口，軟綿拭乾，清油調傳。

一日一換，五日定差。忌無鱗魚、熟麪。
又方，治冷臁瘡：鹿角灰、乳香，為末，清油調傅。
臭蓝 又方，治足上生瘡，臭穢潰爛：漏蘆子一枚，燒為末，入輕
粉少許，井水調塗，效。
檳榔散，治全上。
全蝎 一个　班猫 十四个　巴豆 十四粒　檳榔 一个
先用清油兩半，慢火煎，先入全蝎，次班猫，次巴豆，煎 下
檳榔見巴豆黑色，方入黃蠟一兩，候溶去藥渣不用，只用
蠟油入后藥、　黃蘗皮 去　草麻子 二分各　雄黃 研
硫黃 研生者　黃丹 火飛　海螵蛸 一分　白膠香
黃連　杏仁　輕粉　清油 兩半先熬
七

右為末，同入清油中，調傅瘡上立效。
臼 單方，治臁瘡成田累月不乾：上等好砂糖，先用鹽湯淋洗，后綿帛拭乾，以津唾塗，却
以此傅上，三日愈，神效。
外臭 粉麝散，治臁瘡久爛數十年不愈者、
檳榔 生 壹箇　鴨蛋 打碎 白殼 去肉不存性 用一盞 地上出火毒為度
右為末，入輕粉、麝香，拌勻。臨用先以葱水洗乾，方用藥。
牡礪散，收斂瘡口令乾：
牡礪 壹兩　銅緑 一錢　乳香 去油　黃丹 入火內煆 去出研
右隨用時，旋入枯飛過白礬少許，拌和，傅瘡口上。
秘方，治腳脛骨上作瘡，久爛黑或紫，孔或臭穢不可近，用

蜒蚰十數條，小竹簽穿，定瓦上焙乾，為末，真清油調傅，
割時取效。
秘方，隔紙膏，用多年老杉木節燒灰，真清油調，攤華紙上，
貼在瘡上，以絹帛繫定，不數貼而愈。
洗藥，用海桐皮、石榴皮等分，煎湯淋洗，令淨，然後用熏藥。
熏藥，用牛蒡子半兩，研為末，入於熱子內，燒熏之，然后搽。
手足皸瘃
白及膏，治斷踝皸，用頭髮一大握，桐油一椀，於瓦器內熬，
候油沸，頭髮溶爛，入川白芷、白及、松脂末，出火攤冷，以
瓦器收貯，不容灰入。每用百沸湯泡洗皸裂，令軟拭乾，
傅其上即安，或加少水粉。

秘方，五倍子為末，用牛骨髓填縫內，即愈。
又方，手足皸裂，春夏不愈者：
生薑汁　紅糟　鹽　豬膏 臘月
右同研爛，炒熱，擦入縫內，一時雖痛，少頃皮軟，縫合，仍
再用之即安。
治久行腳心腫痛，蚯蚓糞塗腫處，高閣起腳，一夕即愈。
又方，行路腳跟腫痛：草烏、耳、茂谷等分，為末，新汲水調
傅，露出腳爪甲。
甲
黃蠟膏，治冬月手足拆裂：
清油半兩，盞內慢火煎沸，入黃蠟一塊同煎，候溶入光
䐜 粉、五倍子末少許，熬令稠，紫色為度。先以熱湯洗，火上

烘乾，即用藥傅薄紙貼之。

傅藥，治遠行脚腫，用之可行千里，輕便甚妙。

防風　北細辛　草烏 各等分

右為末，摻鞋底內，如著草鞋，即以水微濕過，然後摻藥。

漏瘡

蠟礬圓，見癰疽，護膜，托裏癰疽，瘰癧漏瘍惡瘡，衛內膜，驅解諸毒，自然內消，神妙，方見前。

溫解散，溫散漏瘡風冷。

藿香葉　厚朴 去粗皮，薑汁炒　半夏 麯　橘皮

蒼术 炒　細辛　川芎　白芷 各一分

辣桂　川白薑 生　甘草 炙，各半分

七

右剉散，每服三錢，水一盞，生薑三片，棗二枚，煎服。

猪腎酒，通行漏瘡惡水自大腸出。

黑牽牛碾細，去皮，取末一分，入猪腎中，以線扎，青荷葉包，慢火煨熟，細嚼，溫鹽酒下。

食治方，治漏瘡肛門周匝有孔十數，諸藥不效，用熟犬肉蘸濃藍汁，空心食之，不食犬肉，驢肉代之，七日自安。

桂附圓，治氣漏、冷漏諸瘡。

桂心　附子 炮，製去皮臍，米醋中浸，再炮，淬三五次，去皮尖　厚朴 去粗皮，薑汁炒

甘草 炙　白术 各一兩　木香 一分　乳香 二錢，別研

右為末，煉蜜圓梧桐子大，空腹米飲下三五十圓。

乳香雲母膏，治漏瘡殺，

穿山甲 燒存性，各半片　眞蚌粉 去殼，同炒，候香熟，起甲，為末，別研

右入乳香末一錢，麝香半錢，文和雲母膏十五貼，為圓梧桐子大，每服三十圓，溫酒下，仍以鹿角膠調鹽酒服。

神授散，見大方勞瘵類。

安腎圓、山藥圓，二藥多服調養。方並見大方虛損類。

代赭石圓，治痔變為漏，膿血不止。

代赭石 醋淬，研　磁石 醋淬七次，研　白礬 煅

牡蠣灰　龍骨 研　蝟皮 炙焦　皂莢刺 燒

猪後蹄垂甲 燒，各存性　赤石脂　川椒 焙

木賊 焙　蜂房 炒，各等分

右為末，神麴糊圓如小豆大，每服五十圓，食前艾并生薑煎湯下。

漏瘡出血處，以熟艾搓和血竭塞，日三換。

雄黃膏，治積年冷漏，黃水不止。

雄黃　硫黃 研細，各一分　頭髮　黃蠟 各半兩

右用清油二兩，煎熟，頭髮溶盡，去滓，次入雄黃、硫黃、黃蠟，慢火上用枝頻攪為膏，以雞生絹貼用。藥先以赤芍、甘草、荊芥湯洗，或露蜂房、白芷煎湯，常洗常貼。

黑玉散，漏瘡通用。

露蜂房 剉，二分　牡蠣粉　黃丹　硫黃 研細，各一分

右同炒，令煙盡，為末，入髮灰一分，麝少許，拌和，傅患處。

麝能引藥透達，亦殺蟲。

又捷效方，用信石新瓦上火煅過，為末，以津液潤紙撚子

藥少許，絍入瘡孔內，如瘡孔多，不可齊上藥，免使害人

血竭散，治痔漏痛不可忍

血竭　牡礪（煆）　髮灰 各等分

右為末，入麝香少許，自以津唾調傅，如更痛，研杏人膏調藥傅之

洗漏瘡方，漏瘡孔中多有惡穢，常須避風洗淨，每用白芷及露蜂房煎湯洗，或大腹皮、苦參湯洗，洗畢候水出，拭乾，用西東石榴皮，晒為末，乾摻

久冷漏瘡，用活鱔魚五六條，擲地，以竹針貫之，置瘡上，良久當有蟲出如線，復之。使盡，用檳榔、黃連末傅。明日以乾艾作湯，投白礬三二錢，洗，不一月全愈

拜　釆

瘰癧

白花蛇散，治九漏瘰癧，發於項腋之間，增寒發熱，或痛或不痛

白花蛇（酒浸軟，去皮骨，焙乾）二兩　生犀角（鎊）半　青皮 半兩

黑牽牛 半兩，半生半炒

右為末，每服一錢，入膩粉半錢，研勻，五更糯米飲調下，巳時利下惡物，乃瘡之根也。更候十餘日再進一服。忌發風壅熱物。如已成瘡，一月可效，用之神효。

四聖散，治瘰癧，用花蛇散取轉後，用此補之，末去根本

海藻（洗）　石決明（煆）　羌活　瞿麥穗 各等分

右為末，每服二錢，米湯調下，日三服，下清水盡為妙

牽牛圓，立效

荊芥穗　僵蠶 各五分　斑猫 二十八個，去頭足，用糯米炒

黑牽牛 五分

右為末，皂角末熬膏為圓，菉豆大。臨睡時先用米飲調滑石末一分服，半夜時再一服，五更初卻用溫酒吞二七丸服，訖，如小便先惡物，行，次日早再進一服，又不行，第三日五更初先進白糯米稀粥湯，卻再進前藥一服，更以燈心湯調琥珀末一分服之，以小便內利去惡毒，是其應也

連翹圓，治瘰癧結核，或破未破者

薄荷 新者二斤，研取汁　皂角 一挺，水浸去皮，搗取汁

已上二味，於銀石器內熬成膏，入

連翹 半兩　黑牽牛 半兩　青皮　陳皮 各一兩

皂角子 慢火炮，去皮取仁，搗羅為末，各兩

右為末，用前膏為丸，梧桐子大，煎連翹湯，食前下三十丸

三聖圓，治瘰癧

丁香 五十個　斑猫 十個　麝香 一分，另研

右為末，用鹽豉五十粒，湯浸爛如泥，和藥令勻，丸如菉豆大，每服五七丸，食前溫酒送下，日三服，至五七日外，覺小便淋澀，是效，即加服。或便下如青筋膜之狀，是病之根，忌濕麵毒食

必勝圓，治瘰癧不以年深日近，及腦後兩邊有小結核連復數個，兼當臍腹內有塊

鯽魚一个，去腸肚并子，入雄黃一粒，雞子大，[illegible]以炒一
蜈蚣一條，於腹內安魚子，於炭火上燒盡取出，
麻五个，去皮，瓦上燒黃，用[illegible]三枚，皂角二挺，去皮，酥炙，

右為末，別用皂角二挺，去皮，搥碎，以水三椀，揉汁，去滓，
熬精羊肉四兩，爛軟，入輕粉五匣，男子乳汁半兩，同研
成膏，和藥末，丸如菉豆大，朱砂為衣，溫酒，侵晨十九，日
一服，至晚下肉疙瘩子，若項有五箇，則以五服藥取之，
視其所生多少，以為服數，既可更進數服，如熱毒瘡癤
未有頭頂者，亦用消散，一方加巴豆三七粒，燒存性入

旱蓮子圓，治少長臟氣不平，憂怒驚恐，諸氣抑欝結聚，瘰
癧滯留項腋，及外傷風寒，燥濕，飲食百毒，結成諸漏，發作
寒熱，遍于項腋，無問久近，悉驗，

旱蓮子　連翹子　威靈仙　何首烏
蔓荊子　三稜（醋浸，濕紙裹，煨）　赤芍藥（已上，各一兩）
南木香（不見火，二兩）　大皂角（三挺，炙。元刮去皮，無則用手指大。）

右為末，米糊圓梧桐子大，茶清下三十丸至五十丸，日
三服，小兒量與之，食後服，

破毒，雄黃圓，治瘰癧久作不愈，寒熱往來，項筋攣急，已破
未破，皆可服之，立見逐下惡物，自小便中來，

通明雄黃　顆塊大朱砂（各三分）　水銀（二分）
斑猫（二十八个，去足翅，用糯米炒黃，）

右先以斑猫為末，續以雄黃朱砂另研為末，并入水銀
細研合和，用雞子清和糯米糊，圓如菉豆大，每服二

七丸，米飲或溫酒下，如惡物未見，半朝再一服，

已驗方，治瘰癧已作者，

烏雞子　紫杖斑猫（四十九个，去頭翅足，）

右每雞子一个，去頂，用筯攪匀，入斑猫七粒，以帋糊蓋
於飯上蒸熟，取開，去斑猫，食雞子，每食一个，煎生料五
積散嚥下，服不過四五，已破者生肌，未破者消散，

海藻圓，治癧生於頸項上，交接各蛇盤癧，宜早治之，

海藻菜（蕎麥炒，去殼，）　白殭蠶（炒，斷絲，）

右為末，取白梅肉泡湯，為圓梧桐子大，每服六七十丸，
臨卧米飲送下，其毒當自大便泄去，忌豆心雞羊酒麪，
日五六服，

經效方，治瘰癧多年不愈者，

不蛀皂角子，一百枚，用米醋一升，硇砂二分，同煮醋盡，
炒令酥，看數癧子多少，如生一个，服一枚，生十个，服十
枚，細嚼，米湯下，酒浸煮服亦可，

立應散，治瘰癧神效，已破未破，皆可服，

連翹　赤芍藥　川芎　當歸
甘草（炙）　滑石（研，各半兩，）　黃芩（三分）　白牽牛（生取末，）
土蜂房（蜜水洗，飯上蒸，各二分半，）　地膽（麸炒，去頭翅足，三分，秤末，）
川烏尖（七箇）

右為末，每服一大錢，濃煎木通湯調下，臨卧服，毒氣從
小便中出，澁痛不妨，如粉片塊血爛肉是也，如未効，後

再服餌以薄荷湯解其風熱且恐瞬性帶毒、清以白尖
或衝上麻悶不能強制、﹅葱白一寸、茶清下以解之、如
小便澁、燈心煎湯調五苓散服、瘡处用好膏藥貼、若瘰
癧潰用此宣導惡毒、本方去、尖芩不用、

皂角散、
不蛀皂角不以多少、每三十條作一束、以棕櫚裹之、縛
定於溷缸内浸一月、取出、却於長流水内再浸一月、死
水不能浣洗、不可用、去棕櫚、曬乾、不得烘焙、羅為末、每
一兩入射香半錢、全蝎七箇、研細拌勻、每服一二錢、溫
酒或湯飲調下、一兩服愈、
粉乳托裏散、治瘰癧攻心、嘔吐、發出其毒、方見前
蠬蓬圓、治瘰癧神效、方見前
蝸牛散、治瘰癧已潰未潰皆可貼、
蝸牛 不拘多少、以竹𥫱串尾上、晒乾、烧存性
右為末入輕粉少許、猪骨髓調、用鵝毛量病大小貼之、
一法、以帶殼蝸牛七箇、生取肉、入丁香七粒於七殼内
烧存性、與肉同研成膏、用紙花貼之、
烧灰散
大田螺并殼肉、烧存性、灰、破者乾貼、未破者清油調傅
洗傅方 白芷煎湯泡荊芥、候温軟、帛蘸洗拭乾、好膏藥
貼、膿汁惡肉出盡、用後藥傅
半夏 南星 血竭 重九 輕粉少許

之

貼敷

右為末、以津唾調傅、一方用五倍子、海螵蛸、攢根、雷丸
五靈脂、麝香為末、乾用清油調搽、濕則乾掺、
又傅方、治瘰癧初作未破作寒熱、
木鱉子二箇、草烏半兩、以米醋磨、入擂爛葱白、連根蚯
蚓糞少許、調勻傅瘰上、以紙條貼、令通氣孔尤妙、
斂瘡口、
血竭 童字 髮子 虎髮 手分 麝香少許
右灰研津唾調傅
灸法
以手仰置肩上、微舉肘取之、肘骨尖上是穴、隨患處左
即灸左、右即灸右、艾炷如小筯頭大、
再灸如前、不過三次、永無恙、如患四五年者、如或用藥
腐不退者、時著灸中時即落、所感稍深、若三作即三灸
乎安、又法、只以蒜片貼瘡瘰上、七壯、一易蒜、多灸取效、
瘤贅
南星膏、治皮膚頭面上瘡瘤、大者如拳、小者如粟、或軟或
硬、不疼不痛、宜服、以可輒用、
右用大南星一枚、細研稠粘、用米醋五七滴、為膏、如無
生者、用乾者為末、醋調如膏、先將小鍼刺痛處、令氣透、
却以藥膏攤紙上、象瘤大小貼之、
治小瘤方、先用甘草煎膏、筆蘸妝瘤傍四圍、乾後復妝凡
三次、後以藥、

大戟　芫花　甘遂

右為末，米醋調，別筆蘸傳其中，不得近著貝草處，次日縮小，又以貝草膏蘸小暈三次，中間仍用大戟、芫花、甘遂如前法，自然焦縮，凡骨瘤、肉瘤、脂瘤、血瘤、石瘤皆不可決，惟脂瘤決去其脂粉則愈，可治六種瘤，決則殺人。

蠟礬圓，治同上，方見前

繫瘤法，兼去鼠奶痔，真奇藥也。

芫花根，淨洗，帶濕不得犯鐵器，於木石器中搗取汁，用線一條浸半日或一宿，以線繫瘤，經宿即落，如未落不換線，不過兩次自落，后以龍骨、訶子末傅瘡口，即合。繫鼠奶痔，依上法，累用文效，如無根只用花，泡濃水浸線之。

黃丹末，治鼻生息肉及面上雀兒瘢

黃丹　硇砂　巴豆去油　餅藥各貳錢

右為末，入生礦石灰末一匕，雞子清調勻，酒瘡用鵝翎刷上，雀兒瘢用竹針刺破，挑藥點之，纔覺痛即拭去可去搽。

丁瘡

秘方，治丁瘡

防風　細辛　甘草節　白殭蠶

青皮　黃連　羌活　獨活

蟬退　赤芍藥各等分

右剉散，每服五錢，先將一服入澤蘭葉少許，薑一兩，剉擂爛，熱酒和服，后用酒水各半盞，生薑三片，煎服取汗。

退減後再入大黃少許，煎服下一兩次，洗藥去餘毒，更用白梅、蒼耳子研爛，貼瘡上，拔去根脚，此方以藥味觀之，甚若不效，然有劾驗，速宜試之。

秘方，治魚臍丁瘡

絲瓜葉即雲刺菜　連鬚葱　韭菜

右同入石鉢內搗爛如泥，以酒和服，查貼腋下，如瘡在左手貼左腋下，右手貼右腋，在左足貼左胯，右足貼右胯，如在中則貼心臍，並用布帛包住，候肉下紅線處皆白則可為安，如有潮熱亦用此法，須令人抱住，恐其顛倒，則難救矣。

酒煎散，治丁瘡

赤烏桕根　水柳根　水楊梅根　荔頭根

紅內消　香白芷各等分

右多為剉散，酒煎，澂入通明雄黃，研爛同服，如瀉時瘡勢客退，瀉只喫此藥，若不瀉再服通利藥。

通利藥

黑牽牛炒乙　巴豆去油　大黃五分生用

右為末，米糊圓如菉豆大，初服七丸，次伍丸，第三服三圓，如瀉不止，喫白米粥，及冷水洗五心，如一服即瀉，住服，壯人、虛弱人與服，如人盛服前藥，通再服后藥，大小分實者。

大通藥

芫花　巴豆　大戟　荊芥　封膠各、

右剉散，白水煎一沸，便濾過，空心服，可留藥滓再煎。

若瀉泄住，再服一服便住。

連翹散，瀉後用此。

連翹　當歸尾　羌活　獨活

防風　赤芍藥　小赤豆各五　大黃貳分

茵蔯　沒姑　馬芹

木香　莪茂　茨菇　薄荷

紅內消　杜白芷　升麻　甘草

忍冬草各叁，若潮不退，加黃芩、梔子仁各叁，朴消少許

右為末，酒調服，不拘時候，痛甚可常加人參、大黃。

三四服愈，如煩嘔，甘草半兩、豆粉一兩為末，濃盞水下。

如割去了疔子止血，用毛鉄甲為末傳。

角瘡口方

霜梅拾箇　大黃伍分

右為饒子，用石灰炒過去石灰，入黃丹三錢為末，乾傅瘡上。

蟬蛻散，治丁瘡最有功效，用蟬蛻、殭蠶為末，酸醋調塗四畔，留瘡口，俟根出稍長，然後拔去，再用藥塗瘡。

蟾酥膏，治丁瘡，取蟾酥，以白麪、黃丹搜作劑，團如麥顆狀，用指甲爬動瘡上，插入，重者針破，患者收一粒，內之，仍以水沉膏貼之。取蟾酥法：用癩蝦蟆，於眉稜上以手擠出酥於油紙上或桑葉上，用新瓦盛下，然後插在背陰處，候乾自收，以於鵝翎筒內藏之。

水沉膏，白及末半錢，水盞內沉下，澄去水，却於皮紙上攤開，貼瘡上。

灸法，掌後橫文後五指，男左女右，灸七壯即瘥，屢效。

簽刺瘡

單方，治竹草簽刺瘡，以象牙屑傳之立出。

又方，嚼白梅傳之立出。

最果治竹草刺瘡發膿作痛，緣傷時不曾出血，又被惡毒氣注痛不止，夜臥不安，初破時其瘡紫赤黑色，發時起二五重皮是也。

綠丸　礬半及以便達熱、發後，於內候取出日乾、　丹參二錢半

麝香一字　馬兜鈴根一錢半

右為末，漿水洗淨瘡口上，敷貼立效。

湯火瘡

傳方：劉寄奴不以多少，為末，先以糯米漿雞翎掃傷處，然後摻藥，並不痛，亦無痕。大凡湯著急以醋調茶鹽末塗之，護肉不壞，然後用別藥傳之，至妙。

又方、

黃連　黃柏　輕粉各等分　朴消少許

右為末，入清油用合子合住，飯上蒸，調塗立愈。

湯潑火燒，細研山梔子，濃調雞子清，鵝毛輕掃上，立冷愈。

又方，側柏葉燒灰存性為末，雞子清調傳，如乾再上。

消

黄柏散治湯火傷、
雞子殻　黄柏樹皮　朴消　大黄
寒水石
右等分爲末白水調塗極效、
又聖惠、
右用雞子黄於銀石器内熬自然油調好粉傅之、
近效方山枇杷柴取皮焙乾爲末生蜜雞子清調傅、
四黄散治湯發火燒熱瘡疼痛
大黄　黄連　黄蘗　黄芩
白皮各等分
右爲末以新瓜蘆以雞翎時刷、
糝藥治白火多生火斑瘡有汁、
黄柏皮澤蘭葉爲末糝之即安、

項瘻

破結散治五瘻及硬不可移名曰石瘻皮色不變名曰肉瘻筋
脉露結名曰筋瘻赤脉交絡名曰血瘻隨憂愁消長名曰氣瘻五
瘻皆不可去決破ヽ則膿血崩潰多致夭枉服此十日知 枉
二十日愈、
海藻洗　龍膽草　海蛤　通草
昆布洗　礬石枯　松蘿各叁分　麥麴四分
半夏　海帶各二分
右爲末每服方寸匕酒調日三服忌鷄魚猪肉豆辛生 辛

藥及諸毒物、
灸法治諸瘰癧灸天窗穴二七壯又灸肩髃左右相當宛宛
處男左十八壯右十七壯女右十八壯左十七壯又灸
肩端兩骨間陥者宛宛中舉臂取之、
又灸兩耳后髮際穴百壯、

外科精要十九巻終

孫真人養生書 節文二十卷

養性序

夫養性者欲所習以成性性自為善不習無不利也性既自善內外百病自然不生禍亂災害亦無由作此養性之大經也善養性者則治未病之病是其義也故養性者不但餌藥餐霞其在兼於百行百行周備雖絕藥餌足以遐年德行不克縱服玉液金丹未能延壽故老子曰善攝生者陸行不遇虎兕此則道德之祐也豈假服餌而祈遐年哉聖人所以制藥餌者以救過行之人也故愚者抱病歷年而不修一行纏痾沒齒終無悔心嵇康曰養性有五難名利不去為一難喜怒不除為二難聲色不去為三難滋味不絕為四難神慮精散為五難五者必存雖心希難老口誦至言咀嚼英華呼吸太陽不能不迴其操不夭其年也五者無於胸中則信順日躋道德日全不祈善而有福不求壽而自延此養生之大旨也

黃帝問於岐伯曰余聞上古之人春秋皆度百歲而動作不衰今時之人年至半百而動作皆衰者時代異耶將人失之耶岐伯曰上古之人其知道者法於陰陽和於術數飲食有常節起居有常度不妄作勞故能形與神俱而盡終其天年度百歲乃去今時之人則不然以酒為漿以妄為常醉以入房以欲竭其精以耗散其真不知持滿不時御神務快其心逆於生樂起居無節故半百而衰也夫上古聖人之教下也皆為之虛邪賊風避之有時恬憺虛無真氣從之精神內守病安從來是以人之壽夭在於撙節若消息得所則長生不死恣其情欲則命同朝露也人年四十而陰氣自半也起居衰矣年五十體重耳目不聰明也年六十而陰痿氣力大衰九竅不利下虛上實涕泣俱出故曰知之則強不知則老仲長統曰王侯之宮美女兼千卿士之家侍妾數百晝則以醇酒淋其骨髓夜則房室輸其血氣耳聽淫聲目樂邪色宴內不出遊外不返王公得之於上豪家馳之於下及至生產不時字育太早或童孺而擅氣或疾病而搆精精氣薄惡血脈不充既出胞藏養護無法又蒸之以綿纊爍之以五味胎傷孩病而脆未及堅剛復縱情欲重重相生病病相孕國無良醫醫無審術奸佞其間過謬常有會不一疾莫能自免今少百歲之人者豈非所習不純正也抱朴子曰或問所謂傷之者豈色欲之間乎答曰亦何獨斯哉然長生之要其在房中上士知之可以延年除病其次不以自伐若年當少壯而知還陰丹以補腦采七益於長俗（谷一作）者不服藥物不失一二百歲也但不得仙耳不得其術者古人方之於凌杯以盛湯羽苞之蓄火也又且才所不逮而強思之傷也力所不勝而強舉之傷也深憂重恚傷也悲哀憔悴傷也喜樂過度傷也久談言笑傷也寢息失時傷也挽弓引弩傷也沈醉

眠

嘔吐傷也、飽食卽臥傷也、跳走喘乏傷也、懽呼哭泣傷也、陰陽不交傷也、積傷至盡、盡則早亡、盡則非道也、是以養性之士、唾不至遠、行不疾步、耳不極聽、目不極視、坐不久處、立不至疲、臥不至懻、先寒而衣、先熱而解、不欲極飢而食、食不可過飽、不欲極渴而飲、飲不欲過多、飽食過多則結積聚、渴飲過多則成痰癖、不欲甚勞、不欲甚佚、不欲流汗、不欲多唾、不欲奔走車馬、不欲極目遠望、不欲多啖生冷、不欲飲酒當風、不欲數數沐浴、不欲廣志遠願、不得規造異巧、冬不欲極溫、夏不欲窮涼、不欲露臥星月、不欲眠中用扇、大寒大熱大風大霧皆不欲冒之、五味不欲偏多、故酸多則傷脾、苦多則傷肺、辛多則傷肝、鹹多則傷心、甘

斷

多則傷腎、此五味尅五臟五行自然之理也、凡言傷者亦不卽覺也、謂久卽損壽耳、是以善攝生者、臥起有四時之早晚、興居有至和之常制、調利筋骨有偃仰之方、祛疾閑邪有吐納之術、流行榮衛有補瀉之法、節宣勞佚有與奪之要、忍怒以全陰、抑喜以養陽、然後先服草木以救虧缺、後服金丹以定無窮、養性之理盡於此矣、皇甫隆令以常閑道人劇京已年一百七十八而甚丁壯、言人當朝朝服食玉泉琢齒、使人丁壯有顏色、去三虫、而堅齒、玉泉者口中唾也、朝旦未起、早漱津令滿口乃吞之、琢齒二七遍、如此者名曰鍊精、嵇康以穰歲多病、饑年少疾、信哉不虛、是以關中土地、俗好儉嗇、廚膳餚饈不過菹醬而已、其人少

吞

病而壽、江南嶺表、其處饒足、海陸鮭餚、無所不備、土俗多疾而人早夭、北方仕子、遊宦至彼、遇其豐贍、以爲福祐所臻、是以尊卑長幼、恣口食啖、夜長醉飽、四体熱悶、赤露眠臥、宿食不消、未逾春月、大小皆病、或患霍亂腳氣脹滿、或寒熱瘧痢、惡核丁腫、或癰疽痔漏、或偏風猥退、不知醫療以至於死、凡如此者、比例皆是、惟云不習水土、都不知病之所由、靜言思之、可爲太息也、學者先須識此、以自誡慎、抱朴子曰、一人之身、一國之象也、胸腹之位、猶宮室也、四肢之列、猶郊境也、骨節之分、猶百官也、神猶君也、血猶臣也、氣猶民也、知治身則能治國也、夫愛其民所以安其國、惜其氣所以全其身、民散則國亡、氣竭則身死、死者不可

生也、亡者不可全也、是以至人消未起之患、治未病之疾、醫之於無事之前、不追於既逝之後、夫人難養而易危也、氣難清而易濁也、故能審威德所以保社稷、割嗜慾所以固血氣、然後真一存焉、三一守焉、百病卻焉、年壽延焉、

道林養性

真人曰、雖常服餌、而不知養性之術、亦難以長生也、養性之道、常欲小勞、但莫大疲及強所不能堪耳、且流水不腐、戶樞不蠹、以其運動故也、養性之道、莫久行久立久坐久臥久視久聽、蓋以久視傷血、久臥傷氣、久立傷骨、久坐傷肉、久行傷筋也、勿汲汲於所欲、勿悁悁懷忿恨、皆損壽命、若能不犯、則得長生也、故善攝生者、常少思少念、少慾、

少事少語少笑少愁少樂少喜少怒少好少惡，行此十二少者，養性之都契也。多思則神殆，多念則志散，多欲則志昏，多事則形勞，多語則氣乏，多笑則臟傷，多愁則心懾，多樂則意溢，多喜則忘錯昏亂，多怒則百脈不定，多好則專迷不理，多惡則憔悴無懽。此十二多不除，則榮衛失度，血氣妄行，喪生之本也。惟無多無少者，幾於道矣。是知勿外緣者，真人初學道之法也。若能知此者，可居瘟疫之中無憂疑矣。既屏外緣，會須守五神（肝心脾肺腎），從四正（言行坐立）。言最不得浮思妄念，想欲事，惡邪大起。故孔子曰：思無邪也。了了分明，勿輟也。仍於每旦初起，面向午，展兩手於膝上，心眼觀氣，上入頂，下達涌泉，旦旦如此，名曰迎氣。常以鼻引氣，口吐氣，小微吐之，不得開口。復欲得氣少出入氣多。每欲食，送氣入腹，每欲食氣為主人也。凡心有所愛，不用深愛；心有所憎，不用深憎，並皆損性傷神。亦不用深譏，亦不用深毀。常須運心於物平等，如覺偏頗，尋改正之。居貧勿謂常貧，居富莫謂常富，居貧富之中，常須守道，勿以貧富易志改性。識達道理，似不能言。有大功德，勿自矜伐。美藥勿離手，善言勿離口，亂想勿經心。常以深心至誠，恭敬於物。慎勿詐善以悅於人，終身為善，人所嫌勿得起恨。事君盡禮，人以為諂，當以道自平其心。道之所在，其德不孤。勿言行善不得善報，以自怨仇。居處勿令心有不足，若有不足，則自抑之，勿令得起。人知止足，天遺其祿。所至之處，勿得多求，多求則心自疲而志自苦。若夫人之所以多病，當由不能養性。平康之日，謂言常然，縱情恣欲，心所欲得，則便為之，不拘禁忌，欺罔幽明，無所不作，自言適性，不知過後一一皆為病本。及兩手摸空，白汗流出，口唱皇天，無所逮及，皆以生平粗心，不能自察，一至於此。但能少時內省身心，則自知見行之中，皆長諸疴，將知四百四病，身手自造，本非由天。及一朝病發，和緩不救，方更誹謗醫藥無效，神仙無靈。故有智之人，愛惜性命者，當自思念，深生愧恥，誡勒身心，常修善事也。至於居處，不得綺靡華麗，令人貪婪無厭，乃患害之源。但令雅素淨潔，無風雨暑濕為佳。衣服器械，勿用珍玉金寶，增長過失，使人煩惱根深。廚膳勿用脯肉，常令儉約為佳。然後行作鵝王步，語作含鐘聲，眠作獅子臥（右脅著地坐腳也）。每日自詠歌云：美食須熟嚼，生食不粗吞。問我居止處，大宅總林村。胎息守五臟，氣至骨成仙。又歌曰：日食三個毒，不嚼而自消。錦繡為五臟，身著糞掃袍。修心既平，又須慎言語。凡言語讀誦，常想聲在氣海中（臍下也）。每日初入後，勿言語讀誦，寧待平旦也。旦起欲專言善事，不欲先計校錢財。又食上不得語，語而食者，常患胸背痛。亦不用寢臥多言笑，寢不得語言者，言五臟如鐘磬，不懸則不可發聲。行不得語，若欲語須住腳，乃語，行語則令人失氣。冬至日止可語不可言。自言曰言，答人曰語。言有人來問，不可不答，自不可發言也。仍勿觸冷開口大語為佳。

言語既慎仍節飲食是以善養性者先飢而食先渴而飲食欲數而少不欲頓而多則難消也常欲令如飽中飢飢中飽耳蓋飽則傷肺飢則傷氣鹹則傷筋酸則傷骨故每學淡食但當熟嚼使米脂入腹勿使酒脂入腸人之當食須去煩惱（暴數為煩侵觸為惱）如食五味必不得暴嗔多令人神驚夜夢邪每食不用重肉喜生百病常須少食肉多食飯及少菹菜并勿食生菜生米小豆陳臭物勿飲濁酒食麵使塞氣孔勿食生肉傷胃一切肉惟須煮爛停冷食之食畢當漱口數過令人牙齒不敗口香熱食訖以冷酢漿漱口者令人口氣常臭作䘌齒病又諸熱食鹹物後不得食冷酢漿水喜失聲成尸咽凡熱食汗出勿當風發痙寒痛令人目澁多睡夜食訖以手摩面及腹令津液通流食畢當行步躊躇計使中數里來行畢使人以粉摩腹上數百過則食易消大益人令人能飲食無百病然後所修為其快也飽食即臥乃生百病不消成積聚飽食仰臥成氣痞作頭風觸寒來者寒未解食熱食成刺風人不得夜食又云夜勿過醉飽食勿精思為勞苦事有損餘虛損人常須忌在巳時食訖則不須飲酒終身無乾嘔勿食父母本命所屬肉令人命不長勿食自己本命肉令人魂魄飛揚勿食一切腦大損人茅屋漏水墮諸脯肉上食之成瘕結凡肉作脯不肯乾者害人祭神肉無故自動食之害人飲食上蜂行住食之必有毒害人腹內有宿病勿食陵鯉魚肉害人濕食及酒漿臨上看視不見人物影者勿食之成卒注若已食腹脹者急以藥下之每十日一食葵葵滑所以通五臟擁氣又是菜之主不用合心食之又飲酒不欲使多多則速吐之為佳勿令至醉即終身百病不除久飲酒者腐爛腸胃漬髓蒸筋傷神損壽醉不可以當風臥不可令人扇之皆即得病也醉不可露臥黍穰中發癩瘡凡人醉不可強食或發癰疽或發瘖或生瘡醉飽不可以走車馬及跳躑醉不可接房醉飽交接小者面䵟咳嗽大者傷絕臟脈損命凡人飢欲坐小便若飽則立小便慎之無病又忍尿不便膝冷成痹忍大便不出成氣痔小便勿努令兩足及膝冷大便不用呼氣及強努令人腰疼目澁宜任之佳凡遇山水塢中出泉者不可久居常食作癭病又深陰地冷水不可飲必作痎瘧飲食以調時慎脫著凡人旦起著衣反者便著之吉衣光者當三振之曰殃去吉濕衣汗衣皆不可久著令人發瘡及風瘙大汗能易衣佳不易者急洗之不爾令人小便不利凡大汗勿偏脫衣喜得偏風半身不遂春天不可薄衣令人傷寒霍亂食不消頭痛脫著既時須調寢處凡人臥春夏向東秋冬向西頭勿北臥及牆北亦勿安床凡欲眠勿歌詠不祥睡起下床先須左足臥勿當舍脊下臥訖勿留燈令魂魄六神不安多愁怨人頭邊勿安火爐日久引火氣頭重目赤及鼻乾夜臥當耳勿有孔吹人即耳聾夏不欲露面臥令人面皮厚喜

成病或作面風冬夜勿覆頭得長壽凡人眠勿以脚懸蹋
高處久成腎水及損房足冷人每見十步直墻勿順墻而
風利吹人發癲及體重人汗勿跂床懸脚久成血痺兩足
折腰疼又不得當眠令人卧勿大語損人氣力暮卧
當閉口口開即失氣且邪惡從口入久而成消渴及失
血色屈膝側卧益人氣力勝正偃卧按孔子不尸卧故曰
睡不厭踧覺不厭舒凡人尸眠則有鬼病魘邪凡眠先卧
心後卧眼人卧一夜當作五度反覆常逐更轉凡人夜魘勿
燃燈喚之定死無疑魘暗喚之吉亦不得近前急喚夜夢惡
不須說旦以水面東方噀之呪曰惡夢著草木好夢成
珠玉即無咎矣又夢之善惡並勿說為吉衣食寢處皆能

順時者吉始不養生之道故善攝生者無犯日月之忌無
失歲時之和須知一日之忌暮無飽食一月之忌晦無大
醉一歲之忌暮無遠行終身之忌暮常無燃燭行房暮常
護氣也凡氣冬至起於湧泉十一月至膝十二月至股正
月至腰名三陽成二月至膊三月至項四月至頂純陽用
事之月也故冬至日於北壁下厚鋪草而卧云受元氣每
八月一日已後即微火暖足勿令下冷無生意常欲使氣
在下不欲泄於上春凍未泮衣欲下厚上薄養陽收陰繼
世長生養陰收陽禍則滅門故云冬時天地氣閉血氣伏藏
人不可作勞出汗發泄陽氣有損於人也又云冬日凍腦
春秋腦足俱凍此聖人之常法也春欲晏卧早起夏及秋

欲侵夜乃卧早起冬欲早卧而晏起皆益人雖云早起莫
在雞鳴前晏起莫在日出後凡冬月忽有大熱之時夏月
忽有大涼之時皆勿受之人有患天行時氣者皆由犯此
也即須調氣息使寒熱平和即免患也每當臘日勿歌舞
犯者必凶常於正月寅日燒白髮吉凡寅日剪手甲午日
剪足甲又燒白髮吉

居處法

凡人居止之室必須周密勿令有細隙致有風氣得入小
覺有風勿強忍久坐必須急急避之久居不覺使人中風
古來忽得偏風四肢不隨或如角弓反張或失音不語者
皆由忽此耳身既中風諸病總集邪氣得便遂此致卒者

十中有九是以大須周密無得輕之慎焉慎焉所居之室
勿塞井及水瀆令人聾盲凡在家及外行卒逢大飄風暴
雨震電昏暗大霧此皆是諸龍鬼神行動經過所致宜入
室閉戶燒香靜坐安心以避之待過後乃出不爾損人或
當時雖未若於後不佳矣又陰霧中不可遠行凡家中有
經像行來先拜之然後拜尊長每行至則峻焉凡居家
不必數沐浴若沐浴必須密室不得大熱亦不得大冷皆
生百病冬浴不必汗出霑沐浴後不得觸風冷新沐髮
訖勿當風勿濕縈髻勿濕頭卧使人頭風眩悶髮禿面黑
齒痛耳聾頭生白屑飢忌浴飽忌沐沐訖須進少許食飲
乃出夜沐髮不食即卧令人心虛饒汗多夢又夫妻不用

同。凡沐浴常以每日浴，隔日沐吉。凡炒湯經宿用，洗體成癬；洗面無光；洗腳即疼痛，作瘡；熱泔洗頭，冷水灌之，作頭風；飲水沐頭，亦作頭風。時行病新汗解，勿冷水洗浴，損心包，不能復。凡居家，常戒約內外長幼，有不快，即須早道，勿使隱忍以為無苦，過時不知，便為重病，遂成不救。小有不好，即按摩挼捺，令百節通利，泄其邪氣。凡人無問有事無事，常須日別蹋脊背四肢一度；頭項苦令熟蹋，即風氣時行不能著人。此大要妙，不可具論。凡人居家及遠行，隨身常有熟艾一升，備急丸、辟鬼丸、生肌藥、甘湯藥、丁腫藥、水銀、大黃、芒硝、甘草、乾薑、桂心、蜀椒，不能更蓄餘藥，此等常不可缺少。及一兩卷備急藥方，并帶辟毒蛇蜂蠍等藥。

隨身。凡人自覺十日已上康健，即須灸三數穴以泄風氣。每日必須調氣補瀉、按摩導引為佳，勿以康健便為常然，須常安不忘危，預防諸病也。其法當須避人，神氣為手力，細帶吞狀，皆須婉轉，偏業一度，則不中天行時氣也。

按摩法

天竺國按摩，此是婆羅門法。

兩手相捉紐捩，如洗手法。

兩手淺相叉，翻覆向胸。

兩手相捉共按脛，左右同。

以手如挽五石力弓，左右同。

兩手相重按髀，徐徐捩身，左右同。

作拳向前築，左右同。

作拳卻頓，此是開胸，左右同。

如拓石法，左右同。

以拳反捶背上，左右同。

兩手據地，縮身曲脊，向上三舉。

兩手抱頭，宛轉髀上，此是抽脅。

大坐斜身偏欹，如排山，左右同。

大坐伸兩腳，即以一腳向前虛掣，左右同。

兩手拒地回顧，此是虎視法，左右同。

立地反拗身三舉。

兩手急相叉，以腳踏手中，左右同。

起立以腳前後虛踏，左右同。

大坐伸兩腳，用相手勾所伸腳著膝中，以手按之，左右同。

右十八勢，但是老人日別能依此三遍者，一月後百病除，行及奔馬，補益延年，能食，眼明輕健，不復疲乏。

老子按摩法

兩手捺髀，左右捩身二七遍。

兩手捻髀，左右紐肩二七遍。

兩手抱頭，左右紐腰二七遍。

左右挑頭二七遍。

兩手托頭三舉之。

一手抱頭，一手托膝三折，左右同。

一手托頭，一手托膝，從下向上三遍，左右同。

兩手攀頭下向，三頓足。

兩手相捉頭上過，左右三遍。

兩手相叉托心前，推卻挽三遍。

兩手相叉著心三遍。

曲腕築肋挽肘，左右亦三遍。

左右挽，前後拔，各三遍。

舒手挽項，左右三遍。

反手著膝，手挽肘，覆手著膝上，左右亦三遍。

手摸肩從上至下使遍，左右同。

兩手空拳築三遍。

兩手相叉反覆攪各七遍。

外振手三遍內振三遍覆手振亦三遍
摩紐指三遍
兩手反捉三遍
兩手反叉上下扭肘無數單用十呼
兩手上聳三遍
兩手下頓三遍
兩手相叉頭上過左右申肋十遍
兩手拳反背上掘脊上下亦三遍搦指也
兩手反捉上下直脊三遍
覆手前聳三遍
覆手搦腕內外振三遍
覆手攙直腳聳三遍
覆手兩手相叉交橫三遍
舒左腳右手承之左手捺腳聳上至下直腳三遍右腳亦然
若有手患冷從上打至下得熱便休
前後拔足三遍
左拔足右拔足各三遍

前後卻拔足三遍
直腳三遍
細腰三遍
內外振腳三遍
若有腳患冷者打熱便休
細腰以寬步頓腳三遍
卻直腳三遍
虎據左右扭肩三遍
推天托地左右三遍
左右排山負山拔木各三遍
舒手直前頓申手三遍
舒兩手兩膝亦各三遍
舒腳直反頓申手三遍
搽內脊外脊各三遍

調氣法

彭祖曰道不在煩但能不思衣食不思聲色不思勝負不思曲直不思得失不思榮辱心無煩形勿極而兼之以導引行氣不已亦可得長年千歲不死凡人不可無思當以漸遣除之彭祖曰和神導氣之道當得密室閉戶安床煖席枕高二寸半正身偃臥瞑目閉氣於胸膈中以鴻毛著鼻上而不動經三百息耳無所聞目無所見心無所思如此寒暑不能侵蜂蠆不能毒壽三百六十歲此鄰於真人也[illegible]

[illegible]

道常以生氣時兩手於腳膝上徐徐按捺肢節口吐濁氣鼻[illegible]

[illegible]良久徐徐乃以手左托右托上托下前托後托瞋目張口叩齒摩眼押頭拔耳挽髮放腰咳嗽發揚振動也雙作隻作反手爲之然後掣足仰振數八十九十而止仰下徐徐定心作禪觀之法閉目存思想見空中太和元氣如紫雲成蓋五色分明下入毛際漸漸入頂如雨初晴雲入山透皮入肉至骨至腦漸漸下入腹中四肢五臟皆受其潤如水滲入地若徹則覺腹中有聲汩汩然意專思存不得外緣斯須即覺元氣達於氣海須臾則自達於湧泉則覺身體振動兩腳蜷曲亦令床坐有聲拉拉然則名一通一通二通乃至日別得三通五通則身體悅懌面色光輝鬢毛潤澤耳目精明令人食美氣力強健百病皆去五年十歲長存不忘得滿千萬通去仙不遠矣人身虛無但有遊氣氣息得理即百病不生若消息失

宜部諸疴癖起。善攝養者，須知調氣方焉。調氣方療萬病大患，百日生眉鬚，自餘者不足言也。凡調氣之法，夜半後日中前氣生，得調；日中後夜半前氣死，不得調。調氣之時，則仰臥床，鋪厚軟，枕高下共身平，舒手展腳，兩手握大拇指節，去身四五寸，兩腳相去四五寸，數數叩齒，飲玉漿，引氣從鼻入腹，足則停止，有力更取。久住氣悶，從口細細吐出盡，還從鼻細細引入，出氣一准前法。閉口以心中數數，令耳不聞，恐有誤亂，兼以手下籌，能至千，則去仙不遠矣。若天陰霧惡風猛寒，勿取氣也，但閉之。若患寒熱及卒患癰疽，不問日中，疾患未發前一食間即調，如其不得好瘥，明日依式更調之。若患心冷病，氣即呼出；若熱病，氣即吹出；若肺病則噓出；若肝病則呵出；若脾病則唏出；若腎病則呬出。夜半後八十一，雞鳴七十二，平旦六十三，日出五十四，辰時四十五，巳時三十六。欲作此法，先左右導引三百六十遍。病有四種：一冷痹，二氣疾，三邪風，四熱毒。若有患者，安心調氣，此法無有不瘥也。凡百病不離五臟，五臟各有八十一種疾，冷熱風氣計成四百四病，事須識其相類，善以知之。心臟病者，體冷熱，相法心色赤，患者夢中見人著赤衣，持赤刀杖火來怖人。療法用呼吹二氣，呼療冷，吹治熱。肺臟病者，胸背滿脹，四肢煩悶。相法肺色白，患者喜夢見美女美男詐親附人，共相抱持，或作父母兄弟妻子。療法用噓氣出。肝臟病者，眼疼，愁憂不樂，悲思，喜頭眼疼痛。相法肝色青，夢見人著青衣，捉青刀杖，或獅子虎狼來恐怖人。療法用呵氣出。脾臟病者，體上遊風習習，身痛煩悶。相法脾色黃，通土色，夢或作小兒擊歷人，邪猶人，或如旋風團欒轉。治法用唏氣出。腎臟病者，體冷陰衰，面目惡痿。相法腎色黑，夢見黑衣及獸物捉刀杖相怖。用呬氣出。冷病者用大呼三十遍，細呼十遍。呼法：鼻中引氣入，口中吐氣出，當令聲相逐，呼字而吐之。熱病者用大吹五十遍，細吹十遍。吹如吹物之吹，當使字氣聲似字。肺病者用大噓三十遍，細噓十遍。肝病者用大呵三十遍，細呵十遍。脾病者用大唏三十遍，細唏十遍。腎病者用大呬五十遍，細呬三十遍。此十二種調氣法，若有病依此法恭敬用心，無有不瘥。皆須左右導引三百六十遍，然後乃為之。

服食法

論曰：凡人春服小續命湯五劑，及諸補散各一劑；夏大熱則服腎瀝湯三劑；秋服黃芪等圓一兩劑；冬服藥酒兩三劑，立春日則止。此法終身常爾，則百病不生矣。俗人見淺，但知鉤吻之殺人，不信黃精之益壽；但識五穀之療飢，不知百藥之濟命；但解施泄以生育，不知固秘以頤養。故有服餌方焉。郗愔曰：夫欲服食，當尋性理所宜，審冷暖之適，不可見彼得力，我便服之。初御藥皆先草木，次石，是為將藥之大較也。所謂精粗相代，階粗以至精者也。夫人從少至長，體習五穀，卒不可一朝頓遣之。凡服藥物，為益遲微

千金作受

即通九州之路，此積年不已，方能骨髓填實，五穀居然而自斷。今人多望朝夕之效，求目下之應，腑臟未充，便以絕粒，穀氣始除，藥未有用，又將御女，形神與俗無別，以此致弊，胡不怪哉。服餌大體皆有次第，不知其術者，非止交有所損，案亦不得其力。故服餌大法，必先去三蟲，三蟲既去，次服草藥，好得藥力，次服木藥，好得力訖，次服石藥，依此次第，乃得遂其藥性，庶事安穩，可以延齡矣。

去三尸蟲圓

生地黃汁三斗，東向竈葦火煎三沸，以清漆二升，以荊匕攪之，日移一尺，納真丹三兩，復移一尺，納瓜子汁三升，復移一尺，納大黃末三兩，微火勿令焦，候可丸圓，如梧桐子大，先食服一丸，日三，濁血下鼻中，三十日諸蟲皆下，五十日百病愈，面色有光澤。

又方

漆二升　蕪菁子三升，末　大黃六兩，末　酒二升半（千金作升半）

右以微火合煎，令可丸，如梧桐子大，先食服三丸，十日濁血下出鼻中，三十日蟲皆爛下，五十日身光澤，一年行及奔馬，消息四體安穩，乃可服草藥。

服天門冬方

天門冬曝乾，擣下篩，食後服方寸匕，日三，可至十服，小兒服尤良，與松脂蜜丸服之益善，惟多彌佳。

又方：擣取汁，微火煎，取五斗，下白蜜一斗，胡麻炒末二

地黎者　　下

升，合攪，微火煎之，勿息，可丸即止，火下大豆黃末，和為餅，徑三寸，厚半寸，一服一枚，日三，百日已上，得益。此方最妙。包果方一法，釀酒服始傷多，先苦，後卽出去病也。

天門冬酒釀法

取天門冬淨洗，去心皮，令人利搗，絞取汁一斗，漬麴二升，麴發，以糯米二斗，准家醞法造酒，春夏極冷下飯，秋冬溫如人肌，此酒和熟，味酸，仍作臭泔腥氣，但服之，久停則香美，餘酒皆不及。封四七日佳。凡八月九月即少少合，至十月多合，擬到來年五月三十日以來相續服之，春三月亦得合，入四月不得合。服酒時若再得天門冬，去心皮，曝乾，擣細末，以上件酒服方寸匕，日三，加至三七，久服長生，補中益氣，愈百病也。治虛勞絕傷，年老衰損羸瘦，偏枯不隨，風濕不仁，冷痺，心腹積聚，惡瘡癰疽，腫癩疾，重者周身膿壞，鼻柱敗爛，服之皮脫出顏色肥白，髮黑齒落再生，入水不濡，二百日後怡泰疾救，拘急者緩，羸劣者強，三百日身輕，三年走及奔馬，又三年心腹痼疾皆去。

服地黃法

生地黃五十斤，擣之，絞取汁，澄去滓，微火上煎減過半，納白蜜五升，棗脂一升，攪令相得，可丸乃止，每服如雞子一枚，日三，令人肥白。

又方

天
之

地黃十斤細切以醇酒二斗漬之三宿出曝乾反覆內漬
取酒盡止與甘草巴戟天厚朴乾漆覆盆子各一斤搗
下篩食后酒服方寸匕日三加至二匕使人老者還少
強力無病延年

作熟地黃法
採地黃去鬚葉及細根搗絞取汁以漬肥者著甑中
蒸之一時出曝燥更內汁中又蒸汁盡止便乾之亦可
直切蒸之半日數以酒洒之使周匝至夕出曝乾可搗
為末煉蜜圓服之

種地黃法
先擇好地黃赤色虛軟者深耕之臘月逆耕凍地彌好
擇肥大好地黃根切長四五分至三寸許一斛可種一
畝二三月種之作畦畔相去一尺生后隨鋤壅數芸之

黃精膏方
黃精一石去鬚毛洗令淨潔打碎蒸令好熟壓得汁
復煎去上游水得一斗內乾薑末三兩桂心末一兩微火
煎看色鬱鬱然欲黃便去火待冷盛不津器中酒五合
和服二合常未食前日二服舊皮脫顏色變光花色有
異鬢髮更改欲長服者不須和酒內生大豆黃絕穀食
之不飢渴長生不老

服烏麻法
取黑皮真檀色者烏麻隨多少水拌令潤勿過濕蒸令
氣遍即出曝乾如此九蒸九曝去上皮末食前和水若
酒服二方寸匕日三漸漸不飢絕穀久服百病不生常
服延年不老

餌柏實方
柏子仁二升搗令細醇酒四升漬攪如泥下白蜜二升
棗膏三升搗令可圓入乾地黃末白术末各一升攪和
圓如梧桐子大每服三十圓日二服二十日萬病皆愈

餌松子方
七月七日採松子過時即落不可得治服方寸匕日三
四一云一服三合百日身輕三百日行五百里絕穀服
昇仙渴飲水亦可和脂服之若圓如梧桐子大服十圓

服松脂方
百鍊松脂下篩以蜜和內角中勿令中風日服如博棊
子大博棊長二寸日三漸漸月別服一斤不飢延年亦可
醇酒和白蜜如餳日服一二兩至半斤凡取松脂老松
皮自有聚脂者最第一其根下有傷折處不見日月者
得之名曰陰脂彌良惟衡山東行五百里有大松皆三
四十圍乃多脂又法五月刻大松陽面使向下二十四
株一株可得半斤亦取其老節根處有脂者得用仙經云
常以三月入衡山之陰取不見日月松脂煉而餌之即
不召而自來服之百日耐寒暑二百日五臟補益服之
五年即見西王母仙經又云諸石所生三百六十五山

其可食者滿谷陰懷中松脂耳其谷正在衡山嶺直東
四百八十里當損提正在横嶺東北行過其南入谷五
十里窮穴有石城白鶴其東方有大石四十餘丈狀如
白松松下二丈有小穴東入山有丹砂可食其南方陰
中有大松大三十圍有三十餘株不見日月皆可取服之

採松脂法
以日入時破其陰以取其膏破其陽以取其脂脂膏等
分食之可以通神靈鑿其陰陽為孔令方五寸深五寸
還以皮掩其孔無令風入風入則不可服以春夏時取
東
之取訖封塞勿泄以泥塗之東北行丹砂穴有陰泉水
可飲此弘農車君以元封元年入此山食松脂十六年
復下居長安東市在上谷牛頭谷時往來至一奇嶺上年
常如三十歲

煉松脂法
松脂七斤以桑灰汁一石煮脂三沸接置冷水中凝復
煮之凡十遍脂白矣可服今谷在衡州東南攸縣界此
松脂與天下松脂不同

餌茯苓方
茯苓十斤去皮酒漬密封下十五日出之取服如博棋
日三亦可屑服方寸匕凡餌茯苓皆湯煮四五沸或以
水漬六七日

千金合下有一劑終身不飢七字

茯苓酥方
茯苓五斤灰汁煮十遍漿水煮十遍清水煮十遍 松脂五斤如茯苓法每次煮四十遍
生天門冬五斤去心皮曝乾作末 牛酥三斤
白蜜三斤煉令沸 蠟三斤煉三十遍
右各搗篩以銅器重湯上先內酥次蠟次蜜消訖內藥
急攪勿住手務令大均內瓷器中密封勿令泄氣先一
日不食欲不食先須吃好美食極飽然後絕食即服二
兩二十日後服四兩又二十日後八兩細丸之以咽中
下為度第二度以四兩為初二十日後八兩又二十日
二兩第三度服以八兩為初二十日二兩又二十日四兩
合一百八十日藥成自後服三丸將補不服亦得恒以
酥蜜消息之美酒服一升為佳合藥須取四時王相日
特忌刑殺厭及四激休廢等日大凶 此彭祖法

茯苓膏方
茯苓淨去皮 松脂二十四斤 松子人 柏子人各十二斤
右皆依法煉之松柏人不煉搗篩白蜜二斗四升內銅
器中湯上微火煎一日一夕次第下藥攪令相得微火
煎七日七夜止丸如小棗每服七丸日三欲絕穀頓服
取飽即得輕身明目不老

服枸杞根方主養性遐齡
枸杞根切一石水一石二斗煮取六斗澄清煎取三升
以小麥一斗乾淨擇內汁中漬一宿曝乾往返令汁盡
曝乾搗末酒服方寸匕日二一年之中以二月八月各

白　淡　湿十金作研　如水

煉鍾乳粉法

鍾乳一斤，不問厚薄，但取白淨十分好者，即任用，非此者不堪用。先泥鐵鐺，可受四五斗者為竈，貯水令滿，去口三寸，內乳著金銀瓷甕內，任有用之，乃下鐺中，令水沒甕上一寸餘，即得。常令如此，勿使出水也。微火燒，日夜不絕，水欲竭即添成暖水，每一周時輒易水洗鐺并乳，七日七夜出之，淨洮乾，內瓷缽中，玉搥縛格，少著水研之，一日一夜，急著水攪令大濁，澄取濁汁，其乳粗者自然著底，作末者即自作濁水出，即經宿澄取其粗著底者，准前法研之。凡五日五夜，皆細逐好作粉，好用澄鍊取曝乾，即更於鐵缽中研之一日，候入水洗不落著樣。

食千金作用

鍾乳散

鍾乳粉（成鍊者）　上黨人參　石斛　乾薑各三分

右四味，搗下篩，三味與乳合和，相得均分作九貼，平旦空腹溫淳酒服一貼，日午後服一貼，黃昏後服一貼，三日後准此服之。凡服此藥法，皆三日一劑，三日內止食一升半飯、一升肉，肉及飯惟爛，不得服葱豉。問曰：何故三日少食，勿得飽也？答曰：三日三夜乳在腹中，熏補臟腑，若此飽食，及推藥出腹，所以不得飽食也。何故不得生食？由食生，故即損傷藥力，藥力既損，臟腑亦傷，所以不得食生食也。何故不得食葱豉？葱豉殺藥，故不得食也。三日服藥訖，盡三日內須作美食補之，任意所便，仍不用葱豉及硬食也。三日補訖，還須准正服藥，如前盡此一斤乳訖，其氣力當自知耳，不能具述。一得此法，其後服一斤二十斤，任意方便可知也。

式　遲

西嶽真人靈飛散方

雲母粉一斤　茯苓八兩　鍾乳粉　柏子人　人參　續斷　桂心各七兩　菊花十五兩　乾地黃十二兩

右九味為末，生天門冬十九斤取汁，溲藥，內銅器中，蒸一石二斗黍米下，米熟，曝乾為末，先食飲服方寸匕，日一。三日力倍，五日血脉充盛，七日身輕，十日面色悅澤，十五日行及奔馬，三十日夜視有光，七十日白髮盡落，故齒皆去。更取二十一匕，白蜜和搗二百杵，丸如梧桐子，大作八十一枚，曝乾，丸皆映徹如水晶珠，欲令髮齒時生者，吞七枚，日三服，即出。髮未白、齒未落者，但服散五百年乃白，如前法服。已白者，餌藥至七百年乃落，入山日吞七丸，絕穀不飢。余得此方以來，將逾三紀，頃者但美而悅之，疑而未敢措手，積年詢訪，屢有好名人，嘗餌得力，遂服之，一如方說，但能業之不已，功不徒棄耳。

黃帝雜忌法

旦起勿開目洗面，令人目澁失明，饒淚。清旦常言善事，勿

三 歎 怒 善

惡言聞惡事，即向所來方唾之吉。又勿嗔怒，勿叱咤咄咲，勿嗟嘆，勿唱奈何，名曰請禍。勿立膝坐而交臂膝上，勿令髮覆面，皆不祥。勿舉足向火，勿對灶罵詈。凡行立坐勿背日，吉。勿面北坐久思，不祥起。凡欲行來，常存魁綱在頭上，所向皆吉。若欲征戰，存斗柄在前以指敵，吉。勿面北冠帶，凶。勿向西北唾，犯魁綱神，凶。勿咳唾，唾不欲遠，成肺病，令人手足重及背痛咳嗽。勿向西北大小便。勿殺龜蛇。勿怒目視日月，令人失明。行及乘馬不用回顧，則神去人。不用見行路尸。凡遇神廟，慎勿輒入，入必恭敬，不得舉目恣意顧瞻，當如對嚴君焉，乃享其福耳；不爾，速獲其殃。亦不得返首顧視神廟。忽見龍蛇，勿興心驚怪，亦勿注意瞻視。（白千金作見）忽有光怪變異之事，即強抑之勿怪。諺曰：見怪不怪，其怪自壞。又路行及眾中見殊妙美女，慎勿熟視而愛之，此當魑魅之物，使人深愛。無問深山曠野，稠人廣眾之中，皆亦如之。凡山水有沙虱處，勿在中浴，害人。欲渡者，當隨驢馬後急渡，不傷人。有水弩處，射人影即死。欲渡水者，以物打水，其弩即散，急渡不傷人。諸山有孔穴，入采寶者，唯三月、九月，餘月山閉氣交，死也。凡人空腹不用見尸，臭氣入鼻，舌上白起，口常臭。欲見尸者，皆須飲酒，見之能辟毒。遠行觸熱，途中逢河，勿洗面，生烏䵟。

（千金無此字者　千金途上作逢大路　猶行）

房中補益法

論曰：人年四十以下多有放恣，四十以上即頓覺氣力一時衰退，衰退既至，眾病蜂起，久而不治，遂至不救。凡人氣力自有盛而過人者，亦不可抑忍，久而不泄，致生癰疽。若年過六十，強有數旬不得交合，意中平平者，自可閉固也。昔貞觀初，有一野老，年七十餘，詣余云：數日來陽氣益盛，思與家嫗晝寢，春事皆成，未知垂老有此，為善惡耶？余答之曰：是大不祥。子獨不聞膏火乎？夫膏火之將竭也，必先暗而後明，明止則滅。今足下年邁桑榆，久當閉精息欲，茲忽春情猛發，豈非反常耶？竊為足下憂之，子其勉歟。後四旬發病而死，此其不慎之效也。如斯之輩非一，且疏一人，以勖將來耳。所以善攝生者，凡覺陽事輒盛，必謹而抑之，不可縱心竭意以自賊也。若一度制得，則一度火滅，一度增油；若不能制，縱情施瀉，即是膏火將滅，更去其油，可不深自防。所患人少年時不知道，知道亦不能信行之，至老乃知道，便以晚矣，病難養也。晚而自保，猶得延年益壽。若年少壯而能行道者，神仙速矣。或曰：年未六十，當閉精守一，為可爾否？曰：不然。男子不可無女，女不可無男，無女則意動，意動則神勞，神勞則損壽。若念真正無可思者，則大佳，長生也。然而萬無一有。強抑鬱閉之，難持易失，使人漏精尿濁，以致鬼交之病，損一而當百也。交會者當避丙丁日，及弦望晦朔，大風大雨，大霧大寒，大暑大雷電大霹靂，天地晦冥，日月薄蝕，虹霓地動，則損人神不吉，損男百倍，令女得病，有子必癲癡頑愚，瘖啞聾聵，攣跛盲眇，多病短

壽、不孝不仁、又避日月星辰、火光之下、神廟佛寺之中、井竈圊廁之側、塚墓尸柩之傍、皆所不可。夫交合如法、則有福德大智善人降託胎中、仍令性行調順、所作和合、家道日隆、祥瑞競集。若不如法、則有薄福愚癡惡人來託胎中、仍令父母性行凶險、所作不成、家道日否、殃咎屢至、雖生成長、家國滅亡。夫禍福之應、有如影響、此乃必然之理、可不再思之。若欲求子者、但待婦人月經絕後一日三日五日、擇其王相日、如春甲乙、夏丙丁、秋庚辛、冬壬癸、以生氣時夜半後乃施瀉、有子皆男、必壽而賢明高爵也。以月經絕後二日四日六日施瀉、有子必女、過六日後勿得施瀉、既不得子、亦不成人。人若方新沐、頭血氣未定、因以交合、令人發癰疽、又不可忍小便以交合、使人淋、莖中痛、面失血色、及遠行疲乏來入房、為五勞虛損少子。婦人月事未絕而與交合、令人成病、得白駮也。

孫真人養生書　卷終

[stamp]